This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HN 4T8H C

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOLTURA.

UFFICIO ORNITOLOGICO.

PRIMO RESOCONTO

DEI RISULTATI DELLA INCHIESTA ORNITOLOGICA IN ITALIA.

PARTE SECONDA

AVIFAUNE LOCALI.

RISULTATI DELLA INCHIESTA ORNITOLOGICA

NELLE SINGOLE PROVINCIE

COMPILATO DAL DOTTORE

ENRICO HILLYER GIGLIOLI

Professore ordinario di Zoologia e Anatomia dei Vertebrati
nel R. Istituto di Studi Superiori di Firenze, Membro del Comitato ornitologico internazionale
e Direttore dell' Ufficio ornitologico.

FIRENZE.

COI TIPI DEI SUCCESSORI LE MONNIER.

1890.

Digitized by Google

Z 82.0145 I 1

Transferred from
Social Ethics Library

Digitized by Google

SOMMARIO.

Sottoregione Continentale o Settentrionale.

PIEMONTE ..... Pag. 2

Provincia di Cuneo ivi

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in questa provincia 3
Specie che vi nidificano 13
Specie che vi sono di passaggio regolare 17
Specie che vi fanno apparizione accidentale 19

Provincia di Torino 20

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in questa provincia 22
Specie che vi sono sedentarie 28
Specie che vi nidificano 29
Specie che vi sono di passaggio regolare 32
Specie di comparsa accidentale 37

Provincia di Alessandria 38

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in questa provincia 39
Specie che vi sono sedentarie 46
Specie che vi nidificano ivi
Specie che vi fanno passo regolare 48
Specie che vi sono di comparsa accidentale 51

Provincia di Novara 52

Distretto di Ossola ivi

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nel circondario di Ossola 54

Distretti di Varallo, Piedimulera e Crodo 64

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in questi distretti 68

Digitized by Google

Specie sedentarie nel distretto di Varallo ..... Pag. 73
Specie sedentarie nel distretto di Crodo 74
Specie sedentarie nel distretto di Piedimulera ivi
Specie erratiche nel distretto di Varallo 75
Specie erratiche nel distretto di Crodo ivi
Specie erratiche nel distretto di Piedimulera 76
Specie che nidificano nei distretti di Varallo e Piedimulera. 77
Specie di passaggio regolare nella provincia di Novara... 99

LOMBARDIA 102

PROVINCIA DI SONDRIO ivi

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in questa provincia 103
Specie che vi sono sedentarie 110
Specie che vi nidificano 111
Specie di passaggio regolare 114

PROVINCIA DI BERGAMO 115

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in questa provincia ivi
Specie sedentarie 120
Specie che vi nidificano 121
Specie di passaggio regolare 122
Specie di comparsa accidentale 126

PROVINCIA DI MILANO ivi

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in questa provincia 127
Specie sedentarie nel circondario di Gallarate 133
Specie che nidificano in questo circondario 134

Distretto Medio Milanese 135

Elenco di specie di uccelli osservate in questo distretto .. 136

PROVINCIA DI CREMONA 138

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in questa provincia 139

PROVINCIA DI MANTOVA 149

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in questa provincia 150

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in Lombardia 157
Specie che vi sono sedentarie 166
Specie che vi nidificano 167
Specie di passaggio regolare 170

Digitized by Google

VENETO ..... Pag. 173

Provincia di Verona ivi

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in questa provincia 174

Provincia di Vicenza 178

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in questa provincia 181

Specie che vi nidificano 186

Specie che vi sono di passaggio 190

Distretto di Bassano 194

Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 195

Provincia di Belluno 197

Elenco generale delle specie di uccelli che si trovano in questa provincia 202

Provincia di Udine 215

Elenco generale delle specie di uccelli che si trovano in questa provincia 217

Distretto di Cividale 229

Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 231

Provincia di Padova 239

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in questa provincia ivi

Provincia di Rovigo 251

Elenco generale delle specie di uccelli osservate in questa provincia 252

Specie che vi nidificano 259

EMILIA 263

Provincia di Bologna ivi

Distretto di Vergato ivi

Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 264

Provincia di Parma 268

Elenco delle specie di uccelli osservate in questa provincia. 269

Sottoregione Peninsulare o Meridionale.

LIGURIA 275

Provincia di Genova ivi

Digitized by Google

Circondario di Savona ..... Pag. 275
Elenco delle specie di uccelli osservate in questo circondario 277
Distretto di Arenzano 287
Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 288
Specie che vi nidificano 297
Distretto di Spezia 301
Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 302

TOSCANA 317
Provincia di Lucca ivi
Elenco delle specie di uccelli osservate in questa provincia. 318
Specie di passaggio regolare nei distretti di Massarosa e Viareggio 336
Provincia di Pisa 339
Elenco delle specie di uccelli osservate in questa provincia. 343
Specie che vi nidificano 354
Provincia di Firenze 358
Elenco delle specie di uccelli osservate in questa provincia. 361
Specie nidificanti nel distretto di Fiesole 380
Specie di passaggio regolare in questo distretto 381
Provincia di Arezzo 386
Distretto del Casentino ivi
Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 389
Provincie di Arezzo e Siena 397
Distretto di Val di Chiana ivi
Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 399
Provincia di Siena 413
Distretto di Sarteano ivi
Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 419
Distretto di San Gimignano 424
Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 426
Provincie di Siena e Grosseto 431
Elenco delle specie di uccelli osservate in queste provincie. 437
Provincia di Grosseto 453
Isola di Giglio ivi
Elenco delle specie di uccelli osservate in quest'isola ivi

Elenco delle specie di uccelli osservate in Toscana 457

Digitized by Google

MARCHE ..... Pag. 472

Provincia di Ancona ivi

Elenco delle specie di uccelli osservate in questa provincia. 474

LAZIO 484

Provincia di Roma ivi

Distretto di Viterbo e Montefiascone ivi

Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 485

ABRUZZI 488

Provincia di Campobasso ivi

Distretto di Jelsi ivi

Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. ivi

CAMPANIA 491

Provincia di Napoli ivi

Elenco delle specie di uccelli osservate in questa provincia. 493

Isola di Capri 500

Elenco delle specie di uccelli osservate in quest' isola.... 502

PUGLIE 506

Elenco delle specie di uccelli osservate nelle Puglie ivi

CALABRIE 528

Provincia di Catanzaro ivi

Distretto di Maida ivi

Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto.. 529

Provincia di Reggio 536

Elenco delle specie di uccelli osservate in questa provincia. 539

Sottoregione insulare.

SICILIA 545

Provincia di Messina ivi

Elenco delle specie di uccelli osservate in questa provincia. 551

Provincia di Siracusa 565

Distretto di Lentini e Carlentini ivi

Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 566

Digitized by Google

Distretto di Modica ..... Pag. 568
Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 569
Specie che vi nidificano 576

Provincia di Caltanissetta 579
Distretto di Terranova ivi
Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 581

Provincia di Palermo 599
Distretto di Castelbuono-Madonie ivi
Elenco delle specie di uccelli osservate in questo distretto. 601

SARDEGNA 610
Elenco delle specie di uccelli osservate nell' isola di Sardegna ivi

CORSICA 631
Elenco delle specie di uccelli osservate in Corsica 632

INDICE DEI NOMI SCIENTIFICI 643

INDICE DEI NOMI VOLGARI 665

Errata-Corrige 695

Aggiunte 697

Digitized by Google

II. — RISULTATI

DELLA

INCHIESTA ORNITOLOGICA

NELLE SINGOLE PROVINCIE.

In questa parte del mio Resoconto intendo raccogliere i materiali che servono a dare un' idea dell'*Avifauna* speciale a ciascuna delle nostre provincie; onde le notizie ricevute dai diversi collaboratori saranno ordinate a tale scopo geograficamente, ed ogni elenco speciale sarà preceduto dai cenni fisiografici locali e da altre notizie d' indole corrispondente.

Va rammentato che queste notizie rispondono ai quesiti: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della categoria **A**, *Osservazioni di natura generale.* Essi sono i seguenti:

1. — Indicare i confini del distretto di osservazione, dando possibilmente un cenno succinto intorno alla costituzione topografica del medesimo con brevi notizie fisiografiche.

2. — Quali sono le specie di uccelli ben note all'osservatore, e quali nomi volgari portano nel distretto? Indicare quali sono più frequenti, quali più scarse; indicare inoltre quali vivono in pianura, quali in montagna, quali contemporaneamente al piano ed ai monti.

3. — Quali specie vi sono sedentarie, cioè rimangono tutto l'anno nelle medesime località del distretto osservato?

Digitized by Google

4. — Quali specie vi sono erratiche, cioé cangiano col variar della stagione il loro luogo di dimora, e. g. dai monti scendono al piano?

5. — Quali specie vengono osservate solamente di passaggio regolare, sia soltanto nella primavera, sia soltanto nell'autunno, sia in entrambe quelle stagioni? Indicare i mesi e possibilmente la quindicina del passo.

6. — Quali specie sono da considerarsi di apparizione accidentale, e quali motivi sono addotti per tali comparse irregolari od avventizie?

Inoltre ho creduto più conveniente riportare qui le risposte al 1° quesito della categoria **C**, *Osservazioni intorno alla nidificazione*, cioè:

1. — Quali specie nidificano nel distretto? Notare: il numero delle covate fatte da ogni specie durante la stagione; l'epoca di ogni singola covata, e di quante uova consiste; se vi sono intervalli nella deposizione delle uova; la durata della incubazione; dire se vi prende parte anche il maschio.

Sottoregione Continentale o Settentrionale.

PIEMONTE.

Cuneo (Abre capitano Vincenzo):

La provincia di Cuneo confina a NE. con quella di Torino, a NO. e SO. colla Francia, all'E. colla provincia di Alessandria ed al SSE. con quella di Genova.

La provincia suddetta offre molte varietà nel suo territorio: da una parte le Alpi marittime, le cui sommità sempre o quasi sempre coperte di neve, fanno un bellissimo contrasto coi ridenti colli ammantati di verdura e colle ampie e feraci valli, adombre di selve e feconde di buoni pascoli, le quali vanno gradatamente stendendosi in vaste e fertili pianure, ricche di ogni sorta di vegetali.

Digitized by Google

Dalle circostanti Alpi scendono molti fiumi e ruscelli che trascorrono la provincia in ogni sua parte.

Le colline ed i poggi sono per lo più coltivati a vite nella parte media e superiore, a cereali e legumi nella parte inferiore.

Circa alla pianura, dessa occùpa la parte settentrionale della provincia, è ricoperta di terre vegetali assai produttive, ed è popolata in gran numero di gelsi ed alberi fruttiferi che ne formano uno dei principali redditi.

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nella provincia di Cuneo, coi nomi volgari locali ed indicazioni di frequenza, di ubicazione, quali sono sedentarie e quali erratiche.

Corvus Corax, *Crouas*, *Cournajas real.* Scarso ai monti, sedentario.

Corvus Corone, *Crov*, *Cournajas.* Frequente ai monti, d'inverno al piano, erratica.

Corvus Cornix, *Cournajas gris*, *Croos bianch.* Frequente ai monti, d' inverno al piano, erratica.

Corvus frugilegus, *Crov*, *Cournajas.* Frequente d' inverno.

Lycos Monedula, *Cournajas pcit.* Scarsa. (Finora un solo esemplare mi è capitato).

Nucifraga Caryocatactes, *Bert franseis*, *Verrou.* Scarsa ai monti, sedentaria.

Pica rustica, *Berta*, *Ajassa.* Frequente al piano, sedentaria.

Garrulus glandarius, *Gaj*, *Bert*, *Ghè.* Frequente ovunque, sedentaria.

Pyrrhocorax alpinus, *Gioja*, *Cioja del bech giaun.* Frequente ai monti, sedentario.

Pyrrhocorax Graculus, *Gioja*, *Cioja del bech rouss.* Frequente ai monti, sedentario.

Sturnus vulgaris, *Stourn*, *Stournel.* Frequente al piano.

Pastor roseus, *Stournel d' mariña.* Scarso al piano.

Digitized by Google

Fringilla cœlebs, *Pinsoun*, *Frangouei*, *Cincin*. Frequente ovunque, sedentario.

Fringilla Montifringilla, *Mountan*, *Mountanel*. Frequente ai monti, d'inverno al piano.

Montifringilla nivalis, *Franguel dla fiocca*, *Arpan*, *Nevareul*. Scarso ai monti, sedentario.

Petronia stulta, *Passra marenga*, o *d'mountagna*. Frequente.

Passer montanus, *Passarot di sales*, o *d'rasa pcita*, *Miarola*. Frequente al piano, sedentaria.

Passer Italiæ, *Passarot doumesti* o *d'rasa grossa*. Frequente al piano, sedentaria.

Coccothraustes vulgaris, *Fruson*, *Bech dur*. Frequente ai monti e al piano.

Ligurinus Chloris, *Verdoun*. Frequente al piano ed ai monti, sedentario.

Chloroptila Citrinella, *Canarin d'mountagna*. Scarso ai monti, sedentario.

Chrysomitris Spinus, *Tarin*, *Virafeuje*, *Lucarin*. Frequente ovunque, erratico.

Carduelis elegans, *Cardlin*, *Ciardoulina*. Frequente ovunque, sedentario.

Serinus hortulanus, *Sirin*, *Serin*. Scarso ai monti.

Cannabina Linota, *Fanel*, *Fanét*. Frequente ai monti e al piano.

Ægiothus Linarius, *Tarin*, *Tarin d'mar*. Scarso ai monti.

Ægiothus rufescens, *Tarin d'mar pcit*. Scarso ai monti.

Pyrrhula europæa, *Cifoulot*, *Ciuffoulot*. Scarso ai monti, erratico.

Loxia Curvirostra, *Bech an crous*, *Bech stort*. Scarso ai monti ed al piano.

Miliaria Projer, *Predicatour*, *Ambroun*, *Cantaris*. Scarso ai monti.

Emberiza Citrinella, *Ambra*, *Giauné*, *Pajarina*. Frequente ovunque, erratico.

Emberiza Cirlus, *Zisi*, *Barbisa*, *Trasola grisa*. Scarso ai monti.

Emberiza Hortulana, *Ourtoulan*, *Trasola*. Frequente ovunque.

Emberiza Cia, *Barbisa*, *Fanin*, *Zia*. Frequente ai monti.

Digitized by Google

Emberiza pusilla. Accidentale.

Emberiza Schœniclus, *Passra d' lesca*, *Scrivañ*. Frequente al piano.

Calcarius nivalis, *Ourtoulan bianch*, *Ambra dla fiocca*. Scarso.

Alauda arborea, *Loudoulina*, *Loudnin*, *Subiarola*. Frequente ovunque.

Alauda arvensis, *Lodna*, *Lodoula*, *Traciola*. Frequente al piano.

Galerita cristata, *Lodoula*, *Traciola*, *Ciouflù*. Frequente al piano.

Agrodroma campestris, *Stroubioun*, *Piourousa*. Scarso ai monti.

Anthus pratensis, *Vainetta*, *Ouvina*, *Grassetta*. Frequente ovunque.

Anthus trivialis, *Vainetta*, *Ouvina*, *Grassetta*. Frequente ovunque.

Anthus Spipoletta, *Vainetta*, *Grassetta da eva*. Frequente ai monti, d' inverno al piano.

Budytes flavus, *Balarina*, *Bouarina*. Frequente al piano.

Budytes cinereocapillus, *Balarina*, *Bouarina*. Scarsa al piano.

Motacilla alba, *Balarina*, *Fournera*. Frequente al piano, sedentaria.

Calobates melanope, *Balarina*, *Bouarina*. Frequente al piano.

Saxicola Oenanthe, *Cul bianch*, *Picamoute*. Scarso ai monti.

Saxicola Stapazina, *Cul bianch d' mountagna*. Assai scarsa ai monti.

Monticola saxatilis, *Passra soulitaria roussa*, *Roussigneul*. Scarso ai monti.

Monticola Cyanus, *Passra soulitaria bleu*. Scarsa ai monti.

Merula nigra, *Merlou*. Frequente ovunque e sedentario.

Merula torquata, *Griva savojarda*, *Ciach-ciach*. Scarso ai monti, sedentario.

Turdus pilaris, *Griva d' mountagna*, *Ciaciara*. Frequente ai monti ed al piano, d' inverno.

Turdus iliacus, *Tourd subioulin*, *Subiot*, *Tourd chilour*. Frequente d' inverno.

Turdus musicus, *Tourd*, *Griva del geneiver*. Frequente.

Turdus viscivorus, *Griva*, *Grivass*. Frequente al piano, sedentaria.

Digitized by Google

Aëdon Luscinia, *Arsigneul*, *Ransigneul*. Frequente al piano.

Erithacus Rubecula, *Piciourouss*, *Petrouss*. Frequente ai monti, erratico.

Cyanecula Wolfi, *Stomi bleu*, *Icét dla steila*. Scarso ai monti.

Ruticilla Phœnicurus, *Cul rouss*, *Cuvaroussa*. Frequente ai monti.

Ruticilla titys, *Couvaroussa*, *Bouciard*, *Piroulét*. Scarso ai monti.

Pratincola Rubicola, *Pounta d'melia*, *Pitamoutas*. Frequente ovunque.

Pratincola Rubetra, *Pounta d'melia*, *Pitamoutas*. Frequente ovunque.

Sylvia orphæa, *Capneir d'mountagna* o *gross*. Scarso ai monti.

Sylvia cinerea, *Canavrota*, *Bianchet*. Frequente ovunque.

Sylvia Curruca, *Canavirola*, *Canavrota di busson*. Scarsa.

Monachus Atricapillus, *Capneir*. Frequente al piano.

Monachus hortensis, *Canavrota*, *Canavirola*. Frequente al piano.

Phylloscopus sibilator, *Cincin verd*. Frequente ovunque.

Phylloscopus Trochilus, *Cincin giaun*. Frequente ovunque.

Phylloscopus Bonellii, *Cincin bianch*. Scarso.

Phylloscopus rufus, *Cincin pcit*. Frequente ovunque.

Hypolais icterina, *Ciancin*, *Cincin*. Scarso al piano.

Acrocephalus palustris, *Ransigneul dle cane pcit*. Scarsa al piano.

Acrocephalus arundinaceus, *Ransigneul dle cane*, *Re di Ransigneui*. Scarso al piano.

Potamodus luscinioïdes, *Lescariña*, *Pajarola*. Scarsa al piano.

Troglodytes parvulus, *Re pcit*, *Re cucala*. Frequente ai monti, erratico.

Cinclus aquaticus, *Merlou da eva*, *Pioumba*. Frequente ed erratico.

Accentor collaris, *Fola*, *Boulou*, *Folariga*. Frequente ai monti, sedentario.

Accentor modularis, *Mouretta*, *Grisareul*, *Vitounetta*. Frequente ovunque, erratica.

Regulus cristatus, *Steila d'or*, *Regiña*. Frequente ai monti, d'inverno al piano, erratico.

Digitized by Google

Regulus ignicapillus, *Steila d' or*, *Regiña*. Frequente ai monti, d' inverno al piano, erratico.

Ægithalus pendulinus, *Taschet*, *Boursalin*, *Fiaschet*. Scarso al piano.

Acredula caudata, *Tupinet*, *Couva lounga*, *Manicujè*. Scarsa ai monti, erratica.

Acredula rosea, *Tupinet*, *Couva lounga*, *Manicujè*. Frequente ovunque, erratica.

Panurus biarmicus. Scarso al piano.

Parus major, *Testa neira*, *Ciribibì*, *Pitavia grossa*. Frequente ovunque, sedentaria.

Parus ater, *Testa neira*, *Pitavia mora*. Scarsa ai monti, erratica.

Cyanistes cæruleus, *Parussiña*, *Testa bleu*. Frequente ovunque.

Pœcile palustris, *Testa neira*, *Fratin*, *Nonetta*. Scarsa al piano.

Sitta cæsia, *Pichét*, *Pich murau*, *Picatoun*. Frequente ovunque, sedentario.

Certhia familiaris, *Rampignet*, *Picatin*, *Rampighin*. Scarso ai monti, sedentario.

Certhia brachydactyla, *Rampignet*, *Picatin*, *Rampighin*. Frequente al piano, sedentario.

Tichodroma muraria, *Parpajoun*, *Pich dla mort*, *Picatin di bauss*. Frequente ai monti, erratico.

Oriolus Galbula, *Ourieul*, *Garbé*. Frequente al piano.

Ampelis Garrulus, *Dourin*. Accidentale.

Lanius Excubitor, *Gabiosna farchêtta* o *d' passage*. Scarsa al piano.

Lanius minor, *Dergna*, *Gabiosna mesaña*. Frequente al piano.

Lanius Collurio, *Gabiosna bussonera*. Frequente al piano.

Lanius auriculatus, *Gabiourna*, *Gabiosna roussa*. Frequente al piano.

Muscicapa collaris, *Becafigh*, *Cichcich*. Scarsa ai monti.

Muscicapa Atricapilla, *Becafigh*, *Cichcich*. Scarsa ai monti.

Butalis Grisola, *Cichcich*. Scarso al piano.

Hirundo rustica, *Roundoula*, *Roundaniña*, *Rioundoula*. Frequente al piano.

Chelidon urbica, *Roundaniña*, *Cul bianch*. Frequente al piano.

Digitized by Google

Clivicola riparia, *Martlin*, *Culbianch d' eva*. Frequente al piano.

Cotile rupestris, *Roundanina d' mountagna*, *Rioundula dle roche*. Frequente ai monti.

Cypselus Apus, *Piví*. Frequente al piano.

Cypselus Melba, *Re di Piví*, *Piví di bauss*. Frequente ai monti.

Caprimulgus europæus, *Carcababi*, *Carcateppe*, *Volababi*. Scarso al piano.

Dryocopus martius. *Pich neir*, *Pich d' mountagna*. Scarso ai monti, sedentario.

Picus major, *Picardela*, *Pich-gaj*. Frequente ovunque, sedentario.

Picus minor, *Pichét d' mountagna*, *Pich-pcit*. Frequente ai monti, sedentario.

Gecinus viridis, *Picass*, *Picatass*. Frequente al piano, sedentario.

Iÿnx Torquilla, *Torsacol*, *Storsacol*. Frequente al piano.

Cuculus canorus, *Coucou*, *Coucú*. Frequente ovunque.

Alcedo Ispida, *Sereña*. *Pioumbin*. Frequente al piano, sedentario.

Coracias Garrula, *Ghé d' mariña*. Scarsa al piano.

Merops Apiaster, *Rocaireul*, *Sereña di prà*, *Ghepié*. Scarso al piano.

Upupa Epops, *Poupoú*, *Poupoula*, *Puta*. Frequente al piano ed ai monti.

Strix flammea, *Crivela*, *Dama*, *Dona*. Frequente ovunque, sedentario.

Syrnium Aluco, *Cious*, *Cravé*, *Ciabriér*. Frequente ai monti, sedentario.

Asio Otus, *Ciouch d' mountagna*, *Mesdúch*. Scarso ai monti, erratico.

Asio accipitrinus, *Sivitouloun*, *Ganavel di fau*. Scarso ai monti.

Athene Noctua, *Sivitoula*, *Crivela*. Frequente ovunque, sedentaria.

Scops Giu, *Ciouch*. Frequente ovunque.

Bubo maximus, *Granduch*, *Dugoú*, *Diavou d' mountagna*. Frequente ai monti, d' inverno al piano; erratico.

Circus æruginosus, *Farcoun dla testa bianca*. Scarso al piano.

Digitized by Google

Circus cyaneus, *Falch d' San Martin.* Scarsa al piano.

Circus cineraceus. Scarsa al piano.

Pandion Haliaëtus, *Acula pescoira*, *Acula bianca.* Scarso al piano.

Circaëtus gallicus, *Aculota*, *Poundrà bianca.* Scarso al piano.

Haliaëtus Albicilla, *Acula roussa* o *dla couva bianca.* Accidentale.

Aquila Chrysaëtus, *Acula real*, *Aígia.* Frequente ai monti, sedentaria.

Aquila pomarina, *Acula.* Scarsa al piano.

Archibuteo lagopus. Scarsa al piano.

Buteo vulgaris, *Poundrá*, *Falcoun.* Frequente ovunque, erratica.

Pernis apivorus, *Poundrà*, *Poundrà grossa.* Frequente in certe annate, scarso in altre; al piano.

Milvus Ictinus, *Falcoun dla couva fourcua.* Scarso.

Falco Peregrinus, *Farchet da pernís.* Frequente ai monti, erratico.

Hypotriorchis Subbuteo, *Farchet di giari* o *raté.* Scarso.

Æsalon regulus, *Farchet dle passre* o *d' mountagna.* Scarso ai monti.

Cerchneis Tinnunculus, *Crivela.* Frequente ovunque e sedentario.

Cerchneis Naumanni, *Crivela.* Scarso al piano.

Cerchneis vespertinus, *Farchet dle causse rousse*, *Ouslé.* Scarsa.

Astur palumbarius, *Farchtoun*, *Capastr.* Frequente ai monti, sedentario.

Accipiter Nisus, *Farchet*, *Sparavé.* Frequente ovunque, erratico.

Gypaëtus barbatus. Scarsa ai monti.

Phalacrocorax Carbo. Scarso al piano.

Microcarbo pygmæus. Accidentale.

Ardea cinerea, *Airoun*, *Neiroun.* Scarso al piano.

Ardea purpurea, *Airoun*, *Neiroun.* Scarso al piano.

Egretta alba, *Airoun*, *Leiroun bianch.* Scarsa al piano.

Egretta Garzetta, *Airoun*, *Leiroun bianch.* Scarsa al piano.

Ardeola ralloïdes, *Airoun giaun pcit.* Scarsa al piano.

Ardetta minuta, *Tus*, *Sgourgétta.* Scarso al piano.

Digitized by Google

Botaurus stellaris, *Troumboun*, *Leiroun*. Scarso al piano.
Nycticorax griseus, *Leiroun dla piuma*. Scarso al piano.
Ciconia alba, *Sicogna*, *Cicogna*. Accidentale.
Ciconia nigra, *Sicogna*, *Cicogna*. Accidentale.
Platalea Leucorodia. Accidentale.
Plegadis Falcinellus. Raro al piano.
Cygnus musicus, *Cin*, *Cign*. Assai raro al piano.
Anser segetum, *Oca sarvaja*. Scarsa al piano.
Anas Boscas, *Ania sarvaja*, *Colverd*. Frequente al piano.
Chaulelasmus streperus, *Ania*. Scarsa al piano.
Spatula clypeata, *Colverd*, *Cassul*. Scarso al piano.
Dafila acuta, *Ania sarvaja dla couva longa*. Scarso al piano.
Mareca Penelope, *Ania*, *Col rouss*. Scarso al piano.
Nettion Crecca, *Ania greca*, *Gargot*. Frequente al piano.
Querquedula Circia, *Saslot*, *Gargot*, *Garganel*. Scarsa al piano.
Fulix ferina. Scarso al piano.
Fulix Fuligula. Scarsa al piano.
Fulix Nyroca. Scarsa.
Bucephala Clangula. Scarso.
Mergus Merganser. Scarso.
Mergellus Albellus. Scarsa.
Columba Palumbus, *Couloumb sarvaj o favè*. Frequente al piano.
Columba Oenas, *Coulumb tourer o toré*. Frequente ovunque.
Columba livia. Scarso ai monti.
Turtur tenera, *Tourtoura*, *Tourtoula*. Frequente ovunque.
Perdix rufa, *Pernis roussa*, *Bertavela*. Frequente ovunque, sedentaria.
Perdix saxatilis, *Pernis gaja*, *Couloumbaña*. Frequente ai monti, sedentaria.
Starna Perdix, *Pernis grisa*, *Tariga*. Frequente ai monti ed al piano, sedentaria.
Coturnix communis, *Quaja*, *Caja*. Frequente ovunque.
Lyrurus Tetrix, *Fasan*, *Fasan d'mountagna*. Scarso ai monti, sedentario.
Lagopus mutus, *Calavria*, *Calabria*, *Pernis bianca*. Frequente ai monti, sedentario.

Digitized by Google

Rallus aquaticus, *Raj*, *Ral.* Frequente al piano.
Ortygometra Porzana, *Gilardiña*, *Girardiña.* Scarso al piano.
Ortygometra Bailloni, *Girardiña pcita.* Scarsa.
Ortygometra parva, *Girardiña pcita.* Scarsa.
Crex pratensis, *Re da quaje, Re dle caje.* Scarso.
Gallinula chloropus, *Poula da eva.* Scarsa.
Fulica atra, *Folaga*, *Poula ciapiña*, Scarsa.
Grus communis, *Grua*, *Gru.* Scarsa.
Otis Tarda. Accidentale.
Otis Tetrax. Accidentale.
Œdicnemus scolopax, *Gambalevrot*, *Gambalevret.* Frequente al piano.
Charadrius Pluvialis, *Piviè doré*, *Piviè real.* Frequente al piano.
Squatarola helvetica, *Piviè*, *Piviè doré.* Scarsa al piano.
Vanellus Capella, *Piviè douminican*, *Vanetta.* Piuttosto scarsa al piano.
Himantopus candidus, *Cavajer loumbard.* Scarso.
Pelidna subarquata. Scarso.
Actodromas minuta. Scarso.
Machetes Pugnax, *Becassot*, *Cavajer*, Scarsa.
Tringoïdes Hypoleucus, *Balota.* Frequente al piano.
Totanus Ochropus, *Becassin*, *Culbianch*, *Piouravej*, *Piouravela.* Scarso al piano.
Totanus Glareola, *Becassin.* Scarso.
Totanus stagnatilis, *Becassin gambe lounghe.* Scarsa.
Totanus Calidris, *Tutù*, *Fouloun.* Scarsa.
Totanus Fuscus, *Cravetta.* Scarso.
Limosa melanura, *Subiareul*, *Gambe lounghe.* Scarsa.
Limosa rufa, *Subiareul*, *Gambe lounghe.* Accidentale.
Scolopax Rusticula, *Becassa.* Frequente ai monti ed al piano.
Gallinago major, *Loumbarda.* Scarso al piano.
Gallinago cælestis, *Becassetta*, *Becassin.* Frequente al piano.
Gallinago Gallinula, *Becassin*, *Voulet.* Scarso al piano.
Numenius Arquata, *Becasson gross.* Scarso.
Numenius Phæopus, *Becassounot gris pcit.* Scarso.
Thalasseus cantiacus. Accidentale.

Digitized by Google

Sterna fluviatilis, *Péscarin*, *Scanapés*. Scarsa.
Sternula minuta, *Péscarin*, *Sgarín*. Scarsa al piano.
Hydrochelidon leucoptera, *Coucai*, *Mounietta*. Scarso.
Hydrochelidon nigra, *Coucai*, *Mounietta*. Scarsa.
Chroocephalus minutus, *Ochetta*, *Mulinè*. Scarso.
Chroocephalus ridibundus, *Ochetta*, *Mulinè*. Non frequente.
Rissa tridactyla. Scarso.
Stercorarius pomatorhinus. Accidentale.
Stercorarius crepidatus. Accidentale.
Stercorarius parasiticus. Accidentale.
Puffinus Kuhli. Accidentale.
Colymbus glacialis. Rara assai.
Colymbus septentrionalis. Rara.
Podiceps cristatus. Scarso.
Podiceps nigricollis. Scarso.
Podiceps fluviatilis, *Pioumbin*, *Toumboulot*. Frequente al piano, sedentario.

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli le quali nidificano nella provincia di Cuneo colle notizie più importanti in proposito.

	N. delle covate.	Epoca di ogni singola covata.	Di quante uova consiste.	Durata dell' incubazione (giorni)	Se vi prende parte anche il maschio.
Corvus Corax.	1	marzo	4 a 6	18 a 20	M. e F.
Corvus Corone.	1	aprile	4 a 5	15 a 18	id.
Corvus Cornix.	1	aprile	3 a 4	15 a 18	id.
Nucifraga Caryocatactes.	2	mar. mag.	3 a 4	16 a 18	id.
Pica rustica.	2	mar. mag.	3 a 6	16 a 18	id.
Garrulus glandarius.	2	apr. giug.	5 a 7	16 a 18	id.
Pyrrhocorax alpinus.	1	maggio	3 a 4	18 a 20	id.
Pyrrhocorax Graculus.	1	maggio	3 a 4	18 a 20	id.
Sturnus vulgaris.	2	mar. giug.	5 a 6	16 a 17	id.
Fringilla cœlebs.	2	apr. mag.	3 a 4	14 a 16	id.
Fringilla Montifringilla.	1	maggio	4 a 5	16 a 18	id.
Montifringilla nivalis.	1	maggio	3 a 4	16 a 18	id.
Petronia stulta.	2	apr. giug.	3 a 4	15 a 16	id.
Passer montanus.	2	apr. mag.	4 a 6	12 a 14	id.
Passer Italiæ.	2	apr. giug.	5 a 6	15 a 16	id.
Coccothraustes vulgaris.	1	maggio	3 a 4	16 a 18	id.
Ligurinus Chloris.	2	apr. giug.	3 a 4	14 a 16	id.
Chrysomitris Spinus.	1	maggio	3 a 4	16 a 18	id.
Carduelis elegans.	2	apr. giug.	3 a 4	14 a 16	id.
Cannabina Linota.	1	maggio	4 a 5	16 a 18	id.
Pyrrhula europæa.	1	maggio	4 a 6	16 a 18	id.
Miliaria Projer.	1	maggio	4 a 5	15 a 16	id.
Emberiza Citrinella.	2	mag. giug.	4 a 5	16 a 18	id.
Emberiza Hortulana.	2	apr. giug.	3 a 4	14 a 16	id.
Emberiza Cia.	1	maggio	4 a 5	15 a 16	id.
Emberiza Schœniclus.	1	maggio	3 a 4	15 a 16	id.
Alauda arborea.	1	maggio	4 a 5	16 a 18	id.
Alauda arvensis.	2	mag. giug.	3 a 4	14 a 16	id.
Galerita cristata.	2	apr. giug.	4 a 5	14 a 16	id.
Anthus pratensis.	2	mag. giug.	4 a 5	16 a 18	id.
Anthus trivialis.	2	mag. giug.	4 a 5	16 a 18	id.
Budytes flavus.	2	apr. giug.	3 a 5	15 a 16	id.
Motacilla alba.	2	apr. giug.	4 a 5	14 a 16	id.

Digitized by Google

	N. delle covate.	Epoca di ogni singola covata.	Di quante uova consiste.	Durata dell' incubazione (giorni)	Se vi prende parte anche il maschio.
Saxicola Oenanthe.	2	mag. giug.	4 a 5	15 a 16	M. e F.
Monticola saxatilis.	1	maggio	4 a 5	16 a 17	id.
Monticola Cyanus.	1	maggio	4 a 6	16 a 17	id.
Merula nigra.	2	apr. giug.	4 a 5	16 a 18	id.
Merula torquata.	1	maggio	4 a 5	16 a 18	id.
Turdus musicus.	1	maggio	5 a 6	16 a 18	id.
Turdus viscivorus.	2	mar. mag.	4 a 5	15 a 16	id.
Aëdon Luscinia.	2	mag. giug.	4 a 5	15 a 16	id.
Erithacus Rubecula.	2	mag. giug.	4 a 6	15 a 16	id.
Ruticilla Phœnicurus.	1	maggio	6 a 7	16 a 17	id.
Ruticilla titys.	1	maggio	4 a 5	16 a 17	id.
Pratincola Rubicola.	2	mag. giug.	5 a 6	15 a 16	id.
Pratincola Rubetra.	2	mag. giug.	5 a 6	15 a 16	id.
Sylvia orphæa.	1	maggio	4 a 5	16 a 18	id.
Sylvia cinerea.	2	mag. giug.	5 a 6	15 a 16	id.
Monachus Atricapillus.	2	mag. giug.	4 a 5	14 a 16	id.
Monachus hortensis.	2	mag. giug.	4 a 5	14 a 15	id.
Phylloscopus sibilator.	1	maggio	4 a 5	14 a 15	id.
Phylloscopus Trochilus.	1	maggio	4 a 6	14 a 16	id.
Phylloscopus Bonellii.	1	maggio	4 a 5	14 a 16	id.
Phylloscopus rufus.	2	mag. lug.	4 a 5	15 a 16	id.
Hypolais icterina.	2	mag. giug.	4 a 5	15 a 16	id.
Acrocephalus palustris.	1	giugno	4 a 5	16 a 17	id.
Acrocephalus arundinaceus.	1	maggio	4 a 5	16 a 17	id.
Potamodus luscinioïdes?.	L'unica volta ch'io sappia fu nel 1859 che venne trovata a nidificare nella Regia tenuta di Pollenzo.				
Troglodytes parvulus.	2	apr. giug.	5 a 6	14 a 15	M. e F.
Cinclus aquaticus.	2	apr. giug.	4 a 6	16 a 18	id.
Accentor collaris.	1	maggio	4 a 5	17 a 18	id.
Accentor modularis.	2	mag. giug.	4 a 5	16 a 17	id.
Regulus cristatus.	2	mag. giug.	8 a 10	14 a 15	id.
Regulus ignicapillus.	2	mag. giug.	8 a 10	14 a 15	id.
Ægithalus pendulinus.	2	apr. giug.	4 a 5	15 a 16	id.
Acredula rosea.	2	febb. apr.	12 a 14	14 a 15	id.
Acredula caudata.	2	febb. apr.	12 a 14	14 a 15	id.
Parus major.	2	apr. giug.	8 a 14	14 a 15	id.
Parus ater.	2	apr. giug.	6 a 8	14 a 15	id.
Cyanistes cæruleus.	2	apr. giug.	10 a 14	14 a 15	id.

Digitized by Google

	N. delle covate.	Epoca di ogni singola covata.	Di quante uova consiste.	Durata dell' incubazione (giorni)	Se vi prende parte anche il maschio.
Poecile palustris.	2	apr. giug.	8 a 10	14 a 15	M. e F.
Sitta cæsia.	1	maggio	4 a 6	15 a 17	id.
Certhia familiaris.	1	marzo	5 a 10	15 a 18	id.
Certhia brachydactyla.	1	marzo	5 a 10	15 a 18	id.
Tichodroma muraria.	1	maggio	ignoro	ignoro	ignoro
Oriolus Galbula.	1	maggio	4 a 5	16 a 18	M. e F.
Lanius minor.	1	giugno	4 a 5	15 a 16	id.
Lanius Collurio.	1	giugno	4 a 6	15 a 16	id.
Lanius auriculatus.	1	giugno	4 a 5	15 a 16	id.
Muscicapa collaris.	1	maggio	5 a 6	15 a 16	id.
Muscicapa Atricapilla.	1	maggio	5 a 6	15 a 16	id.
Butalis Grisola.	1	maggio	4 a 5	15 a 16	id.
Hirundo rustica.	2	mag. giug.	4 a 6	14 a 15	id.
Chelidon urbica.	2	mag. giug.	4 a 5	14 a 15	id.
Clivicola riparia.	1	maggio	5 a 6	14 a 15	id.
Cotile rupestris.	1	giugno	5 a 6	15 a 16	id.
Cypselus Apus.	2	mag. giug.	2 a 3	14 a 15	id.
Cypselus Melba.	1	maggio	ignoro	ignoro	ignoro
Caprimulgus europæus.	1	giugno	1 a 2	15 a 16	ignoro
Dryocopus martius.	1	giugno	2 a 3	16 a 18	M. e F.
Picus major.	2	apr. giug.	4 a 5	15 a 17	id.
Picus minor.	1	maggio	3 a 4	15 a 18	id.
Gecinus viridis.	2	apr. giug.	4 a 5	15 a 17	id.
Iynx Torquilla.	2	apr. giug.	4 a 8	15 a 17	id.
Cuculus canorus.	Credo una sola covata. Non mi capitarono mai dei nidiacei oltre al mese di giugno.				
Alcedo Ispida.	2	apr. giug.	3 a 4	15 a 16	M. e F.
Upupa Epops.	1	maggio	4 a 5	16 a 18	id.
Strix flammea.	1	maggio	4 a 6	16 a 18	Sola F.
Syrnium Aluco.	1	maggio	2 a 3	16 a 18	id.
Asio Otus.	1	maggio	3 a 4	16 a 18	id.
Athene Noctua.	1	maggio	3 a 4	15 a 16	id.
Scops Giu.	1	maggio	3 a 5	16 a 18	id.
Bubo maximus.	1	aprile	1 a 2	20 a 22	id.
Aquila Chrysaëtus.	1	maggio	1 a 3	28 a 20	id.
Buteo vulgaris.	1	maggio	2 a 4	24 a 25	id.
Falco Peregrinus.	1	aprile	3 a 4	18 a 20	id.
Cerchneis Tinnunculus.	1	aprile	4 a 6	18 a 20	id.

Digitized by Google

	N. delle covate.	Epoca di ogni singola covata.	Di quante uova consiste.	Durata dell' incubazione (giorni)	Se vi prende parte anche il maschio.
Astur palumbarius.	1	maggio	3 a 4	19 a 20	Sola F.
Accipiter Nisus.	1	maggio	4 a 6	18 a 20	id.
Anas Boscas.	1	maggio	8 a 12	25 a 26	id.
Columba Palumbus.	2	mag. giug.	1 a 2	16 a 18	M. e F.
Columba Oenas.	2	mag. giug.	1 a 2	16 a 18	id.
Columba livia.	2	mag. giug.	1 a 2	16 a 18	id.
Turtur tenera.	2	mag. giug.	1 a 2	16 a 18	id.
Perdix rufa.	2	apr. giug.	12 a 14	18 a 20	Sola F.
Perdix saxatilis.	1	maggio	10 a 14	18 a 20	id.
Starna Perdix.	2	apr. giug.	8 a 14	18 a 20	id.
Coturnix communis.	2	mag. lug.	6 a 10	16 a 18	id.
Lyrurus Tetrix.	1	giugno	6 a 10	18 a 20	id.
Lagopus mutus.	1	maggio	8 a 10	18 a 20	id.
Rallus aquaticus.	1	maggio	7 a 8	ignoro	ignoro
Œdicnemus scolopax.	1	giugno	1 a 2	16 a 18	M. e F.
Tringoïdes Hypoleucus.	1	maggio	4 a 5	15 a 16	id.
Totanus Ochropus.	1	maggio	4 a 5	15 a 16	id.
Scolopax Rusticula.	Negli ultimi giorni di Maggio 1875 presso Sommariva-Perno (Cuneo), un contadino trovò il nido con due nidiacei e se ne impadronì menandone vanto in paese, venne dalle Guardie delle Regie caccie preso in contravvenzione e condannato quale distruttore di nidi. In allora a detto paese vi era caccia riservata per il Re.				
Sternula minuta.	1	maggio	3 a 4	ignoro	ignoro
Podiceps fluviatilis.	1	maggio	4 a 5	ignoro	ignoro

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli che sono di passaggio regolare nella provincia di Cuneo.

Specie di passaggio in Primavera.

Budytes cinereocapillus, 2ª quindicina aprile, 1ª maggio.
Potamodus luscinioïdes, 1ª quindicina maggio.
Merops Apiaster, 1ª quindicina maggio.
Milvus Ictinus, 1ª quindicina aprile.
Cerchneis vespertinus, 2ª quindicina aprile.
Spatula clypeata, 1ª quindicina marzo.
Querquedula Circia, 1ª quindicina marzo.
Fulix Nyroca, 1ª quindicina marzo.
Bucephala Clangula, 1ª quindicina marzo.
Limosa melanura, 1ª e 2ª quindicina maggio.
Hydrochelidon leucoptera, 2ª quindicina aprile.
Hydrochelidon nigra, 2ª quindicina aprile.

Specie di passaggio in Autunno.

Corvus frugilegus, 1ª quindicina novembre.
Serinus hortulanus, 1ª e 2ª quindicina ottobre.
Ægiothus Linarius, 1ª e 2ª quindicina ottobre.
Loxia Curvirostra, ottobre e novembre, ogni 5 o 6 anni.
Emberiza Cirlus, 1ª quindicina novembre.
Agrodroma campestris, 2ª quindicina ottobre e 1ª novembre.
Anthus Spipoletta, 1ª quindicina ottobre e vi passa l'inverno.
Calobates melanope, 2ª quindicina settembre.
Saxicola Stapazina, 2ª quindicina settembre e 1ª ottobre.
Turdus pilaris, 2ª metà novembre e parte dell'inverno.
Sylvia Curruca, 2ª quindicina settembre.
Lanius Excubitor, novembre e talvolta in dicembre.
Circus aeruginosus, ottobre e 1ª quindicina novembre.
Æsalon regulus, 2ª quindicina di settembre.

Digitized by Google

Anser segetum, 2ª quindicina novembre e dicembre.
Chaulelasmus streperus, 1ª quindicina dicembre.
Dafila acuta, 1ª quindicina dicembre.
Mareca Penelope, 1ª quindicina dicembre.
Nettion Crecca, 2ª quindicina ottobre.
Fulix ferina, 1ª e 2ª quindicina novembre.
Mergellus Albellus, 1ª quindicina dicembre.
Grus communis, 2ª quindicina novembre e 1ª dicembre.
Squatarola helvetica, 1ª quindicina novembre.
Vanellus Capella, 1ª quindicina ottobre.
Numenius Phaeopus, 2ª quindicina novembre.
Sterna fluviatilis, 2ª quindicina agosto.

Specie di passaggio in Primavera ed Autunno.

Turdus iliacus, aprile e novembre.
Cyanecula Wolfi, maggio e settembre.
Asio accipitrinus, marzo e settembre.
Pandion Haliaëtus, marzo e novembre.
Pernis apivorus, maggio e settembre.
Hypotriorchis Subbuteo, 2ª aprile e settembre.
Ardea cinerea, 2ª apr., 1ª mag., 2ª ottob. e 1ª novembre.
Ardea purpurea, 2ª apr., 1ª mag., 2ª ottob. e 1ª novembre.
Ardeola ralloides, 2ª apr., 1ª mag., 2ª ottob. e 1ª novembre.
Ardetta minuta, 2ª apr., 1ª mag., 2ª ottob. e 1ª novembre.
Botaurus stellaris, 2ª apr., 1ª mag., 2ª ottob. e 1ª novembre.
Nycticorax griseus, 2ª apr., 1ª mag., 2ª ottob. e 1ª novembre.
Ciconia alba, 1ª e 2ª marzo, 2ª agosto e 1ª settembre.
Ciconia nigra, 1ª e 2ª marzo, 2ª agosto e 1ª settembre.
Ortygometra Porzana, aprile ed ottobre.
Ortygometra Bailloni, aprile ed ottobre.
Ortygometra parva, aprile e ottobre.
Crex pratensis, maggio, agosto e settembre.
Gallinula chloropus, aprile e novembre.
Charadrius Pluvialis, aprile e novembre.
Machetes Pugnax, aprile e settembre.

Digitized by Google

Totanus Glareola, aprile e settembre.
Totanus Calidris, aprile e settembre.
Scolopax Rusticula, 2ª mar., 1ª apr., 2ª ottob. e 1ª novembre.
Gallinago major, maggio ed agosto.
Gallinago cælestis, aprile e settembre.
Gallinago Gallinula, aprile e settembre.
Numenius Arquata, maggio ed ottobre.
Chroocephalus rïdibundus, aprile e settembre.

Elenco delle specie di uccelli da considerarsi come di apparizione accidentale nella provincia di Cuneo.

Lycos Monedula.
Pastor roseus.
Ægiothus rufescens.
Emberiza pusilla.
Calcarius nivalis.
Panurus biarmicus.
Ampelis Garrulus.
Coracias Garrula.
Circus cyaneus.
Circus cineraceus.
Circaëtus gallicus.
Haliaëtus Albicilla.
Aquila pomarina.
Archibuteo lagopus.
Cerchneis Naumanni.
Gypaëtus barbatus.
Phalacrocorax Carbo.
Microcarbo pygmæus.
Egretta alba.
Egretta Garzetta.
Platalea Leucorodia.
Cygnus musicus.
Fulix Fuligula.
Mergus Merganser.
Fulica atra.
Otis Tarda.
Otis Tetrax.
Himantopus candidus.
Pelidna subarquata.
Actodromas minuta.
Totanus stagnatilis.
Totanus fuscus.
Limosa rufa.
Thalasseus cantiacus.
Chroocephalus minutus.
Rissa tridactyla.
Stercorarius pomatorhinus.
Stercorarius crepidatus.
Stercorarius parasiticus.
Puffinus Kuhli.
Colymbus glacialis.
Colymbus septentrionalis.
Podiceps cristatus.
Podiceps nigricollis.

Digitized by Google

Queste comparse avventizie nella provincia possono essere cagionate da improvvise bufere, come pure da rigidi inverni. Gli uccelli rimontando il corso dei fiumi arrivano fino a noi e si fermano lungo le abbondanti sorgenti che esistono in queste località e che non sono mai gelate neanche coi più grandi freddi.

Torino (Gasca Luigi, Pezzi Luigi, Martorelli prof. Giacinto, Bainotti Carlo):

Il distretto da me osservato, e nel quale durante il periodo di oltre 25 anni, ho fatto la maggior parte delle mie caccie, trovàsi posto in uno dei punti più centrali del Piemonte. Il terreno è molto fertile ed è coltivato per la maggior parte a prati ed a campi. I boschi più notevoli sono quelli di Caramagna, dei Correnti, di Santa Cristina, di Casanova e delle Cascinette, questi ultimi lungo il torrente Stura. Vi si trovano pure cosparse numerose boscaglie di acacie e particolarmente lungo il Po. Moltissimi poi sono i boschi, e cedui e di alto fusto, che si incontrano sulla collina, che, posta a levante, a brevissima distanza da Torino, si prolunga nel distretto esaminato fino a Gassino verso il nord e fino a Moncalieri verso il sud.

A ragguardevole distanza dai suoi confini, più sotto indicati; è cinto ad O. ed a N. dalle Alpi e al S. dai colli prealpini sino all'Appennino Ligure; si apre ad E. ai primi raggi del sole. Trovasi a 250 metri circa dal livello del mare. È bagnato dal fiume Po, e parzialmente dai torrenti Dora Riparia e Stura, non che da altri piccoli fiumi e torrentelli di minore importanza. Vere paludi e laghi non ve ne sono, ma bensì qualche piccolo stagno.

Comprende un buon tratto della provincia di Torino, e confina al S. coi comuni di Caramagna, Racconigi e Sommariva Perno, all' O. coi comuni di Grugliano e Collegno, al N. coi comuni di Leyni e Brandizzo, ed all' E. con quelli

Digitized by Google

di Gassino e Chieri, percorrendo il versante a levante della collina fino a Moncalieri.

Misura, approssimativamente, in lunghezza, dal nord al sud, chilometri sessanta, ed in larghezza, dall'est all'ovest, chilometri venti. (*Gasca*).

Il distretto da me percorso include la perimetria intorno a Torino, cioè: lungo il Po da Carignano a Brandizzo, indi il territorio compreso nella linea di circonvallazione avente per limite Carignano, Vinovo, Orbassano, Collegno, Venaria Reale, Caselle, Settimo Torinese, Brandizzo e la Collina di Torino.

Boschiva a pioppi, salici ed acacie la regione lambita dal Po, specialmente la sponda sinistra; boschive le due sponde della Stura, popolate di quercie, pioppi, acacie, salici, ecc. Boschi estesi di quercia, specialmente tra Brandizzo a Caselle. Coltivata a campi e prati (eccettuatone i dintorni di Stupinigi, ove esiste la bandita reale, che è per lo più boschiva), tutta la regione a mezzogiorno, a ponente ed a nord di Torino, con pochi gerbidi in vicinanza della Stura, lungo il Po, e tra Volpiano e Settimo. Infine coltivata la collina a vigneti per buona parte ed a boschi cedui di quercie e castagni la regione interna di essa.

Va poi menzionata la regione in vicinanza di Carignano (verso il Po) come quella che più spesso fornì specie di uccelli da riva ed acquatici non tanto frequenti. (*Pezzi*).

La provincia di Torino comprende una vasta estensione di pianura sulla quale scorrono abbondanti le acque versate dai colossi alpini d'ogni parte, e qua e là si allargano in praterie cui rendono acquitrinose e si trattengono in alcune depressioni che convertono in stagni. Coi prati si alternano i campi, e in taluni punti rimangono folti boschi. Sulla riva destra del Po è pure notevole per l'ornitologo la Collina Torinese, lieta di vigneti, di fresche boscaglie, che si estende sino al Monferrato e si connette pure cogli ameni poggi astigiani. Sulla riva sinistra, a poca distanza dalle acque del fiume, sorgono le Alpi Graje e Cozie, di-

Digitized by Google

mora prediletta di moltissimi uccelli in estate, ostacolo che moltissimi altri debbono vincere nei loro viaggi, e barriera insuperabile per alcuni. Per tal modo la provincia di Torino si presenta opportuna allo studioso degli uccelli più di tante altre dell'Italia settentrionale, come dalle osservazioni particolari che già si hanno riescirà evidente.

(*Martorelli*).

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nella provincia di Torino, con indicazioni di frequenza, ecc.

Corvus Corax, osservato una volta in Valle di Viu (*M.*).[1]
Corvus Corone, sedentaria abbondante (*G. M.*).
Corvus Cornix, comune (*G. M.*).
Corvus frugilegus, frequente d'inverno (*G. M.*).
Lycos Monedula, accidentale *G. P.*).
Nucifraga Caryocatactes, non comune (*M.*).
Pica rustica, abbondante (*G. P. M.*).
Garrulus glandarius, frequente (*G. P. M.*).
Pyrrhocorax alpinus, scarso al piano (*G.*), comune e sedentario sulle Alpi (*M.*).
Pyrrhocorax Graculus, sulle Alpi, meno numerosa della precedente (*M.*).
Sturnus vulgaris, frequente, sedentario (*G. M.*).
Pastor roseus, accidentale (*G. M.*).
Fringilla cœlebs, frequente, sedentario (*G. P. M.*).
Fringilla Montifringilla, comune d'autunno (*G. M.*).
Montifringilla nivalis, non comune (*M.*).
Petronia stulta, scarsa (*G. M.*).
Passer montanus, abbondante (*G. P. M.*).
Passer Italiæ, frequente (*G. M.*).
Coccothraustes vulgaris, frequente (*G. M.*).

---

[1] Ho indicato colle iniziali i nomi dei collaboratori che hanno fornito la notizia.

Digitized by Google

Ligurinus Chloris, frequente (*G. P. M.*).
Chloroptila Citrinella, scarso (*G.*).
Chrysomitris Spinus, comune (*G. M.*).
Carduelis elegans, frequente (*G. P. M.*).
Serinus hortulanus, non comune, estivo (*B.*).
Cannabina Linota, frequente (*G. M.*).
Ægiothus Linarius, assai scarso (*G. M.*).
Pyrrhula europæa, non raro (*G. M.*).
Loxia Curvirostra, accidentale (*G. M.*).
Euspiza melanocephala, veduto una volta (*G.*).
Miliaria Projer, frequente (*G. P. M.*).
Emberiza Citrinella, abbondante (*G. P. M.*).
Emberiza Cirlus, piuttosto scarso (*G. M.*).
Emberiza Hortulana, scarso (*G.*) frequente (*M.*).
Emberiza Cia, scarso (*G.*), piuttosto frequente (*M.*).
Emberiza pusilla, accidentale (*G. P.*).
Emberiza Schœniclus, scarso (*G.*), abbondante (*M.*).
Calcarius nivalis, accidentale (*G. P.*).
Alauda arborea, frequente (*G. P.*).
Alauda arvensis, comune (*G. M.*).
Galerita cristata, scarsa (*G. P.*), comune (*M.*).
Agrodroma campestris, scarso (*G.*).
Anthus pratensis, frequente (*G. M.*).
Anthus trivialis, scarso (*G.*), di passo (*G. M.*).
Anthus Spipoletta, frequente di passo (*G. M.*).
Anthus obscurus, accidentale (*G.*).
Budytes flavus, frequente (*G.*), scarso (*M.*).
Budytes cinereocapillus, abbondante (*G. M.*).
Motacilla alba, frequente (*G. P. M.*).
Calobates melanope, comune e sedentaria (*G.*).
Saxicola Oenanthe, comune estivo (*G. M.*).
Saxicola Stapazina, accidentale (*G.*).
Monticola saxatilis, estiva sui monti (*M.*).
Monticola Cyanus, frequente in estate (*M.*).
Merula nigra, comunissimo (*G. P. M.*).
Merula torquata, abbondante (*M.*).
Turdus obscurus, accidentale (*Salvadori*).

Digitized by Google

Turdus pilaris, talvolta abbondante (*G. M.*).
Turdus iliacus, piuttosto scarso (*G. M.*).
Turdus musicus, abbondante (*G. M.*).
Turdus viscivorus, abbondante e sedentario (*G. M.*).
Aëdon Luscinia, frequente (*G. M.*).
Erithacus Rubecula, comune (*G. P. M.*).
Cyanecula Wolfi, scarso (*G.*), non tanto scarso (*M.*).
Cyanecula suecica, non scarso di passo (*M.*).
Ruticilla Phœnicurus, scarso (*G.*), comune (*M.*).
Ruticilla titys, raro (*G.*), abbondante ai monti (*M.*).
Pratincola Rubicola, comune (*G. M.*).
Pratincola Rubetra, frequente, estivo (*G. M.*).
Sylvia nisoria, estiva, rara e localizzata (*G.*).
Sylvia orphæa, scarsa (*G.*).
Sylvia cinerea, frequente (*G. M.*).
Sylvia Curruca, scarsa, (*G.*), piuttosto abbondante (*M.*).
Monachus Atricapillus, frequente (*G. P. M.*).
Monachus hortensis, scarso (*G.*).
Phylloscopus sibilator, poco frequente (*G.*).
Phylloscopus Trochilus, poco frequente (*G.*).
Phylloscopus Bonellii, scarso (*G. M.*).
Phylloscopus rufus, poco frequente (*G.*).
Hypolais polyglotta, localizzato (*G.*).
Acrocephalus palustris, scarsa (*G.*), piuttosto comune (*M.*).
Acrocephalus streperus, scarsa (*G. M.*).
Acrocephalus arundinaceus, scarso (*G.*) non raro (*M.*).
Calamodus schœnobænus, scarso (*G.*), frequente (*M.*).
Calamodus aquaticus, raro (*G.*).
Locustella nævia, scarso (*B.*).
Troglodytes parvulus, comune (*G. M.*).
Cinclus aquaticus, scarso (*G.*), piuttosto abbondante (*M.*).
Accentor collaris, molto comune (*M.*).
Accentor modularis, scarsa (*G.*).
Regulus cristatus, frequente (*G. M.*).
Regulus ignicapillus, scarso (*G.*).
Ægithalus pendulinus, non comune (*G. M.*).
Acredula rosea, frequente (*G. P. M.*).

Digitized by Google

Parus major, abbondante (*G. M.*).
Parus ater, scarsa (*G.*), non rara (*M.*).
Cyanistes cæruleus, abbondante (*G. P. M.*).
Poecile palustris, frequente (*G. P. M.*).
Lophophanes cristatus, scarsa sulle Alpi (*M.*).
Sitta cæsia, comunissimo (*G. P. M.*).
Certhia brachydactyla, scarso (*G. P.*) non raro (*M.*).
Tichodroma muraria, sulle Alpi (*M.*).
Oriolus Galbula, frequente, estivo (*G. M.*).
Ampelis Garrulus, accidentale (*G.*).
Lanius Excubitor, scarsa (*G.*), comune (*M.*).
Lanius minor, frequente (*G. M.*).
Lanius Collurio, comune (*G. M.*).
Lanius auriculatus, frequente (*G. M.*).
Muscicapa Atricapilla, scarsa (*G.*), comune (*M.*).
Butalis Grisola, frequente (*G.*).
Hirundo rustica, frequente (*G. M.*).
Chelidon urbica, frequente (*G. M.*).
Clivicola riparia, frequente (*G. M.*).
Cotile rupestris, sulle Alpi (*M.*).
Cypselus Apus, frequente (*G. M.*).
Cypselus Melba, scarso (*G.*).
Caprimulgus europæus, scarso (*G.*).
Picus major, abbondante (*G. M. P.*).
Picus Lilfordi, uno a Pinerolo (*Marchisio*).
Picus minor, raro (*G. M.*).
Gecinus viridis, abbondante (*G. P. M.*).
Iynx Torquilla, comune (*G. M.*).
Cuculus canorus, frequente (*G. M.*).
Alcedo Ispida, comune (*G. P. M.*).
Coracias Garrula, accidentale (*G.*).
Merops Apiaster, accidentale (*G. B.*).
Upupa Epops, frequente (*G. M.*).
Strix flammea, comune (*G. P. M.*).
Syrnium Aluco, poco frequente (*G. M.*).
Asio Otus, poco frequente. (*G. M.*).
Asio accipitrinus, poco frequente (*G.*).

Digitized by Google

Athene Noctua, frequente (*G. P. M.*).
Scops Giu, comune in estate (*G. M.*).
Bubo maximus, non comune (*G.*), piuttosto comune (*M.*).
Circus cyaneus, accidentale (*B.*).
Circaëtus gallicus, raro (*P.*).
Haliaëtus Albicilla, scarsa (*P. M.*).
Aquila Chrysaëtus, non rara (*M.*).
Aquila clanga, scarsa (*M.*).
Aquila pomarina, accidentale (*Salvadori*, *M.*).
Archibuteo lagopus, accidentale (*G.*).
Buteo vulgaris, frequente (*G. P. M.*).
Pernis apivorus, poco frequente (*G.*).
Milvus migrans, accidentale (*B.*).
Falco Peregrinus, accidentale (*G.*).
Hypotriorchis Subbuteo, poco comune (*G. M.*).
Æsalon regulus, poco frequente (*G. M.*).
Cerchneis Tinnunculus, molto comune (*G. P. M.*).
Cerchneis Naumanni, accidentale (*P.*).
Cerchneis vespertinus, accidentale (*G.*).
Astur palumbarius, scarso (*P.*).
Accipiter Nisus, frequente (*G. P. M.*).
Pelecanus Onocrotalus, accidentale (*G.*).
Ardea cinerea, frequente (*G. P. M.*).
Ardea purpurea, frequente (*G. M.*).
Ardeola ralloïdes, frequente (*G.*).
Ardetta minuta, frequente (*G. P. M.*).
Botaurus stellaris, frequente (*G. M.*).
Nycticorax griseus, scarso (*M. B.*).
Plegadis Falcinellus, scarso (*G.*).
Bernicla brenta, accidentale (*Marchisio*).
Anser segetum, frequente (*G.*).
Dendrocycna javanica, accidentale (*G.*).
Anas Boscas, frequente (*G. P. M.*).
Spatula clypeata, scarso (*G.*), frequente (*M.*).
Dafila acuta, frequente (*G. M.*).
Mareca Penelope, frequente (*G. M.*).
Nettion Crecca, comune (*G. M.*).

Digitized by Google

Querquedula Circia, frequente (*G. M.*).
Fulix Fuligula, frequente (*G.*).
Bucephala Clangula, scarso (*P.*).
Mergus Serrator, scarso (*G.*).
Mergellus Albellus, scarsa (*G.*).
Columba Palumbus, comune (*G. M.*).
Columba Oenas, abbondante (*G. M.*).
Columba livia, non raro (*M.*).
Turtur tenera, frequente (*G. M.*).
Perdix saxatilis, comune sulle Alpi (*M.*).
Starna Perdix, frequente (*G. P. M.*).
Coturnix communis, frequente (*G. M.*).
Lyrurus Tetrix, comune sulle Alpi (*M.*).
Lagopus mutus, comune sulle Alpi (*M.*).
Rallus aquaticus, frequente (*G. M.*).
Ortygometra Porzana, frequente (*G. M.*).
Ortygometra Bailloni, frequente (*G. M.*).
Ortygometra parva, frequente (*G. M.*).
Crex pratensis, frequente (*G. M.*).
Gallinula chloropus, frequente (*G. M.*).
Fulica atra, frequente (*G. M.*).
Grus communis, accidentale (*G.*), comune (*M.*).
Otis Tarda, accidentale (*G.*).
Œdicnemus scolopax, comune (*G. M.*).
Charadrius Pluvialis, frequente (*G. M.*).
Eudromias Morinellus, accidentale (*M.*).
Ægialitis curonica, frequente (*G. M.*).
Ægialitis Hiaticula, scarso (*G.*).
Vanellus Capella, frequente (*G. M.*).
Recurvirostra Avocetta, scarsa (*G.*).
Himantopus candidus, scarso (*G. B.*).
Limicola platyrhyncha, scarso (*G.*).
Pelidna subarquata, abbondante (*G.*).
Actodromas minuta, frequente (*G.*).
Machetes Pugnax, comune (*M.*).
Tringoïdes Hypoleucus, comune (*G. M.*).
Totanus Ochropus, comune (*G. P. M.*).

Digitized by Google

Totanus Glareola, scarso (*B. G. M.*).
Totanus Calidris, scarsa (*G. M.*).
Scolopax Rusticula, frequente (*G. M.*).
Gallinago major, comune (*G. M.*).
Gallinago cælestis, frequente (*G. M.*).
Gallinago Gallinula, frequente (*G. M.*).
Numenius Arquata, non abbondante (*G. M.*).
Numenius tenuirostris, accidentale (*G.*).
Sterna fluviatilis, frequente (*G. M.*).
Sternula minuta, piuttosto comune (*G. M.*).
Hydrochelidon hybrida, molto scarso (*G.*).
Hydrochelidon leucoptera, frequente (*G.*).
Hydrochelidon nigra, frequente (*G.*), non comune (*M.*).
Chroocephalus minutus, accidentale (*G.*).
Chroocephalus ridibundus, frequente (*G. M.*).
Larus canus, raro (*P. M.*).
Larus cachinnans, scarso (*M.*).
Stercorarius crepidatus, accidentale (*P.*).
Colymbus arcticus, accidentale (*G.*).
Podiceps cristatus, scarso (*M.*).
Podiceps nigricollis, accidentale (*M.*).
Podiceps fluviatilis, frequente (*G. P. M.*).

Elenco delle specie di uccelli che sono sedentarie nella provincia di Torino.

Corvus Corax, (*M.*).
Corvus Corone, (*M.*).
Corvus Cornix, (*G. M.*).
Nucifraga Caryocatactes, (*M.*).
Pica rustica, (*G. P. M.*).
Garrulus glandarius, (*G.P. M.*).
Pyrrhocorax alpinus, (*M.*).
Pyrrhoocorax Graculus, (*M.*).
Sturnus vulgaris, (*G. M.*).
Fringilla coelebs, (*G. P. M.*).
Montifringilla nivalis, (*M.*).
Passer montanus, *G. P. M.*).
Passer Italiæ, (*G. M.*).
Coccothraustes vulgaris, (*G.*).
Ligurinus Chloris, (*G. P. M.*).
Carduelis elegans, (*G. P. M.*).
Miliaria Projer, (*G. P. M.*).
Emberiza Citrinella, (*G. P. M.*).

Digitized by Google

Alauda arborea, (*P.*).
Alauda arvensis, (*G.*).
Galerita cristata, (*G. P. M.*).
Motacilla alba, (*G. P. M.*).
Calobates melanope, (*G.*).
Merula nigra, (*G. P. M.*).
Turdus viscivorus, (*G. M.*).
Erithacus Rubecula, (*G. M. P.*).
Pratincola Rubicola, (*G. M.*).
Monachus Atricapillus, (*G.P.M.*).
Troglodytes parvulus, (*G. M.*).
Cinclus aquaticus, (*M.*).
Accentor collaris, (*M.*).
Regulus cristatus, (*G. M.*).
Acredula rosea, (*G. P. M.*).
Parus major, (*G. M.*).
Parus ater, (*M.*).
Cyanistes cæruleus, (*G. P. M.*).
Pœcile palustris, (*P.*).
Sitta cæsia, (*G. P. M.*).
Certhia brachydactyla, (*G.P.M.*).
Tichodroma muraria, (*M.*).
Picus major, (*G. P. M.*).
Gecinus viridis, (*G. P. M.*).
Alcedo Ispida, (*G. P. M.*).
Strix flammea, (*G. P. M.*).
Athene Noctua, (*G. P. M.*).
Aquila Chrysaëtus, (*M.*).
Buteo vulgaris, (*G. P. M.*).
Cerchneis Tinnunculus, (*G.P.M.*).
Accipiter Nisus, (*G. P. M.*).
Anas Boscas, (*G. P. M.*).
Nettion Crecca, (*G. M.*).
Columba Palumbus, (*G. M.*).
Columba Oenas, (*G. M.*).
Perdix saxatilis, (*M.*).
Starna Perdix, (*G. P. M.*).
Lyrurus Tetrix, (*M.*).
Lagopus mutus, (*M.*).
Rallus aquaticus, (*G. M.*).
Gallinula chloropus, (*G.*).
Fulica atra, (*G. M.*).
Totanus Ochropus, (*G.*).
Scolopax Rusticula, (*G.*).
Podiceps fluviatilis, (*G. P. M.*).

Elenco delle specie di uccelli le quali nidificano nella provincia di Torino, con notizie in proposito.

Corvus Corone, valle di Gressonay (*M.*).
Pica rustica, primi marzo, ova 4 o 5 (*G.*).
Garrulus glandarius, metà aprile, ova 4 o 5 (*G.*).
Sturnus vulgaris, metà marzo, ova 4 o 5 (*G.*).
Fringilla cœlebs, fine aprile, ova 5 (*G. P.*).
Passer montanus, metà aprile e giugno, ova 5 a 6 (*G. P.*).
Passer Italiæ, fine aprile e giugno, ova 5 o 6 (*G. P.*).

Digitized by Google

Coccothraustes vulgaris, fine maggio (*G. P.*).
Ligurinus Chloris, fine aprile, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Carduelis elegans, maggio, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Serinus hortulanus, maggio (*B.*).
Miliaria Projer, aprile, ova 5 o 6 (*G. P.*).
Emberiza Citrinella, maggio, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Emberiza Hortulana, qualche coppia (*G. P.*).
Alauda arborea, fine marzo, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Alauda arvensis, fine marzo, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Galerita cristata, aprile, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Budytes flavus, metà aprile, due covate, ova 5 o 6 (*G.*).
Budytes cinereocapillus, aprile, due covate, ova 5 o 6 (*G. P.*).
Motacilla alba, metà aprile, due covate, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Calobates melanope, marzo, due covate, ova 6 (*G. P.*).
Saxicola Oenanthe, sulle Alpi e colli (*M.*).
Monticola saxatilis, sui monti (*M.*).
Monticola Cyanus, sui monti (*M.*).
Merula nigra, aprile e fine giugno, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Turdus viscivorus, febbraio, marzo e maggio, ova 5 (*G. P.*).
Aëdon Luscinia, metà maggio, due covate, ova 5 (*G. P.*).
Erithacus Rubecula, in collina fine aprile, ova 5 o 6 (*G.*).
Ruticilla titys, sulle Alpi (*M.*).
Pratincola Rubicola, primi aprile, ova 5 o 6 (*G. P.*).
Pratincola Rubetra, maggio (*M.*).
Sylvia nisoria, fine maggio, una covata, ova 5 (*G. P.*).
Sylvia orphæa, maggio, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Sylvia cinerea, primi maggio, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Monachus Atricapillus, aprile, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Phylloscopus Trochilus, maggio (*P.*).
Hypolais polyglotta, fine maggio, ova 5 (*G. P.*).
Acrocephalus palustris, fine maggio (*G. P.*).
Acrocephalus streperus, fine maggio (*P.*).
Acrocephalus arundinaceus, fine maggio, ova 5 (*G. P.*).
Calamodus schænobœnus, maggio ova 5 (*G. P.*).
Troglodytes parvulus, in collina fine aprile, ova 6 o 7 (*G. P.*).
Accentor collaris, ai monti (*M.*).
Ægithalus pendulinus, aprile, ova 7 o 8 (*G. P.*).

Digitized by Google

Acredula rosea, primi marzo, ova 10 a 14 (*G. P.*).
Parus major, aprile e giugno ova 8 a 16 (*G. P.*).
Cyanistes cæruleus, aprile, ova 7 (*G. P.*).
Pœcile palustris, qualche coppia (*G. P.*).
Sitta cæsia, metà aprile, ova 5 a 7 (*G. P.*).
Certhia brachydactyla, primi aprile, ova 6 a 7 (*G. P.*).
Tichodroma muraria, sulle Alpi Graje (*M.*).
Oriolus Galbula, metà maggio, ova 4 o 5 (*G.*).
Lanius minor, maggio, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Lanius Collurio, maggio, ova 5 o 6 (*G. P.*).
Lanius auriculatus, maggio, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Butalis Grisola, maggio e luglio, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Hirundo rustica, primi maggio e fine giugno, ova 5 o 6 (*G. P.*).
Chelidon urbica, primi maggio e fine giugno, ova 5 o 6 (*G. P.*).
Clivicola riparia, aprile e giugno, ova 5 o 6 (*G. P.*).
Cotile rupestris, sulle Alpi (*M.*).
Cypselus Apus, maggio, una covata, ova 4 (*G. P.*).
Caprimulgus europæus, giugno, ova 2 (*G. P.*).
Picus major, aprile, una covata, ova 5 o 6 (*G. P.*).
Gecinus viridis, aprile, una covata, ova 5 o 6 (*G. P.*).
Iynx Torquilla, fine aprile, una covata ova 6 (*G. P.*).
Cuculus canorus, un pulcino nel nido di *Sylvia cinerea* (*G.*).
Alcedo Ispida, 5 o 6 uova (*G. P.*).
Upupa Epops, fine aprile, una covata, ova 6 (*G. P.*).
Strix flammea, fine aprile, una covata, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Athene Noctua, aprile, una covata, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Scops Giu, maggio, una covata, ova 4 o 5 (*G. P.*).
Aquila Chrysaëtus, sulle Alpi (*M.*).
Buteo vulgaris, maggio (*G.*).
Cerchneis Tinnunculus, maggio, una covata, ova 5 o 6 (*G. P.*).
Accipiter Nisus, maggio, una covata (*G.*).
Ardea cinerea, maggio (*P.*).
Ardetta minuta, giugno (*M. P.*).
Anas Boscas, maggio (*P. M.*).
Nettion Crecca, maggio (*M.*).
Columba Palumbus, primi maggio, ova 2 (*G. P.*).
Turtur tenera, maggio, ova 2 (*G. P.*).

Digitized by Google

Perdix saxatilis, sulle Alpi (*M.*).
Starna Perdix, fine marzo, ova 14 e più (*G. P.*).
Coturnix communis, maggio e luglio, ova 12 a 18 (*G. P.*).
Lyrurus Tetrix, sulle Alpi (*M.*).
Lagopus mutus, sulle Alpi, forse due covate (*M.*).
Rallus aquaticus, maggio (*M.*).
Ortygometra Porzana, maggio e luglio (*G.*).
Crex pratensis, maggio (*G. P.*).
Gallinula chloropus, maggio e luglio (*G.*).
Œdicnemus scolopax, maggio (*G. P.*).
Ægialitis curonica, maggio (*G.*).
Tringoïdes Hypoleucus, maggio (*G. P.*).
Totanus Ochropus, maggio (*G. P.*).
Scolopax Rusticula, casualmente (*G.*).
Gallinago major, possibilmente (*G.*).
Sterna fluviatilis, maggio-giugno (*G. P. M.*).
Sternula minuta, maggio (*M.*).
Podiceps fluviatilis, maggio (*G. M. P.*).

Elenco delle specie di uccelli che sono di passaggio regolare nella provincia di Torino.

Specie di passaggio in Primavera.

Saxicola Stapazina, aprile (*G.*).
Cyanecula Wolfi, fine marzo primi aprile (*P.*).
Sylvia nisoria, maggio (*G.*).
Phylloscopus sibilator, aprile (*P.*) e settembre (*G.*).
Hypolais polyglotta, primi maggio (*G.*).
Calamodus aquaticus, fine aprile (*G.*).
Cerchneis vespertinus, maggio (*P.*).
Botaurus stellaris, marzo (*G.*).
Querquedula Circia, marzo (*P. G.*).
Himantopus candidus, fine aprile (*G.*).

Digitized by Google

Limicola platyrhyncha, primavera (*G.*).
Pelidna subarquata, primavera (*G.*).
Actodromas minuta, primavera (*G.*).

Specie di passaggio in Autunno.

Corvus Corone, ottobre (*P.*) novembre (*G.*).
Corvus Cornix, ottobre (*P.*) novembre (*G.*).
Corvus frugilegus, ottobre (*P.*) novembre (*G.*).
Sturnus vulgaris, febbraio (*G.*).
Fringilla Montifringilla, ottobre a gennaio (*P.*).
Petronia stulta, inverno (*G.*).
Chrysomitris Spinus, ottobre (*G.*).
Chloroptila Citrinella, inverno (*G.*).
Pyrrhula europæa, fine ottobre a dicembre (*P. G.*).
Emberiza Citrinella, novembre (*G.*).
Emberiza Cirlus, novembre (*G.*).
Emberiza Cia, fine ottobre (*G.*).
Merula nigra, ottobre (*G.*).
Turdus pilaris, ottobre novembre (*P. G.*).
Turdus iliacus, ottobre novembre (*P. G.*).
Monachus hortensis, agosto-settembre (*M.*).
Cinclus aquaticus, ottobre (*P.*) novembre (*G.*).
Cyanistes cæruleus, ottobre (*G.*).
Tichodroma muraria, ottobre (*P.*).
Lanius Excubitor, ottobre a gennaio (*P. G.*).
Syrnium Aluco, ottobre (*G.*).
Bubo maximus, ottobre (*G.*).
Asio Otus, settembre a dicembre (*P. G.*).
Asio accipitrinus, settembre a dicembre (*P. G.*).
Pandion Haliaëtus, settembre, ottobre (*P.*).
Buteo vulgaris, principio inverno (*G.*).
Pernis apivorus, settembre, ottobre (*P. G.*).
Hypotriorchis Subbuteo, settembre-ottobre (*G.*).
Æsalon regulus, ottobre (*P. G.*).
Astur palumbarius, settembre a gennaio (*P.*).

Digitized by Google

Accipiter Nisus, settembre-ottobre (*G.*).
Anser segetum, novembre, dicembre (*P. G.*).
Bucephala Clangula, dicembre (*P.*).
Columba Oenas, fine settembre a metà dicembre (*P.*).

Specie di passaggio in Primavera ed Autunno.

Fringilla Montifringilla, (*M.*) novembre (*G.*).
Coccothraustes vulgaris, (*M. G.*).
Chrysomitris Spinus, (*M.*) novembre (*G.*).
Cannabina Linota, (*P.*) novembre (*G.*).
Pyrrhula europæa, (*M.*).
Emberiza Schœniclus, (*P.*) autunno (*G.*).
Emberiza Hortulana, (*G.*).
Alauda arvensis, (*M. G.*).
Alauda arborea, primi aprile (*G.*).
Agrodroma campestris, (*P.*) aprile (*G.*).
Anthus pratensis, (*M. P.*) primi aprile (*G.*).
Anthus trivialis, (*M.*) primi aprile (*G.*).
Anthus Spipoletta, (*M. P.*) fine marzo (*G.*).
Budytes flavus, (*M. P.*) fine marzo (*G.*).
Budytes cinereocapillus (*M.*) fine marzo (*G.*).
Motacilla alba, (*M.*).
Saxicola Oenanthe, (*M. P.*) aprile e settembre (*G.*).
Monticola saxatilis, (*M.*).
Merula torquata, (*M.*).
Turdus pilaris, (*M. P.*).
Turdus iliacus, (*M.*).
Turdus musicus, (*M. P.*). ottobre (*G.*).
Aëdon Luscinia, (*M.*) prima metà aprile (*G.*).
Erithacus Rubecula, (*M.*).
Cyanecula Wolfi, (*M. G.*).
Ruticilla Phœnicurus, (*M. P. G.*).
Ruticilla titys, (*M.*) aprile (*G.*).
Pratincola Rubetra, (*M. P. G.*).
Pratincola Rubicola, primi aprile (*G.*).
Sylvia orphæa, (*M.*) aprile (*G.*).

Digitized by Google

Sylvia cinerea, (*M.*) aprile (*G.*).
Sylvia Curruca, (*M.*) aprile (*G.*).
Monachus Atricapillus, (*M.*).
Monachus hortensis, aprile e settembre (*G.*).
Phylloscopus Bonellii, (*P. G.*).
Phylloscopus rufus, (*P. G.*).
Phylloscopus Trochilus, (*G.*).
Acrocephalus palustris, (*M.*) maggio (*G.*).
Acrocephalus streperus, (*M.*) maggio (*G.*).
Acrocephalus arundinaceus, (*M.*) aprile (*G.*).
Calamodus schænobœnus, (*M.*) aprile (*G.*).
Accentor modularis, (*M. P. G.*).
Regulus cristatus, (*P. G.*).
Regulus ignicapillus, (*P. G.*).
Ægithalus pendulinus, (*M. G.*).
Parus ater, (*P.*) ottobre (*G.*).
Pœcile palustris, (*P.*) ottobre (*G.*).
Oriolus Galbula, (*M.*) fine aprile (*G.*).
Lanius minor, (*M.*) prima metà maggio (*G.*).
Lanius Collurio, (*M.*) prima metà maggio (*G.*).
Lanius auriculatus, (*M.*) fine aprile (*G.*).
Muscicapa Atricapilla, (*M. P. G.*).
Butalis Grisola, (*M. G.*).
Hirundo rustica, (*M. G.*).
Chelidon urbica, (*M. G.*).
Clivicola riparia, (*M. G.*).
Cotile rupestris, (*M.*).
Cypselus Apus, (*M. G.*).
Cypselus Melba, (*P. G.*).
Caprimulgus europæus, (*M. G.*).
Iynx Torquilla, (*M.*) seconda metà marzo (*G.*).
Coracias Garrula, (*P.*).
Cuculus canorus, (*M. G.*).
Upupa Epops, (*M.*) prima metà aprile (*G.*).
Scops Giu, (*M.*) primi aprile (*G.*).
Circaëtus gallicus, (*P.*).
Buteo vulgaris, (*P.*).

Digitized by Google

Hypotriorchis Subbuteo, (*P.*).
Æsalon regulus, (*M.*).
Accipiter Nisus, (*M.*).
Ardea cinerea, (*M. G.*).
Ardea purpurea, (*M. P.*) aprile (*G.*).
Ardeola ralloïdes, aprile e settembre (*G.*).
Ardetta minuta, (*M.*) fine aprile (*G.*).
Nycticorax griseus, (*M. P.*).
Anas Boscas, fine autunno e primavera (*G.*).
Spatula clypeata, (*M.*).
Mareca Penelope, (*M. G.*).
Dafila acuta, (*M. G.*).
Nettion Crecca, fine autunno e primavera (*G.*).
Fulix ferina, (*M.*).
Fulix Fuligula, inverno (*G.*).
Mergus Serrator, inverno (*G.*).
Mergellus Albellus, inverno (*G.*).
Columba Palumbus, (*M.*) fine febbraio (*G.*).
Columba Oenas, (*M.*) fine settembre (*G.*).
Turtur tenera, (*M.*) seconda metà aprile (*G.*).
Coturnix communis, (*M.*) fine aprile (*G.*).
Rallus aquaticus, (*M.*) ottobre (*G.*).
Ortygometra Porzana, (*M. P. G.*).
Ortygometra Bailloni, (*M. G.*).
Ortygometra parva, (*M. G.*).
Crex pratensis, (*M.*) fine aprile (*G.*).
Gallinula chloropus, (*M. P. G.*).
Fulica atra, (*M. P.*) inverno (*G.*).
Grus communis, (*M.*).
Œdicnemus scolopax, (*M.*) primavera (*G*).
Charadrius Pluvialis, (*M.*) novembre (*G.*).
Ægialitis curonica, (*M.*) aprile (*G.*).
Ægialitis Hiaticula, (*P.*) primi aprile (*G.*).
Vanellus Capella, (*M.*) novembre (*G.*).
Recurvirostra Avocetta, maggio e settembre (*G.*).
Machetes Pugnax, (*M.*).
Tringoïdes Hypoleucus, (*M. P.*) marzo (*G.*).

Digitized by Google

Totanus Glareola, (*M.*) aprile (*G.*).
Totanus Calidris, (*M. P.*) aprile (*G.*).
Totanus Ochropus, marzo e ottobre (*G.*).
Scolopax Rusticula, (*M. P. G.*).
Gallinago major, (*M.*) marzo e ottobre (*G.*).
Gallinago cælestis, (*M. P.*) settembre e aprile (*G.*).
Gallinago Gallinula, (*M.*) settembre e aprile (*G.*).
Numenius Arquata, (*M. P.*) autunno (*G.*).
Sterna fluviatilis, (*M. P.*) fine aprile (*G.*).
Sternula minuta, (*M. P.*) fine aprile (*G.*).
Hydrochelidon nigra, (*M. P.*) fine maggio (*G.*).
Chroocephalus ridibundus, (*M. P. G.*).

Elènco delle specie di uccelli da considerarsi come di apparizione accidentale nella provincia di Torino.

Lycos Monedula, (*G. P.*).
Pastor roseus, (*G.*).
Ægiothus Linarius, (*G.*).
Loxia Curvirostra, (*G.*).
Euspiza melanocephala, (*G.*).
Emberiza pusilla, (*P.*).
Calcarius nivalis, (*G. P.*).
Anthus obscurus, (*G.*).
Saxicola Stapazina, (*G.*).
Turdus obscurus, (*Salvadori*).
Calamodus aquaticus, (*G.*).
Locustella nævia, (*B.*).
Lophophanes cristatus, (*M.*).
Ampelis Garrulus, (*G.*).
Picus Lilfordi, (*Marchisio*).
Picus minor, (*G. M.*).
Coracias Garrula, (*G.*).
Merops Apiaster, (*G. B.*).
Circus cyaneus, (*B.*).
Aquila pomarina, (*Salvadori*).
Archibuteo lagopus, (*G.*).
Milvus migrans, (*B.*).
Falco Peregrinus, (*G.*).
Cerchneis Naumanni, (*P.*).
Cerchneis vespertinus, (*G.*).
Pelecanus Onocrotalus, (*G.*).
Plegadis Falcinellus, (*G.*).
Grus communis, (*G.*).
Otis Tarda, (*G.*).
Numenius tenuirostris, (*G.*).
Hydrochelidon hybrida, (*G.*).
Chroocephalus minutus, (*G.*).
Larus cachinnans, (*M.*).
Stercorarius crepidatus, (*P.*).
Colymbus arcticus, (*G.*).
Podiceps nigricollis, (*M.*).

Digitized by Google

Alessandria. circondario di Voltaggio (Camusso Niccolò):

Da circa vent' anni che io m' occupo d' uccelli, ho sempre posto speciale cura allo studio dell' Avifauna della provincia d' Alessandria. Perciò le risposte che io posso fornire ai diversi quesiti della presente inchiesta si riferiscono ad una zona troppo vasta per studi speciali, e pei quali, più che la estensione del terreno osservato, valgono le prolungate e pazienti ricerche dell' ornitologo. Limitai perciò la zona d' osservazione ad una parte del territorio del comune di Voltaggio; territorio da me conosciuto in ogni suo particolare, e battuto per ogni senso da molti anni, e prestantesi in modo squisito alle osservazioni delle quali è caso. Valsemi assai l' aiuto delle note da me tenute esattamente da circa dieci anni, delle prese fatte ad una mia uccelliera sita in una delle località più favorite nel passo autunnale, e moltissimo mi giovarono le indicazioni avute da uccellatori e cacciatori passionatissimi e veritieri; primo fra' quali godo qui ringraziare l' egregio signor dottore Mario Fenelli di Gavi, che con oltre cinquant' anni di attente osservazioni sugli uccelli di questi luoghi (per quanto praticamente e non scientificamente fatte), potè fornirmi preziosissimi dati.

Sono confini alla zona da me studiata: le falde dell' Appennino Ligure, e più propriamente il confine segnato fra la provincia di Alessandria e quella di Genova dai monti della Bocchetta a S., il territorio del comune di Carrosio a N., la valle della Scrivia ad E., ed i territorii di Parodi Ligure e di Mornese ad O.

Il torrente Lemmo, che nasce nei monti della Bocchetta, attraversa questa zona in tutta la sua lunghezza da sud a nord, ricevendo nel suo corso alcuni torrentelli minori, ma pur essi provvisti d' acqua tutto l' anno, quali la Carbonasca, il Rumezzano ed il Recroso a destra, l' Acquastriata, il Morscione e la Brigna a sinistra. Rappresenta il torrente Lemmo, col suo letto limitato d' assai, l' arteria

Digitized by Google

principale, per la quale si fa quasi tutto il passaggio sì di emigrazione che di immigrazione.

Monti altissimi circuiscono questo territorio da tre lati, la sola parte rivolta a nord rimanendo aperta. Fra questi monti apronsi molti valichi o gole, dagli uccelli, in genere, preferiti per punti di passaggio; la neve cuopre tali monti per circa quattro mesi, cioè dal dicembre all'aprile.

Non sono molti anni che una ricca vegetazione d'alberi annosi e di cespugli inverdiva tutti questi monti; ma una inconsulta e pur legalmente tollerata mania di diboscamento li ridusse oggidì poverissimi, essendo tutte le più alte punte e molti minori monticelli spogli affatto di ogni vegetazione arborea, servendo soltanto a pascoli. Per queste ragioni moltissime specie d'uccelli, che un tempo vi si incontravano abbondantissime, sono oggidì fatte rare d'assai, ed alcune di esse tendono a sparire, mentre sgraziatamente qualche specie, ed importante, scomparve affatto.

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nella provincia di Alessandria, coi nomi volgari locali ed indicazioni di frequenza, ecc.[1]

Corvus Corax, *Crówu.* Raro.
Corvus Corone, *Crówu.* Meno rara.
C. Cornix, *Crówu*, *Cornággia.* Comune.
C. frugilegus, *Crówu.* Più comune di tutti i Corvi.
Lycos Monedula, *Crovin.* Rarissimo.
Nucifraga Caryocatactes. Di comparsa casuale.
Pica rustica, *Làja.* Rarissima ai monti e solo di passo; comunissima al piano.

---

[1] Col titolo *Gli uccelli del Basso Piemonte,* Milano, 1887, il signor N. Camusso ha pubblicato un elenco con note e notizie degli uccelli della provincia di Alessandria; egli divide le 228 specie registrate in stazionarie 41, di passo regolare 91, di passo irregolare 47, avventizie 49.

Digitized by Google

Garrulus glandarius, *Gazzan-na.* Comunissima.
Sturnus vulgaris, *Storno*, *Stronello.* Comune.
Pastor roseus, *Storn rèusa.* Casuale, rarissimo.
Fringilla coelebs, *Frenguéllo.* Comunissimo.
F. Montifringilla, *Frenguéllo montanin.* Comune.
Montifringilla nivalis. Rarissimo; casuale ne è la comparsa.
Petronia stulta, *Passuun.* Comune.
Passer montanus, *Passuétta.* Comunissima.
P. Italiæ, *Pássua.* Comunissima.
P. domesticus, *Pássua.* Rarissima.
Coccothraustes vulgaris, *Frixiún.* Comune; intermittente.
Ligurinus Chloris, *Verdón.* Abbonda.
Chrysomitris Spinus, *Lugaén.* Comune; intermittente.
Carduelis elegans, *Cardén-na.* Comunissimo.
Serinus hortulanus, *Siaén.* Non comune, di passo irregolare.
Cannabina Linota, *Fanétto.* Comunissimo.
Ægiothus rufescens. Rarissimo, di accidentale comparsa.
Carpodacus erythrinus. Rarissimo, di accidentale comparsa.
Pyrrhula europæa, *Sciguun.* Non comune.
Loxia Curvirostra, *Beccotorto.* Raro; irregolare.
Miliaria Prejer, *Ciattarón.* Comunissimo.
Emberiza Citrinella, *Sia pagéa.* Comunissimo.
E. Cirlus, *Sia muntagnin-na.* Comune.
E. Hortulana, *Nottuán.* Comune.
E. cæsia, *Sia muntagni-na.* Rarissimo.
E. Cia, *Sia nostrà.* Comune.
E. Schœniclus, *Strapássua.* Raro.
Melanocorypha Calandra. Rarissima; casuale.
Alauda arborea, *Petronélla.* Comunissima.
A. arvensis, *Grivéa*, *Lódua.* Piuttosto rara.
Galerita cristata, *Capelúnna*, *Lodua.* Piuttosto rara.
Agrodroma campestris, *Terén-na.* Piuttosto raro.
Corydalla Richardi. Rarissimo; casuale affatto.
Anthus pratensis, *Sisì da prou.* Comune.
A. trivialis, *Spia da nottuan.* Frequentissimo.
A. Spipoletta, *Sisì d' aegua.* Frequente.
Budytes flavus, *Gianétta.* Comune.

Digitized by Google

B. cinereocapillus, *Gianétta*. Scarsa.
Motacilla alba, *Bâlén-na*. Frequente.
Calobates melanope, *Gianétta*. Frequente.
Saxicola Oenanthe, *Cugianco de téra*. Frequente.
S. albicollis. Rarissima.
S. Stapazina. Rarissima.
Monticola saxatilis, *Cuarossón*. Frequente.
M. Cyanus, *Passua salutia*. Scarsa.
Merula nigra, *Merlo*. Comunissimo.
M. torquata. Rarissimo.
Turdus pilaris, *Calandra*. Scarsa; intermittente.
T. iliacus, *Corsín*. Abbonda.
T. musicus, *Turdo*. Abbonda.
T. viscivorus, *Tourdeuia*. Abbonda.
Aëdon Luscinia, *Ruscigneu*. Comunissimo.
Erithacus Rubecula, *Pecetto*. Comunissimo.
Cyanecula Wolfi. Rarissimo.
Ruticilla Phœnicurus, *Cuarossetta*. Frequente.
R. titys, *Cuarossetta*. Frequente.
Pratincola Rubicola, *Simacusti*. Frequente.
P. Rubetra, *Simacusti*. Frequente.
Sylvia nisoria, *Fenugià*. Scarso.
S. orphæa, *Moretta*, *Ciccibeú*. Comune.
S. cinerea, *Ciarlettua*. Rara.
S. Curruca. Rara.
S. subalpina, *Ciarlettuin-na*. Rara.
Monachus Atricapillus, *Testaneigra*. Frequente.
M. hortensis, *Beccafigo*. Frequente.
Pyrophthalma melanocephala. Rarissimo.
Melizophilus undatus. Rara.
M. sardus. Rarissima.
Phylloscopus sibilator, *Boén*. Frequente.
Ph. Trochilus, *Boèn*, *Sisì*. Frequente.
Ph. Bonellii, *Boenétto*. Scarso.
Ph. rufus, *Boenétto*. Scarso.
Hypolais polyglotta, *Ciarlettuinna*. Frequente.
Acrocephalus streporus, *Paiarzin*. Rara assai.

Digitized by Google

Acrocephalus arundinaceus, *Ruscigneu foestè*. Raro.
Calamodus schœnobænus, *Paiarzin*. Raro.
C. aquaticus, *Paiarzin*. Raro.
Potamodus luscinioïdes. Accidentale.
Cettia Cettii. Accidentale.
Cisticola cursitans, *Pittamuscin*. Scarso.
Troglodytes parvulus, *Cincin da neive*, *Reattin*. Comunissimo.
Cinclus aquaticus, *Merlo acquà*, *Pescamartin*. Comunissimo.
Accentor collaris. Scarso.
A. modularis, *Buschin*. Scarsa.
Regulus cristatus, *Testin d' ou*. Frequente.
R. ignicapillus, *Testin d' ou*. Frequente.
Ægithalus pendulinus. Rarissimo.
Acredula rosea, *Parissuin*. Scarsa.
Parus major, *Parisseua*. Abbonda.
P. ater, *Parissuin*. Rara.
Cyanistes cæruleus, *Parissuin celeste*. Rara.
Poecile palustris. Rara.
Sitta cæsia, *Rampeghin*. Frequente.
Certhia brachydactyla, *Rampeghin*. Comune.
Tichodroma muraria, *Pittamon*. Comune.
Oriolus Galbula, *Garbè*. Comunissimo.
Lanius Excubitor, *Cajurno lombardo grosso*. Rarissima.
L. minor, *Cajurno lombardo*. Rara.
L. Collurio, *Cajurno*. Comunissima.
L. auriculatus, *Cajurno*. Comunissima.
Muscicapa collaris. Rara.
M. Atricapilla. Rara.
Butalis Grisola. Meno raro.
Hirundo rustica, *Rundanin-na*. Comune.
H. rufula. Rarissima.
Chelidon urbica, *Cugianco d' aja*. Comunissimo.
Clivicola riparia, *Cugianco de riva*. Raro.
Cotile rupestris. Rara.
Cypselus Apus, *Rondón*. Comunissimo.
C. Melba, *Rondón gianco*. Raro.
Caprimulgus europæus, *Carcabaggi*. Comune.

Digitized by Google

Picus major, *Picunsin*. Poco abbondante.
P. minor, *Picunsin*. Piuttosto raro.
Gecinus viridis, *Piconso gazanà*. Frequente.
Iynx Torquilla, *Pittafurmighe*. Comunissimo.
Cuculus canorus, *Cúccu*. Comunissimo.
Alcedo Ispida, *Serena*. Comunissimo.
Coracias Garrula. Rarissimo e casuale.
Merops Apiaster, *Serena cua lunga*. Rarissimo e casuale.
Upupa Epops, *Galletto d' marzo*. Comunissima.
Strix flammea, *Damina*. Raro al monte, comune al piano.
Syrnium Aluco, *Aucco*. Piuttosto raro.
Asio Otus, *Aucco*. Piuttosto raro.
A. accipitrinus, *Testagatto*. Frequente.
Athene Noctua, *Ciò*. Comunissima.
Scops Giu, *Ciò*, *Ciouin*. Meno comune.
Bubo maximus, *Dugo*, *Aucco grosso*. Raro.
Circus æruginosus, *Farcón*. Raro.
Circus cyaneus. Rarissima, casuale.
C. cineraceus. Rarissima, casuale.
Circaëtus gallicus, *Agugia*. Non raro.
Aquila Chrysaëtus, *Aquila*. Rara.
Archibuteo lagopus, *Farco galinà*. Rara.
Buteo vulgaris, *Farco galinà*. Meno rara.
Pernis apivorus, *Farco galinà*. Non raro.
Milvus Ictinus. Raro.
M. migrans. Rarissimo.
Falco Peregrinus. Raro.
Hypotriorchis Subbuteo, *Crivéla*. Comunissimo.
Æsalon regulus, *Crivela*, *Farchétto*. Rarissimo.
Cerchneis Tinnunculus, *Crivèla*. Comunissimo.
C. Naumanni, *Crivéla*. Rarissimo.
C. vespertinus. Rarissimo.
Astur palumbarius. Rarissimo.
Accipiter Nisus, *Farchetto*. Comune.
Ardea cinerea, *Perdigiorno senzen grosso*. Rarissimo.
A. purpurea, *Perdigiorno rosso*. Rarissimo.
Egretta alba. Rarissima, accidentale.

Digitized by Google

Egretta Garzetta. Rarissima, accidentale.
Ardeola ralloïdes. Rarissima, accidentale.
Ardetta minuta, *Perdigiorno piccin.* Non rara.
Botaurus stellaris. Rarissimo.
Nycticorax griseus. Rarissimo.
Ciconia alba. Eccezionalmente rara.
Plegadis Falcinellus. Rarissimo.
Cygnus musicus, *Cign.* Accidentale.
Anser segetum. Eccezionalmente rara, casuale.
Anas Boscas, *Ania sarvaega*, *Colloverde.* Non raro.
Chaulelasmus streperus, *Ania sarvaega.* Rara assai.
Spatula clypeata, *Spàtula*, *Beccociatto.* Non raro.
Dafila acuta, *Ania sarvaega.* Raro.
Mareca Penelope, *Ania sarvaega.* Raro.
Nettion Crecca, *Garganèlla.* Comune.
Querquedula Circia, *Garganella.* Comune.
Fulix ferina, *Ania neigra.* Rarissimo.
F. Nyroca. Rarissima.
Bucephala Clangula, *Quattr' oeuggi.* Raro.
Mergus Merganser, *Pescaron.* Raro assai.
Mergellus Albellus, *Pescareula.* Rara.
Columba Palumbus, *Colàsso.* Piuttosto comune.
C. Oenas, *Coombo sarvaego.* Piuttosto comune.
C. livia, *Coombo sarvaego.* Meno comune.
Turtur tenera, *Túrtua.* Comunissima.
Perdix rufa, *Pernixe rossa.* Comune, non abbondante.
Perdix saxatilis, *Cômbea.* Rara.
Starna Perdix, *Stérna.* Comune, non abbondante.
Coturnix communis, *Quâgia.* Rara.
Rallus aquaticus. Rara.
Ortygometra Porzana, *Galinétta.* Raro.
O. Bailloni, *Galinétta d' aegua.* Rara.
O. parva, *Galinétta.* Rara.
Crex pratensis, *Requaggio.* Raro.
Gallinula chloropus, *Galinétta neigra.* Rarissima.
Fulica atra, *Fulaga.* Rara.
Grus communis, *Grù.* Rarissima.

Digitized by Google

Otis Tarda. Accidentale.
Otis Tetrax. Rara assai.
Œdicnemus scolopax, *Teston.* Comune al piano.
Charadrius Pluvialis, *Testonotto.* Comune al piano.
Squatarola helvetica. Rarissima.
Eudromias Morinellus. Piuttosto rara.
Ægialitis cantiana, *Curentin.* Piuttosto raro.
Æ. curonica, *Curentin.* Piuttosto raro.
Æ. Hiaticula, *Pio-piò.* Piuttosto raro.
Vanellus Capella, *Galinétta*, *Marzéu.* Piuttosto rara.
Hæmatopus Ostralegus, *Beccassa de ma.* Rarissima.
Himantopus candidus. Rarissimo.
Pelidna subarquata. Raro, in primavera.
Actodromas minuta. Raro, in primavera.
Machetes Pugnax. Rarissima.
Tringoïdes Hypoleucus, *Piò-piò*, *Curentin.* Non raro.
Totanus Ochropus, *Cugianco d' aegua.* Non raro.
T. Glareola, *Piò-piò.* Non raro.
T. stagnatilis, *Piò-piò.* Non raro.
T. Calidris, *Piò-piò.* Non rara.
T. fuscus, *Curenton.* Raro.
Limosa melanura, *Beccassa d' ma.* Avventizia.
L. rufa. Avventizia.
Scolopax Rusticula, *Beccassa.* Comune assai.
Gallinago major, *Becassin mazzengo.* Rarissimo.
G. cælestis, *Beccassin reà.* Rara.
G. Gallinula, *Beccassin sordo.* Raro.
Numenius Arquata, *Poulin d' acqua.* Al piano.
N. tenuirostris. Rarissimo.
Sterna fluviatilis, *Ochin.* Frequente.
Sternula minuta. Raro.
Hydrochelidon nigra. Meno raro della specie precedente.
Chroocephalus melanocephalus. Accidentale.
Podiceps cristatus, *Cassasut.* Raro.
Podiceps nigricollis, *Suttacquin.* Raro.
Podiceps fluviatilis, *Cassasut pcit.* Meno scarso.

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli che sono sedentarie nella provincia di Alessandria, circondario di Voltaggio.

Corvus Cornix.
Pica rustica.
Garrulus glandarius.
Sturnus vulgaris.
Fringilla cœlebs.
Passer montanus.
P. Italiæ.
Carduelis elegans.
Cannabina Linota.
Miliaria Projer.
Emberiza Citrinella.
E. Cirlus.
E. Cia.
Alauda arborea.
A. arvensis.
Galerita cristata.
Motacilla alba.
Calobates melanope.
Monticola Cyanus.
Merula nigra.
Turdus viscivorus.
Erithacus Rubecula.
Ruticilla titys.
Pratincola Rubicola.
Monachus Atricapillus.
Troglodytes parvulus.
Accentor collaris.
Cinclus aquaticus.
Regulus cristatus.
R. ignicapillus.
Parus major.
Certhia brachydactyla.
Tichodroma muraria.
Picus major.
P. minor.
Gecinus viridis.
Alcedo Ispida.
Athene Noctua.
Cerchneis Tinnunculus.
Perdix rufa.
Starna Perdix.

Elenco delle specie di uccelli che nidificano nel distretto di Voltaggio, provincia di Alessandria, con note di frequenza.[1]

Garrulus glandarius. Comunissima.

Sturnus vulgaris. Comune da pochi anni.

---

[1] Mentre posso dare esattissima la nota degli uccelli che annidano nel distretto, sono dolente di dover sorvolare a tutte le altre questioni

Digitized by Google

Fringilla cœlebs. Comunissimo.
F. Montifringilla. Rarissima.
Petronia stulta. Comune.
Passer montanus. Comunissima.
P. Italiæ. Comunissima.
Coccothraustes vulgaris. Rarissimo.
Ligurinus Chloris. Comune.
Carduelis elegans. Comune.
Cannabina Linota. Comune.
Pyrrhula europæa. Rarissimo.
Miliaria Projer. Comune.
Emberiza Citrinella. Comune.
E. Cirlus. Comune.
E. Hortulana. Comunissimo.
E. Cia. Comune.
Alauda arborea. Comune.
Budytes flavus. Comune.
Motacilla alba. Comune.
Calobates melanope. Meno della precedente.
Saxicola Oenanthe. Scarseggia.
S. albicollis. Rarissima.
S. Stapazina. Rarissima.
Monticola saxatilis. Comunissimo.
M. Cyanus. Rara assai.
Merula nigra. Comunissimo.
Turdus viscivorus. Comunissima.
Aëdon Luscinia. Comunissimo.
Erithacus Rubecula. Comune.
Ruticilla Phœnicurus. Comune.
R. titys. Comune.
Pratincola Rubicola. Scarseggia.
P. Rubetra. Scarseggia.
Sylvia nisoria. Scarseggia.
S. orphæa. Comune.
S. cinerea. Comune.
S. Curruca. Scarsa.
S. subalpina. Scarsa.
Monachus Atricapillus. Comune.
M. hortensis. Comune.
Phylloscopus Bonellii. Comune.
Ph. rufus. Scarseggia.
Hypolais polyglotta. Scarseggia.
Cisticola cursitans. Scarseggia.
Troglodytes parvulus. Comune.
Cinclus aquaticus. Comune.
Accentor collaris. Scarso.
Regulus cristatus. Raro.
R. ignicapillus. Raro.
Acredula rosea. Scarsa.
Parus major. Comunissima.
Certhia brachydactyla. Comune.
Tichodroma muraria. Scarso.

---

fatto in merito alla nidificazione, e per non aver avuto il presente questionario che quando buona parte degli uccelli avevano già costrutto da molto il loro nido, e per mancare d' uno speciale permesso, che mi preservasse da una contravvenzione alla quale sarei certo andato incontro se avessi voluto attendere alle osservazioni rigorose, delle quali erami mestieri per poter rispondere al presente quesito. Nella speranza di potere in una prossima primavera meglio rispondere a tali domande, mi limito a segnare qui le specie che mi risulta certissimo annidare nel distretto.

Digitized by Google

Lanius minor. Rarissima.
L. Collurio. Comune.
L. auriculatus. Comune.
Muscicapa collaris. Rarissima.
Butalis Grisola. Rarissimo.
Hirundo rustica. Rara.
Chelidon urbica. Comunissimo.
Cotile rupestris. Rara.
Cypselus Apus. Comunissimo.
Caprimulgus europæus. Comunissimo.
Picus major. Raro.
P. minor. Raro.
Gecinus viridis. Comune.
Iynx Torquilla. Comune.
Cuculus canorus. Comune.
Alcedo Ispida. Comune.
Upupa Epops. Comune.
Strix flammea. Rarissimo.
Syrnium Aluco. Rarissimo.
Asio Otus. Rarissimo.
A. accipitrinus. Casualmente.
Athene Noctua. Comune.
Scops Giu. Raro.
Bubo maximus. Rarissimo.
Circaëtus gallicus. Rarissimo.
Buteo vulgaris. Rarissima.
Cerchneis Tinnunculus. Comune.
Accipiter Nisus. Scarso.
Columba Palumbus. Raro.
Turtur tenera. Comune.
Perdix rufa. Comune.
Starna Perdix. Comune.
Coturnix communis. Rarissima.
Tringoïdes Hypoleucus. Raro.
Sterna fluviatilis. Scarso.

Elenco delle specie di uccelli che sono di passaggio regolare nel distretto di Voltaggio, nella provincia di Alessandria. [1]

Sturnus vulgaris. Giunge ad aprile, parte a luglio; ripassa a settembre e novembre.
Fringilla cœlebs. Autunno, da ottobre a metà novembre.
F. Montifringilla. Autunno, da novembre a metà febbraio.
Petronia stulta. Giunge in aprile, parte nell'ottobre.

[1] Fra le specie che fanno passaggio regolare, io annoto anche alcune di quelle, che, pur essendo fra le sedentarie, sogliono nelle epoche delle migrazioni aumentare di numero per quegli individui che venendo da luoghi più settentrionali del nostro, soffermansi nel loro transito qualche tempo in questo distretto.

Digitized by Google

Passer montanus. Dalla fine di settem. alla metà di novem.

P. Italiæ. Dalla fine di settembre alla metà di novembre.

Ligurinus Chloris. Giunge ad aprile, parte dalla metà d'ottobre alla metà di novembre.

Carduelis elegans. Fa passo da settembre alla fine di ottobre.

Cannabina Linota. Passa in autunno, dalla fine d'agosto a tutto novembre.

Miliaria Projer. Da settembre a febbraio.

Emberiza Citrinella. Dalla metà d'agosto a tutto dicembre.

E. Cirlus. Dal principio di settembre a tutto novembre.

E. Hortulana. Arriva nell'aprile e annida, parte dall'agosto alla fine di settembre.

E. Cia. Arriva alla metà d'aprile e annida, parte continuando il passo a tutto novembre.

Alauda arborea. Arriva alla metà d'aprile e annida, parte continuando il passo a tutto novembre.

Anthus pratensis. Passa in autunno dalla metà d'ottobre alla fine di novembre.

A. trivialis. Passa da apr. a magg. e da luglio a tutto ottob.

A. Spipoletta. Passa da apr. a magg. e da ottob. a tutto febbr.

Budytes flavus. Arriva alla metà di marzo, passa fino a tutto ottobre.

Motacilla alba. Arriva alla metà di marzo, passa fino a tutto ottobre.

Calobates melanope. Giunge in aprile e annida, parte nel settembre.

Saxicola Oenanthe. Giunge nella seconda metà d'aprile, parte nell'ottobre.

Monticola saxatilis. Arriva nel maggio, parte dall'agosto a tutto settembre.

Merula nigra. Arriva coll'aprile, parte fra l'ottobre e tutto il novembre.

Turdus iliacus. Fa solo passo autunnale da ottobre a gennaio.

T. musicus. Passa tra il marzo e l'aprile scarso, ripassa abbondante fra il settembre ed il novembre.

T. viscivorus. Giunge a febbraio, passa in autunno dal principio d'ottobre al dicembre.

Digitized by Google

Aëdon Luscinia. Giunge alla fine di marzo, parte dentro l'ottob.

Erithacus Rubecula. Arriva a marzo, parte da ottobre alla fine di novembre.

Ruticilla Phœnicurus. Arriva a marzo, parte da settembre alla fine d'ottobre.

R. titys. Arriva a marzo, passa da settemb. alla fine di ottob.

Pratincola Rubicola. Giunge alla metà d'aprile, scompare nell'ottobre.

P. Rubetra. Arriva nel marzo, parte fra l'ottob. ed il novemb.

Sylvia orphæa. Giunge a metà d'aprile, parte nell'agosto.

Monachus Atricapillus. Giunge a metà di marzo, parte nella 1ª quindicina di settembre.

Phylloscopus sibilator. Arriva al principio d'aprile, parte nel settembre.

Hypolais polyglotta. Arriva al principio d'aprile, parte nel settembre.

Troglodytes parvulus. Giunge nell'aprile, parte in tutto il novembre.

Parus major. Arriva nel marzo (fine), fa passaggio dalla fine d'ottobre alla fine di novembre.

Oriolus Galbula. Giunge dal 10 al 20 aprile, parte dalla metà d'agosto alla fine di settembre.

Lanius Collurio. Dalla metà d'aprile a tutto settembre.

L. auriculatus. Dalla metà d'aprile a tutto settembre.

Hirundo rustica. Arriva alla fine di marzo, passa in partenza a tutto ottobre.

Chelidon urbica. Dal principio di marzo a tutto ottobre.

Cypselus Apus. Dall'aprile a tutto settembre.

Caprimulgus europæus. Dal principio di magg. a tutto sett.

Iynx Torquilla. Arriva alla metà di marzo, scompare nel settembre.

Cuculus canorus. Dal principio d'aprile alla fine di settembre.

Upupa Epops. Dalla metà di marzo alla fine di settembre.

Asio accipitrinus. Dal principio d'aprile alla metà di maggio, e dalla metà d'ottobre alla metà di novembre.

Cerchneis Tinnunculus. Passa in qualche abbondanza da settembre a novembre.

Digitized by Google

Accipiter Nisus. Da aprile ai primi di giugno, e dalla fine di settembre a tutto novembre.

Turtur tenera. Dalla fine di aprile alla prima metà di sett.

Vanellus Capella. Dalla fine d' ott. alla prima metà di nov.

Scolopax Rusticula. Dalla fine di febbraio a tutto marzo, e dalla fine di settembre a tutto dicembre.

Elenco delle specie di uccelli da considerarsi come di apparizione accidentale nella provincia di Alessandria.

Corvus Corax.
Lycos Monedula.
Nucifraga Caryocatactes.
Pastor roseus.
Montifringilla nivalis.
Ægiothus rufescens.
Carpodacus erythrinus.
Emberiza cæsia.
Melanocorypha Calandra.
Agrodroma Richardi.
Saxicola albicollis.
Saxicola Stapazina.
Merula torquata.
Cyanecula Wolfi.
Sylvia nisoria.
Pyrophthalma melanocephala.
Melizophilus sardus.
Acrocephalus arundinaceus.
Acrocephalus streperus.
Potamodus luscinioïdes.
Cettia Cettii.
Ægithalus pendulinus.
Hirundo rufula.
Coracias Garrula.
Merops Apiaster.
Circus æruginosus.
Circus cyaneus.
Circus cineraceus.
Archibuteo lagopus.
Cerchneis Naumanni.
Astur palumbarius.
Egretta alba.
Egretta Garzetta.
Ardeola ralloïdes.
Botaurus stellaris.
Ciconia alba.
Plegadis Falcinellus.
Cygnus musicus.
Mergus Merganser.
Otis Tarda.
Otis Tetrax.
Squatarola helvetica.
Hæmatopus Ostralegus.
Himantopus candidus.
Limosa melanura.
Limosa rufa.
Chroocephalus melanocephalus.
Podiceps cristatus.
Podiceps nigricollis.

Digitized by Google

Novara, circondario di Ossola (Bazetta capitano Giulio, Pertusi dott. cav. Alessandro):

L' Ossola superiore dal punto di vista faunistico, si può considerare limitato dai seguenti confini: Il bacino del Toce dalle sue sorgenti sino ad Ornavasso, più le vallate secondarie di Anzasca, Antrona, Bognanco, Divedro, Antigorio, Formazza e Vigezzo. Queste valli sono delimitate, verso la Svizzera, dai confini di Stato. Solo per la Valle Vigezzo, parmi convenga comprendere nel territorio faunistico ossolano i due distretti che, pur facendo parte del Mandamento di Santa Maria Maggiore, non appartengono, topograficamente, al bacino del Toce, e cioè il territorio al di là del passo di Finero sino alla galleria di Cursolo ove incomincia il territorio di Valle Canobbina, e l' altro dei Bagni di Craveggia che pur formando la testata della Valle Ousernone (Canton Ticino), in quel tratto dipende dal mandamento di Santa Maria Maggiore, Valle Vigezzo.

Il territorio faunistico ossolano, così delineato, presenta i seguenti principali caratteri fisici: L' Ossola è compresa in quel tratto che si estende nel versante delle alpi Leponzie, dal Monte Rosa al Gries, sotto il 26° di longitudine orientale, intersecato dal 46° di latitudine. Confina, ad O. ed a N. col Canton Vallese; a NE. ed a E. col Canton Ticino; a S. col circondario di Pallanza. Ad O. ed a N., l' Ossola è ricinta dalla catena delle Alpi che partendo dal gruppo del Monte Rosa si prolunga a semicerchio fino al Gries dal cui massiccio hanno poi origine i contrafforti che la separano ad E., dal Canton Ticino fino al monte Limidario. Un nucleo di monti, che potrebbe considerarsi come gruppo isolato, segna il confine col circondario di Pallanza, verso il S.

Ghiacciai, nevi perpetue e nude roccie segnano i punti più culminanti che delimitano i confini di Stato, anche qui astrazione fatta, per quel tratto di confine in Valle Vigezzo. Ai ghiacciai ed alle nevi perpetue fanno seguito zone

Digitized by Google

di pascoli alpini che vanno man mano declinando sino agli altipiani delle valli, altipiani in gran parte abitati in ogni stagione dell' anno che, come in Valle Formazza ad Agaro, in Valle Anzasca a Macugnaga ecc., trovansi fra i 1200 ed i 1500 metri di altitudine sul livello del mare. Le valli secondarie già nominate, nonchè le piccole vallate terziarie sono tutte percorse da torrenti che, più su, più giù, sboccano nel fiume Toce.

Oltre 53 laghetti alpini, quali più quali meno estesi e profondi, trovansi sparsi in questa zona alpina e non sono rari quelli che sono situati a ben 2500 metri d' altitudine. Desumendolo dai dati decennali dell' Osservatorio Meteorologico di Domodossola abbiamo, per l' estate, una massima di caldo di + 31° ed una minima di + 15°; e per l'inverno una massima di + 10° ed una minima di — 9°. La temperatura media annuale oscilla fra i + 13° ed i 15°. La neve cade frequente durante l' inverno, l' autunno e la primavera, ciò massime sulle vette e sugli altipiani delle valli, tanto che alcuni pascoli ne sono ancora ricoperti in giugno e sonvi laghetti alpini gelati a mezzo luglio. Nel bacino della Valle del Toce si coltivano tuberi, viti e grani. Vi predominano le praterie. — I boschi di ontani sorgono rigogliosi ovunque l' infiltrazione delle acque forma terreno paludoso. I pioppi, le querci, i gelsi, gli alberi da frutta sono comuni al piano. I boschi cedui ed i castagneti salgono sui versanti sin oltre gli 800 metri. Seguono quindi zone di betule e faggi a cui fanno seguito boschi di conifere che per ultimo limite hanno larga zona di mirtilli e rododendri che si spingono sin presso le ultime morene. L' avifauna Ossolana è rappresentata da quasi tutte le specie proprie e caratteristiche dell'avifauna Alpina. (*Bazetta*).

La Valle, o circondario, dell' Ossola è formata dal bacino del fiume Toce e dai suoi sette affluenti che decorrono da sette vallate disposte a guisa delle dita allungate di una mano e sono: Valle Anzasca, Antrona, Bognanco, Divedro,

Digitized by Google

Antigorio, Formazza o Isorno e Vigezzo; tutte confluenti nel bacino di Domodossola. Ha la direzione da N. a S. con a destra e ad O. le valli Anzasca, Antrona, Bognanco e Divedro (Sempione); a N. quelle di Antigorio, Formazza od Isorno (sorgenti del Toce); ad E. Val Vigezzo. Confina colla Svizzera in tutta questa cornice di altissimi monti, e così ad O. ha il Monte Rosa e il Monte Leone, a N. il Gries, coi loro immensi ghiacciai; ad E. ha monti meno elevati.

La fauna ornitologica Ossolana presenta pressochè tutte le specie proprie della fauna Alpina, non che molte comuni al piano della Lombardia. Cosicchè mentre si hanno in alto i Francolini, il Fringuello della neve ecc., al piano si hanno le Quaglie, l'Usignolo ecc. (*Pertusi*).

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nel circondario di Ossola, provincia di Novara, coi nomi volgari locali, indicazioni di frequenza, ecc.[1]

Corvus Corax, *Coûrv*, *Scorbatt.* Raro; abita gli alti monti; non so se nidifica.

Corvus Cornix. Rarissimamente se ne trova qualche individuo unito ai Corvi.

Corvus frugilegus, *Coûrv*, *Scorbatt.* Comune; di passo.

Nucifraga Caryocatactes, *Nisciolera.* Nidifica sui monti; non troppo comune, non potei ancora procurarmi ova o nidiacei.

Pica rustica, *Berta.* Non nidifica nell'Ossola, ne posseggo due esemplari, vi compare accidentalmente; è comune nel Novarese.

---

[1] Questo elenco è dovuto al capitano Bazetta, il compianto dott. Pertusi avendo contribuito annotazioni intorno alle specie a lui più note, le quali meno poche eccezioni coincidono con quelle date dal capitano Bazetta.

Digitized by Google

Garrulus glandarius, *Gasgía*, *Gagía*. Comune; nidifica al piano ed al monte; non oltre i 600 metri (*Pertusi*).

Pyrrhocorax alpinus, *Pagiôn*. Comune sui monti; nei rigidi inverni scende al piano; al primo bel tempo risale.

Pyrrhocorax Graculus. Due volte venne trovato misto ai branchi dei Gracchi; è rarissimo nell' Ossola.

Sturnus vulgaris, *Stoûrnell*, *Stornell*. Non è comune all' epoca della riproduzione; capita a piccoli branchi in autunno e primavera.

Pastor roseus. Mi è nota la cattura di due giovani maschi presi molti anni sono.

Fringilla cœlebs, *Franguel*, *Franguèi*. Comune; nidifica al piano ed ai monti; emigra; pochi rimangono stazionarii.

Fringilla Montifringilla, *Franguel montan*, *Montan*. Giunge di passo autunnale in branchi; non mi consta abbia nidificato nell' Ossola.

Montifringilla nivalis, *Franguel d'la nev*, *Franguel d'montagna*. Nidifica in prossimità dei ghiacciai; vive a branchi; raramente scende al piano nell' inverno.

Passer montanus, *Passara*, *Passarin*; *Passarot*. Frequente; va generalmente confusa col Passero comune.

Passer Italiæ, *Passara*, *Passarin*, *Passarot*. Comune e sedentaria; abbonda al piano; pochi al monte (*Pertusi*).

Coccothraustes vulgaris, *Frisôn*, *Sfrisôn*. Non mi consta abbia nidificato nell' Ossola; giunge più o meno in numero nell' autunno.

Ligurinus Chloris, *Verdôn*, *Amolott*. Nidifica al piano ed al monte; molti giungono di passo primaverile ed autunnale.

Chloroptila Citrinella. Non posso con certezza accennare a questa specie (*Bazetta*); ne inviai uno al Museo di Firenze (*Pertusi*).

Chrysomitris Spinus, *Rigorin*, *Rigolin*. Un certo numero nidifica sui nostri monti; giunge a branchi nel novembre.

Carduelis elegans, *Ravanin*. Nidifica di preferenza al piano; comune; giunge di passo in branchi.

Serinus hortulanus, *Pinin*, *Sverzellin*, *Verzellin*. Nidifica di

Digitized by Google

preferenza ai monti; non è comune; giunge di passo primaverile e autunnale.

Cannabina Linota, *Fannin*, *Fannett.* Nidifica sui monti sin oltre i 1200 metri; giunge in branchi a primavera ed autunno.

Ægiothus rufescens, *Fannin bastard.* Nidifica ai monti; non è comune; giunge talvolta di passo frammisto al Montanello.

Pyrrhula europæa, *Ziffolot*, *Ciuffolot.* Alcune coppie nidificano sui monti; giunge di passo; non è comune.

Loxia Curvirostra, *Becc in crôs.* Non ho mai potuto avere ova o nidiacei di questa specie; alcuni anni è comune in tutte le stagioni sui monti; passano anni invece che pochi se ne vedono.

Emberiza Citrinella, *Spajarda.* Nidifica sui monti; è comune; branchi ne giungono di passo primaverile ed autunnale; pochi individui si trovano anche nell'inverno.

Emberiza Cirlus. Alcuni piccoli branchi capitano d'autunno.

Emberiza Hortulana, *Ortolan.* Giungono di primavera ed in autunno; alcune coppie nidificano.

Emberiza Cia, *Zipp.* Giungono di primavera ed in autunno; alcune coppie nidificano.

Emberiza pusilla, *Zipp.* Giungono di primavera ed in autunno; alcune coppie nidificano; assai più raro della specie precedente.

Emberiza Schœniclus. Raro.

Melanocorypha Calandra, *Calandra.* Rara; qualche individuo giunge di passo.

Alauda arborea, *Lodola.* Giunge d'autunno e primavera; ne rimangono alcune d'inverno; nidifica sui monti.

Alauda arvensis, *Lodola.* Giunge d'autunno e primavera; ne rimangono alcune d'inverno; nidifica sui monti.

Galerita cristata, *Lodola.* Giunge di passo; non so se abbia nidificato.

Agrodroma campestris, *Calandra.* Giunge di passo; non so se abbia nidificato.

Anthus pratensis, *Vinascina*, *Vit-vit.* Nidifica sui monti sin

Digitized by Google

presso i 2000 metri; scende al piano in autunno; ne rimangono anche nell' inverno.

Anthus trivialis, *Dordina.* Giunge di passo; alcune coppie nidificano sui monti.

Anthus Spipoletta, *Vitt-vitt.* Nidifica sui monti.

Budytes flavus, *Gialdirola*, *Piss-piss.* Alcuni nidificano; giunge numeroso in settembre.

Budytes cinereocapillus, *Gialdirola*, *Piss-piss.* Meno comune della specie precedente, colla quale viene confusa.

Motacilla alba, *Ballarina*, *Tremacôva.* Comune e nidificante; molte giungono di passo.

Calobates melanope, *Ballarina gialda*, *Gialdirola.* Meno comune della precedente; nidifica; molte giungono di passo.

Saxicola Oenanthe, *Cú bianc*, *Cul bianc.* Giunge in primavera; nidifica sui monti sin oltre i 2000 metri; discende al piano in autunno.

Monticola saxatilis, *Côvarousson*, *Corossolon.* Non è tanto comune; nidifica fra gli scogli; non si innalza oltre i 1000 metri; emigra.

Monticola Cyanus, *Passera solitaria.* Non è tanto comune; nidifica fra gli scogli; non si innalza oltre i 1000 metri; emigra.

Merula nigra, *Merlo*, *Merl.* Comune al piano e ai monti; non sale oltre i 1400 o 1500 metri; se ne rinvengono in discreto numero anche d' inverno; sono forse quelli che hanno nidificato al piano.

Merula torquata, *Merlo d' montagna.* Non è molto comune; abita gli alti boschi; nidifica, ma non potei mai averne i piccini; non emigra e solo nei rigidi inverni scende verso il piano.

Turdus pilaris, *Viscarda*, *Calandar.* Nidifica sugli alti monti nei boschi di faggi; emigra; ne rimangono anche d'inverno.

Turdus iliacus, *Zipp, Zippar.* Giunge di passo autunnale; non so se abbia nidificato sui nostri monti; emigra.

Turdus musicus, *Dôrd.* Nidifica nei nostri monti fin circa i 1400 e 1500 metri di altitudine; emigra.

Digitized by Google

Turdus viscivorus, *Dresch.* Nidifica al piano e sui monti; lo ho trovato nidificante sin oltre i 2000 metri di altitudine; emigra.

Aëdon Luscinia, *Roussignêul*, *Roussignêu.* Giunge in aprile; nidifica; riparte in settembre.

Erithacus Rubecula, *Pett-rouss*, *Pettarouss.* Giunge in aprile; nidifica; riparte in sett.; alcuni rimangono l'inverno.

Cyanecula Wolfi. Compare accidentalmente in maggio; so di tre soli esemplari catturati nell' Ossola; sono tre maschi adulti; due si conservano nel Museo Galletti a Domodossola.

Ruticilla Phœnicurus, *Covarôss*, *Coûvaroûs.* Comune, nidifica di preferenza ai monti; non sale oltre i 1200 metri; emigra; alcuni rimangono durante l' inverno.

Ruticilla titys, *Covarôss d' montagna.* Comune; nidifica sugli alti monti sin oltre i 2000 metri; emigra; pochi se ne trovano l' inverno.

Pratincola Rubicola, *Morêu, Moreûl*, *Scimarêul.* Abita e nidifica di preferenza sugli alti monti; emigra; alcuni pochi rimangono d' inverno.

Pratincola Rubetra, *Morêu*, *Moreûl*, *Scimarêul.* Meno comune della specie precedente con la quale viene generalmente confuso.

Monachus Atricapillus, *Capnegàr.* Giunge in aprile; nidifica al monte ed al piano; emigra.

Monachus hortensis, *Pizzafigh*, *Beccafigh.* Giunge in aprile; nidifica al monte ed al piano; vedesi numeroso in settembre; emigra.

Phylloscopus sibilator, *Tuin*, *Tui.* Giunge in aprile; nidifica al monte ed al piano; non è abbondante come la specie precedente; emigra.

Phylloscopus Trochilus, *Tuin*, *Tui.* Giunge in aprile; nidifica al monte ed al piano; meno comune della specie precedente; emigra.

Troglodytes parvulus, *Re di scês*, *Rè-rè.* Nidifica al piano e di preferenza ai monti, ove lo ho trovato sin oltre i 2000 metri; alcuni rimangono d' inverno.

Digitized by Google

Cinclus aquaticus, *Fôlar*, *Merlo d' acqua*, *Merlo acquirêu*. Nidifica lungo i torrenti montani; d' estate lo si rinviene sino a 2500 metri; scende al piano in autunno.

Accentor collaris, *Passra d' montagna*, *Franguel d' montagna*. Abita e nidifica sulle vette; nei rigidi inverni scende talvolta al piano.

Regulus cristatus, *Stellin*, *Usell ad la Madona*. Nidifica ai monti; se ne trovano nel tardo autunno e d' inverno.

Regulus ignicapillus, *Stellin*, *Usell ad la Madona*. Nidifica ai monti; se ne trovano nel tardo autunno; è confuso con la specie precedente.

Acredula caudata, *Côva longa*, *Parasciolina*. Abita le foreste di pini; non è comune; scende al piano nell' inverno.

Acredula rosea, *Côva longa*, *Parasciolina*. Assai più comune della precedente; nidifica anche al piano; vive in branchi; credo sia specie sedentaria; va confuso con la specie precedente.

Parus major, *Parusciola*, *Perusciola*. Comune; nidifica al piano ed ai monti; molte ne giungono di passo; se ne trovano anche d' inverno.

Parus ater, *Parusciolettа*, *Perusciolina*. Abita e nidifica ai monti; scende al piano; è meno comune della specie precedente; se ne trovano anche nell' inverno.

Cyanistes cæruleus, *Monighina*. Comune al monte ed al piano; abbastanza frequente anche d' inverno; forse sedentaria.

Poecile borealis. Rara assai; ebbi un solo esemplare a preparare.

Lophophanes cristatus, *Parusciolettа d' montagna*. Non può dirsi comune, ma nemmeno rara; abita e nidifica nei boschi di pini; raramente la si incontra al piano, anche nell' inverno.

Sitta cæsia, *Pich-togu*, *Piccasciett*, *Pich muradôur*. Comune, di preferenza sui monti che non al piano, non sale però molto in alto; frequente al piano nell' inverno ed autunno; credo sia stazionario.

Certhia familiaris, *Rampighin*. Comune al monte ed al piano; sedentario.

Digitized by Google

Certhia brachydactyla, *Rampighin.* È confusa con la specie precedente; è più comune al piano meno ai monti; sedentaria.

Tichodroma muraria, *Uscell' dal frecc*, *Piccascin d' montagna.* Non è comune; abita e nidifica sui monti; l' ho osservato tra i 1500 ed i 1800 m. d'altezza; nell' inverno se ne vedono al piano e fino nei paesi sui campanili e le torri.

Oriolus Galbula, *Galbè*, *Merlo Galbè.* Giunge in maggio e nidifica; non è comune; riparte in settembre.

Lanius Excubitor, *Stragazza molinara*, *Stragazzon.* Giunge d'autunno ed in primavera; non è comune; non mi risulta che nidifichi nell' Ossola.

Lanius minor, *Stragazzon.* Giunge in primavera; nidifica; riparte in settembre; non è comune.

Lanius Collurio, *Stragazza.* Giunge in primavera; più abbondante della specie precedente; nidifica; emigra.

Lanius auriculatus, *Stragazzon*, *Stragazza.* Giunge in primavera; meno comune della specie precedente; nidifica; emigra.

Hirundo rustica,[1] *Rôndola*, *Rôndolina.* Comunissima dal marzo al settembre.

Chelidon urbica, *Sassareûl*, *Cu-bianc.* Comunissimo dal marzo al settembre.

Cotile rupestris,[2] *Sassareûl d'montagna.* Comunissima dal marzo a settembre presso le scogliere; mai nei paesi. Nidifica.

Cypselus Apus, *Rôndolôn.* Comunissimo dal marzo a settemb.

Cypselus Melba,[3] *Piv*, *Pivi*, *Rôndolôn d' montagna.* Giunge in

---

[1] Il giorno 4 novembre 1878 ho veduta una rondine volare lungo i bastioni di Novara. Il giorno 25 ottobre 1882 ed il 15 ottobre 1883 hò veduto ancora alcune rondini nei dintorni di Domodossola.

[2] Nel gennaio 1873, trovandomi di guarnigione a Modica (Sicilia), osservai più volte questa specie aggirarsi presso le scogliere dei dintorni, e potei assicurarmi che passavano la notte entro le grotte numerosissime in quel luogo.

[3] Noto che mentre nell'Ossola il *C. Melba* non si rinviene che assai in alto sui monti, ad Omegna, circondario di Pallanza, nidifica sul

Digitized by Google

maggio; abita e nidifica sulle scogliere nei monti; l'hò trovato nidificante ad oltre 2000 metri.

Caprimulgus europæus, *Nòcciola*. Giunge in maggio; non è comune; nidifica; parte in settembre.

Dryocopus martius,[1] *Pich nègar*, *Pich d' montagna*. Non è tanto comune; abita e nidifica nei boschi di conifere; non sale oltre i 1500 metri; sedentario.

Picus major, *Pich roûss*, *Pich cul roûss*. Abbastanza comune; abita e nidifica di preferenza sui monti, ma non sale tanto in alto; sedentario.

Picus minor, *Piccascin d' montagna*, *Piccascett*. Piuttosto raro; abita le foreste di pini; raramente scende al piano; sedentario.

Gecinus viridis, *Picch*, *Piccasc*, *Pich vert*. Comune al piano ed al monte sale circa ai 1000 metri; sedentario.

Iynx Torquilla, *Stortacoll*. Giunge alla fine di marzo; nidifica; riparte in ottobre; abita il piano ed il monte.

Cuculus canorus, *Cú-cú*. Giunge in maggio; riparte in settembre. So di Cuculi che hanno deposto uova in nidi di Codirossi spazzacamini a 2000 metri di altitudine.

Alcedo Ispida, *Martin pescadôr*, *Piombin*, *Serena*. Non è raro; nidifica; non sale molto in alto lungo i torrenti montani. Lo credo specie sedentaria o di migrazione limitatissima.

Coracias Garrula. In 30 anni so di due individui presi nell' Ossola.

Merops Apiaster. In 30 anni so di due soli individui presi nell' Ossola. (Un maschio ed una femmina adulti, presi in primavera).

Upupa Epops, *Buba*, *Bubbola*, *Puppola*. Giunge in aprile; nidifica; riparte in settembre.

---

campanile di quella parrocchiale, ove ogni anno se ne osservano alcuni branchi.

[1] Il 6 giugno 1885, il 19 giugno 1886, il 21 giugno 1884 ebbi giovani *Dryocopus* già atti al volo. Ne ho spesso allevati. Nei nidiacei si distinguono digià i maschi dalle femmine. Notai che in essi l' occhio è scuro invece che giallo chiaro come negli adulti.

Digitized by Google

Strix flammea, *Dama*, *Bella donna*. Il sig. dott. cav. Pertusi mi assicura d'aver veduti i nidiacei di questa specie. Non avendo simili osservazioni credo sia rara nell' Ossola.

Syrnium Aluco, *Olôch*, *Oloûch*, *Lolôch*. Comune. Ebbi adulti di questa specie nel dicembre e gennaio; sedentario; abita di preferenza il monte.

Asio Otus, *Dug piscnin*, *Scvetton*. Meno comune della specie precedente. Sono convinto emigri, non avendone mai veduti nell' inverno.

Asio accipitrinus, *Scvetton*. Giunge di passo. Non mi consta nidifichi; raro.

Athene Noctua, *Scvetta*, *Scivetta*, *Svetta*. Rara nell' Ossola superiore; comune nell' Ossola inferiore.

Scops Giu, *Cioûc*, *Sciscieûl*. Giunge in maggio; nidifica; riparte in ottobre; abbastanza comune.

Bubo maximus, *Dugo*, *Dug*, *Gran Dug*, *Dus*. Abbastanza comune; nidifica; sale sui monti sino ai 2000 metri. Credo sia sedentario.

Circus aeruginosus, *Falchètt*. Raro. Un solo esemplare ne conservo nella raccolta ornitologica ossolana.

Circus cyaneus, *Falchètt*. Rara. Due esemplari ne conservo nella raccolta ossolana.

Aquila Chrysaëtus, *Aquila*. Nidifica. Credo poter asserire che nel dicembre compie limitate emigrazioni.

Buteo vulgaris, *Pojana*, *Eula*, *Pojanon*. Comune; nidifica; sedentaria.

Pernis apivorus, *Falchett*. Pochi giungono di passo. Non so se nidifichi.

Hypotriorchis Subbuteo, *Falchett*. Pochi giungono di passo. Non so se nidifichi nell' Ossola.

Æsalon regulus, *Falchett*. Pochi giungono di passo. Non so se nidifichi.

Cerchneis Tinnunculus, *Falchett*. Comune e sedentario.

Cerchneis vespertinus, *Falchett*. Alcuni giungono di passo.

Astur palumbarius, *Falchett*. Conosco una sola cattura. È una femmina adulta presa sulla vetta del monte Moro, a 3000 metri di altitudine.

Digitized by Google

Accipiter Nisus, *Falchett.* Meno comune del Gheppio, ma nidificante.

Pelecanus Onocrotalus. Accidentale.

Phalacrocorax Carbo. Accidentale.

Ardea cinerea, *Airon*, *Sgolgia.* Alcune coppie giungono di passo in maggio. Non mi consta abbia nidificato.

Ardea purpurea, *Airon*, *Sgolgia.* Alcune coppie giungono di passo in maggio. Nel maggio 1876 ebbi due nidiacei; credo però si tratti di un caso isolato.

Ardetta minuta, *Sgolgin.* Non è comune; nidifica ogni anno.

Ciconia alba, *Cicogna.* Quasi ogni anno se ne vedono alcune nel maggio.

Anas Boscas, *Anida selvadiga.* Non è comune; giunge di passo. Quasi ogni anno alcune coppie nidificano.

Columba Palumbus, *Pivion selvadigh.* Giungono in maggio; non sono comuni; alcuni nidificano.

Perdix saxatilis, *Parnis*, *Pernis.* Comune, sedentaria.

Starna Perdix, *Parnigon*, *Pernisetta*, *Starna.* Comune nella bassa Ossola; rarissima nell'Ossola superiore.

Coturnix communis, *Quaja.* Giunge in maggio; nidifica anche sugli altipiani sin oltre i 1000 metri; riparte in settembre.

Lyrurus Tetrix, *Fasan* (il maschio), *Fasanella* (la femmina). Comune e sedentario; diventa ogni anno però più scarso (*Pertusi*).

Lagopus mutus, *Francolin*, *Sberna*, *Alberna.* Comune e sedentario.

Rallus aquaticus, *Grugnett.* Non comune; alcune coppie nidificano; emigra.

Ortygometra Porzana, *Gilardina.* Non comune; alcune coppie nidificano; emigra.

Crex pratensis, *Re di quaj.* Giunge in maggio; nidifica; riparte in settembre.

Gallinula chloropus, *Gallinetta d' acqua.* Non comune; non mi consta abbia nidificato.

Fulica atra, *Fôlaga.* Non comune; non mi consta abbia nidificato.

Digitized by Google

Grus communis. Accidentale.

Œdicnemus scolopax. Un solo esemplare ne ho veduto; preso in giugno.

Cursorius gallicus. Accidentale.

Charadrius Pluvialis. Accidentale.

Vanellus Capella, *Vannett*, *Pavonzina.* Piuttosto rara, di passo.

Machetes Pugnax. Accidentale.

Tringoïdes Hypoleucus. Non comune; nidifica (*Pertusi*).

Scolopax Rusticula, *Gallinascia*, *Beccascia.* Giunge in marzo ed in ottobre; si conoscono pochi casi dell' avvenuta nidificazione di questa specie nell' Ossola.

Gallinago cælestis, *Sgneppa.* Giunge in marzo ed in ottobre; non mi consta abbia nidificato.

Gallinago Gallinula, *Sgneppin.* Giunge in marzo ed in ottobre; non mi consta abbia nidificato.

Numenius Arquata. Accidentale.

Sterna fluviatilis. Qualche rara volta è comparsa.

Hydrochelidon hybrida. Qualche rara volta venne osservato.

Podiceps fluviatilis, *Foûlireûf*, *Sottacquin.* Nidifica, ma non è comune; lo credo sedentario.

- - -

Novara, distretti di Varallo, Piedimulera e Crodo (Rodino, cav. Giuseppe, Guarinoni Giov. Andrea, Danisi Vito, Demori Giuseppe):

Premesso che gli osservatori dei distretti forestali di Varallo, Piedimulera e Crodo hanno descritto i circondarî ove la loro inchiesta ornitologica ebbe luogo, darò soltanto alcune notizie riguardanti l' intera provincia, di cui i distretti medesimi fanno parte. La provincia di Novara confina a E. con quella di Milano, e col territorio della Confederazione Elvetica; a S. colle provincie di Alessandria e di Pavia; a O. e N. con quella di Torino. In essa sono compresi i circondarî amministrativi di Vercelli, Biella, Valsesia, Ossola, Pallanza e Novara.

Digitized by Google

Varia è la costituzione topografica della parte della provincia a cui si riferiscono le osservazioni della inchiesta ornitologica, racchiudendo essa una estesa pianura coltivata a cereali, ortaglie e prati, alternati da piantagioni di gelsi, pioppi, ontani e salici; svariate colline popolate di vigneti e boschi cedui di quercia, misti con altre specie legnose. Man mano che si sale in montagna, riscontransi castagni fruttiferi e boschi cedui della medesima specie, misti con qualche ceppaia di faggio. — Segue poscia la coltura del faggio predominante, e misto con abeti e pini silvestri. — Più in alto crescono gli abeti rossi e finalmente i larici fino all' elevazione di circa 2000 metri sul livello del mare.

Nella regione si ha adunque una terra coronata da altissime alpi e da monti, ancora ammantati di ricche foreste e pascoli naturali, che scendono in amene e deliziose colline popolate di boschi cedui e di ridenti vigneti; ubertose e feconde pianure provvedute di ampie valli con verdi prati, campi, orti e giardini. — Temperatura varia, dalla mite, rallegrata da acque di laghi, fiumi e copiosi torrenti, alla rigida causata da eterni ghiacciai.

Tutto ciò può dare asilo e ricetto ad un considerevole numero di uccelli, di specie diverse, delle quali nel seguente elenco sono indicate quelle note agli osservatori. (*Rodino*).

Le mie osservazioni ornitiche si restrinsero alla Valsesia, piccola regione alpestre sul versante meridionale delle Alpi Pennine a cui è collegata per il gruppo del Monte Rosa, posta sotto 45° 49′ di latitudine N. e 4° 11′ di longitudine O. dal meridiano di Roma. È circoscritta, da tre parti da catene montuose che si diramano dal Monte Rosa, e dalla quarta dalla pianura Novarese e Vercellese.

Confina, colla Valstrona e il Lago d' Orta ad E., per mezzo di una catena montuosa che si eleva da 400 metri sul livello del mare e raggiunge i confini al nord con un'elevazione di metri 2500; a N. colla Vallanzasca ossolana a mezzo di catena montuosa che mantenendo un' eleva-

Digitized by Google

zione media di metri 2500 sul livello del mare, va a congiungersi col Monte Rosa; ad O. colla Valle di Gressoney e Valstrona Biellese a mezzo d'altra catena che partendo dal Monte Rosa cioè da 3000 e più metri sul livello del mare si dirige verso il piano Vercellese; a S. con la pianura Vercellese e Novarese.

Entro siffatti limiti, la catena montuosa nordica protende nel senso della lunghezza della Valsesia due principali diramazioni dando luogo a tre valli, l'una percorsa dal fiume Sesia che scaturisce dalle falde nevose del Monte Rosa e forma il bacino principale lungo circa chilometri 50; la seconda percorsa dal torrente Sormenza che dopo un percorso di 26 chilometri, scendendo dai valloni di Rima e del Carcofaro, si getta nel Sesia; la terza percorsa dal torrente Mastallone che scendendo dal laghetto d'Euga, dopo un percorso di 25 chilometri, ingrossato da numerosi torrentelli, si getta esso pure nel Sesia. Le altre catene ad E. ed a O. hanno numerosissime diramazioni, cosicchè numerosissime sono le valli secondarie ed i sub-bacini che confluiscono nel Sesia e nel Mastallone diretti da E. a O. e da O. ad E. Ne consegue che i terreni che occupano il piano della valle, tenuti a campi ed a prati, non arrivano a 12000 ettari nella superficie complessiva del distretto di ettari 76,446. Per oltre 12,000 ettari la superficie è montuosa, occupata da boschi, pascoli, rocce e ghiacciai.

In tante e sì svariate condizioni del suolo che forniscono diversi aspetti di clima e di vegetazione, la Valsesia offre all'ornitologo lo studio di un gran numero di specie d'uccelli che sogliono in essa fermare loro stanza. Le immigrazioni in Valsesia d'oltr'Alpe non si verificano su gran scala. E la ragione n'è la disposizione delle catene montuose, l'elevatezza dei monti con ripido declivio e la direzione della Valle rispetto al continente italico di cui fa parte. Le specie che più compaiono di passaggio nell'interno della Valsesia, sono quelle a robusto e sostenuto volo, cioè tali che ponno sorvolare ad un'altezza di metri 1000 almeno sul livello del fiume Sesia. Su que-

Digitized by Google

sto argomento per formulare dati precisi converrebbe venissero messe in opera contemporaneamente lungo la Valsesia, cioè da S. a N. ed in tre distinti posti i più adatti, tre uccellande a roccolo, collocate: la prima a 360 metri sul livello del mare, la seconda a 1200, la terza a 2000 od anche 2200. (*Guarinoni*).

Il distretto forestale di Piedimulera è costituito da tre principali valli: Anzasca, Ossola inferiore e Strona, quest'ultima divisa dalle prime da una catena di monti. È percorso da tre principali corsi d'acqua: l'Anza che l'attraversa da O. ad E., il Toce dal N. al S., e la Strona da O. N. O. ad E. S. E; il primo e l'ultimo scaricano nel Toce e questo nel Lago Maggiore. Può quindi considerarsi, oltre lo sfogo delle valli, come chiuso in un bacino delimitato da ogni parte da monti, e cioè ad E. dalla catena delle Alpi Lepontine, ad O. dal versante destro della Strona inferiore, a N. dal versante sinistro dell'Anza o del Toce, e al S. dal versante sinistro della catena dei monti che staccandosi dal Rosa e avanzandosi verso E. divide la Valsesia dalle valli dell'Anzasca e della Strona. Delle tre predette valli la più importante è quella dell'Ossola inferiore; sia per l'ampiezza rispetto alle altre due, sia perchè è quella che offre maggior campo d'osservazioni, fermandosi quivi la maggior parte degli uccelli noti nel distretto, mentre nelle altre due non si vedono che poche specie, gran parte note pure nella prima, e quelle che amano gli alti monti. Il piano di dette valli è coltivato in parte, che è la maggiore, a prato semplice od arborato, in parte a campo ove si semina granturco, segala, panico, fagiuoli, patate ecc., consociatovi pure la coltivazione della vite; e in parte a bosco. I versanti invece delle due catene di monti in basso sono coperti in gran parte da castagneti fruttiferi commisti ad altre piante, con piccoli tratti intermezzati di terreni coltivati; più sopra sono boschi, per lo più cedui, di faggio, rovere, ontano bianco, nocciolo, sorbo, tiglio ecc. e in alto sono i pascoli alpestri con pochi cespugli. Lo stesso può dirsi delle altre due val-

Digitized by Google

late, ma nell'Anzasca è maggiore la quantità di conifere: abete rosso e bianco e larice, mentre le colture sono più ristrette. (*Danisi*).

Il distretto di osservazione non è che quello forestale di Crodo il quale abbraccia le principali vallate Antigorio, Devero, Formazza, Dell'Impossibile, Diveria e Cariasca comprendendo i comuni di Formazza, Salecchio, Agaro, Premia, Baceno, Cravegna, Vicena, Mozzio, Crodo, Montecrestese, Crevoladossola, Varzo, Trasquera. Le maggiori osservazioni però vertono in modo speciale sulla Val Antigorio, quindi la Val di Devero e la Valle Formazza, vallate queste che aperte a mezzogiorno vanno a mettere verso N. in mezzo a ghiacciai e trovansi fra due strette file di erte ed alte montagne; vuoi imboschite di conifere, vuoi nude di vegetazione null'altro mostrando che viva roccia a base granitica, vuoi con qualche pascolo più o meno fertile e su nelle alture, dove pure si riscontra qualche stagno d'acqua più o meno esteso, e che talvolta non a torto si merita il nome di piccolo lago. (*Demori*).

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nella provincia di Novara, distretti di Varallo (Valsesia), di Crodo e di Piedimulera, coi nomi volgari locali.

Corvus Corax, *Crovasc, Cornac, Scurbat, Cheurv, Courv, Croass.*
Corvus Corone, *Crouas neigro.*
Corvus Cornix, *Scurbat, Cornass bartone, Cheurv, Cornagia, Cornagia molinara.*
Corvus frugilegus, *Scorbat, Cheurv, Quaquà, Cruasc.*
Lycos Monedula, *Ciauva, Cournagia.*
Nucifraga Caryocatactes, *Nicciolera, Gaggía nicciolera, Rompanos.*

Digitized by Google

Pica rustica, *Pica*, *Berta*, *Checa*, *Gagia*.

Garrulus glandarius, *Gazza*, *Gagia*, *Berta*, *Gasgia*, *Berta rossa*, *Gaza roussa*.

Pyrrhocorax alpinus, *Pagion*, *Pigion*, *Cola*.

Pyrrhocorax Graculus, *Cola*.

Sturnus vulgaris, *Stournel*, *Stornell*, *Stornin*, *Stornin de tor*.

Fringilla cœlebs, *Frangoul*, *Fringuell*, *Franguel*, *Cinciuin*, *Ciui-cin*.

Fringilla Montifringilla, *Franguel montan* (Vigezzo), *Franguel montagnon*, *Montan*.

Montifringilla nivalis, *Franguel di al bianch*, *Franguel dla nev*, *Frecc*.

Passer montanus, *Passerin*, *Passarot*, *Passaron d' montagna*, *Zip*, *Passarinot*.

Passer Italiæ, *Passarot*, *Passra*, *Passarin*, *Passeroton*, *Passerot colombera*.

Passer domesticus. Si vede di passaggio in ottobre; rara.

Coccothraustes vulgaris, *Frisoun*, *Frison*.

Ligurinus Chloris, *Verdoun*, *Amulot*, *Amolott*, *Verdogn*.

Chloroptila Citrinella, *Pinin*, *Verdolin*, *Canarin d' montagna*.

Chrysomitris Spinus, *Legaurin*, *Rigulin*, *Rigorin*, *Regorin*, *Onicerecc*.

Carduelis elegans, *Cardelit*, *Ravanin*, *Ravanit*, *Ravarin*, *Lavarin*.

Serinus hortulanus, *Regorin*.

Cannabina Linota, *Monten*, *Brunel*, *Cicic*, *Fanin*.

Ægiothus rufescens, *Fanin bastard*, *Fanin*, *Fanin dla Rgina*.

Pyrrhula europæa, *Buvreul*, *Cifulot*, *Subiot*, *Zufolott*, *Zifolott*.

Loxia Curvirostra, *Bech in crous*.

Miliaria Projer.

Emberiza Citrinella, *Spaiarda*, *Spaiarda gialla*, *Spaiard*, *Squaiard*, *Maiarda giauna*.

Emberiza Cirlus, *Zii*, *Zip-zip*, *Maiarda neigra*.

Emberiza Hortulana, *Ortolan*.

Emberiza Cia, *Vinaccina*, *Spaiarda grisa*.

Emberiza pusilla. Accidentale in Val Vigezzo.

Emberiza Schœniclus, *Psi-psi*.

Calcarius nivalis.

Digitized by Google

Melanocorypha Calandra.

Alauda arborea, *Lodola*, *Lodi.*

Alauda arvensis, *Lnina*, *Lodoula*, *Lodula*, *Turlo*, *Lodoula de camp.*

Galerita cristata, *Calandra*, *Lodoula del ciuf.*

Anthus pratensis, *Lodula d' montagna*, *Guzetta*, *Sguisetta*, *Dondina.*

Anthus trivialis, *Tordina*, *Vina*, *Dordinà*, *Sguisetta*, *Dondina.*

Anthus Spipoletta, *Svit-svit.*

Budytes flavus, *Piss*, *Balarina*, *Ballerina*, *Vaccherina.*

Motacilla alba, *Balarina*, *Tremacua*, *Quattroecci*, *Cio*, *Tremacua del cap nèigro.*

Calobates melanope, *Ballarina gialda*, *Tremacouva*, *Tremacua giana.*

Saxicola Oenanthe, *Culbianch*, *Cic-ciac d'montagna*, *Coubianch*, *Ousel dii sass*, *Steinvogel*, *Carcatepe.*

Monticola saxatilis, *Couva rouss*, *Couva rousson*, *Merl rouss.*

Monticola Cyanus, *Passra solitaria*, *Passra salutaria.*

Merula nigra, *Merlo*, *Merl*, *Merl negher.*

Merula torquata, *Merla du cullarit*, *Merl d' montagna*, *Merl del stomich bianch*, *Margon.*

Turdus pilaris, *Viscarda*, *Calandra*, *Griva.*

Turdus iliacus, *Durt*, *Dourt*, *Sipa.*

Turdus musicus, *Torod*, *Durt*, *Dort.*

Turdus viscivorus, *Dresch.*

Aëdon Luscinia, *Roussgneul*, *Rusignol*, *Rossigneu.*

Erithacus Rubecula, *Pettarouss*, *Pettirouss*, *Picciorouss*, *Martinèt*, *Magonèt*, *Martineu.*

Cyanecula Wolfi, *Gorzbleu.*

Ruticilla Phœnicurus, *Couarouss*, *Farciola d' montagna*, *Couarouss meanè*, *Couaroussa cita.*

Ruticilla titys, *Couarouss d' montagna*, *Farciola*, *Magnan*, *Fournareu.*

Pratincola Rubicola, *Scimareul*, *Ousel dii sass*, *Sassareu.*

Pratincola Rubetra, *Scimareul*, *Sassareu.*

Sylvia Curruca.

Monachus Atricapillus, *Capnegar*, *Capnèiar*, *Capenera*, *Capenegar*, *Capneigro.*

Digitized by Google

Monachus hortensis, *Beccafich.*
Phylloscopus sibilator, *Tuit, Zuit, Ciuit verdogn.*
Phylloscopus Trochilus, *Piuvi, Tuit, Zuit, Ciuit giaun.*
Phylloscopus rufus, *Piuvi, Tuit, Zuit, Ciuit.*
Hypolais icterina.
Troglodytes parvulus, *Re di beucc, Re-re, Bo-gros, Re di usei, Sauta-beucc, Reatel.*
Cinclus aquaticus, *Foular, Merlo d'eva, Merl pescadour.*
Accentor collaris, *Frison d' montagna, Mutuna, Stornin.*
Accentor modularis, *Usel d'jeux coulour ciel, Taragneul, Morat.*
Regulus cristatus, *Stelin, Uslin del testin giald, Ugion, Centrub, Giavani, Usel dla Madona.*
Regulus ignicapillus, *Ugion, Centrub, Giavani.*
Acredula rosea, *Coua lunga, Parousciola dla coua lunga, Pampua.*
Parus major, *Parusciola gialda, Parousciola, Parousciola grossa.*
Parus ater, *Parousciolin, Trentarola, Cavalonghia, Parousciolina.*
Cyanistes cæruleus, *Monighina, Parousciola celesta, Monighetta, Parousciola molinera, Parousciola quarantina.*
Pœcile palustris, *Parousciolina, Parousciola grisa, Parousciolin.*
Lophophanes cristatus, *Parousciola dal ciuf, Parousciola, Parousciola del capuss.*
Sitta cæsia, *Piccascet, Pichin, Pichet, Piguset, Pichet pantoulon, Gring, Picascin.*
Certhia familiaris, *Rampighin, Rampighett, Pichet d' la rusca.*
Certhia brachydactyla, *Rampighin.*
Tichodroma muraria, *Piccoscin, Picascin, Pich di mur, Gratasass.*
Oriolus Galbula, *Merlo garbel.*
Ampelis Garrulus, *Frison di fiochet.*
Lanius Excubitor, *Stragazzon, Stragazza grossa, Stragazza, Stragazza molinera.*
Lanius minor, *Stragazzon, Stragazza grisa.*
Lanius Collurio, *Stragazza, Stragazza cita.*
Lanius auriculatus, *Stragazza.*
Muscicapa collaris, *Batiale, Ciapamusch.*
Muscicapa Atricapilla, *Batiale.*
Hirundo rustica, *Rondola, Roundula, Roundolina.*

Digitized by Google

Chelidon urbica, *Cubianch*, *Sassarieul*, *Sassareul*, *Rondon del cul bianch*, *Dardanet*, *Roundon sassareu.*
Cotile rupestris, *Sassareul d' montagna.*
Cypselus Apus, *Roundolon negher*, *Rondolon.*
Cypselus Melba, *Rondolon d' montagna.*
Caprimulgus europæus, *Tettavacc*, *Nociola*, *Carcaciatri*, *Neucciola.*
Dryocopus martius, *Pich-negar*, *Pich-nejar*, *Picasc-negar*, *Pich neigro.*
Picus major, *Pich-rouss*, *Picasc-rouss*, *Pich del cul rouss*, *Pich bracc.*
Picus medius, *Pich-rouss-mezzan.*
Picus minor, *Picascet*, *Pichin*, *Pich rouss cito*, *Pigazet*, *Pichet fiorâ.*
Gecinus viridis, *Pich-vert*, *Picasc*, *Picasc-vert.*
Gecinus canus, *Picascitt.*
Iÿnx Torquilla, *Stortacol*, *Stortacheul*, *Becaformig*, *Storzacheul.*
Cuculus canorus, *Cucù*, *Cucò.*
Alcedo Ispida, *Serena*, *Martin pescador*, *Pescamartin.*
Coracias Garrula, *Gagía marina.*
Upupa Epops, *Pupa*, *Buba*, *Puppla*, *Upa.*
Strix flammea, *Dama*, *Craver*, *Ciavareul.*
Syrnium Aluco, *Olouch*, *Luluch*, *Cul da ja jeui*, *Aloch*, *Loloch*, *Louluch.*
Asio Otus, *Sceveton*, *Cul da ja jeui*. *Olouch di bosch*, *Oolouch.*
Asio accipitrinus, *Sceveton.*
Athene Noctua, *Scivetta*, *Sciuveta*, *Scieta.*
Scops Giu, *Sciuscieul*, *Ciouch.*
Bubo maximus, *Grandug*, *Bouw*, *Granduch.*
Circus æruginosus, *Falchett.*
Circus cyaneus, *Falchett.*
Aquila Chrysaëtus, *Stur*, *Aquila.*
Buteo vulgaris, *Eula*, *Poiana*, *Rattouner*, *Nibi*, *Palaccia.*
Pernis apivorus, *Falchett.*
Milvus Ictinus, *Nibiu.*
Hypotriorchis Subbuteo, *Falchett.*
Æsalon regulus, *Falchettin.*
Cerchneis Tinnunculus, *Falchett d' oselitt*, *Falcheton*, *Falchetasc.*

Digitized by Google

Cerchneis Naumanni, *Falchett.*
Astur palumbarius.
Accipiter Nisus, *Falchett.*
Ardea cinerea, *Sgorza.*
Anas Boscas, *Anitra salvadiga*, *Anedra salvaiga.*
Spatula clypeata.
Querquedula Circia, *Garganel.*
Columba Palumbus, *Pivioun salvadig*, *Pavion salvadi*, *Favas*, *Pivion salvadigo gross.*
Columba Oenas.
Turtur tenera, *Tourtoura salvadiga*, *Tourtula selvadig.*
Perdix saxatilis, *Pernis*, *Parnigia*, *Pernis-roussa.*
Starna Perdix, *Pernis*, *Starna.*
Coturnix communis, *Quaia.*
Tetrao Urogallus, *Gall d' montagna.*
Lyrurus Tetrix, *Fasan*, *Fagian*, *Fasanella*, *Fasen.*
Bonasa betulina.
Lagopus mutus, *Francolin*, *Culmastur*, *Francoulinn*, *Berna.*
Crex pratensis, *Re di quai.*
Œdicnemus scolopax.
Cursorius gallicus.
Charadrius Pluvialis.
Vanellus Capella, *Paoncel.*
Totanus Ochropus, *Culbianch*, *Più-più.*
Scolopax Rusticula, *Becaccia*, *Becassa*, *Galinassa*, *Gallinasc.*
Gallinago cælestis, *Becacin*, *Becassin.*
Gallinago Gallinula, *Frulin*, *Becasin cito*, *Sneppin.*
Sternula minuta, *Sgarrin.*
Hydrochelidon nigra, *Sgarrin.*

Nel distretto forestale di Varallo, che si estende a tutto il circondario amministrativo di Valsesia, rimangono tutto l'anno nelle medesime località le specie seguenti:

Corvus Corax.
Nucifraga Caryocatactes.
Montifringilla nivalis.
Passer Italiæ.
Merula torquata.
Dryocopus martius.

Digitized by Google

Perdix saxatilis.
Starna Perdix.
Lyrurus Tetrix.
Lagopus mutus.

Nel distretto forestale di Crodo, costituito dei comuni del mandamento omonimo e di parte di quello di Domodossola, sono stazionarie le specie seguenti:

Nucifraga Caryocatactes.
Montifringilla nivalis.
Loxia Curvirostra.
Pyrrhula europæa.
Merula torquata.
Dryocopus martius.
Syrnium Aluco.
Athene Noctua.
Bubo maximus.
Cerchneis Tinnunculus.
Buteo vulgaris.
Perdix saxatilis.
Lyrurus Tetrix.
Lagopus mutus.

Nel distretto forestale di Piedimulera, costituito di comuni appartenenti ai due circondarî amministrativi di Domodossola e Pallanza, sono sedentarie le seguenti specie:

Corvus Corax.
Lycos Monedula.
Nucifraga Caryocatactes.
Pica rustica.
Pyrrhocorax alpinus.
Fringilla Montifringilla.
Montifringilla nivalis.
Passer Italiæ.
Coccothraustes vulgaris.
Ligurinus Chloris.
Cloroptila Citrinella.
Cannabina Linota.
Loxia Curvirostra.
Emberiza Schœniclus.
Alauda arborea.
Alauda arvensis.
Galerita cristata.
Turdus viscivorus.
Cinclus aquaticus.
Accentor collaris.
Dryocopus martius.
Alcedo Ispida.
Strix flammea.
Athene Noctua.
Bubo maximus.
Aquila Chrysaëtus.
Perdix saxatilis.
Lyrurus Tetrix.
Bonasa betulina.

Digitized by Google

Nei distretti anzi indicati sono erratiche, cioè cangiano col variare della stagione il loro luogo di dimora le specie seguenti:

Distretto di Varallo.

Corvus Corone.
Corvus Cornix.
Garrulus glandarius.
Pyrrhocorax alpinus.
Pyrrhocorax Graculus.
Fringilla cœlebs.
Fringilla Montifringilla.
Coccothraustes vulgaris.
Ligurinus Chloris.
Carduelis elegans.
Pyrrhula europæa.
Emberiza Citrinella.
Motacilla alba.
Calobates melanope.
Monticola Cyanus.
Turdus viscivorus.
Erithacus Rubecula.
Troglodytes parvulus.
Cinclus aquaticus.
Accentor collaris.
Accentor modularis.
Regulus cristatus.
Parus major.
Cyanistes cæruleus.
Pœcile palustris.
Sitta cæsia.
Certhia familiaris.
Tichodroma muraria.
Picus major.
Picus medius.
Picus minor.
Gecinus viridis.
Alcedo Ispida.

Distretto di Crodo.

Corvus frugilegus.
Lycos Monedula.
Garrulus glandarius.
Pyrrhocorax alpinus.
Passer montanus.
Passer Italiæ.
Chrysomitris Spinus.
Carduelis elegans.
Emberiza Citrinella.
Emberiza Cia.
Calcarius nivalis.
Anthus Spipoletta.
Monticola Cyanus.
Merula nigra.
Turdus musicus.
Turdus viscivorus.
Erithacus Rubecula.
Ruticilla Phœnicurus.
Ruticilla titys.
Pratincola Rubicola.
Phylloscopus sibilator.
Phylloscopus Trochilus.

Digitized by Google

Troglodytes parvulus.
Cinclus aquaticus.
Acredula rosea.
Parus major.
Parus ater.
Cyanistes cæruleus.
Lophophanes cristatus.
Sitta cæsia.
Certhia familiaris.
Certhia brachydactyla.
Tichodroma muraria.
Picus minor.
Gecinus viridis.
Gecinus canus.
Asio Otus.
Milvus Ictinus.

Distretto di Piedimulera.

Corvus frugilegus.
Sturnus vulgaris.
Fringilla cœlebs.
Passer montanus.
Chrysomitris Spinus.
Carduelis elegans.
Cannabina Linota.
Pyrrhula europæa.
Loxia Curvirostra.
Emberiza Citrinella.
Emberiza Cirlus.
Emberiza Hortulana.
Emberiza Cia.
Anthus trivialis.
Anthus Spipoletta.
Calobates melanope.
Saxicola Oenanthe.
Merula nigra.
Turdus musicus.
Erithacus Rubecula.
Ruticilla titys.
Monachus Atricapillus.
Troglodytes parvulus.
Acredula rosea.
Cyanistes cæruleus.
Sitta cæsia.
Certhia brachydactyla.
Lanius Excubitor.
Picus major.
Gecinus viridis.
Cuculus canorus.
Upupa Epops.
Buteo vulgaris.
Pernis apivorus.
Æsalon regulus.
Columba Palumbus.
Turtur tenera.

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli le quali nidificano nella provincia di Novara, distretti di Varallo e Piedimulera, colle notizie più importanti in proposito.

Corvus Corax. Nidifica una sol volta in marzo; depone da 4 a 5 uova verdastre macchiate di bruno, a brevi intervalli. L'incubazione dura dai 15 ai 20 giorni, nè vi prende parte il maschio. Non usa del medesimo nido nella stagione seguente nè lo ricostituisce parzialmente. Non varia nè modo nè forma di costruzione, alla quale prendono parte tanto il maschio quanto la femmina. Costruisce fra roccie e rupi elevate in luoghi quasi inaccessibili, il nido, che è grandissimo e si compone di ramoscelli e radici con uno strato più interno di muschi e gramigne. (Varallo).

Corvus Corone. Nidifica una sol volta in aprile; depone di seguito 5 o 6 uova di color verde turchino macchiato di bruno. L'incubazione dura dai 15 ai 20 giorni, nè vi prende parte il maschio. Non usa del medesimo nido nella stagione seguente nè lo ricostituisce parzialmente. Non varia nè modo nè forma di costruzione, alla quale prendono parte maschio e femmina. Preferisce gli alberi di mezzana altezza per farvi il nido. Si compone all'esterno di ramoscelli spinosi cementati con fango; allo interno di ramoscelli esili. (Varallo).

Corvus Cornix. Nidifica una sol volta in aprile; depone di seguito 5 o 6 uova di color verde turchino macchiate di bruno. L'incubazione dura dai 15 ai 20 giorni, nè vi prende parte il maschio. Non usa del medesimo nido nella stagione seguente nè lo ricostituisce parzialmente. Non varia nè modo nè forma di costruzione, alla quale prendono parte maschio e femmina. Preferisce gli alberi alti per farvi il nido. (Varallo).

Digitized by Google

Nucifraga Caryocatactes. Fa due covate e depone da 4 a 5 uova. L'incubazione dura circa 15 giorni. Non usa del medesimo nido nella stagione seguente nè lo ricostituisce parzialmente. Il nido è costrutto con vimini e poco fieno alla sommità di piante d'alto fusto di faggio, abete e larice. (Varallo).

Pica rustica. Fa una sola covata in aprile e maggio, depone da 5 a 7 uova di un verde ceruleo con macchie brune. In caso di distruzione procede alla seconda ed anche alla terza nidificazione in cui prende pure parte il maschio. Non fa uso dello stesso nido. Non varia modo nè forma di costruzione a cui concorre anche il maschio. Nidifica su alti alberi, costruendo il nido esternamente con ramoscelli cementati con argilla ed internamente con uno strato di materie soffici. Il nido è chiuso superiormente da una volta di ramoscelli ispidi o con graticolato, e non lascia che uno stretto passaggio laterale o foro nella parte meno appariscente. (Varallo).

Garrulus glandarius. Fa una sola covata in aprile o maggio di 3 a 6 uova che depone successivamente, aventi color bigio olivastro. L'incubazione dura dai 15 ai 21 giorni. Non fa uso dello stesso nido. Non varia nè forma nè costruzione del nido e vi prendono parte tanto il maschio quanto la femmina. Comunemente nidifica sugli alti alberi annosi. Il nido è semplice ed i materiali grossolani; consiste di pochi ramoscelli frammisti a radici filiformi nell'interno. (Varallo).

Pyrrhocorax alpinus. Fa una sola covata in aprile o maggio, depone da 4 a 5 uova bianche con macchie scure. L'incubazione dura dai 15 ai 20 giorni. Pare faccia ritorno al medesimo nido nella stagione seguente e lo ricostituisca interamente usando dei materiali del vecchio nido. Non varia nè forma nè costruzione del nido e vi prendono parte tanto il maschio quanto la femmina. Nidifica nelle anfrattuosità delle rupi scoscese. (Varallo).

Sturnus vulgaris. Fa due e talvolta tre covate in aprile maggio e giugno, depone da 4 a 6 uova per nidiata

Digitized by Google

color verde mare. Il maschio prende parte alla costruzione del nido ed all'incubazione. Usa tanto del nido altrui quanto di quello che cóstruisce. La costruzione che fa è assai imperfetta, consistendo in un ammasso di foglie, fieno e muschi. Nidifica nei fori degli alberi, ma più comunemente nelle colombaie e nelle buche delle vecchie fabbriche, sui tetti delle case. (Varallo).

Fringilla coelebs. Comunemente fa una sola covata in maggio o giugno, deponendo 5 o 6 uova bigie rossastre con macchie scure specialmente all'estremità più ottusa. Ne depone una al giorno. Il maschio sorveglia l'incubazione, ma non vi prende parte; essa dura dai 15 ai 20 giorni. Non fa uso del medesimo nido, nè vi fa ritorno nella stagione seguente. Non varia nè il modo nè la forma di costruzione alla quale prendono parte maschio e femmina. Il nido viene fatto tanto su alberi alti, quanto sui bassi purchè fronzuti, e nella biforcazione dei rami in posizione nascosta; è elegante di forma e di costruzione; vien fatto con fili d'erba, di canape e di corteccie, con sottili radici abilmente intessute fra loro nella parte esterna, e nell'interna con denso strato di crini. Ai fianchi scoperti del nido appicica dei licheni che trovansi sulla corteccia dell'albero in cui lo costruisce. (Varallo).

Fringilla Montifringilla. Nidifica una sola volta in maggio o giugno, depone da 4 a 5 uova grigiastre con macchie brune. Il maschio non prende parte all'incubazione. Non fa nuovo uso dello stesso nido. Non varia modo nè forma di costruzione alla quale lavorano maschio e femmina. Nidifica di preferenza sugli alti monti ed in boschi di piante conifere. Il nido è formato all'esterno da muschi e rivestito all'interno con crini, lana e penne. (Varallo).

Passer Italiae. Fa due o tre covate nei mesi di maggio giugno e luglio, depone da 5 a 6 uova, una al giorno, per covata. Le uova sono bianchiccie coperte da piccole macchie oblunghe turchiniccie e brune. All'incu-

Digitized by Google

bazione prende parte anche il maschio. Questa specie non sempre costruisce il nido, ma ora si serve di quelli delle colombaie, ora di quelli del *Cypselus Apus* col quale sostiene lotte accanite per il possesso. Ogni qualvolta si serve del nido già costrutto da lui o da altre specie vi apporta alcune modificazioni ed aggiunte per maggior pulitezza ed adattamento alla incubazione. La costruzione varia a seconda de' luoghi in cui vien fatta, e vi prendono parte maschio e femmina. Nidifica sotto i tetti e nelle colombaie e talvolta anche nei buchi delle piante nel quale caso le uova sono più arrotondate. Costruisce il nido con fieno e lo riveste internamente con cenci, lana e penne. (Varallo).

Coccothraustes vulgaris. Fa una sola covata nel maggio di 4 a 6 uova biancastre e picchiettate di bruno. Non fa uso dello stesso nido nè vi ritorna nella susseguente stagione. Non varia modo, nè forma di costruzione del nido, e vi prendono parte maschio e femmina. Nidifica sugli alberi nell' inserzione dei grossi rami. Costruisce il nido con fuscelli e radici. (Varallo).

Ligurinus Chloris. Fa una sola covata nel maggio di 5 a 6 uova bianche verdastre macchiate di rosso bruno. Il maschio prende parte all' incubazione. Non fa ritorno allo stesso nido. Il colore delle uova può dirsi protettivo partecipando in gran parte al colore complessivo della pianta su cui posano. Nella costruzione del nido non varia la forma. Per la nidificazione preferisce le piante a foglia persistente e le conifere. Il nido consta all' esterno di fuscelli e filamenti erbosi e muschi, ed all' interno di crini, lana e penne; è posto sui primi rami del tronco. (Varallo).

Chrysomitris Spinus. Pare nidifichi sugli alti monti dei distretti di Varallo e di Piedimulera poichè l' osservatore signor Guarinoni assicura averne veduto il 20 agosto 1884 un branco di 5 novelli poco sopra il paese di Doccio.

Digitized by Google

Carduelis elegans. Secondo la riuscita fa una, due ed anche tre covate nei mesi di maggio, giugno e luglio. La prima covata è di 5 uova, le altre di 4 od anche di 3; le uova sono macchiate di bruno rossastro verso l'estremità più grossa. Il maschio prende parte all'incubazione. Non fa uso dello stesso nido nè vi ritorna. Nella costruzione del nido non varia la forma; lo costruisce sugli alberi di media grandezza, e preferisce a tal uopo le piante conifere. Esso è di forma emisferica tessuto esternamente di fuscelli, radichette e steli di erbe filiformi con molta arte, e nello interno con sostanze lanugginose. (Varallo).

Serinus hortulanus. Fa una sola covata in maggio o giugno di 4 o 5 uova biancastre con sfumatura cenericcia che sull'estremità più grossa presenta poche macchie bruno-rossiccie miste a tratti di rosso scuro. Non fa uso dello stesso nido, nè vi fa ritorno. Non varia la forma di costruzione del nido, e vi prendono parte maschio e femmina. Presceglie le piante fruttifere per la costruzione dal nido che vien fatto con molta cura; esternamente è costituito di sottili fuscelli internamente di lanuggine. (Varallo)

Pyrrhula europæa. Fa una sola covata in maggio o giugno di 5 o 6 uova bianche azzurrognole volgenti al verdastro con macchie brune e violacee. Il maschio non prende parte alla incubazione che dura circa 15 giorni; la femmina depone le uova consecutivamente una per giorno. Non fa uso dello stesso nido, nè vi ritorna nella stagione seguente. Non varia il modo e la forma del nido, che vien costrutto dalla sola femmina impiegandovi circa dieci giorni. Nidifica sugli alti alberi e nei cespugli. Il sott'Ispettore di Varallo ne raccolse uno nel maggio 1886 in un giardino di Rassa a circa 800 metri sul livello del mare; trovavasi ad un metro e mezzo d'altezza su di una pianticella di *Buxus sempervirens*. Il nido è semplice, esternamente è composto di radici filiformi o fuscelli intessuti fra loro; in-

Digitized by Google

ternamente di radici più sottili e crini. Il tutto è sostenuto da un palchetto di fuscelli disposti l'uno su l'altro a croce e poggianti sulle biforcazioni dei rami. (Varallo).

Emberiza Citrinella. Fa una sola covata da maggio alla metà di giugno, deponendo consecutivamente 4 o 5 uova a fondo bianco, macchiate di diversi colori e specialmente di bruno. Il maschio non prende parte all'incubazione. Non fa uso dello stesso nido nè vi ritorna nella susseguente stagione. Varia la costruzione del nido secondo il luogo ove lo costruisce, usando maggior cura se lo fa sui bassi rami di un cespuglio. Usualmente è posto sul terreno, nel folto dell'erba e nei cespugli. Esternamente è costituito di fieno e radici; internamente di radicelle, lana e penne. Trovasi quasi sempre allo scoperto. (Varallo).

Emberiza Cirlus. Fa una sola covata dal maggio al giugno, deponendo 4 o 5 uova di un bianco perlato con macchie, punti e strisce rosso-bruno scure. Non fa uso dello stesso nido. Non varia il modo di costruzione nè la forma del nido, posto a terra fra cespugli, di forma assai elegante, intessuto all'esterno con foglie di edera e di quercia e di delicata borraccina, ed allo interno con minute pagliuzze e radichette. (Varallo).

Alauda arborea. Comunemente fa due covate dal marzo al luglio di 4 o 5 uova, rossiccio grigie macchiate di bruno, che sono deposte consecutivamente. L'incubazione dura circa 10 giorni, e non vi prende parte il maschio. Non fa uso dello stesso nido che per una sola covata. Tiene lo stesso modo di forma e di costruzione del nido, e vi prende parte il maschio. Il colore delle uova può dirsi protettivo per la somiglianza all'ambiente in cui sono deposte. Nidifica a terra nei campi a ridosso di una zolla; usa poche erbe e paglia. (Varallo).

Alauda arvensis. Comunemente fa due covate dal marzo al luglio di 4 o 5 uova rossiccio grigie macchiate di

Digitized by Google

bruno che sono deposte consecutivamente. L'incubazione dura circa 10 giorni, e non vi prende parte il maschio. Non fa uso dello stesso nido che per una sola covata. Tiene lo stesso modo di forma e di costruzione del nido, e vi prende parte il maschio. Il color delle uova può dirsi protettivo per la somiglianza all'ambiente in cui sono deposte. Il nido è fatto con poche erbe e paglia in una piccola incavatura del terreno, senz'arte, e nascosto con cura. (Varallo).

Galerita cristata. Comunemente fa due covate dal marzo al luglio di 4 o 5 uova rossiccio grigie macchiate di bruno, che sono deposte consecutivamente. L'incubazione dura circa 10 giorni, e non vi prende parte il maschio. Non fa uso dello stesso nido che per una sola covata. Tiene lo stesso modo di forma e di costruzione del nido, e vi prende parte il maschio. Il color delle uova può dirsi protettivo per la somiglianza all'ambiente in cui sono deposte. Nidifica come le precedenti al piede di un cespuglio, di una zolla erbosa e specialmente nell'impronta del piede dei bovini, preferendo le località prossime alle strade. Il nido è rozzamente intessuto di fieno. (Varallo).

Anthus pratensis. Nidifica sui monti e al piano deponendo le uova vicino a ruscelli e paludi in buchi o sotto i cespugli. (Piedimulera).

Budytes flavus. Nidifica deponendo le uova in buchi scavati nella terra. Fa due covate di 4 o 5 uova ciascuna. (Piedimulera).

Motacilla alba. Fa due covate di 4 a 6 uova bianche azzurrognole sparse di molti punti cenericci scuri. Il maschio non prende parte all'incubazione che dura circa 15 giorni. Nidifica dall'aprile al luglio e depone le uova una al giorno. Spesso fa uso del medesimo nido, riattando con aggiunta di materie nuove. La costruzione non varia, ma la forma è diversa a seconda dei luoghi in cui fabbrica il nido, alla cui costruzione lavorano tanto il maschio quanto la femmina. Nidifica

Digitized by Google

presso i fiumi e predilige i fori dei fabbricati e i tetti delle case. Costruisce il nido con paglia, fieno a radici rivestendolo internamente di lana e peli. (Varallo).

Calobates melanope. Comunemente fa due covate dal marzo al giugno di 4 a 6 uova ciascuna, bianche o leggermente rossastre sparse di lineette e di punti bigi rossastri appena visibili. Pare che all' incubazione prenda parte anche il maschio. Non fa uso del medesimo nido. La costruzione, non la forma, è sempre uguale. Nidifica tra i sassi e sul terreno, preferibilmente presso qualche corrente d' acque, costruendo con radiche, paglia e foglie. (Varallo).

Saxicola Oenanthe. Costruisce il nido in mezzo ai cespugli con sostanze morbide. Le uova in numero di 4 di color celeste si schiudono dopo 15 giorni d' incubazione. (Varallo).

Monticola saxatilis. Nidifica in maggio o giugno; fa una sola covata di 3 a 4 uova di colore azzurro, deposte di seguito. L' incubazione dura circa 15 giorni. Il 27 luglio il sotto Ispettore di Varallo raccolse nei pascoli di Campollo a 2000 metri sul livello del mare un individuo della specie non peranco capace di nutrirsi da sè. Non fa uso dello stesso nido. Non varia forma nè modo di costruzione e vi prendono parte maschio e femmina. Il nido è greggio e semplice. Si compone di radici e filamenti erbacei; presceglie le concavità in località dirupate e frastagliate da sporgenze rocciose. (Varallo).

Monticola Cyanus. Fa una sola covata in aprile e maggio di 5 o 6 uova di color verdastro celestognolo deposte di seguito. Non fa uso dello stesso nido. Non varia il modo di costruzione, nè la forma del nido che vien fatto dal maschio. Per la costruzione del nido sceglie a preferenza le località fuor di mano in montagna ove le rupi scoscese offrono ogni sicurezza. Nidifica anche sui camini isolati in alto, sul vertice delle torri isolate, sui campanili, nei burroni; costruisce usando fili d' erba e penne. (Varallo).

Digitized by Google

Merula nigra. Nidifica dal marzo all'agosto allevando due ed anche tre covate all'anno, deponendo di seguito da 3 a 6 uova per covata verdi bleu con macchie rugginose. L'incubazione segue senza il concorso del maschio e dura circa 15 giorni. Usa diverso nido ogni covata. Non varia il modo nè la forma di costruzione del nido e vi prende parte il solo maschio. Nella prima covata colloca il nido presso terra nel cavo delle ceppaie o nei cespugli. Nella seconda e terza covata sugli alberi di mezzana altezza, e sui capitozzi, ma sempre là dove il fogliame presta maggior riparo. Il nido è costituito all'esterno di muschi, licheni, felci e foglie, nel mezzo da uno strato di radichette ripiegate ed intessute fra loro a cocchio e cementate con argilla; all'interno di radichette più sottili e di muschi. (Varallo).

Merula torquata. Fa una sola covata dal maggio al luglio, deponendo 5 o 6 uova biancastre macchiate di bruno rossiccio. Non ritorna al medesimo nido; questo è costruito dal solo maschio a terra fra i cespugli. Pel resto e per la forma segue il metodo del suo congenere antecedente. (Varallo).

Turdus pilaris. Non si è trovata questa specie a nidificare. Persone degne di fede hanno però assicurato il sotto Ispettore di Varallo che in Valsesia nidifica, ma di rado ai monti, e che vi fa una sola covata di 6 uova color celestino punteggiato in rosso. (Varallo).

Turdus musicus. Fa due covate specialmente quando non riesce la prima, depone 5 o 6 uova nella prima covata di color bleu carico macchiate di scuro segnatamente nel vertice più ottuso. La seconda covata è di minor numero di uova. La nidificazione avviene dall'aprile al luglio. Il maschio non piglia parte all'incubazione. Varia il nido ad ogni covata, e ad ogni stagione. Non varia la forma della costruzione del nido ed è fatto dal solo maschio. Costruisce il nido sui faggi, abeti e larici adulti e nidifica pure nei cespugli. Il nido di for-

Digitized by Google

ma emisferica è costrutto con fieno, muschi, licheni, pagliuzze e radici, rivestito internamente d'intonaco misto di terra e di materie organiche. (Varallo).

Turdus viscivorus. Questa specie fa una ed anche due covate all'anno, deponendo 4 o 5 uova bianco-verdastre macchiate di bruno. Nidifica dal marzo al giugno; il maschio non piglia parte alla incubazione che dura da 15 a 20 giorni. Varia nido ad ogni covata e non ne fa uso nella stagione susseguente. Non varia modo nè forma nella costruzione del nido alla quale lavorano il maschio e la femmina, da 5 a 7 giorni. Nidifica sulle piante d'alto fusto ad una altezza di 6 a 10 metri ed in ispecie sui larici e faggi ben ramificati. Il nido alquanto più grande, è nella forma e nei materiali uguale a quello del suo congenere antecedente. (Varallo).

Aëdon Luscinia. Nidifica in maggio. Fa una sola covata di 4 o 6 uova olivastre scure che depone consecutivamente. L'incubazione dura circa 15 giorni ed avviene unicamente per cura della femmina. Non usa del medesimo nido nella susseguente stagione. Non varia modo nè forma nella costruzione del nido, fatta dal maschio e dalla femmina. Nidifica di preferenza sui rami bassi di bosco folto in vicinanza ad acqua e nelle siepi o sui cespugli presso terra, componendo il nido con radici filiformi e foglie che intreccia insieme. (Varallo).

Erithacus Rubecula. Nidifica dalla fine di aprile a tutto luglio; fa una ed anche due covate di 5 o 6 uova ciascuna gialliccie con macchie rossastre. All'incubazione prende parte anche il maschio. Non usa del medesimo nido ad ogni covata. Non varia modo di costruzione nè forma del nido, e vi piglia parte il maschio. Nidifica nei cespugli presso terra, talora anche nei buchi dei muri; costruisce con muschi, foglie e crini. Nasconde il nido con foglie che ammassa intorno lasciando il solo spazio per penetrarvi. (Varallo).

Digitized by Google

Cyanecula Wolfi. Non si potè accertare la nidificazione di questa specie. Il sotto Ispettore di Varallo fu però assicurato che in Valsesia nidifica qualche volta facendo una sola covata di 6 uova di color bianchiccio, deposte di seguito e che costruisce il nido in siti umidi o presso correnti d'acqua con fieno all'esterno e materie lanugginose e peli all'interno. (Varallo).

Ruticilla titys. Nidifica dall'aprile al luglio e fa due covate, depone da 5 a 6 uove bianche, una al giorno. L'incubazione dura non meno di 15 giorni e non vi prende parte il maschio. Usa talvolta del medesimo nido tanto per una seconda covata quanto col farvi ritorno nella stagione seguente. Quando usa dello stesso nido lo riatta parzialmente ed anche intieramente nel qual caso gli dà diversa direzione. Pare non vari modo e forma di costruzione, ma ne varia la posizione e direzione in caso di diverse covate nel medesimo nido. Nidifica specialmente nell'alta Valsesia (Alagna, Riva Valdobbia, Campertogno, Rassa, Rimella, Fobello, Carcofaro, Bimasco e Rima San Giuseppe) nelle case. Nei detti paesi si ha per questa specie un vero e religioso rispetto, attribuendo alla sua nidificazione, nelle case in cui avviene, un augurio di prosperità e di allontanamento di sventure per la famiglia che vi abita. Il nido è un denso feltro di radici, filamenti di erbe e muschi intrecciati tra loro in forma di solido parallelepipedo incavato nel mezzo a forma di coppa. Lo varia però a seconda delle condizioni del luogo che presceglie. (Varallo).

Pratincola Rubicola. Nidifica dal maggio all'agosto e fa una sola covata di 5 o 6 uova verdastre punteggiate rosso mattone. Il maschio non piglia parte all'incubazione. Non ritorna al medesimo nido. Non varia modo nè forma di costruzione del nido. Costruisce nei siti incolti al piede di un cespuglio e sotto le radici del medesimo lo nasconde. È costituito di paglia, crini e lana. La femmina contribuisce col colore delle penne

Digitized by Google

superiori a nasconderlo ed a confonderlo col colore dell' ambiente. (Varallo).

Pratincola Rubetra. Fa una sola covata, deponendo in maggio da 6 a 7 uova color celeste verdognolo. Il maschio non prende parte all' incubazione. Non ritorna al medesimo nido. Non varia modo nè forma di costruzione. Costruisce il nido nei siti incolti al piede di un cespuglio e sotto le radici del medesimo lo nasconde. È costituito di paglia, crini e lana. La femmina contribuisce col colore delle penne superiori a nasconderlo ed a confonderlo col colore dell' ambiente. (Varallo).

Monachus Atricapillus. Comunemente non fa che una covata in maggio o giugno di 5 o 6 uova quasi sferiche, bianco giallastro sfumato macchiate di scuro. Alla incubazione prende parte attiva anche il maschio. Non ritorna al medesimo nido. Non varia modo nè forma di costruzione e vi piglia parte anche il maschio. Nidifica nei giardini e nei boschi cedui. Il nido è posto vicino a terra in luogo diligentemente nascosto dalle foglie. È composto di filamenti erbacei e di foglie. (Varallo).

Phylloscopus sibilator. Fa una covata dal maggio a giugno, depone da 4 a 6 uova e all' incubazione prende parte anche il maschio. Non ritorna al medesimo nido. Non varia modo nè forma di costruzione e vi prendono parte maschio e femmina. Nidifica nei boschi cedui e nei castagneti, a terra. Il nido è semplice, nascosto fra il muschio e l' Erica dove questa cresce abbondante. Il nido è costrutto con filamenti d' erba, muschi e qualche piuma; ha forma di borsa, con ristretta apertura d' accesso. (Varallo).

Troglodytes parvulus. Fa due covate di 6 a 8 uova bianche, finamente punteggiate di bruno scuro, specialmente verso l'estremità più ottusa. La prima covata avviene dall'aprile al giugno, la seconda dal giugno all'agosto; l' incubazione dura circa 15 giorni e pare non vi prenda parte il maschio. Non ritorna al medesimo nido. Non

Digitized by Google

varia modo di costruzione, ma è costretto a variare la forma e la dimensione a seconda dei luoghi che ha prescelti. Il maschio prende parte attiva alla costruzione. Nidifica fra le grosse radici delle ceppaie, sotto i tetti delle case alpestri e delle capanne fra erbe e muschi. Costruisce il nido in forma di borsa rotonda voluminosa, ammassando muschi che informemente unisce; lascia una piccola apertura laterale, e nell'interno lo guarnisce di piume. (Varallo).

Cinclus aquaticus. Fa una ed anche due covate e depone da 5 a 6 uova bianche. Il maschio non prende parte all'incubazione. Non usa che una sol volta del nido. Non varia il modo nè la forma di costruzione che vien fatta tanto dal maschio che dalla femmina. Costruisce a terra lungo i fiumi ed i torrenti, in ispecie dietro piccole cascate, con muschi e fogliuzze solidamente intrecciate all'esterno; ed all'interno con sottili filamenti erbacei. Ha la forma quasi sferica con apertura laterale. (Varallo).

Accentor collaris. Fa una sola covata dal maggio all'agosto di 5 a 6 uova bianche a punti scuri. Non ritorna al medesimo nido. Non varia il modo nè la costruzione del nido, alla quale piglia parte anche il maschio. Costruisce a terra nei pascoli perenni e cespugliati. (Varallo).

Regulus cristatus. Fa due covate da marzo a tutto luglio, depone da 5 a 10 uova bianco rosate o bigie, con qualche punto rossiccio poco apparente. All'incubazione non prende parte il maschio. Non ritorna al medesimo nido. Non varia il modo nè la forma della costruzione, alla quale piglia parte anche il maschio. Costruisce sugli abeti e anche a terra tra i cespugli di *Alnus*. Il nido è di forma sferica con piccola apertura laterale; fatto di muschi esternamente e di piume e lana internamente. (Varallo).

Acredula rosea. Nidifica una sola volta, deponendo 14 o 15 uova bianco-cineree con punti di color mattone. Non

Digitized by Google

ritorna al medesimo nido. Non varia il modo nè la forma della costruzione, alla quale piglia parte anche il maschio. Nidifica sugli alberi a circa metà altezza. Il nido è costrutto con special cura a forma di borsa cilindrica con due aperture laterali; è fatto con licheni e muschi all'esterno, pelurie e penne all'interno; viene solidamente attaccato ad uno o più rami. (Varallo).

Parus major. Fa varie covate, deponendo consecutivamente 8 a 12 uova, bianche macchiate di rosso. Nidifica dall'aprile al luglio. Il maschio non piglia parte alla incubazione che dura non più di dodici giorni. Pare che talvolta usi del medesimo nido e solamente lo riatti con qualche aggiunta. Non varia il modo nè la forma della costruzione del nido, alla quale piglia parte anche il maschio. Nidifica nei fori degli alberi e nelle fessure delle muraglie. (Varallo).

Parus ater. Nidifica nelle abetaie della Valsesia settentrionale dall'aprile al luglio, allevando più di una covata.

Cyanistes cæruleus. Nidifica in Valsesia, ma non si hanno notizie intorno al modo della nidificazione.

Pœcile palustris. Fa una e qualche volta due covate dall'aprile al luglio, deponendo 14 o 15 uova, bianco-cineree con punteggiature di color rossiccio più ravvicinate verso la parte ottusa.

Lophophanes cristatus. Nidifica in Valsesia a circa 1200 metri sul livello del mare; ma non si hanno notizie intorno al modo della nidificazione.

Sitta cæsia. Nidifica una sola volta, deponendo da 5 a 7 uova di color biancastro, punteggiate di rosso. Il maschio non prende parte all'incubazione. Non fa ritorno al medesimo nido. Non varia il modo nè la forma della costruzione. Nidifica nelle cavità degli alberi, allargando l'apertura col becco se è troppo stretta, o restringendola con mota se è troppo larga. Per materiali si serve di muschi e di detriti vegetali. (Varallo).

Certhia familiaris. Fa una o anche due covate di 6 o 7 uova

Digitized by Google

bianche macchiate di rosso, dall'aprile al luglio. Il maschio non partecipa all'incubazione. Non fa ritorno al medesimo nido. Non varia il modo nè la forma della costruzione. Fa il nido ne' fori degli alberi. (Varallo).

Certhia brachydactyla. Fa una e anche due covate di 6 o 7 uova bianche macchiate di rosso, dall'aprile al luglio. Il maschio non partecipa all'incubazione. Non torna al medesimo nido. Non varia il modo nè la forma della costruzione. Fa il nido ne' fori degli alberi. (Varallo).

Oriolus Galbula. Non fa che una sola covata di 4 o 5 uova bianche con macchie nerastre. Il maschio non prende parte all'incubazione. Non torna al medesimo nido. Non varia il modo e la costruzione del nido a cui concorre anche il maschio. Nidifica nella biforcazione dei rami degli alberi. Forma un contorno al nido, allacciando i rami con foglie, e lo intesse a forma di borsa il cui interno è reso soffice con muschi e filamenti erbacei. (Varallo).

Lanius minor. Fa una sola covata nel maggio o giugno, di 6 o 7 uova bianche con macchie bigio-sbiadite. Non ritorna al medesimo nido. Non varia modo nè forma della costruzione. Predilige le località dove sono alti alberi, specialmente pioppi, sui quali ama costruire il nido con steli d'erbe e radici filiformi allo esterno, con muschi e la lanuggine di cui sono circondati i semi di pioppo all'interno. (Varallo).

Lanius Collurio. Fa una e tavolta due covate dal maggio all'agosto di 6 o 7 uova bianche carnicine, macchiettate di bruno rossastro, e ne depone una al giorno. Non ritorna al medesimo nido. Non varia modo, nè forma di costruzione e vi lavorano maschio e femmina. Preferisce costruire nelle fitte ed alte siepi di campagna e qualche volta tra i filari delle viti; adopera radichette finissime, steli erbosi, muschi, licheni e lanuggine. (Varallo).

Lanius auriculatus. Fa una sola covata dal maggio al luglio.

Digitized by Google

di 5 o 6 uova biancastre, picchiettate di bruno o rossastro, specialmente alle estremità. Non ritorna al vecchio nido. Non varia modo nè forma di costruzione e vi lavorano maschio e femmina. Costruisce di preferenza nei frutteti e nei vigneti. In quanto alla forma e ai materiali non diversifica dal suo congenere precedente. (Varallo).

Muscicapa collaris. Fa una sola covata in maggio di 5 o 6 uova di color celeste sbiadito. Non varia modo nè forma di costruzione del nido e vi lavorano maschio e femmina. Costruisce nella cavità degli alberi ed a marcata profondità, con sottili pagliuzze, radichette e steli. (Varallo).

Muscicapa Atricapilla. Comunemente non fa che una covata in maggio di 5 o 6 uova. Il maschio non prende parte alla incubazione. Non ritorna al medesimo nido. Non varia il modo e la forma del nido, alla di cui costruzione prende parte il maschio. (Varallo).

Hirundo rustica. Comunemente fa due covate la prima in aprile e la seconda in giugno; e depone nella prima covata 5 uova, nella seconda 3, di colorito roseo o bianco sudicio con punti or bruni, or rossastri, or violacei. Qualche volta fa una terza covata. Il maschio non prende parte all'incubazione. Usa dello stesso nido sia nella stessa stagione che nella successiva, raffazzonandolo con fango e paglia. Il modo di costruzione è sempre uguale e vi prende parte anche il maschio. Nidifica sotto le tettoie, le torrette dei camini e sotto le grondaie e porticati. Costruisce con fango commisto a paglia esternamente, internamente con penne e fieno. (Varallo).

Chelidon urbica. Fa due covate e lo stesso numero d'uova della precedente specie. All'incubazione non solo un maschio ma varii maschi prendono parte. Nidifica nelle epoche sovra indicate per la *Hirundo rustica.* Usa dello stesso nido sia nella stessa stagione che nella successiva, raffazzonandolo con fango e paglia. Il modo di

Digitized by Google

costruzione è sempre eguale e vi prende parte anche il maschio. Nidifica sotto i cornicioni delle case, delle chiese e campanili di preferenza, talora anche sotto i porticati e le loggie in legno e nei crepacci delle roccie. Il nido consta di materiali eguali a quelli della specie precedente, ma è più piccolo e più chiuso nella parte superiore. Nidifica a maggior altezza di quella scelta dalla precedente specie.

Cypselus Apus. Fa più covate di 3 o 4 uova bianche dall'aprile alla metà di luglio. Pare che il maschio non prenda parte all'incubazione. Fa soventi ritorno allo stesso nido che riordina. Non varia il modo di costruzione, ma variano le dimensioni del nido a seconda delle esigenze locali, nelle uccelliere omette di costruirlo, essendogli apprestato dalla mano dell'Uomo. Nidifica nelle torri, nelle muraglie e sotto le grondaie e nelle uccelliere o passeraie che in Valsesia appositamente gli si costruiscono per trarne profitto. Nel caso che il nido non gli venga apprestato, lo costruisce con pagliuzze, radichette e simili materie, cementandole con sostanza di un lucido marmoreo che appresta nella bocca. (Varallo).

Caprimulgus europæus. Deposita a terra quasi senza compor nido, ai piedi di un albero, due uova dal maggio all'agosto. Le uova sono un poco più grosse di quelle del Merlo e alquanto più brune. Il maschio non prende parte all'incubazione. (Varallo).

Dryocopus martius. Fa una sola covata in aprile o maggio di 3 uova bianco-lucide senza macchie. Non torna al medesimo nido. Non varia modo nè forma di costruzione. Presceglie le piante d'alto fusto di faggio, di abete ed anche di castagno in luoghi elevati e che siano internamente cariate o vuote. Vi introduce foglie e muschi con cui forma una specie di letto per le uova. (Varallo).

Picus major. Depone ne' fori degli alberi da 4 a 6 uova d'un bianco puro. All'incubazione concorre il maschio. Non

Digitized by Google

torna al medesimo nido. Non varia il modo nè la forma di costruzione; forma il nido specialmente nelle cavità naturali o fori già fatti ed usati da altri Picchi. Sceglie a preferenza le piante di faggio. (Varallo).

Picus medius. Depone ne' fori degli alberi da 4 a 6 uova d'un bianco puro. All'incubazione concorre il maschio. Non torna al medesimo nido. Non varia il modo nè la forma di costruzione; predilige le cavità naturali o fori già fatti ed usati da altri Picchi, a preferenza sulle piante di faggio. (Varallo).

Picus minor. Depone ne'fori degli alberi da 4 a 6 uova d'un bianco puro. All'incubazione concorre il maschio. Non torna al medesimo nido. Non varia il modo nè la forma di costruzione; predilige specialmente le cavità naturali o fori già fatti ed usati da altri Picchi; a preferenza sulle piante di faggio (Varallo).

Gecinus viridis. Fa una sola covata dall'aprile a tutto giugno di 5 ad 8 uova perfettamente bianche. Il maschio non prende parte alla incubazione. Torna al nido proprio o a quello dei suoi affini, ma non sempre. Non varia il modo nè la forma di costruzione del nido. Nidifica ne'fori degli alberi. (Varallo).

Iÿnx Torquilla. Depone una sola covata in maggio di 6 uova bianco-avorio, un uovo al giorno senz'interruzione. Il maschio non concorre all' incubazione. Non torna al medesimo nido. Non varia modo nè forma di costruzione del nido. Preferisce i fori naturali che si trovano nel pioppo e nel salcio ove fabbrica il nido senz'alcuna arte. (Varallo).

Cuculus canorus. A questa specie non si può assegnare un preciso numero di uova, le depone nei nidi altrui ad intervalli. Variano poi assai di colore: se ne trovano di rossiccie, verdastre, turchiniccie, talvolta macchiate, talvolta lineate di color rossastro, olivastro, bruno. La deposizione delle uova avviene dalla metà di maggio al luglio.

Alcedo Ispida. Depone una sola covata dall'aprile al luglio,

Digitized by Google

dono parte alla costruzione. Fa il nido sulle torri e anche sulle cime degli alberi lo fabbrica con fuscelli e radici. (Varallo).

Astur palumbarius. Fa una sola covata in aprile o maggio di 5 o 6 uova. Non torna al medesimo nido. Tanto il maschio che la femmina prendono parte alla formazione del nido. Costruisce su alti alberi ed in ispecie sui larici e abeti. Il nido consta di fuscelli, rivestiti all' interno di materie soffici. (Varallo).

Accipiter Nisus. Fa una sola covata di 3 a 5 uova in primavera. Le uova variano di colore, ordinariamente sono bianchiccie, picchiettate di giallo rossastro alle estremità. Non torna al medesimo nido. Tanto il maschio che la femmina prendono parte alla costruzione. Nidifica sugli alti rami delle piante conifere. Il nido è simile a quello della specie precedente.

Columba Palumbus. Pare faccia più d'una covata di 2 o 3 uova bianche. Nella incubazione, che dura circa 14 giorni prende parte anche il maschio. Non fa uso del medesimo nido. Nella costruzione del nido, che è semplicissimo, prende parte anche il maschio. Costruisce verso la cima degli alti alberi, e preferisce luoghi di silenzio e di quiete. In mancanza di meglio però costruiscono anche sulle roccie. Il nido è fatto con ramoscelli e radici rozzamente intrecciati. (Varallo).

Columba Oenas. Nidifica in Valsesia. Il Sotto-Ispettore di Varallo ne ebbe una nidiata in giugno, presa poco lungi da Varallo.

Turtur tenera. Fa una e talvolta due covate nella stagione, deponendo 2 uova bianche per covata. All'incubazione prende parte anche il maschio. Non fa uso del medesimo nido. Nella costruzione del nido prende parte anche il maschio. (Varallo).

Perdix saxatilis. Fa una sola covata, deponendo nei pascoli più elevati da 8 a 18 uova di un color giallo sudicio o rossastro. Non torna al medesimo nido. Non varia il modo di costruzione che è semplicissimo poichè ove

Digitized by Google

deporrà le uova si prepara razzolando una nicchia, vi introduce foglie secche e nulla più. Il maschio pare prenda parte all'ammassamento dei pochi materiali che circondano le uova. Il nido vien fatto nei versanti solati elevati cioè superiormente a 750 metri sul livello del mare e nelle località pascolive cespugliate, o nei boschi cedui, dal maggio al luglio. (Varallo).

Starna Perdix. Fa talvolta due covate, deponendo nella prima da 15 a 20 uova di color olivastro pallido; nella seconda covata un numero minore. Il maschio non prende parte alla incubazione. Non torna al medesimo nido. Non varia modo di costruzione. Pare che il maschio prenda parte all'ammassamento dei pochi materiali che circondano le uova. Campi a cereali, luoghi cespugliati, boschi cedui ed ericeti sono i siti che presceglie per la deposizione delle uova. (Varallo).

Coturnix communis. Fa una sola covata in giugno di 10 a 16 uova giallastre o rossicce con macchie brune. L'incubazione dura circa 20 giorni e non vi piglia parte il maschio. Non ritorna al medesimo nido. Non varia modo di costruzione. Pare che il maschio prenda parte all'ammassamento dei pochi materiali, che circondano le uova. Sceglie a preferenza per deporre le uova le praterie e i campi seminati a trifoglio, nascondendole nel più fitto della vegetazione. (Varallo).

Lyrurus Tetrix. Fa una sola covata in maggio di 6 a 10 uova gialle rugginose sparse in gran numero di grandi e piccole macchie nero-ruggine. Il maschio non prende parte all'incubazione. Depone le uova per terra senza preparazione di sorta. Le località scelte per la covata sono i pascoli alpini, fittamente cespugliati di *Rododendron ferrugineum* e di *Alnus viridis*. (Varallo).

Lagopus mutus. Fa una sola covata in maggio o giugno, deponendo da 8 a 15 uova oblunghe, gialle rugginose, sparse in gran numero di grandi e piccole macchie nero-ruggine. Il maschio non prende parte all'incubazione. Non costruisce nido, deponendo le uova dove il

Digitized by Google

muschio è piuttosto alto, o sul nudo terreno in luoghi dirupati e rocciosi. (Varallo).

Elenco delle specie di uccelli che sono di passaggio regolare nella provincia di Novara.

Distretto di Varallo.

Scolopax Rusticula. Dal 1° al 15 marzo, e dal 15 al 31 ottobre.
Charadrius Pluvialis. Dal 1° al 31 ottobre.

Distretto di Crodo.

Corvus Corax. Dal 15 novembre al 15 dicembre.
Corvus Cornix. Dal 15 novembre al 15 dicembre.
Corvus frugilegus. Dal 15 novembre al 15 dicembre.
Sturnus vulgaris. Dal 1° al 31 marzo, e dal 1° al 31 dicemb.
Fringilla Montifringilla. Dal 15 ottobre al 15 novembre.
Passer domesticus. Dal 1° al 15 ottobre.
Coccothraustes vulgaris. Dal 1° al 15 ottobre.
Ligurinus Chloris. Dal 1° al 31 magg., e dal 1° al 31 dicemb.
Carduelis elegans. Dal 15 al tutto marzo, e dal 15 dicembre al 20 gennaio.
Chrysomitris Spinus. Dal 15 ottobre al 15 novembre.
Chloroptila Citrinella. Dal 15 ottobre al 15 novembre.
Cannabina Linota. Dal 15 ottobre al 15 novembre.
Ægiothus rufescens. Dal 15 ottobre al 15 novembre.
Miliaria Projer. Dal 15 ottobre al 15 novembre.
Emberiza Citrinella. Dal 1° al 30 aprile.
Emberiza Hortulana. Dal 1° al 30 aprile.
Emberiza Cia. Dal 1° al 30 settembre.
Emberiza Schœniclus. Dal 1° al 30 settembre.
Alauda arvensis. Dal 1° al 15 ottobre.
Galerita cristata. Dal 1° al 15 ottobre.
Anthus trivialis. Dal 15 ottobre al 15 novembre.

Digitized by Google

Anthus Spipoletta. Dal 15 ottobre al 15 novembre.
Budytes flavus. Dal 15 ottobre al 15 novembre.
Motacilla alba. Dal 15 al 30 marzo, e dal 1° al 30 settemb.
Calobates melanope. Dal 15 ottobre al 15 novembre.
Saxicola Oenanthe. Dal 15 al 30 mar., e dal 1° al 30 settemb.
Monticola saxatilis. Dal 1° al 31 maggio.
Turdus pilaris. Dal 1° al 31 maggio.
Turdus musicus. Dal 1° al 15 ottobre.
Aëdon Luscinia. Dal 1° al 31 maggio, e dal 1° al 31 dicemb.
Ruticilla Phœnicurus. Dal 1° al 30 settembre.
Ruticilla titys. Dal 1° al 30 settembre.
Pratincola Rubicola. Dal 1° al 30 settembre.
Monachus Atricapillus. Dal 1° al 31 magg., e dal 15 al 31 ag.
Sylvia Curruca. Dal 1° al 15 ottobre.
Accentor collaris. Dal 1° al 30 maggio.
Lanius Excubitor. Dal 15 maggio al 15 giugno, e dal 15 al 31 agosto.
Lanius minor. Dal 15 maggio al 15 giugno, e dal 15 al 31 agosto.
Lanius Collurio. Dal 15 maggio al 15 giugno, e dal 15 al 31 agosto.
Lanius auriculatus. Dal 15 maggio al 15 giugno, e dal 15 al 31 agosto.
Hirundo rustica. Dal 1° al 30 maggio.
Chelidon urbica. Dal 1° al 30 maggio.
Cypselus Apus. Dal 1° al 30 maggio.
Cypselus Melba. Dal 1° al 30 magg., e dal 1° al 30 settemb.
Picus major. Dal 1° al 15 ottobre.
Iÿnx Torquilla. Dal 1° al 31 maggio.
Cuculus canorus. Dal 1° al 30 luglio.
Upupa Epops. Dal 1° al 30 aprile.
Strix flammea. Dal 15 magg. al 15 giu., e dal 1° al 30 settemb.
Asio Otus. Dal 15 maggio al 15 giugno.
Scops Giu. Dal 15 maggio al 15 giugno.
Œdicnemus scolopax. Dal 15 novembre al 15 dicembre.
Scolopax Rusticula. Dal 15 febbraio a tutto marzo, e dal 15 dicembre al 20 gennaio.

Digitized by Google

Gallinago cælestis. Dal 15 ottobre al 15 novembre.
Totanus Ochropus. Dal 15 al 30 marzo, e dal 15 novembre al 15 dicembre.

Distretto di Piedimulera.

Corvus Corax. Novembre e dicembre.
Corvus Cornix. Novembre e dicembre.
Sturnus vulgaris. Dal 1° al 31 marzo, e dal 15 settembre al 15 novembre.
Ligurinus Chloris. Dal 15 settembre al 15 ottobre.
Chrysomitris Spinus. Dal 15 al 31 ottobre.
Cannabina Linota. Dal 15 settembre al 15 ottobre.
Emberiza Citrinella. Dal 1° al 15 settembre.
Alauda arborea. Dal 1° al 31 marzo, e dal 15 al 30 ottobre.[1]
Alauda arvensis. Dal 1° al 31 marzo, e dal 15 al 30 ottobre.[1]
Anthus trivialis. Dal 15 al 30 settembre — parte rimangono presso le paludi del Toce.
Anthus Spipoletta. Dal 15 al 30 settembre — parte rimangono presso le paludi del Toce.
Budytes flavus. Dal 1° al 15 settembre — parte rimangono.
Saxicola Oenanthe. Dal 1° al 30 mar., e dal 1° al 15 settemb.
Turdus pilaris. Dal 1° al 15 ottobre.
Turdus iliacus. Dal 1° al 15 ottobre.
Aëdon Luscinia. Dal 15 al 30 aprile, e dal 1° al 15 ottobre.
Cyanecula Wolfi. In dicembre e rimane.
Hirundo rustica. Dal 1° al 15 aprile, e dal 15 settembre ai primi di ottobre.
Cotile rupestris. Dal 1° al 31 marzo, e dal 15 al 31 ottobre.

---

[1] Queste specie presentarono il fatto di ritornare per qualche giorno durante l' inverno cioè nei giorni 23 e 24 dicembre per causa di variazioni atmosferiche.

Digitized by Google

LOMBARDIA.

Sondrio (Galli-Valerio Bruno):

La Valtellina, sotto il qual nome si comprende, oltre la provincia di Sondrio, quella porzione della provincia di Como che sta fra il Lario e il così detto Trivio, corre dal Nord-Est all'Ovest sempre serrata fra due catene di monti: le prealpi Orobie al Sud e le Alpi al Nord. Essa confina al Sud colle provincie di Bergamo e di Brescia; al Nord col cantone Grigione, all'Est col Tirolo tedesco, al Sud col Lario. Due vallate principali costituiscono la Valtellina: Quella dell'Adda, la più lunga, che corre da Est ad Ovest, e quella del Liro che corre da Nord a Sud. In queste due valli principali ne sbucano moltissime altre secondarie, ora strette, orride, dirupate, ora larghe, piane e ben coltivate, che mandano, esclusa quella di Livigno, il contributo delle loro acque ai due fiumi più importanti: il Liro e l'Adda. Annovereremo qui fra le vallate secondarie quella del Mera e la Codera che s'aprono nella valle del Liro; quelle del Masino, del Mallero, la Fontana, del Poschiavino, di Grosio; di Livigno, di Fralle, che stanno sulla destra dell'Adda, quelle del Bitto, del Tartano, la Madre, la Cervia, del Livrio, della Venina, di Belviso, del Frodolfo, sulla sinistra del medesimo fiume. — Le due catene di monti rinserranti la Valtellina, in molti punti si allargano formando bacini di una certa estensione quali quello di Morbegno, di Sondrio, di Groviotto ecc. — In tali condizioni facilmente si comprende come e il piano, e la palude, e la foresta, e il torrente, e il fiume, e il ghiacciaio, e la nuda cresta del monte vi si possano contemporaneamente trovare. Nelle pianure, nelle rive de' fossati e de' fiumi, crescono rigogliosi le *Salix alba*, *viminalis*, *fragilis*, *vitellina* ecc.; i *Populus tremula*, *canescens*, *nigra*, *alba;* i *Morus alba*, *nigra;* l'*Alnus glutinosa;* la *Daphne laureola*, ecc., le quali tutte s'innalzano per breve tratto sui

Digitized by Google

monti. A loro succedono la *Castanea sativa;* la *Juglans regia;* le *Betula alba*, *ovata*, *nana;* i *Pinus abies*, *picea*, *larix*, *sylvestris*, *mugo*, *cembra;* il *Fagus sylvatica;* i *Rhododendron ferrugineum*, *hirsutum;* i *Juniperus communis*, *sabina*, *nana*, ecc. Ma a poco a poco, mano mano che c'innalziamo, tutti questi alberi vanno intisichendo, appaiono qua e là come rara reliquia d'una vegetazione superba, spariscono e cedono il porto alle tisiche erbe rasentanti le basi degli immensi ghiacciai. — Fra quelle piante, fra quegli arbusti, fra quelle erbe, vivono, prolificano, muoiono le varie specie ornitiche che in seguito accenneremo; vivono, prolificano, muoiono: l'*Ursus arctos;* la *Capella rupicapra;* il *Canis vulpes;* le *Mustela martes*, *erminea*, *putorius*, *foina;* il *Sciurus vulgaris;* la *Lutra vulgaris;* i *Myoxus glis*, *avellanarius;* la *Talpa europæa;* il *Meles taxus;* i *Mus decumanus*, *musculus;* l'*Arvicola arvalis;* il *Crossopus fodiens;* la *Crocidura aranea.* Nell'acque degli stagni, de' laghi e de' fiumi, guizzano il *Cottus gobio;* l'*Alburnus alborella*, la *Tinca vulgaris*, il *Salmo fario* ecc.; e vivono i numerosi batraci. Sulle aride rupi corrono velocemente: le *Lacerta viridis*, *muralis;* la *Vipera berus*, l'*Anguis fragilis* ecc. Per l'aria, sulle fronde, sui fiori, sul suolo, vola, combatte, si agitano miriadi d'insetti e

Un mondo di viventi atomi, a cui
Sembra una stilla di rugiada, un lago;
E per girare intorno
All'orbe immenso d'una margherita
Consumano la vita.

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nella provincia di Sondrio, coi nomi volgari locali, ed indicazioni di frequenza, ecc.

Corvus Corax, *Corv gross.* Non tanto comune, vive sui monti e di rado discende al piano.

Digitized by Google

Corvus Cornix, *Cornagia*. Comune.

Corvus frugilegus, *Corv*. Comunissimo, vive al piano.

Nucifraga Caryocatactes, *Gagia nisciulera*. Non tanto comune, vive costantemente sui monti.

Pica rustica, *Berta*. Comunissima, vive in pianura.

Garrulus glandarius, *Gagia*. Comune, vive quasi sempre sui monti, non discendendo se non di rado in pianura.

Pyrrhocorax alpinus, *Crasc*, *Crascin*. Comunissimo, vive sempre sui monti.

Pyrrhocorax Graculus, *Crasc*, *Crascin*. Comune, vive sempre sui monti.

Sturnus vulgaris, *Sturnell*. Comunissimo, vive al piano.

Pastor roseus. Raro, vive al piano.

Fringilla cœlebs, *Franguel*. Comunissimo, vive tanto al piano che sui monti.

Fringilla Montifringilla, *Franguel muntan*. Vive sui monti, raramente discende al piano; è specie comune.

Montifringilla nivalis, *Üsell de la nef*. *Bianchin*. Vive sugli alti monti sedentario.

Passer montanus, *Passer*. Comunissima, vive in pianura.

Passer Italiæ, *Passer gross*. Vive in pianura e anche in montagna ovunque sono abitazioni; è comunissima.

Coccothraustes vulgaris, *Sfrison*. Comune a mezza montagna.

Ligurinus Chloris, *Verdon*. Comunissimo, vive sui monti e in pianura.

Chrysomitris Spinus, *Legürin*. Comunissimo, vive tanto in pianura che in montagna.

Carduelis elegans, *Lavarin*. Comunissimo, vive preferibilmente in pianura.

Serinus hortulanus, *Sverzerin*. Comunissimo, trovasi in pianura e in montagna.

Cannabina Linota, *Finett*. Comunissimo, vive sui maggenghi e in pianura.

Ægiothus rufescens, *Cardinalin*. Comune, vive specialmente in montagna, ma trovasi alcune volte anche al piano.

Pyrrhula europæa, *Cifulott*, *Gemôn*. Comune, vive sempre in montagna.

Digitized by Google

Loxia Curvirostra, *Bec in crus*, *Becher*. Comune, vive costantemente sui monti.

Emberiza Citrinella, *Spaiarda*. Comunissimo, vive sui maggenghi e in pianura.

Emberiza Hortulana. Non molto comune, vive al piano e in montagna.

Emberiza Cia, *Zipp*. Comunissimo, vive sui maggenghi e nelle vigne.

Emberiza Schœniclus. Non comune, vive in pianura.

Calandrella brachydactyla, *Gic Giac*. Comune in certi anni, in altri no; vive sempre in pianura.

Alauda arborea, *Tûrli*, *Odolin de crap*. Comune, vive tanto in pianura come a mezza montagna.

Alauda arvensis, *Lodola*, *Odola*, *Odola de campagna*. Comunissima, vive sempre in pianura.

Anthus pratensis, *Sguizzeta*. Comunissima, vive sui maggenghi e in pianura.

Anthus trivialis, *Durdina*. Comunissima, vive sui maggenghi e in pianura.

Anthus Spipoletta, *Sguizeton*. Comune, vive sui maggenghi e in pianura.

Budytes flavus, *Buarina*. Comune, vive in pianura.

Budytes cinereocapillus, *Buarina*. Comune, vive in pianura.

Motacilla alba, *Ballarina*, *Quatremula*. Comunissima, vive sempre in pianura.

Calobates melanope, *Quatremula gialda*. Comune, vive in pianura.

Saxicola Oenanthe, *Cübianc*. Comune, vive in pianura e in montagna.

Monticola saxatilis, *Cuarussa*. Comune, vive sempre in montagna.

Monticola Cyanus, *Passera sulitaria*. Comune, vive a mezza montagna, fra le viti.

Merula nigra, *Merlo*. Comunissimo, vive anche in montagna, ma più specialmente in pianura.

Merula torquata, *Merlo de muntagna*. Comune, vive sempre sui monti.

Digitized by Google

Turdus pilaris, *Viscarda.* Comunissima, vive in montagna e non discende al piano se non nell'inverno.

Turdus iliacus, *Turd spinard.* Vive in montagna e al piano; è comune.

Turdus musicus, *Turd.* Comunissimo, vive in montagna e al piano.

Turdus viscivorus, *Dress.* Comunissima, vive in montagna e non discende se non raramente nell'inverno.

Aëdon Luscinia, *Rusigneu.* Comune, vive al piano.

Erithacus Rubecula, *Pettross.* Vive specialmente ai monti, ma anche al piano; è specie comune.

Cyanecula Wolfi. Non molto comune, vive al piano.

Ruticilla Phœnicurus, *Cürross.* Comunissimo, vive tanto al monte quanto al piano.

Ruticilla titys, *Cürros féré.* Comune, vive specialmente sui monti dirupati, ma discende anche al piano.

Pratincola Rubicola, *Taragn? Muratt?* Non molto comune, vive in pianura.

Pratincola Rubetra, *Taragn.* Comunissimo, vive sui maggenghi e in pianura.

Sylvia orphæa, *Bianchet.* Comune al piano.

Sylvia cinerea. Non comune, vive in pianura.

Sylvia Curruca, *Bianchett?* Non comune, vive in pianura.

Monachus Atricapillus, *Capnegher.* Comune, vive al piano.

Monachus hortensis, *Bianchett?* Comune, vive in pianura.

Pyrophthalma melanocephala, *Bianchett?* Raro, vive in pianura.

Phylloscopus sibilator, *Tuin.* Comune, vive al piano e al monte.

Phylloscopus Trochilus, *Tuin.* Comune, vive in pianura.

Phylloscopus rufus, *Tuin*, *Tuit.* Comunissimo, vive in montagna e in pianura.

Hypolais polyglotta. Non comune, vive al piano.

Acrocephalus streperus. Comune, vive al piano.

Acrocephalus arundinaceus. Comune, vive in pianura.

Locustella naevia. Rarissimo, vive al piano.

Troglodytes parvulus, *Forabeucc*, *Trenta pés.* Comunissimo, vive in montagna e in pianura.

Digitized by Google

Cinclus aquaticus, *Merlo acquireu.* Vive al piano e al monte; comunissimo.

Accentor collaris, *Mattarott.* Comune, vive sempre nelle alte montagne.

Accentor modularis, *Passera buschina*, *Matelina.* Comunissima, vive sui monti da cui non discende se non in pieno inverno.

Regulus cristatus, *Stelin*, *Stelletin.* Comune, vive sui monti e non li abbandona se non nell'inverno.

Regulus ignicapillus, *Stelin*, *Stelletin.* Come la specie precedente, ma meno comune.

Acredula caudata, *Cua lunga.* Non abbondante, vive al piano.

Acredula rosea, *Cua lunga.* Comunissima, vive al piano.

Parus major, *Parascieula.* Comunissima, vive al piano ed al monte.

Parus ater, *Parascieula de munt.* Comune, vive solo al monte.

Cyanistes cæruleus, *Muneghina.* Comune, vive al piano e al monte.

Pœcile palustris, *Parasciulin de munt.* Non comune come le precedenti, vive al piano e al monte.

Sitta cæsia, *Parulé.* Comune, vive al monte.

Certhia familiaris, *Rampeghin.* Comunissimo, vive sempre sui monti.

Certhia brachydactyla, *Rampeghin.* Meno comune della precedente specie, vive al piano.

Tichodroma muraria, *Reusa.* Non comune, vive sulle rupi e in pianura ove sono abitazioni.

Oriolus Galbula, *Gardé, Merlo adurà.* Non comune, vive ai monti e al piano.

Ampelis Garrulus. Capita raramente, vive al piano.

Lanius minor, *Gazzott flüval.* Comune, vive in pianura.

Lanius Collurio, *Gazzott*, *Cagnina.* Comunissima, vive al piano.

Lanius auriculatus, *Gazzott.* Specie più rara delle precedenti, vive al piano.

Muscicapa Atricapilla, *Alett.* Comunissima ovunque.

Hirundo rustica, *Rundena.* Comunissima, vive al piano.

Digitized by Google

Chelidon urbica. Comunissima, vive specialmente al monte, ma anche al piano.

Cypselus Apus, *Rondon.* Comunissimo, vive in montagna e al piano.

Picus major, *Picasc.* Sui monti; non comune.

Picus minor. Raro, vive a mezza montagna e al piano.

Gecinus viridis, *Picasc.* Comunissimo, vive al piano e al monte.

Iÿnx Torquilla, *Stortacol*, *Vaca grossa.* Comune, vive al piano.

Cuculus canorus, *Cücul*, *Cüchett.* Comune, vive al piano e al monte.

Alcedo Ispida, *Martin pescadù.* Comune, vive al piano.

Upupa Epops, *Bübola.* Comune vive al piano.

Strix flammea. Al piano, non comune.

Nyctala Tengmalmi. Non comune, vive al monte.

Asio accipitrinus. Non comune, vive sui monti.

Athene Noctua, *Scigueta.* Comunissima, vive a mezza montagna tra le viti; raramente cala al piano.

Scops Giu, *Sciscieu.* Non abbondante, vive al piano e al monte.

Bubo maximus, *Düc.* Comune, vive in montagna; qualche volta cala al piano.

Aquila Chrysaëtus, *Aquila.* Comune, sta sempre sugli alti monti.

Buteo vulgaris, *Aigula.* Comunissima, vive ai monti, ma specialmente in pianura.

Cerchneis Tinnunculus, *Falchett.* Comune, vive al piano e a mezza montagna.

Accipiter Nisus, *Gavinell.* Comune, vive particolarmente al piano; raramente ai monti.

Gypaëtus barbatus. Forse trovasi ancora sopra Chiavenna.

Pelecanus Onocrotalus, *Pellicano.* Capita raramente.

Ardetta minuta, *Sgolgin.* Comune, vive al piano.

Ciconia alba. Di passaggio casuale; presa a Colico.

Ciconia nigra. Di passaggio casuale; presa a Colico.

Anser segetum, *Oca salvadega.* Capita raramente al piano.

Anas Boscas, *Aneda salvadega.* Comune, vive al piano.

Digitized by Google

Querquedula Circia, *Garganell.* Comune, vive al piano.
Mergus Serrator. Accidentale nella Valtellina.
Columba Palumbus, *Pevion salvadegh.* Comune, vive al piano.
Columba Oenas, *Pevion salvadegh.* Comune, vive al piano.
Turtur tenera, *Turtura.* Meno comune, vive al piano.
Perdix rufa, *Pernis.* Temo che quella da me esaminata non sia stata presa in Valtellina.
Perdix saxatilis, *Cuturna.* Comunissima, vive sempre in montagna.
Starna Perdix, *Pernis, Perniseta.* Comunissima, vive a mezza montagna fra le viti; qualche volta discende al piano.
Coturnix communis, *Quaia.* Comunissima, vive al piano; qualche volta però fu colta sui monti.
Lyrurus Tetrix, *Gall de montagna* (il ♂), *Gallina, Sterla* (la ♀), *Pullastron* (il giovane). Comune, va diminuendo; abita gli alti monti.
Bonasa betulina, *Franculin.* Comune, va diminuendo; vive sugli alti monti, qualche volta scende al piano.
Lagopus mutus, *Runcasc.* Abita gli alti monti; è comune.
Rallus aquaticus, *Grügnett.* Comune, vive al piano.
Ortygometra Porzana, *Gilardina.* Comune vive al piano.
Crex pratensis, *Re de quai.* Comune, vive al piano.
Gallinula chloropus, *Grügnetton.* Comune, vive al piano.
Fulica atra, *Fulega.* Non abbondante nella prov. di Sondrio, vive al piano.
Grus communis. Di passaggio e rara.
Ægialitis curonica. Non comune, vive al piano.
Vanellus Capella, *Pavonzin.* Comune, vive in pianura.
Tringoïdes Hypoleucus, *Piu.* Comune, vive in pianura lungo i fiumi.
Totanus Ochropus. Nidifica talvolta nella prov. di Sondrio.
Totanus stagnatilis. Trovasi qualche volta a Colico.
Limosa melanura. Di passaggio in Valtellina.
Scolopax Rusticula, *Beccazza, Gallinazza.* Comune, ma non abbondante se non nelle rigide annate; vive al piano e a mezza montagna.
Gallinago major, *Sgneppon, Meng.* Comune, vive al piano.

Digitized by Google

Gallinago cælestis, *Sgneppa*. Comune, vive al piano.
Gallinago Gallinula, *Sgneppin*. Comune, vive al piano.
Chroocephalus ridibundus, *Garigula*, *Sgulatrel*. Abita il lago di Mezzola e il Lario presso Colico; è comunissimo.

Elenco delle specie di uccelli che sono sedentarie nella provincia di Sondrio.

Corvus Corax.
Corvus Cornix.
Corvus frugilegus.
Nucifraga Caryocatactes.
Pica rustica.
Garrulus glandarius.
Pyrrhocorax alpinus.
Pyrrhocorax Graculus.
Fringilla cœlebs.
Passer montanus.
Passer Italiæ.
Montifringilla nivalis.
Ligurinus Chloris.
Chrysomitris Spinus.
Carduelis elegans.
Serinus hortulanus.
Pyrrhula europæa.
Loxia Curvirostra.
Emberiza Citrinella.
Emberiza Cia.
Alauda arvensis.
Anthus pratensis.
Anthus Spipoletta.
Motacilla alba.
Calobates melanope.
Monticola Cyanus.
Merula nigra.
? Merula torquata.
Turdus viscivorus.
Erithacus Rubecula.
? Ruticilla Phœnicurus.
Ruticilla titys.
? Monachus Atricapillus.
Troglodytes parvulus.
Cinclus aquaticus.
Accentor collaris.
Accentor modularis.
Regulus cristatus.
Regulus ignicapillus.
? Acredula caudata.
Acredula rosea.
Parus major.
Parus ater.
Cyanistes cæruleus.
Pœcile palustris.
Sitta cæsia.
Certhia familiaris.
Certhia brachydactyla.
Tichodroma muraria.
Picus major.
Gecinus viridis.
Alcedo Ispida.
? Strix flammea.
? Nyctala Tengmalmi.

Digitized by Google

? Asio accipitrinus.
Athene Noctua.
Bubo maximus.
Aquila Chrysaëtus.
Buteo vulgaris.
Cerchneis Tinnunculus.
Accipiter Nisus.
? Anas Boscas.
? Perdix rufa.
Perdix saxatilis.
Starna Perdix.
Lyrurus Tetrix.
Bonasa betulina.
Lagopus mutus.
? Fulica atra.

Elenco delle specie di uccelli le quali nidificano nella provincia di Sondrio, con alcune notizie.

Corvus Corax. Nel marzo ed aprile, 4 uova.
Corvus Cornix.
? Corvus frugilegus.
Nucifraga Caryocatactes. Nel giugno.
Pica rustica. Nel maggio, 5 uova.
Garrulus glandarius. 5 uova.
Pyrrhocorax alpinus.
Pyrrhocorax Graculus.
Fringilla cœlebs. Due covate di 6 uova ciascuna. Una nel maggio l'altra nel luglio, alla fine.
Montifringilla nivalis. Allo Spluga.
Passer montanus. Nel maggio e nell'agosto. Uova 6 o 7.
Passer Italiæ. 6 uova in maggio ed agosto.
Coccothraustes vulgaris.
Ligurinus Chloris.
Chrysomitris Spinus. Nel marzo.
Carduelis elegans. 4 o 6 uova.
Serinus hortulanus. Maggio.
Cannabina Linota.
Ægiothus rufescens. Luglio.
Pyrrhula europæa. Nel luglio.
Loxia Curvirostra. In marzo.

Digitized by Google

Emberiza Citrinella.
Emberiza Hortulana.
Alauda arborea.
Alauda arvensis.
? Anthus pratensis.
Anthus trivialis.
Anthus Spipoletta.
Budytes flavus.
Budytes cinereocapillus.
Motacilla alba. Nel giugno.
Calobates melanope.
Saxicola Oenanthe.
Monticola saxatilis.
Monticola Cyanus. Nel maggio.
Merula nigra. Nel maggio e nel luglio. Due covate di 5 uova ciascuna.
Merula torquata.
Turdus musicus.
Turdus viscivorus.
Aëdon Luscinia. Nella 2ª metà di maggio.
Erithacus Rubecula.
Ruticilla Phœnicurus.
Ruticilla titys.
Pratincola Rubetra.
Sylvia orphæa. In maggio.
Monachus Atricapillus. Nel maggio. Mette 4 o 6 uova.
Monachus hortensis. Nell' agosto.
Acrocephalus streperus.
Acrocephalus arundinaceus. Nel maggio o nel giugno.
Troglodytes parvulus.
Cinclus aquaticus.
Accentor collaris.
Accentor modularis. Nel luglio.
Regulus cristatus. Nel giugno.
Regulus ignicapillus.
Acredula rosea. Due covate di 16 uova ciascuna. La prima nel marzo la seconda nel maggio.

Digitized by Google

Parus major. Nel maggio e nel luglio. Fa due covate generalmente di 8 uova.
Parus ater. Nel maggio e nell'agosto.
Cyanistes cæruleus.
Pœcile palustris.
Sitta caesia.
Certhia familiaris.
Certhia brachydactyla.
Oriolus Galbula. Nel maggio.
Lanius minor. Nel giugno.
Lanius Collurio. Nel giugno. Uova 5 o 6.
?Lanius auriculatus.
Muscicapa Atricapilla.
Hirundo rustica. Due covate di 6 o 4 uova ciascuna. La prima in aprile la seconda in luglio (fine).
Chelidon urbica. Due covate di uova 4 ciascuna. La prima nel maggio la seconda nel luglio.
Cypselus Apus. Nel giugno.
Gecinus viridis.
?Iÿnx Torquilla.
Cuculus canorus. Nel luglio.
Alcedo Ispida.
Upupa Epops. Maggio, covata di 3 uova.
Strix flammea.
Athene Noctua. Maggio o giugno. Una covata di 2 o 3 uova.
Asio accipitrinus. Agosto.
Bubo maximus. Aprile o maggio. Una covata di 2 uova.
Aquila Chrysaëtus. Una covata di 2 uova nel giugno.
Buteo vulgaris. Una covata di 4 uova nel giugno.
Cerchneis Tinnunculus. Una covata nel maggio.
Accipiter Nisus.
Ardetta minuta. Nel maggio e nel giugno. Mette 5 uova bianche.
Anas Boscas.
?Querquedula Circia.
Columba Palumbus. Aprile e maggio.
Columba Oenas. Aprile e maggio.

Digitized by Google

Turtur tenera. Nel maggio e nel giugno. Mette 2 uova bianche.
Perdix saxatilis. Nel maggio. Mette 14 o 15 uova.
Starna Perdix. Nel maggio e giugno. Mette 20 uova.
Coturnix communis. Due covate. Una nel maggio l'altra nel luglio, ciascuna di 9 a 11 uova.
Lyrurus Tetrix.
Bonasa betulina.
Lagopus mutus.
Rallus aquaticus.
Ortygometra Porzana.
Gallinula chloropus.
Crex pratensis. Nel giugno.
?Fulica atra.
? Ægialitis curonica.
Tringoïdes Hypoleucus. Nel maggio. Mette 4 uova.
Totanus Ochropus.

Elenco delle specie di uccelli che sono di passaggio regolare nella provincia di Sondrio.

Sturnus vulgaris. In primavera e nell'ottobre.
Calandrella brachydactyla. Seconda quindicina del settembre.
Anthus pratensis. Giunge in ottobre, parte in marzo.
Turdus pilaris. Arriva in novembre, parte in febbraio.
Turdus iliacus. Giunge in novembre, parte in febbraio.
Cyanecula Wolfi. Nella seconda quindicina di agosto e nei primi di settembre passano i maschi; le femmine passano alla fine del settembre.
Mergus Serrator. Nella prima metà di novembre.
Vanellus Capella. Fine ottobre e primi novembre e ancora nel marzo.
Scolopax Rusticula. Alla fine dell'ottobre e ai primi del novembre.

Digitized by Google

Gallinago major. In primavera, più raro in autunno.
Gallinago cælestis. Incomincia il passo nella seconda quindicina di agosto.

Bergamo (Stefanini Giovanni):

La provincia di Bergamo è fertilissima ed ha una superficie di 220 leghe quadrate, una quinta parte trovasi in pianura, il resto è montuoso; possiede alcuni piccoli laghi, ed i fiumi Adda, Brembo e Serio. Confina colle provincie di Sondrio, Como, Milano, Cremona e Brescia. La temperatura media annuale è di + 13° centigradi ed ha per estremi il — 10° ed il + 27° e 28°. Nella parte montuosa l'aria è secca, leggera e saluberrima; nella parte bassa è invece umida e pesante. La grandine non è rara, le brine vi sono frequenti, le nebbie spesse volte densissime.

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nella provincia di Bergamo, coi nomi volgari locali ed indicazioni di frequenza, ubicazione ecc.

Corvus Corax, *Croff gros.* È scarsissimo, vive in montagna.
Corvus Corone, *Croff nigher.* È frequente sulle alte vette.
Corvus Cornix, *Cornagia griza.* È scarsissima, vive sui monti.
Corvus frugilegus, *Croff*, *Cornagia negra.* È frequente al piano durante le nevi.
Lycos Monedula, *Tacola.* È scarsissima.
Nucifraga Caryocatactes, *Gaza nisòlera.* Scarsissima sui monti ed al piano.
Pica rustica, *Gaza ladra.* Vive sui monti ed al piano.
Garrulus glandarius, *Gaza carnera.* È frequente sui monti ed al piano.
Sturnus vulgaris, *Stornel.* È comune in pianura.

Digitized by Google

Fringilla cœlebs, *Franguel.* È frequente al monte ed al piano.

Fringilla Montifringilla, *Montanel.* È frequente al monte ed al piano durante il passo.

Passer montanus, *Pasera -busareola.* Frequente al monte ed al piano.

Passer Italiæ, *Paserù merder.* Frequente al monte ed al piano.

Coccothraustes vulgaris, *Frisù.* Scarso ai monti ed al piano.

Ligurinus Chloris, *Amarot.* Scarso ai monti ed al piano.

Chrysomitris Spinus, *Logherì.* È frequente al monte ed al piano durante il passaggio.

Carduelis elegans, *Raari.* Vive in pianura ed è frequente; scarso ai monti.

Serinus hortulanus, *Sverzerì.* Scarsissimo, è solo di passaggio ai monti ed al piano.

Cannabina Linota, *Ocanell.* È frequentissimo ai monti ed al piano, ma solo di passo.

Ægiothus Linarius, *Cardinalì.* È scarsissimo ai monti ed al piano lorquando è di passo.

Pyrrhula europæa, *Siglot.* Scarso ai monti ed al piano, solo di passaggio.

Loxia Curvirostra, *Becc in crus.* Compare irregolarmente di passaggio nei monti.

Miliaria Projer, *Tētà rais.* Scarso e solo di passo in pianura.

Emberiza Citrinella, *Pajarana.* Scarso al piano ed al monte.

Emberiza Hortulana, *Ortolà.* È frequente al monte ed al piano.

Emberiza Cia, *Spions.* Frequente al monte ed al piano, solo di passo.

Emberiza Schœniclus, *Spions dē la larga.* Poco frequente, vive in pianura.

Melanocorypha Calandra, *Calandra.* È frequente in pianura.

Alauda arborea, *Lodolì.* È frequente al piano ed al monte.

Alauda arvensis, *Lodola.* È frequente al piano ed al monte.

Galerita cristata, *Calandra col capeŭs.* Scarsa, vive al piano.

Agrodroma campestris, *Sguisetù.* Scarso, vive in pianura durante il passo.

Anthus pratensis, *Sguisĕta.* È frequente in pianura.

Digitized by Google

Anthus trivialis, *Guina.* È frequente durante il passo al monte ed al piano.

Budytus flavus, *Boarì.* È frequente in pianura durante il passo.

Motacilla alba, *Balarota.* È frequente in pianura.

Calobates melanope, *Balarina.* È frequente in pianura lungo i canali d'acqua.

Saxicola Oenanthe, *Cul bianc.* È frequente durante il passo al monte ed al piano.

Monticola saxatilis, *Caròsol.* Scarso, vive sui monti.

Monticola Cyanus, *Passera solitaria.* È scarsa, vive sui monti.

Merula nigra, *Merlo.* È frequente sui monti ed al piano.

Merula torquata, *Merla montana.* È scarsa, vive sui monti.

Turdus pilaris, *Viscera.* È frequente durante il passo al monte ed al piano.

Turdus iliacus, *Sdordì.* È frequente durante il passo al monte ed al piano.

Turdus musicus, *Durt.* Frequente alla montagna ed alla pianura.

Turdus viscivorus, *Drèsa.* È scarsa, vive al monte ed al piano.

Aëdon Luscinia, *Rosigneol.* È scarso, vive sui monti ed al piano.

Erithacus Rubecula, *Picial.* È frequentissimo durante il passo al monte ed al piano.

Cyanecula Wolfi, *Morat dè la stela.* È scarsissimo al monte ed al piano.

Ruticilla Phoenicurus, *Morat.* È frequentissimo durante il passo al monte ed al piano.

Ruticilla titys, *Morat carbuner.* Scarso al monte ed al piano.

Pratincola Rubicola, *Macheti de montagna.* Scarso al monte ed al piano.

Pratincola Rubetra, *Machet.* È frequente durante il passo ai monti ed al piano.

Sylvia cinerea, *Sardagna.* È frequente al monte ed al piano.

Sylvia Curruca, *Beca mure.* È scarsa al monte ed al piano.

Monachus Atricapillus, *Capnigher.* È frequente al piano ed al monte.

Monachus hortensis, *Becafic.* È frequente durante il passo al monte ed al piano.

Digitized by Google

Phylloscopus sibilator, *Tuì verd.* È frequente al monte ed al piano.

Phylloscopus Trochilus, *Tuì zald.* È frequente al monte ed al piano.

Phylloscopus Bonellii, *Tuì bianch.* È frequente al monte ed al piano.

Phylloscopus rufus, *Tuì.* È frequente alla montagna ed alla pianura.

Hypolais icterina, *Tuinot.* Scarso, vive in pianura.

Acrocephalus palustris, *Ciochēta.* Scarso, vive in pianura.

Troglodytes parvulus, *Reati o Buzaseze.* È frequente sul monte ed al piano.

Cinclus aquaticus, *Merla aquareola.* Scarso, vive lungo i margini del Brembo.

Accentor modularis, *Matèla.* È frequente durante il passo al monte ed al piano.

Regulus ignicapillus, *Steli.* È frequente al monte ed al piano.

Acredula rosea, *Scoasi.* È frequente al monte ed al piano.

Parus major, *Paisŏla.* È frequente al monte ed al piano.

Parus ater, *Ciŭŭci.* È frequente sui monti, al tempo del passo anche al piano.

Cyanistes cæruleus, *Moneghina.* Scarsa ai monti ed al piano.

Sitta caesia, *Picot senerí.* È frequente nei boschi in pianura.

Certhia brachydactyla, *Rampighí.* È scarso, vive nei boschi della pianura.

Tichodroma muraria, *Barbell dè corna.* È scarso, vive sulle alte montagne.

Oriolus Galbula, *Galber.* È scarso in pianura, vive raro ai monti.

Lanius Excubitor, *Gazeola frizunera.* È scarsa, vive in pianura.

Lanius minor, *Gazeola frizunera picola.* È scarsa, vive in pianura.

Lanius Collurio, *Gazeola.* È frequente ai monti ed al piano.

Muscicapa collaris, *Alĕt.* Frequente al piano ed al monte.

Muscicapa Atricapilla, *Alet nigher.* Frequente al piano ed al monte.

Butalis Grisola, *Aletù.* È scarso ai monti ed al piano.

Digitized by Google

Hirundo rustica, *Rondena.* È frequente al monte ed al piano.
Chelidon urbica, *Dardì.* È frequente al monte ed al piano.
Clivicola riparia, *Rondenì.* È frequente al monte ed al piano.
Cypselus Apus, *Dardù.* È frequente al monte ed al piano.
Caprimulgus europæus, *Squartasatt.* Scarso ai monti ed al piano.
Picus major, *Picot ross.* Frequente al piano.
Gecinus viridis, *Picot verde.* Scarso, vive in pianura.
Iÿnx Torquilla, *Beca foermighe.* Frequente al piano.
Cuculus canorus, *Cŏch.* Frequente al piano ed al monte.
Alcedo Ispida, *Piombì.* È frequente in pianura nei luoghi acquosi.
Upupa Epops, *Böba.* È scarsa, vive in pianura.
Strix flammea, *Dama.* Frequente ai monti ed al piano.
Syrnium Aluco, *Lok di Bosk.* Scarso, vive sui monti.
Asio Otus, *Lok.* Scarso, vive sui monti.
Athene Noctua, *Sieta.* Frequente al piano.
Scops Giu, *Locket o Siseol.* Frequente ai monti ed al piano.
Bubo maximus, *Dus.* È scarso, vive sui monti.
Buteo vulgaris, *Pojana.* Frequente sui monti.
Hypotriorchis Subbuteo, *Falchet di Lodole.* Frequente ai monti ed al piano.
Æsalon regulus, *Ganiel di franguei.* Scarso al piano ed al monte.
Cerchneis Tinnunculus, *Falchet dē Tŏr.* Scarso al piano ed al monte.
Botaurus stellaris, *Cà de Sēre o Scacc.* Scarso, vive al piano.
Anas Boscas, *Nedròt salvadeg.* Scarso, vive in pianura.
Mareca Penelope, *Cŏ rosso.* Scarso, vive in pianura.
Nettion Crecca, *Garganell.* Scarsa, vive in pianura.
Querquedula Circia, *Garganell.* È scarsa, vive in pianura.
Turtur tenera, *Tortora.* È scarsa, vive in pianura.
Perdix saxatilis, *Coturna.* È scarsa, vive sui monti.
Starna Perdix, *Pernis.* È scarsa ai monti ed al piano.
Coturnix communis, *Quaia.* Frequente al monte ed al piano.
Lyrurus Tetrix, *Gal de montagna.* Scarso, vive sui monti.
Lagopus mutus, *Roncass.* Scarso, vive sui monti.

Digitized by Google

Rallus aquaticus, *Grugnett.* Frequente, vive al piano.
Ortygometra Porzana, *Gilardina.* Frequente in pianura.
Crex pratensis, *Re dē quae.* Frequente in pianura.
Gallinula chloropus, *Grugnetù.* È scarsa, vive in pianura.
Fulica atra, *Folega.* È scarsa, vive in pianura.
Charadrius Pluvialis, *Codur.* Scarso, vive in pianura.
Vanellus Capella, *Paunsi.* Scarsa, vive in pianura.
Tringoïdes Hypoleucus, *Cul bianc d'aqua.* Scarso, vive in pianura.
Scolopax Rusticula, *Pola.* È frequente al monte ed al piano.
Gallinago major, *Sgnepū.* È scarso al monte ed al piano.
Gallinago cælestis, *Sgnepa.* È frequente al monte ed al piano.
Gallinago Gallinula, *Sgnepi.* È frequente in pianura.
Podiceps fluviatilis, *Sott' aquì.* È scarso, vive al piano nei laghi e fiumi.[1]

Elenco delle specie di uccelli che sono sedentarie nella provincia di Bergamo.

Corvus frugilegus.
Garrulus glandarius.
Sturnus vulgaris.
Fringilla cœlebs.
Passer montanus.
Passer Italiæ.
Carduelis elegans.
Emberiza Citrinella.
Melanocorypha Calandra.
Alauda arvensis.
Monticola Cyanus.
Merula nigra.
Turdus musicus.
Monachus Atricapillus.
Parus major.
Parus ater.
Acredula rosea.
Picus major.
Gecinus viridis.
Strix flammea.
Athene Noctua.
Perdix saxatilis.
Starna Perdix.
Lyrurus Tetrix.

[1] L' osservatore nel rispondere al presente quesito si attenne alla citazione di tutte quelle specie che sono sedentarie in questa provincia, e di quelle di passaggio, tacendo di quelle, la cui apparizione sarebbe da considerarsi accidentale.

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli le quali nidificano nella provincia di Bergamo. [1]

Garrulus glandarius.
Sturnus vulgaris.
Fringilla cœlebs.
Passer montanus.
Passer Italiæ.
Coccothraustes vulgaris.
Carduelis elegans.
Emberiza Citrinella.
Emberiza Hortulana.
Melanocorypha Calandra.
Alauda arborea.
Alauda arvensis.
Galerita cristata.
Motacilla alba.
Calobates melanope.
Monticola saxatilis.
Monticola Cyanus.
Merula nigra.
Turdus musicus.
Turdus viscivorus.
Aëdon Luscinia.
Pratincola Rubicola.
Sylvia cinerea.
Monachus Atricapillus.
Acrocephalus palustris.
Troglodytes parvulus.
Regulus ignicapillus.
Acredula rosea.
Parus major.
Parus ater.
Sitta cæsia.
Certhia brachydactyla.
Lanius Excubitor.
Lanius minor.
Lanius Collurio.
Hirundo rustica.
Chelidon urbica.
Clivicola riparia.
Cypselus Apus.
Cuculus canorus.
Alcedo Ispida.
Strix flammea.
Athene Noctua.
Cerchneis Tinnunculus.
Perdix saxatilis.
Starna Perdix.
Coturnix communis.

---

[1] Non essendosi lo scrivente mai occupato di osservazioni intorno alla nidificazione degli uccelli, è dolentissimo di non poter somministrare qualche dato in materia. Esso però fece le necessarie annotazioni delle richieste e non mancherà a tempo opportuno di occuparsi in sì belli e dilettevoli studi, ed appena avrà potuto raccogliere qualche interessante notizia, per osservazioni proprie, o ben autenticate, si farà premura parteciparle a codesta onorevole Direzione dell' Ufficio ornitologico. Intanto però non crede inutile dare qui di seguito una nota delle principali specie che nidificano in questa provincia. (*Stefanini*).

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli che sono di passaggio regolare nella provincia di Bergamo.[1]

Corvus frugilegus. È di passaggio nella 2ª metà di novembre.

Garrulus glandarius. È di passaggio nella 2ª quindicina di ottobre e nella 1ª quindicina di marzo.

Sturnus vulgaris. Durante tutto il mese di ottobre è di passaggio in numerosissimi stormi.

Fringilla cœlebs. È di passaggio dalla prima metà di ottobre alla metà di novembre, e di ripasso nel mese di marzo.

Fringilla Montifringilla. Il suo regolare passaggio è dagli ultimi quindici giorni di ottobre a tutto novembre.

Passer montanus. È di passaggio in numerosi branchi nella 2ª quindicina di ottobre.

Passer Italiæ. È di passaggio alla medesima epoca del *P. montanus* anzi si frammischia con quello ma in minor quantità.

Coccothraustes vulgaris. Il suo passaggio si effettua nella 2ª quindicina di ottobre, ma in numero molto limitato.

Carduelis elegans. È di passo in pochissima quantità nella 2ª quindicina di ottobre, nella 1ª di novembre ed alla fine di marzo.

Chrysomitris Spinus. È di passaggio nel mese di ottobre sino alla metà di novembre e nel mese di marzo.

Emberiza Citrinella. Di passo piuttosto scarso dalla 2ª metà di ottobre sino alla 1ª quindicina di novembre.

Emberiza Hortulana. Di passaggio non troppo abbondante nel mese di agosto.

Emberiza Cia. È di passaggio nella 2ª quindicina di ottobre a tutta la 1ª di novembre.

---

[1] Osservasi che diverse delle qui accennate specie quantunque annoverate anco quali sedentarie, presentano però un numero di individui più o meno rilevante provenienti da altre regioni che sono di passaggio (*Stefanini*).

Digitized by Google

Emberiza Schœniclus. Il passo è nella 2ª quindicina di ottob.

Melanocorypha Calandra. Di passaggio in scarsissima quantità nella 1ª quindicina di novembre.

Alauda arborea. È di passaggio nella 2ª quindicina di ottobre e nella 2ª quindicina di marzo.

Alauda arvensis. È di passaggio (se le stagioni sono buone) nella 1ª quindicina di novembre in branchi abbondantissimi.

Agrodroma campestris. È di passaggio in scarsa quantità nella 2ª quindicina di ottobre.

Anthus pratensis. Il passo si effettua nella 2ª quindicina di agosto e nella 2ª di marzo.

Anthus trivialis. Di passaggio nel mese di agosto ed in marzo.

Motacilla alba. Il passo si effettua nella 2ª metà di ottobre.

Calobates melanope. È di passaggio dalla metà di settembre a tutto ottobre, ma in limitata quantità.

Saxicola Oenanthe. È di passaggio nella 2ª quindicina di agosto e nella prima quindicina di aprile.

Turdus pilaris. È di passaggio nella 1ª quindicina di novembre a tutto dicembre, ed in febbraio.

Turdus iliacus. Il passo si effettua la 1ª quindicina di novembre.

Turdus musicus. Col favore di una bella stagione il passo è assai numeroso dal 1º al 20 ottobre e nella 1ª quindicina di aprile.

Turdus viscivorus. Passaggio molto scarso nella 1ª metà di novembre.

Erithacus Rubecula. Passaggio abbondante tutto l'ottobre sino alla metà di novembre.

Ruticilla Phœnicurus. Passaggio abbondante nella 1ª quindicina di settembre, e in quella di aprile.

Pratincola Rubetra. È di passaggio nella 2ª quindicina di agosto e nella 2ª quindicina di aprile.

Sylvia cinerea. Il passaggio si effettua nella 1ª quindicina di agosto e nella 1ª quindicina di aprile.

Monachus Atricapillus. È di passo durante il mese di agosto e nella 1ª quindicina di aprile.

Digitized by Google

Monachus hortensis. È di passaggio dalla 1ª quindicina di agosto a tutta la 1ª quindicina di settembre.

Phylloscopus sibilator. Il passo dura tutto il mese di agosto.

Phylloscopus Trochilus. Come il precedente è di passo durante l'agosto.

Phylloscopus Bonellii. È di passaggio nella 2ª quindicina di luglio e nella 1ª quindicina di agosto.

Phylloscopus rufus. È di passo in ottobre e di ripasso nella 2ª quindicina di marzo e la 1ª quindicina di aprile.

Hypolais icterina. Passaggio scarso durante il mese di agosto.

Troglodytes parvulus. È di passaggio nel mese di ottobre e novembre, e di ripasso nel marzo.

Accentor modularis. Il passo si effettua in ottobre ed il ripasso nella 1ª quindicina di aprile.

Regulus ignicapillus. È di passaggio nella 2ª quindicina di ottobre e nella 1ª di novembre.

Acredula rosea. È di passo durante l'ottobre.

Parus major. È di passo nella 2ª quindicina di ottobre e nella 1ª di novembre.

Parus ater. È di passaggio nella 2ª metà di settembre a tutto ottobre. Questa specie che è pure qui sedentaria non tiene un regolare passaggio tutti gli anni, ma lo sospende alle volte per due ed anche tre annate, lorquando però viene effettuato è abbondantissimo e riesce di non poco divertimento a molti bambini che con una pania fissa alla gabbia contenente uno di questi uccelli, appesa alla finestra, anche nell'interno della città, ne catturano diversi.

Cyanistes cæruleus. Passaggio scarso nella 2ª quindicina di ottobre e nella 1ª quindicina di novembre.

Oriolus Galbula. Passaggio scarso nei mesi di agosto e magg.

Lanius Excubitor. Passaggio scarsissimo in settembre.

Lanius minor. Passaggio scarso la 1ª quindicina di agosto.

Lanius Collurio. È di passaggio nella 1ª quindicina di agosto e 2ª quindicina di aprile.

Muscicapa collaris. È di passaggio durante il mese di agosto e nella 2ª quindicina di aprile.

Digitized by Google

Muscicapa Atricapilla. Il passo verificasi eguale alla precedente.

Butalis Grisola. Passaggio scarso durante la 1ª quindicina di agosto.

Hirundo rustica.

Chelidon urbica.

Clivicola riparia. Le tre suaccennate specie giungono nella 1ª quindicina di aprile, nidificano, e ripartono durante il mese di settembre.

Cypselus Apus. Come per le tre specie precedenti.

Caprimulgus europæus. È raro; il suo passo effettuasi nell'agosto.

Iynx Torquilla. È di passaggio durante il mese di settembre e nell'aprile.

Cuculus canorus. Giunge nella 2ª metà di aprile e ci abbandona nell'agosto.

Scops Giu. È di passaggio nel mese di agosto.

Botaurus stellaris. Se ne incontrano alcuni individui di passo nella 1ª quindicina di agosto e nella 2ª di aprile.

Anas Boscas.

Mareca Penelope.

Nettion Crecca.

Querquedula Circia. Queste quattro specie, quantunque in poca quantità, effettuano il loro passaggio nella 2ª quindicina di novembre a tutto dicembre, e se ne catturano diverse durante le nevi.

Coturnix communis. Giunge in questa provincia nel mese di maggio e parte in agosto.

Rallus aquaticus.

Ortygometra Porzana.

Crex pratensis.

Gallinula chloropus. Le quattro suaccennate specie sono di passo durante il mese di agosto ed in aprile, alcune però se ne catturano anche durante il settembre.

Fulica atra. È di passo durante il dicembre e gennaio ma in poca quantità.

Charadrius Pluvialis. È di scarso passaggio in novembre ed in marzo.

Digitized by Google

Vanellus Capella. È di scarso passaggio in dicembre ed in aprile.

Scolopax Rusticula. È di passo nella 2ª quindicina di ottobre e nella 1ª di novembre, e nella 2ª di marzo.

Gallinago major. È di scarsissimo passaggio che verificasi nella 1ª quindicina di novembre, e dalla metà di marzo a tutto aprile.

Gallinago cælestis. Il passo si effettua dal principio di agosto sino alla fine di novembre, ed in primavera dalla metà di febbraio a tutto aprile; non è poi raro il caso di catturarne diversi anche durante le nevi.

Gallinago Gallinula. Giunge in ottobre e riparte dalla 2ª metà di aprile alla 1ª di maggio.

Elenco delle specie di uccelli di apparizione accidentale nella provincia di Bergamo.

Pastor roseus.
Petronia stulta.
Montifringilla nivalis.
Calcarius nivalis.
Accentor collaris.
Panurus biarmicus.
Coracias Garrula.
Merops Apiaster.
Nyctala Tengmalmi.
Circus cyaneus.
Aquila Chrysaëtus.
Ardea cinerea.
Ardea purpurea.
Ardetta minuta.
Nycticorax griseus.
Columba Palumbus.
Otis Tarda.
Otis Tetrax.
Œdicnemus scolopax.
Ægialitis curonica.
Tetanus Ochropus.

Milano (Brambilla nob. Giuseppe).

Castellanza trovasi a metà strada circa fra Milano ed il Lago Maggiore. Il paese è piano tutt'all'intorno, ma è solcato da una ristretta e poco profonda valle, formata dal

Digitized by Google

piccolo fiume Olona, che ha le sue sorgenti nei monti presso Varese e si disperde nei canali di irrigazione presso Milano. Ad E. la pianura si estende fino alle colline Comasche e Briantee. Al S. si congiunge colle grandi pianure della valle del Po. Ad O. si estende fino al Ticino. A N. fino ai colli di Varese e quelli che si trovano fra il Verbano ed il Lario.

Il suolo della Castellanza è quasi per intero coltivato pel prodotto dei grani. Vi è pure una abbondante piantagione di gelsi, e prima dalla malattia delle viti, il vino era un prodotto considerevole del territorio. Ora le viti sono coltivate in piccola parte; ma nel limitrofo territorio di Busto Arsizio la coltura della vite si è molto riattivata. Nel detto territorio di Busto Arsizio vi sono pure vaste brughiere che si congiungono con altre che si estendono fino al Ticino, che è alla distanza di circa 11 chilometri dalla Castellanza. Lungo il confine E. di questo territorio vi sono molte pinete che si congiungono a S. con altre boscaglie di Rescalda, Rescaldina, Origgio e Gerenzano ed a N. coi vasti boschi di Porla e di Mozzate detti boschi Majoli, o del Mirabello. La natura del suolo è ghiaiosa ed arida, ma non ingrata.

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nella provincia di Milano coi nomi volgari locali, indicazioni di frequenza, ecc.

Corvus Cornix, *Taccola.* Scarsa.
Corvus frugilegus, *Scourbat.* Frequente.
Pica rustica, *Berta.* Scarsa.
Garrulus glandarius, *Gasgia.* Frequente.
Sturnus vulgaris, *Stournell.* Frequente.
Fringilla cœlebs, *Franguèll.* Frequente.

Digitized by Google

Fringilla Montifringilla, *Mountân*. Frequente.
Passer montanus, *Passaretta*. Frequente.
Passer Italiæ, *Passera*, *Passaroun*. Frequente.
Coccothraustes vulgaris, *Frisoûn*. Frequente.
Ligurinus Chloris, *Amorott*, *Verdôun*. Frequente.
Chrysomitris Spinus, *Legorîn*. Frequente.
Carduelis elegans, *Ravarîn*. Frequente.
Serinus hortulanus, *Sgarzorîn*, *Verdosîn*. Scarso.
Cannabina Linota, *Fanett*. Frequente.
Ægiothus Linarius, *Cardinalîn*. Scarso.
Ægiothus rufescens, *Cardinalîn*. Scarso.
Pyrrhula europæa, *Zifolott*, *Gemoûn*. Scarso.
Loxia Curvirostra, *Becch in crous*. Scarso.
Miliaria Projer, *Pravôun*. Scarso.
Emberiza Citrinella, *Spajarda*. Frequente.[1]
Emberiza Cirlus, *Zioûn*. Poco frequente.
Emberiza Hortulana, *Ortôlan*. Frequente.
Emberiza Cia, *Zia*. Frequente.
Emberiza Schœniclus, *Ziott*. Frequente.
Alauda arborea, *Turlo*. Frequente.
Alauda arvensis, *Lodola*. Frequente.
Galerita cristata, *Calandra*. Frequente.
Anthus pratensis, *Guzzetta*, *Guzzettina*. Frequente.
Anthus trivialis, *Dourdina*. Frequente.
Anthus Spipoletta, *Guzzettoûn*. Frequente.
Budytes flavus, *Boarina*. Frequente.[2]
Motacilla alba, *Bolarotta*. Frequente.
Saxicola Oenanthe, *Cubianch*. Frequente.

---

[1] C' è confusione nei nomi volgari delle Emberize. Io chiamo Spajarda la *Citrinella* del capo giallo; Zioûn la *Cirlus* col giallo solo in petto; Zia la *Cia* che col canto dice *zia*, senza giallo nelle penne; Ziott lo *Schœniclus* senza giallo, più oscuro della precedente, col capo nero e cinerea la gola. Forse altri useranno altri nomi volgari o li confondono. Io sostengo la mia versione.

[2] C' è gran confusione nei nomi volgari delle Cutrettole. Io chiamo *Boarina* quella gialla; *Balarotta* quella bianca e nera. Ce n' è un' altra più bianca con voce più acuta, che chiamerebbesi *Balerina* che io non conosco bene. A tutte poi si dà il nome generico di *Tremacôua*.

Digitized by Google

Monticola saxatilis, *Corossouloûn*. Comune ai monti, scarso al piano.
Merula nigra, *Merlo*. Frequente.
Turdus pilaris, *Viscarda*. Frequente.
Turdus iliacus, *Dressin*, *Zipper*. Frequente.
Turdus musicus, *Dourd*. Frequente.
Turdus viscivorus, *Dress*, *Dressoûn*. Frequente.
Aëdon Luscinia, *Rossigneu*. Frequente.
Erithacus Rubecula, *Picett*. Frequente.
Cyanecula Wolfi, *Pett' azur*. Scarsissimo.
Ruticilla Phœnicurus, *Morett*, *Coaroussa*. Frequente.
Pratincola Rubicola, *Machett*. Frequente.
Sylvia cinerea, *Sardagna*. Frequente.
Monachus Atricapillus, *Capnegher*. Frequente.
Phylloscopus sibilator, *Tuin*. Frequente.
Phylloscopus Trochilus, *Tuin*. Frequente.
Phylloscopus rufus, *Tuin*. Frequente.
Calamodus aquaticus, *Risireu*. Frequente.
Troglodytes parvulus, *Reotîn*. Frequente.
Cinclus aquaticus, *Merlo d' acqua*. Frequente.
Accentor modularis, *Passera mattella*. Frequente.
Regulus cristatus, *Stellin*, *Codorin*. Frequente.
Regulus ignicapillus, *Stellin*, *Codorin*. Frequente.
Ægithalus pendulinus, *? Pendolin*. Frequente.
Acredula caudata, *Pintin*. Scarso.
Acredula rosea, *Pintin*. Frequente.
Panurus biarmicus, *Todeschin*, *Ussarin*, *Ungaresin*. Frequente.
Parus major, *Parasceula*. Frequente.
Parus ater, *Parasciolin*. Meno frequente.
Cyanistes cæruleus, *Moneghin*. Frequente.
Pœcile palustris, *Moneghin*. Frequente.
Sitta cæsia, *Picascieu*, *Picozzin senerin*. Frequente.
Certhia brachydactyla, *Rampeghîn*. Frequente.
Oriolus Galbula, *Galbèe*. Frequente.
Lanius Excubitor, *Stragazzoûn*, *Gasgetta mornera*. Frequente.
Lanius minor. Non frequente.
Lanius Collurio, *Stragazzetta*, *Gasgetta*. Frequente.

Digitized by Google

Muscicapa collaris, *Alett.* Frequente.
Muscicapa Atricapilla, *Alett.* Frequente.
Hirundo rustica, *Rondena*, *Rondinella.* Frequente.
Chelidon urbica, *Darden*, *Cubianch.* Frequente.
Cypselus Apus, *Roundôun.* Frequente.
Caprimulgus europæus, *Picarân.* Frequente.
Picus major, *Picozz*, *Picasch.* Frequente.
Picus medius. Rarissimo.
Picus minor. Rarissimo.
Gecinus viridis, *Picasch gainèe.* Frequente.
Iÿnx Torquilla, *Stortacoll.* Frequente.
Cuculus canorus, *Cou-coù.* Frequente.
Alcedo Ispida, *Martin Pescoù.* Frequente.
Upupa Epops, *Buba*, *Upupa.* Frequente.
Strix flammea, *Lourock*, *Bella donna.* Frequente.
Syrnium Aluco, *Lourouk.* Frequente.
Athene Noctua, *Sciguetta.* Frequente.
Scops Giu, *Sciscieu.* Frequente.
Bubo maximus, *Gran Dugo.* Ai monti, al piano scarso.
Aquila Chrysaëtus, *Aquila.* Ai monti, scarsa al piano.
Buteo vulgaris, *Pojana.* Frequente.
Cerchneis Tinnunculus, *Falchett de campanin.* Frequente.
Accipiter Nisus, *Falchett.* Frequente.
Pelecanus Onocrotalus, *Pelicân.* Rarissimo.
Ardea cinerea, *Sgolgia*, *Sgolgioûn.* Frequente.
Ardea purpurea, *Sgolgia roussa.* Meno frequente.
Ardeola ralloïdes, *Sgolgîn.* Rara.
Ardetta minuta, *Sgolgîn.* Frequente.
Botaurus stellaris, *Tanabûs.* Frequente.
Nycticorax griseus, *Quak*, *Ajroûn.* Meno frequente.
Ciconia alba, *Sigogna.* Rara.
Ciconia nigra, *Sigogna.* Rara.
Cygnus musicus, *Cing salvadegh.* Rarissimo.
Anser segetum, *Oca salvadega.* Frequente.
Anas Boscas, *Aneda salvadega*, *Germana.* Frequente.
Chaulelasmus streperus, *Grisetta.* Frequente.
Spatula clypeata, *Cazzulott.* Frequente.

Digitized by Google

Dafila acuta, *Coll loungh* (*Sforcelôun*, Lago Maggiore). Frequente.
Mareca Penelope, *Côu-rouss.* (*Pio*, Lago Maggiore). Frequente.
Nettion Crecca, *Garganell.* Frequente.
Querquedula Circia, *Arzadega* (da alcuni *Crè-crè*). Frequente.
Fulix ferina, *Rossera.* (Lago Maggiore). Frequente.
Fulix Marila, *Morettoûn.* Frequente.
Fulix Fuligula, *Tomireula.* (Lago Maggiore). Frequente.
Fulix Nyroca. Non frequente.
Bucephala Clangula, *Quattr' eucc.* Poco frequente.
Mergus Merganser, *Resegott.* Scarso.
Mergus Serrator, *Resegott.* (Lago Maggiore). Meno scarso.
Columba Palumbus, *Tuoun.* Frequente.
Columba Oenas, *Puvioûn salvadegh.* Frequente.
Columba livia, *Puvioûn de Colombèra.* Frequente.
Turtur tenera, *Tourtora*, *Tourtorella.* Frequente.
Perdix rufa, *Cotornîs*, *Cotourno.* In montagna frequente.
Starna Perdix, *Pernîs.* Frequente.
Coturnix communis, *Quaja.* Frequente.
Tetrao Urogallus, *Cedroun*, *Gall cedroûn.* In montagna non frequente.
Lyrurus Tetrix, *Gall de montagna*, *Fasan de montagna*, maschio; *Gallina de montagna*, *Fasanella de montagna*, femmina. Frequente in montagna.
Bonasa betulina, *Francolîn.* In montagna frequente.
Lagopus mutus, *Erbolana.* In montagna frequente.
Rallus aquaticus, *Grugnett.* Frequente.
Ortygometra Porzana, *Gilardina.* Frequente.
Ortygometra Bailloni, *Calchin.* Frequente.
Ortygometra parva, *Calchin.* Frequente.
Crex pratensis, *Re de Quaj.* Frequente.
Gallinula chloropus, *Grugnettoûn gianèe*, maschio; *Gilardina gianera*, femmina. Frequente.
Fulica atra, *Folega.* Frequente.
Grus communis, *Gru.* Scarsa.
Otis Tarda, *Otarda*, *Pollin salvadegh.* Rarissima.
Otis Tetrax. Rara.

Digitized by Google

Œdicnemus scolopax, *Oggioun*, *Usell legoratt.* Non frequente.
Charadrius Pluvialis, *Pivé doré*, *Codur.* Frequente.
Ægialitis curonica, (*Stornoûn*, Lago Maggiore). Frequente.
Vanellus Capella, *Vanetta*, *Pavonzina.* Frequente.
Hæmatopus Ostralegus, *Galinazza de mâr.* Rarissima.
Pelidna alpina, *Gireu* (*Rivelin*, Lago Maggiore). Frequente.
Actodromas minuta, *Gambett.* Frequente.
Machetes Pugnax, *Gambett*, *Gambèttoûn.* Frequente.
Tringoïdes Hypoleucus, *Gambett.* Frequente.
Totanus Ochropus, *Cubianca*, *Travacola.* Frequente.
Totanus Glareola. Raro.
Limosa melanura, *Sgneppôun de mâr.* Rara.
Scolopax Rusticula, *Galinazza.* Frequente.
Gallinago major, *Sgnepôun.* Frequente.
Gallinago cælestis, *Sgnèpa.* Frequente.
Gallinago Gallinula, *Sgnepîn.* Frequente.
Numenius Arquata, *Seguroun.* (*Cor marin*, Lago Maggiore). Frequente.
Numenius Phæopus. Raro.
Sterna fluviatilis, *Sgarin.* Frequente.
Sternula minuta, *Sgarin.* Frequente.
Hydrochelidon nigra,[1] *Sgarin negher.* Poco frequente.
Colymbus arcticus, *Duca* (Lago Maggiore). Rarissima.
Podiceps cristatus, *Giver* (Lago Maggiore). Raro.
Podiceps fluviatilis, *Sottaquin*, *Piombin.* Frequente.

---

[1] Si vedono vari Laridi sui laghi dove in genere si chiamano *Sgarettôun de mâr.*

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli che sono sedentarie nella provincia di Milano e specialmente a Castellanza, circondario di Gallarate.

Corvus Cornix. Scarsa.
Pica rustica. Scarsa.
Garrulus glandarius. Comune.
Fringilla cœlebs. Scarso.
Passer montanus. Abbondante.
Passer Italiæ. Abbondante.
Ligurinus Chloris. Scarso.
Alauda arborea. Scarsa.
Alauda arvensis. Scarsa.
Motacilla alba. Scarsa.
Merula nigra. Scarso.
Turdus viscivorus. Scarsa.
Parus major. Scarsa.
Picus major. Scarso.
Gecinus viridis. Scarso.
Strix flammea. Scarso.
Syrnium Aluco. Si crede perso.
Athene Noctua. Scarsa.
Accipiter Nisus. Scarso.
Starna Perdix. Comune.

Queste sono le specie che io crederei veramente sedentarie in questo altipiano nordico Lombardo, dominato dai venti gelati, che direttamente scendono dalle Alpi, talvolta in forma di vera tormenta. La temperatura iemale in questa località, massime all'aurora, è assai bassa e quando il suolo è tutto coperto di neve e intenso il gelo, varie di queste specie, compresa la *Starna Perdix*, pare che scompaiano momentaneamente per riparare presso ai laghi, ai fiumi, o presso le acque sorgive della bassa Lombardia in cerca di clima meno aspro e di possibile alimento, ricomparendo appena la stagione si fa più mite. I passeri stessi fuggono dalle campagne e si rifugiano nei casolari del villaggio.

Due vasti giardini, adorni di una massa di annosi coniferi, la valletta del piccola fiume Olona, fiancheggiato da altissimi alberi, valgono a trattenere in questo territorio gran parte delle specie qui notate come sedentarie, altrimenti nella nuda campagna ben poche se ne fermerebbero nell'inverno. (*Brambilla*).

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli le quali nidificano nella provincia di Milano, circondario di Gallarate, preceduto da alcune considerazioni in proposito.

Non sono molte le specie di uccelli che nidificano in questa località e queste specie ed il numero degli individui vanno sempre scemando sensibilmente. Causa di questa diminuzione è in gran parte lo sboscamento. A mia memoria le campagne e le strade campestri erano fiancheggiate da siepi con grossi alberi di quercia e di castagno. Nei campi stessi vi erano spesso boschetti di castagno che fornivano i tutori per le viti, di cui allora tutto piantato era questo territorio. Ora non vi sono più viti, nè quercie, nè castagni, nè boschetti. Tutto è scomparso. Non vi sono che siepi di Robinia, che si tagliano al piede ogni due anni, e i Gelsi.

Molti uccelli quindi non trovano dove nascondere i loro nidi. Pure dei nidi se ne fanno ancora, ma questi vengono inesorabilmente distrutti dai contadinelli. Nei giorni festivi massimamente, tutti i ragazzi del paese si sbandano pei campi in cerca di nidiate, per il solo scopo e la voluttà della loro distruzione. È cosa incredibile la persistenza loro in quell'opera vandalica. Nessuno li ammonisce, nessuno li trattiene ed il danno va crescendo.

Il Governo dovrebbe preoccuparsene e porvi un freno. Esistono leggi di caccia abbastanza buone, ma nessuno invigila per farle osservare e tutti le trasgrediscono impunemente. In Isvizzera nessuno tocca mai un nido, perchè vi sono divieti rigorosi ed il popolo è stato educato a rispettarli. Il Ministero dell'Istruzione Pubblica dovrebbe prescrivere ai maestri di campagna di inculcare ai contadinelli il rispetto alle leggi che in proposito sarebbero da emanarsi e far conoscer loro come la conservazione degli uccelli stia nell'interesse dell'agricoltura. Qui l'opera sarà lunga e difficile, ma ogni cosa ha un principio. I preti, se volessero, o sapessero, potrebbero far molto. — Le Rondini sono dette

Digitized by Google

gli uccelli della Madonna e i loro nidi sono i soli per lo più rispettati nelle campagne. Potrebbero inspirare lo stesso rispetto anche per gli altri uccelli. Ma....

Insomma bisogna in qualche modo togliere l'abuso della distruzione dei nidi ed inspirare sentimenti gentili ed umanitari a questa massa di futuri elettori ed eleggibili. Le seguenti specie di uccelli nidificano in questa località. (*Brambilla*).

Corvus Cornix.
Pica rustica.
Garrulus glandarius.
Sturnus vulgaris.
Fringilla cœlebs.
Passer montanus.
Passer Italiæ.
Ligurinus Chloris.
Carduelis elegans.
Emberiza Hortulana.
Alauda arborea.
Alauda arvensis.
Motacilla alba.
Merula nigra.
Turdus viscivorus.
Aëdon Luscinia.
Monachus Atricapillus.
Parus major.
Sitta cæsia.
Certhia brachydactyla.
Oriolus Galbula.
Lanius Collurio.
Hirundo rustica.
Chelidon urbica.
Cypselus Apus.
Caprimulgus europæus.
Picus major.
Gecinus viridis.
Iynx Torquilla.
Cuculus canorus.
Upupa Epops.
Strix flammea.
Syrnium Aluco.
Athene Noctua.
Scops Giu.
Buteo vulgaris.
Cerchneis Tinnunculus.
Accipiter Nisus.
Columba Palumbus.
Turtur tenera.
Starna Perdix.
Coturnix communis.

Milano, distretto Medio Milanese: Monza, Barlassina, Saronno, Rho (Magretti Giuseppe):

Il distretto nel quale pratico le mie caccie ed osservazioni ornitologiche, giace nel medio milanese cioè a circa 10 chilometri al N. di Milano. Confina ad E. con Monza e

Digitized by Google

Desio e colle prime appendici briantee di Seregno e Carate; al N. e N. O. con Barlassina e Saronno, all'O. con Busto-Arsizio, a S. con Legnago, Nerviano e Rho. È una plaga a perfetta pianura, in gran parte coltivata, pochi essendo oramai i boschi lasciativi a ricordo dei tempi andati. Il terreno è molto frazionato per il sistema di colonìa e quindi coltivato con molta solerzia e cura. Questa plaga comprende tuttavia ancora, e specialmente nei dintorni di Saronno, Barlassina, Osate e Garbagnate, le così dette *gruane* o *brughiere* o geologicamente parlando, la regione post-glaciale denominata del *ferretto* o delle *argille rosse*. Anche qui alla brughiera estesa e nuda ove alcuni anni indietro non cresceva che l'Erica, si andarono sostituendo a poco a poco molte piantagioni di *Pinus sylvestris* che vi crescono in breve tempo, queste pure frastagliate da piccoli tratti dissodati ove vien praticata la coltivazione a cereali.

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Milano, distretto Medio Milanese: Monza, Barlassina, Saronno, Rho; con indicazioni di frequenza, ecc.

Chrysomitris Spinus. Di passo in aprile e settembre; raro.

Cannabina Linota. Di passo nella prima metà di aprile ed ottobre; raro.

Pyrrhula europæa. Passa nella seconda metà di novembre; scarso.

Loxia Curvirostra. Passa più o meno frequente nella prima metà di agosto.

Miliaria Projer. Passa, non sempre abbondante, nella seconda metà di novembre.

Emberiza Hortulana. Passa abbondante nella prima metà di agosto.

Emberiza Schœniclus. Scarso, passa nella prima metà di aprile ed in ottobre.

Digitized by Google

Alauda arvensis. Passa più o meno frequente nella prima metà di novembre.

Anthus pratensis. Più o meno abbondante di passo in aprile ed ottobre.

Anthus Spipoletta. Più o meno frequente di passo in aprile ed ottobre.

Anthus trivialis. Di passo più o meno abbondante nella prima metà di settembre.

Saxicola Oenanthe. Frequente di passo nella prima metà di aprile e settembre.

Turdus pilaris. Di passo più o meno abbondante nella seconda metà di marzo e novembre.

Turdus iliacus. Più o meno frequente di passaggio in aprile ed ottobre.

Turdus musicus. Più o meno abbondante di passaggio in aprile ed ottobre.

Ruticilla Phœnicurus. Ora più or meno frequente di passo nella prima metà di aprile e settembre.

Anas Boscas. Non frequente di passo nella prima metà di febbraio ed ottobre.

Spatula clypeata. Non abbondante di passo nella prima metà di aprile.

Dafila acuta. Non frequente di passo nella prima metà di febb.

Mareca Penelope. Non abbondante di passo nella seconda metà di marzo.

Nettion Crecca. Frequente di passo nella seconda metà di marzo.

Querquedula Circia. Abbastanza frequente di passo in marzo e settembre.

Fulix ferina. Non molto frequente di passo nella seconda metà di marzo.

Columba livia. Abbondante di passo nella prima metà di marzo ed ottobre.

Rallus aquaticus. Non abbondante di passo nella prima metà di aprile ed ottobre.

Ortygometra Porzana. Non abbondante di passo nella prima metà di febbraio e settembre.

Digitized by Google

Crex pratensis. Di passo non abbondante in aprile e settemb.
Fulica atra. Non abbondante di passo in marzo e settemb.
Œdicnemus scolopax. Non frequente di passo nella prima metà di marzo ed ottobre.
Charadrius Pluvialis. Ora raro assai di passaggio in marzo e settembre.
Vanellus Capella. Frequente di passo in marzo e settembre.
Machetes Pugnax. Ora raro, di passo in marzo e settembre.
Totanus Ochropus. Poco frequente di passo in mar. e settemb.
Totanus fuscus. Non comune, di passo in marzo e settemb.
Scolopax Rusticula. Talvolta frequente, di passo nella prima metà di marzo ed ottobre.
Gallinago major. Raro, di passo in marzo, aprile e settemb.
Gallinago cælestis. Talvolta frequente, di passo in marzo, aprile e settembre.
Gallinago Gallinula. Talvolta frequente, di passo in marzo, aprile e settembre.

Cremona (Ferragni Odoardo).

La provincia di Cremona situata si può dire al mezzogiorno della Lombardia, è bagnata da fiumi importantissimi, che limitano il suo territorio da due lati: così l'Adda ne contermina la parte occidentale e scende a mescolarsi col Po, il quale segue tutto il suo lato meridionale sino al di là di Casalmaggiore; mentre ad oriente l'Oglio segna per lunghi tratti il nostro confine risalendo sino oltre Soncino ove la parte alta della nostra provincia si unisce col finitimo territorio di Bergamo, e quivi ancora accoglie nel suo grembo le acque del Serio, che scendono a confondersi con quelle dell' Adda poco al disopra di Gombito.

Il terreno vi è ovunque piano e atto alla coltivazione dei migliori cereali, se ne togli la zona prossima ai fiumi che mostrasi coperta di boschi e alquanto accidentata a motivo delle gravi alluvioni succedutevi allorquando nessuna diga poneva ritegno allo irrompere delle fiumane.

Digitized by Google

Quivi s' incontrano terreni elevati, aridi e ghiaiosi e conseguenti terre basse e fangose che già furono letto di correnti disalveate. Così presso il Serio i *mosi* occupanti vastissimo spazio, lungo l' Adda le *gerre* volgarmente dette *mortazza* e le propinque vastissime *basse* che molto s' internano; lungo il Po qua e là stagni e gore (Po morto di Brancare, Lancone della Gussola ecc.) che pure s' incontrano tratto tratto lungo l' Oglio (Oglio morto ecc.). Però questi luoghi furono poco alla volta in gran parte guadagnati all' agricoltura e convertiti in fertili risaie, in boschi cedui, in vigneti ecc. e così con assidua vicenda il nostro territorio in breve volgere di anni diverrà un immenso piano coltivato, ove una fitta rete di canali e di acque porteranno ovunque la vegetazione e la ricchezza. Il clima vi è piuttosto vario; nell' estate non di rado il sole riarde la terra con raggi infuocati proprii all' Italia meridionale e talvolta nell' inverno il termometro scende notevolmente sotto il zero gelando gli stagni ed anco le acque correnti.

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nella provincia di Cremona, con indicazioni di frequenza, ecc. [1]

Corvus Corone. Non comune, invernale.

Corvus Cornix. Piuttosto frequente e sedentaria.

Corvus frugilegus. Abbondante dall' ottobre al marzo; non nidifica in provincia.

Lycos Monedula. Accidentale nell' inverno.

Nucifraga Caryocatactes. Accidentale.

Pica rustica. Comune e stazionaria.

Garrulus glandarius. Comune e stazionaria; molte giungono nell' autunno.

[1] Queste notizie sono tolte dall' opera pregievole pubblicata dal signor O. Ferragni, intitolata *Avifauna Cremonese*, Cremona, 1885, e dai *Supplementi* successivi.

Digitized by Google

Pyrrhocorax alpinus. Accidentale.

Sturnus vulgaris. Comune e nidificante, pochi rimangono a a svernare.

Pastor roseus. Avuto il 25 agosto 1881 e nell' ottobre 1884.

Fringilla cœlebs. Comune, stazionario e di copioso passaggio.

Fringilla Montifringilla. Invernale, non comune.

Petronia stulta. Rara, invernale.

Passer montanus. Abbondante e stazionaria.

Passer Italiæ. Frequente e stazionaria.

Coccothraustes vulgaris. Comune e stazionario.

Ligurinus Chloris. Abbondante, pochi rimangono a svernare.

Chrysomitris Spinus. Di passaggio irregolare.

Carduelis elegans. Abbondante e stazionario.

Serinus hortulanus. Di scarso passaggio in ottobre e novembre soltanto.

Cannabina Linota. Puramente invernale.

Ægiothus Linarius. Avuto nell'ottobre 1881 un solo esemplare.

Pyrrhula europæa. Invernale, non comune.

Loxia Curvirostra. Avventizio.

Miliaria Projer. Stazionario, ma più abbondante nell'inverno.

Emberiza Citrinella. Stazionario ma più abbondante nell' inverno.

Emberiza Cirlus. Invernale, non comune.

Emberiza Hortulana. Estivo, nidificante in abbondanza.

Emberiza Cia. Di rara comparsa.

Emberiza Schœniclus. Abbondante tra ottobre e aprile.

Emberiza pyrrhuloïdes. Di scarso passaggio.

Calcarius lapponicus. Accidentale.

Calcarius nivalis. Raro assai.

Calandrella brachydactyla. Avventizia.

Alauda arborea. Sedentaria e abbondante alle epoche del passo; nidifica al piano.

Alauda arvensis. Abbondante, stazionaria e di passo.

Galerita cristata. Stazionaria, ma divenuta scarsa.

Agrodroma campestris. Scarso di passo in autunno.

Anthus pratensis. Abbondante tra settembre e aprile.

Digitized by Google

Anthus cervinus. Scarsa, avuta in ottobre 1882, di passo autunnale.

Anthus trivialis. Di passaggio in aprile e autunno.

Anthus Spipoletta. Invernale, non comune.

Budytes flavus. Di scarso passaggio in primavera, più abbondante nell' autunno.

Budytes cinereocapillus. Estiva e nidificante in maggiore o minore abbondanza; giunge in aprile, parte tra il settembre e la prima metà del novembre.

Motacilla alba. Comune e sedentaria, di passo abbondante.

Calobates melanope. Invernale, non abbondante.

Saxicola Oenanthe. Di scarso passo in primavera, di passo abbondante in autunno.

Merula nigra. Sedentario e di passo abbondante.

Merula torquata. Avventizio.

Turdus pilaris. Invernale, non sempre abbondante.

Turdus iliacus. Invernale e di scarso doppio passo.

Turdus musicus. Invernale e di doppio passaggio.

Turdus viscivorus. Sedentaria e di passo.

Aëdon Luscinia. Estivo e abbondante.

Erithacus Rubecula. Invernale ed abbondante.

Cyanecula Wolfi. Raro, di doppio passaggio.

Ruticilla Phœnicurus. Estivo e comune, nidifica in abbondanza al piano.

Ruticilla titys. Capita in autunno, ma è raro.

Pratincola Rubicola. Sedentario, più comune d' estate.

Pratincola Rubetra. Scarso di doppio passaggio.

Sylvia nisoria. Estiva, assai comune e nidificante.

Sylvia orphæa. Avventizia.

Sylvia cinerea. Estiva e comunissima.

Sylvia Curruca. Avventizia nell' autunno.

Sylvia subalpina. Rara e dubbiosa.

Sylvia nana. Accidentale.

Monachus Atricapillus. Comune ed estiva.

Monachus hortensis. Estivo e non comune.

Phylloscopus sibilator. Comune, di doppio passo e molto probabilmente nidificante.

Digitized by Google

Phylloscopus Trochilus. Raro, di passo soltanto.
Phylloscopus Bonellii. Estivo, ma non comune.
Phylloscopus rufus. Invernale, forse anche sedentario.
Hypolais icterina. Di passaggio e non comune.
Hypolais polyglotta. Estivo, ma non abbondante.
Acrocephalus palustris. Estiva, nidificante, ma rara.
Acrocephalus streperus. Estiva, ma scarsa.
Acrocephalus arundinaceus. Estivo comunissimo.
Calamodus schœnobænus. Estivo e di passo.
Calamodus aquaticus. Di doppio passaggio, forse nidificante.
Locustella nævia. Raro; ne uccisi uno il 23 settembre 1883 a Cava Tigozzi.
Cisticola cursitans. Dubbioso.
Troglodytes parvulus. Invernale, anco nidificante.
Cinclus aquaticus. Accidentale.
Accentor collaris. Avventizio.
Accentor modularis. Invernale e rarissima.
Regulus cristatus. Invernale e comune.
Regulus ignicapillus. Invernale, meno comune.
Ægithalus pendulinus. Comune da marzo ad ottobre.
Acredula caudata. Rara, invernale.
Acredula rosea. Frequente nell' autunno ed inverno.
Acredula Irbyi. Stazionaria, più comune durante il passo.
Parus major. Comune e sedentaria, anche di passo.
Parus ater. Invernale e rara.
Cyanistes cæruleus. Comune e sedentaria, anche di passo.
Pœcile palustris. Comune e stazionaria.
Sitta cæsia. Stazionario, più abbondante d' estate.
Certhia brachydactyla. Sedentario.
Tichodroma muraria. Invernale, assai raro.
Oriolus Galbula. Estivo e comune.
Lanius Excubitor. Non rara da ottobre a marzo.
Lanius minor. Comune ed estiva.
Lanius Collurio. Comune ed estiva.
Lanius auriculatus. Di passo, pochi nidificano.
Muscicapa Atricapilla. Di passaggio regolare in aprile e maggio, non osservato al ripasso.

Digitized by Google

Butalis Grisola. Estivo e comune.
Hirundo rustica. Estiva e abbondante.
Chelidon urbica. Estivo e abbondante.
Clivicola riparia. Estivo e abbondante.
Cypselus Apus. Estivo e abbondante.
Cypselus Melba. Avventizio in seguito a burrasche.
Caprimulgus europæus. Estivo e comunissimo.
Picus major. Stazionario e comune.
Picus minor. Di scarso passaggio.
Gecinus viridis. Comune e sedentario.
Iynx Torquilla. Estivo ed abbondante.
Cuculus canorus. Estivo e comune.
Alcedo Ispida. Sedentario e comune.
Coracias Garrula. Accidentale, una venne colta ad Alfiano nel settembre 1884.
Merops Apiaster. Di passaggio, era una volta più comune.
Upupa Epops. Estiva e piuttosto comune, giunge in marzo e talvolta in febbr., parte e ripassa in agosto e settem.
Strix flammea. Comune e sedentario.
Syrnium Aluco. Autunnale, forse nidificante.
Asio Otus. Puramente invernale.
Asio accipitrinus. Di passo regolare in autunno, sett. a nov.
Athene Noctua. Sedentaria; alcuni emigrano.
Scops Giu. Puramente estivo.
Bubo maximus. Di rara comparsa nell' autunno.
Circus æruginosus. Accidentale in primavera.
Circus cyaneus. Di scarso passaggio in aprile e novembre.
Pandion Haliaëtus. Di passaggio regolare in marzo ed aprile, più di raro nel settembre.
Haliaëtus Albicilla. Accidentale.
Aquila Chrysaëtus. Di rara comparsa.
Aquila clanga. Accidentale.
Buteo vulgaris. Comune e stazionaria, ma più abbondante nell' autunno ed inverno.
Milvus migrans. Di scarso, ma regolare passaggio nel maggio; tre veduti a Spinadesco il 6 maggio 1883, parecchi nel maggio 1884 e 1885.

Digitized by Google

Falco Peregrinus. Accidentale nell' autunno.

Hypotriorchis Subbuteo. Di scarso passaggio in marzo ed aprile e nel settembre e ottobre.

Æsalon regulus. Di scarso passaggio.

Cerchneis Tinnunculus. Comune e sedentario, diventa erratico nell' inverno.

Cerchneis Naumanni. Di scarso passaggio, forse nidificante giacchè fu veduto lungo il Po il 15 luglio 1883.

Cerchneis vespertinus. Di passo regolare in primavera.

Accipiter Nisus. Comune di passo e nell' inverno.

Pelecanus Onocrotalus. Accidentale, nell' agosto 1877 un branco di 32 si posò su di un' isoletta all' imboccatura dell' Adda; tre vennero uccisi.

Phalacrocorax Carbo. Di rara comparsa.

Ardea cinerea. Comune dall' agosto al maggio.

Ardea purpurea. Raro, giunge in aprile e maggio e forse rimane a nidificare.

Egretta alba. Di casuale comparsa.

Egretta Garzetta. Di casuale comparsa.

Ardeola ralloïdes. Di raro passaggio in aprile e maggio.

Ardetta minuta. Estivo e assai comune.

Botaurus stellaris. Invernale, e di doppio passo.

Nycticorax griseus. Di passo non abbondante, ma regolare dal marzo al giugno, ed in autunno, seconda metà di luglio al settembre.

Ciconia alba. Accidentale in marzo ed aprile.

Ciconia nigra. Rara, osservata in agosto e settembre 1882 e 1883; ne ebbi una il 14 agosto ed un' altra il 1° settembre 1882, entrambe uccise sul Po.

Platalea Leucorodia. Accidentale.

Plegadis Falcinellus. Accidentale nel maggio.

Cygnus Olor. Accidentale nell' inverno.

Cygnus musicus. Raro nei rigidi inverni; l' ultimo preso fu un maschio adulto, ucciso sull'Oglio nel febbraio 1880.

Anser cinereus. Rara nell' inverno.

Anser segetum. Di passo regolare in novembre e dicembre, e nel marzo ed aprile; pochi rimangono a svernare.

Digitized by Google

Anser albifrons. Accidentale nell' inverno.

Anser erythropus. Accidentale nell' inverno.

Tadorna cornuta. Accidentale.

Anas Boscas. Sedentaria, ma specialmente abbondante durante l' inverno ed alle epoche del passo in ottobre e novembre e nel marzo.

Chaulelasmus streperus. Rara, invernale.

Spatula clypeata. Piuttosto comune nell' inverno ed alle due epoche del passo; quello primaverile ha luogo dal marzo al maggio.

Dafila acuta. Invernale e comune, ma abbonda di più durante il passo primaverile.

Mareca Penelope. Invernale, ma più copioso alle epoche del passo, in novembre e marzo.

Nettion Crecca. Abbondantissima dall' autunno alla primavera, e in scarso numero nidificante.

Querquedula Circia. Abbondante, ma soltanto durante il passo primaverile in marzo ed aprile.

Fuligula rufina. Avventizio nell' inverno.

Fulix ferina. Invernale, ma specialmente di passaggio in ottobre e novembre, e febbraio e marzo.

Fulix Fuligula. Di doppio passaggio, qualche anno abbondante nel marzo.

Fulix Nyroca. Rara nell' autunno e nell' inverno, ma talora di passaggio copioso in primavera.

Bucephala Clangula. Raro nell' inverno.

Œdemia nigra. Accidentale nell' autunno.

Mergus Merganser. Invernale; ogni anno càpitano sul Po, ma sono quasi sempre giovani.

Mergus Serrator. Raro di doppio passaggio, nel tardo autunno e nell' aprile.

Mergellus Albellus. Invernale, sono scarsi gli adulti.

Columba Palumbus. Di passaggio in marzo ed aprile ed in settembre ed ottobre, poche coppie rimangono a nidificare.

Columba Oenas. Invernale, giunge in settembre e ottobre e parte o ripassa nel marzo.

Digitized by Google

Columba livia. Dubbiosamente selvatici.

Turtur tenera. Comune dalla metà d' aprile a quella di sett.

Starna Perdix. Abbondante e sedentaria.

Coturnix communis. Abbondante dall' aprile al novembre, poche rimangono a svernare.

Rallus aquaticus. Stazionaria e nidificante.

Ortygometra Porzana. Estivo e di copioso passaggio in autunno e primavera, forse anche sedentario.

Ortygometra Bailloni. Estiva, ma non abbondante.

Ortygometra parva. Poco comune di doppio passo, forse nidificante.

Crex pratensis. Comune alle due epoche del passo, aprile-maggio, settembre-ottobre; qualche coppia rimane a nidificare.

Gallinula chloropus. Stazionaria, più scarsa nell' inverno.

Fulica atra. Stazionaria in scarso numero e di doppio passaggio; marzo ed aprile, e dal settembre al novembre.

Grus communis. Di passaggio, ma di rado sosta.

Otis Tarda. Di casuale comparsa.

Œdionemus scolopax. Comune da marzo a novembre; non rimane a svernare.

Charadrius Pluvialis. Di doppio passo pochi svernano.

Squatarola helvetica. Di scarso passaggio; ne vidi uno ancora in abito nuziale il 20 agosto 1884, sul Po.

Ægialitis cantiana. Avventizio, ne ebbi uno il 10 marzo 1885.

Ægialitis curonica. Estivo e comunissimo; giunge verso il 20 marzo, nidifica e parte tra il settembre e l'ottobre.

Ægialitis Hiaticula. Di scarso passaggio dal marzo al maggio e anche al giugno; più abbondante nel settembre.

Vanellus Capella. Invernale e abbondante; arriva dopo la metà di ottobre e parte in marzo ed aprile. Forse qualche coppia rimane a nidificare giacchè ne uccisi uno giovanissimo, che appena volava, il 7 luglio 1880, sul Po.

Strepsilas Interpres. Veduto il 10 maggio 1885.

Hæmatopus Ostralegus. Di rara comparsa in aprile.

Recurvirostra Avocetta. Di rara comparsa.

Digitized by Google

Himantopus candidus. Di casuale comparsa.

Phalaropus hyperboreus. Accidentale.

Limicola platyrhyncha. Di passaggio scarso ed irregolare; avuto nel settembre 1883 e nell'agosto e settembre 1884.

Pelidna subarquata. Di passaggio regolare dalla fine di aprile al principio di giugno; non osservato in autunno.

Pelidna alpina. Comune di doppio passaggio, in marzo e aprile ed in settembre ed ottobre, allora meno abbondante.

Actodromas minuta. Di passo regolare in aprile, maggio e oltre la metà di giugno e dall' agosto all' ottobre.

Actodromas Temmincki. Assai più raro della precedente, si vede nel maggio e nel settembre.

Calidris Arenaria. Avventizia, avuta sul Po l'11 ottobre 1881.

Machetes Pugnax. Di passaggio abbondante in marzo ed aprile; alcuni veduti il 4 giugno 1884, forse sono giovani che rimangono senza però riprodursi. Ripassa in minor numero in agosto e settembre.

Tringoïdes Hypoleucus. Di doppio passaggio, dal marzo al maggio e dal luglio all' ottobre; qualche coppia rimane a nidificare.

Totanus Ochropus. Sedentario, ma più abbondante alle epoche del passo; credo con certezza che qualcuno si riproduca da noi.

Totanus Glareola. Passa in aprile e maggio e ripassa dal luglio al settembre.

Totanus stagnatilis. Piuttosto raro, osservato nel maggio e nel giugno.

Totanus Calidris. Di doppio passo ed invernale.

Totanus fuscus. Piuttosto rara di doppio passaggio.

Totanus nebularius. Comunissima durante il passo in aprile-maggio e agosto-settembre; è anche sedentaria, ma in scarso numero.

Limosa melanura. Di scarso passo in marzo ed aprile.

Limosa rufa. Avventizia.

Scolopax Rusticula. Di doppio passaggio, dalla metà di ottobre alla metà di novembre e nel marzo. Qualcuna

Digitized by Google

rimane l' inverno, e avrebbe anco nidificato, ciò avvenne lungo il Po nei boschi di Roncaglia nel maggio 1879.

Gallinago major. Di doppio passaggio non abbondante.

Gallinago cælestis. Giunge alla fine di luglio e sino al novembre, pochi rimangono l'inverno; il ripasso ha luogo dal febbraio all' aprile.

Gallinago Gallinula. Arriva in settembre, sverna e ripassa o parte in marzo ed aprile.

Numenius Arquata. Quasi in ogni stagione se ne vede, ma specialmente dal marzo al maggio e dall' agosto al novembre.

Numenius Phæopus. Raro, veduto il 26 aprile 1885.

Glareola Pratincola. Avventizia.

Sterna fluviatilis. Giunge verso il 20 marzo, nidifica in abbondanza sulle isolette del Po, e parte in settembre.

Sternula minuta. Arriva in maggio, nidifica in abbondanza sulle isolette del Po, e parte in settembre.

Hydrochelidon hybrida. Accidentale, avuto il 18 maggio 1884.

Hydrochelidon leucoptera. Giunge in maggio e non sempre è abbondante, non si ferma.

Hydrochelidon nigra. Estivo, di passo abbondante in aprile e maggio, e dall' agosto all' ottobre; ha nidificato con certezza.

Chroocephalus minutus. Accidentale.

Chroocephalus ridibundus. Invernale e di passo copioso in marzo ed aprile ed in ottobre e novembre.

Larus canus. Avventizia.

Larus cachinnans. Accidentale nel dicembre.

Stercorarius pomatorhinus. Avventizio; uno veduto nel febbraio, uno ucciso il 4 ottobre 1880.

Stercorarius parasiticus. Accidentale, avuto un giovane ucciso sul Po il 23 settembre 1882.

Colymbus arcticus. Rara nel tardo autunno od inverno.

Colymbus septentrionalis. Di passaggio irregolare nell' autunno ed inverno.

Podiceps cristatus. Raro da settembre a maggio.

Digitized by Google

Podiceps griseigena. Accidentale, uno venne ucciso sul Po il 7 dicembre 1886; era una femmina.

Podiceps nigricollis. Sedentario, ma non abbondante; pare nidifichi in provincia.

Podiceps fluviatilis. Stazionario e con quasi certezza nidificante.

Mantova (Paglia prof. Enrico):

Il campo d' osservazione scelto di preferenza per queste note, è la valle dal Mincio, nei dintorni della città di Mantova. Essa è formata dall' avvallamento, dominato da alte terrazze alluvionali, per cui serpeggia il fiume Mincio nella direzione generale da ovest ad est, e nel centro del quale sopra varie isolette sorge la città.

L' acqua del Mincio venne fino dal 1198 artificialmente sostenuta da dighe per modo da formare intorno alla città vasti specchi denominati: Lago superiore a ponente, Lago di mezzo a settentrione, e Lago inferiore a levante. A mezzodì si allarga la valle di Paiolo, pure artificialmente inondabile. Le sponde dei laghi suddetti sono largamente coperte da vegetazioni palustri e da boschi, sicuro ricetto di tante specie di uccelli e convegno dei cacciatori. Vasti canneti e giuncaie galleggianti orlano pure gli specchi d' acqua e si alternano ai paduli melmosi e ai praticelli torbosi ombrati da ontani e da salici. Le alte rive delle terrazze si distendono in campagne fruttuose, quali a suolo ghiaioso o calcare, aride ma ben lavorate, e quali in praterie irrigatorie e sconfinate risaie.

I confini di tale plaga possono segnarsi presso a poco: a settentrione col canale d' irrigazione derivato dalla sinistra del Mincio a Pozzuolo, detto la Molinella; a levante dal corso inferiore del fiumicello Derbasco; a mezzodì da una linea che va dalle valli della Virgiliana a quella dell' Osone verso Montanara; e ad occidente dalla sponda elevata alla destra del Mincio superiore. Questa zona di terreno

Digitized by Google

circostante alla città, misura circa 200 chilom. quadrati di superficie; 20 dei quali circa coperti da acque stagnanti e da paludi.

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nella provincia di Mantova, con indicazioni di frequenza, ecc.[1]

Corvus Corone. Comune d' inverno.
Corvus Cornix. Comune.
Corvus frugilegus. Invernale.
Lycos Monedula. Poco comune.
Nucifraga Caryocatactes. Non rara.
Pica rustica. Comune.
Garrulus glandarius. Comune.
Sturnus vulgaris. Comune.
Pastor roseus. Qualche anno abbonda insieme alle cavallette a cui dà la caccia; nel 1860 comparve numeroso alle Grazie d' estate, ritornò nell' anno seguente poi più, fino al 1875 in cui sostò vari mesi a Villafranca.
Fringilla cœlebs. Comune, pochi svernano.
Fringilla Montifringilla. Frequente.
Montifringilla nivalis. Raro, preso a Castelgoffredo.
Passer montanus. Frequente.
Passer Italiæ. Comune, spesso vedonsi casi d' isabellismo, più rari gli albinismi.
Coccothraustes vulgaris. Comunissimo.
Ligurinus Chloris. Comunissimo.
Chrysomitris Spinus. Frequente d' autunno.
Carduelis elegans. Comunissimo.
Serinus hortulanus. Comune.
Cannabina Linota. Frequente.

---

[1] Il prof. Enrico Paglia in un suo lavoro intitolato *Saggio di Studi Naturali sul territorio Mantovano*, Mantova, 1877; pubblicava questo elenco, al quale ha ora fatto non poche rettifiche ed aggiunte.

Digitized by Google

Ægiothus rufescens. Raro.
Pyrrhula europæa. Poco frequente, rimane d'inverno.
Loxia Curvirostra. Poco comune.
Miliaria Projer. Comune.
Emberiza Citrinella. Frequente.
Emberiza Cirlus. Poco frequente.
Emberiza Hortulana. Frequente d'estate.
Emberiza Schœniclus. Frequente.
Calcarius nivalis. Non comune.
Calandrella brachydactyla. Raro, preso a Medole.
Alauda arborea. Comune.
Alauda arvensis. Frequente.
Galerita cristata. Comune.
Agrodroma campestris. Comune.
Corydalla Richardi. Accidentale; un esemplare si conserva nella collezione del conte d'Arco.
Anthus pratensis. Comune.
Anthus trivialis. Comune.
Anthus Spipoletta. Comune.
Budytes flavus. Comune.
Motacilla alba. Comunissima.
Calobates melanope. Comune.
Saxicola Oenanthe. Non comune.
Monticola Cyanus. Piuttosto rara.
Merula nigra. Comunissimo anche d'inverno.
Merula torquata. Non frequente.
Turdus pilaris. Comune.
Turdus iliacus. Comune.
Turdus musicus. Invernale e di passaggio.
Turdus viscivorus. Comune.
Aëdon Luscinia. Comunissimo.
Erithacus Rubecula. Comune.
Cyanecula Wolfi. Raro.
Ruticilla Phœnicurus. Comune.
Pratincola Rubicola. Comune.
Sylvia nisoria. Rara, presa a Castelgoffredo.
Sylvia orphæa. Non comune.

Digitized by Google

Sylvia cinerea. Poco comune.
Sylvia Curruca. Frequente.
Monachus Atricapillus. Comune, estiva.
Monachus hortensis. Comune.
Phylloscopus Trochilus. Comune.
Hypolais icterina. Poco comune.
Acrocephalus streperus. Comune.
Acrocephalus arundinaceus. Comunissimo, estivo.
Calamodus schœnobænus. Arriva in aprile e parte in ottobre.
Calamodus aquaticus. Specie estiva.
Cettia Cettii. Non comune, estivo.
Cisticola cursitans. Giunge in aprile, parte in settembre.
Troglodytes parvulus. Frequente d' inverno.
Cinclus aquaticus. Comune sul lago di Mantova.
Accentor collaris. Raro, preso a Castelgoffredo.
Regulus cristatus. Comune.
Regulus ignicapillus. Frequente.
Ægithalus pendulinus. Poco frequente.
Acredula rosea. Comune.
Panurus biarmicus. Comune nei canneti ove nidifica.
Parus major. Comunissima.
Cyanistes cæruleus. Comune.
Sitta cæsia. Comune.
Certhia brachydactyla. Comune, annida ne' fessi dei muri.
Tichodroma muraria. Raro, preso a Medole.
Oriolus Galbula. Estivo e comune.
Lanius Excubitor. Comune.
Lanius minor. Comune.
Lanius Collurio. Comune.
Lanius auriculatus. Piuttosto rara.
Muscicapa collaris. Poco comune.
Butalis Grisola. Piuttosto raro.
Hirundo rustica. Comune dal marzo all' ottobre.
Chelidon urbica. Comune dal marzo all' ottobre.
Clivicola riparia. Abbondante nella buona stagione, nidifica negli argini e nelle rive.
Cotile rupestris. Rara, presa a Castelgoffredo.

Digitized by Google

Cypselus Apus. Comune, giunge dopo e parte prima delle Rondini.
Caprimulgus europæus. Frequente, estivo.
Picus major. Comune.
Picus minor. Comune.
Gecinus viridis. Comune.
Iynx Torquilla. Comune.
Cuculus canorus. Comune tra aprile ed ottobre.
Alcedo Ispida. Frequente e stazionario.
Coracias Garrula. Rara, presa a Bozzolo.
Merops Apiaster. Raro.
Upupa Epops. Comune, giunge in aprile e parte in ottobre.
Strix flammea. Comune.
Syrnium Aluco. Comune.
Asio Otus. Poco comune.
Asio accipitrinus. Piuttosto raro.
Athene Noctua. Comunissima.
Scops Giu. Comune.
Bubo maximus. Raro, preso presso Campione.
Circus æruginosus. Comune.
Circus cyaneus. Accidentale.
Pandion Haliaëtus. Poco comune, preso nel 1861 a Pietole.
Haliaëtus Albicilla. Accidentale.
Aquila Chrysaëtus. Avventizia, presa alla Virgiliana nel 1817.
Aquila clanga. Rara, presa vicino a Mantova.
Archibuteo lagopus. Rara, presa a Castelgoffredo.
Buteo vulgaris. Comunissima.
Milvus Ictinus. Di scarso passaggio in primavera.
Milvus migrans. Assai raro, preso sul lago di Mantova.
Falco Peregrinus. Piuttosto raro.
Hypotriorchis Subbuteo. Nidifica in provincia.
Æsalon regulus. Raro, preso a Castelgoffredo.
Cerchneis Tinnunculus. Comune e sedentario.
Cerchneis vespertinus. Rara, presa a Castelgoffredo.
Accipiter Nisus. Comune.
Gyps fulvus. Accidentale, preso a Buscoldo nel 1813 e a Formigosa nel 1885.

Digitized by Google

Pelecanus Onocrotalus. Accidentale.

Phalacrocorax Carbo. Accidentale, preso a Fellonica e sul lago di Mantova nel 1861.

Microcarbo pygmæus. Accidentale nel 1843.

Ardea cinerea. Comune, nidifica nei canneti del lago superiore, di giorno va in cerca di cibo nelle risaie.

Ardea purpurea. Comune sul lago.

Egretta alba. Rara.

Egretta Garzetta. Piuttosto rara, presa alla Rafaina; non nidifica da noi.

Ardeola ralloïdes. Comune, si trattiene poco.

Ardetta minuta. Comune, estivo e nidificante tra le canne.

Botaurus stellaris. Comunissimo di primavera e d'autunno, scarso nell'inverno.

Nycticorax griseus. Non molto comune.

Ciconia nigra. Rara, presa a Castellaro.

Plegadis Falcinellus. Raro.

Cygnus musicus. Capita casualmente d'inverno sul lago di Mantova, se ne videro in Paiolo nel 1859.

Anser cinereus. Di passaggio nell'inverno.

Anser segetum. Non comune.

Tadorna cornuta. Rara.

Anas Boscas. Comunissimo; giunge in grandi stuoli al cominciare dell'inverno e si trattiene, alcuni partono in primavera, altri rimangono a nidificare.

Chaulelasmus streperus. Comune; vive solitaria e nidifica deponendo da 8 a 9 uova.

Spatula clypeata. Comune, ma non abbondante alle epoche del passo.

Dafila acuta. Comune.

Mareca Penelope. Comune, ma di solo passo.

Nettion Crecca. Comunissima ai due passi, non è accertata la sua nidificazione in provincia.

Querquedula Circia. Comune, ma soltanto di passo in primavera.

Fuligula rufina. Raro, vive solitario e talvolta si ferma da noi l'estate.

Digitized by Google

Fulix ferina. Invernale e comune.
Fulix Marila. Piuttosto comune.
Fulix Fuligula. Comune alle epoche del passo.
Fulix Nyroca. Comune, qualcuna rimane a nidificare.
Bucephala Clangula. Comune, più rari gli adulti.
Œdemia fusca. Raro.
Erismatura leucocephala. Raro.
Mergus Merganser. Poco comune.
Mergus Serrator. Comune, invernale.
Mergellus Albellus. Comune, invernale, ma rimane poco.
Columba Palumbus. Estivo e nidificante, non sverna.
Columba Oenas. Sedentaria e di doppio passaggio.
Turtur tenera. Estiva e comune.
Syrrhaptes paradoxus. Accidentale nel 1876.
Starna Perdix. Comune.
Coturnix communis. Comunissima.
Rallus aquaticus. Comune e nidificante.
Ortygometra Porzana. Abbondante alle due epoche del passo, non rimane a nidificare.
Ortygometra Bailloni. Comune alle due epoche del passo.
Ortygometra parva. Poco comune in aprile.
Crex pratensis. Comune dal settembre al novembre.
Gallinula chloropus. Sedentaria e comune; nidifica.
Fulica atra. Abbondante e stazionaria, nidifica.
Grus communis. Rara.
Otis tarda. Rara, presa a Cizzolo e a Castellaro.
Otis Tetrax. Rara, presa a Castellaro.
Œdicnemus scolopax. Raro.
Charadrius Pluvialis. Comune di primavera.
Squatarola helvetica. Comune.
Eudromias Morinellus. Non comune.
Ægialitis curonica. Raro di primavera.
Ægialitis Hiaticula. Poco comune.
Vanellus Capella. Comune.
Hæmatopus Ostralegus. Raro, preso ad Ostiglia.
Recurvirostra Avocetta. Rara, presa a Cizzolo.
Himantopus candidus. Raro in primavera.

Digitized by Google

Phalaropus fulicarius. Accidentale, preso a Casalmoro.
Machetes Pugnax. Frequente.
Tringoïdes Hypoleucus. Raro in primavera.
Totanus Ochropus. Comune.
Totanus stagnatilis. Comune.
Totanus Calidris. Non frequente.
Totanus nebularius. Comune.
Limosa melanura. Accidentale nell' inverno.
Scolopax Rusticula. Frequente.
Gallinago major. Di doppio passo, più raro in autunno.
Gallinago cælestis. Comune.
Gallinago Gallinula. Frequente.
Numenius Arquata. Comune.
Numenius Phæopus. Raro d' inverno.
Glareola Pratincola. Rara, presa alla Virgiliana.
Sterna fluviatilis. Comune.
Sternula minuta. Comune.
Hydrochelidon leucoptera. Non comune in primavera.
Hydrochelidon nigra. Comune.
Chroocephalus ridibundus. Comune.
Chroocephalus melanocephalus. Comune.
Larus canus. Comune.
Larus fuscus. Raro.
Larus cachinnans. Non comune, specialmente gli adulti.
Procellaria pelagica. Accidentale, preso a Viadana.
Colymbus glacialis. Rara.
Colymbus arcticus. Rarissima.
Colymbus septentrionalis. Poco comune.
Podiceps cristatus. Comune, nidifica sul lago.
Podiceps griseigena. Raro, capita d' inverno.
Podiceps nigricollis. Comune e nidificante.
Podiceps fluviatilis. Comune e nidificante.

Digitized by Google

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nella Lombardia; coi nomi volgari ed indicazioni di frequenza, ubicazione ecc. [1]

Corvus Corax, *Corbatt.* Comune (*T*), scarso (*B*), m.
Corvus Corone, *Corbatt.* Comune (*T*), scarsa (*B*), p. m.
Corvus Cornix, *Taccola.* Comune, p. m.
†**Corvus frugilegus.** Comune, p. m.
†**Lycos Monedula.** Rara.
Nucifraga Caryocatactes, *Rampanòs.* Raro, accidentale (*T*), frequente (*B*), p. c. m.
Pyrrhocorax alpinus, *Scorbattin del bech giald.* Raro (*T*), frequente (*B*), m.
Pyrrhocorax Graculus, *Sgazza marina.* Raro, accidentale.
Pica rustica, *Berta.* Comune, p. c.
Garrulus glandarius, *Gaja*, *Gasgìa.* Comunissima, p. c. m.
Sturnus vulgaris, *Stornell.* Comunissimo, p. c.
Pastor roseus, *Stornell rosa.* Accidentale in grossi branchi, p.
Fringilla cœlebs, *Franguell.* Comunissimo, p. c. m.
Fringilla Montifringilla, *Montan.* Comunissimo, p. c. m.
Montifringilla nivalis, *Franguell de la nev.* Raro, m.
Petronia stulta, *Passaron de montagna.* Rara, c.
Passer montanus, *Passeretta.* Comunissima, p. c.

---

[1] Questo elenco è frutto delle osservazioni riunite dei signori conti Ernesto Turati e Carlo Borromeo, i quali nel rispondere ai quesiti per la inchiesta ornitologica hanno compreso nel campo delle loro osservazioni l'intera Lombardia. Quando il risultato delle osservazioni dei due egregi collaboratori non è identico lo indicherò colle iniziali dei loro nomi. Le lettere *p. c. m.*, indicano: pianura, collina, montagna.

Il conte Ernesto Turati osserva che le specie segnate con croce gli furono indicate come lombarde da amici ornitologi o cacciatori, ovvero egli stesso le vide con tale provenienza conservate in Musei. Le altre tutte furono catturate dal conte Turati, oppure da lui vedute in carne.

Il conte Carlo Borromeo nota che le notizie da lui contribuite sono il frutto di quarantacinque anni di uccellagione, più specialmente le osservazioni sue si riferiscono alle provincie di Milano, Como e Sondrio.

Digitized by Google

Passer Italiæ, *Passerotto*. Comunissima, p. c.
Passer domesticus. Scarsa (*B*).
Coccothraustes vulgaris, *Frison*. Comunissimo, p. c. m.
Ligurinus Chloris, *Amorott*. Comunissimo, p. c.
Chrysomitris Spinus, *Legorin*. Comunissimo, p. c. m.
Carduelis elegans, *Ravarin*. Comunissimo, p. c.
Serinus hortulanus, *Sgarzorin*. Raro (*T*), comune (*B*), p. c.
Chloroptila Citrinella, *Verdolin*. Raro, p. c.
Cannabina Linota, *Fanett*. Comunissimo, p. c. m.
†Cannabina flavirostris, Rarissimo.
Ægiothus rufescens, *Cardinalin*. Comune.
Ægiothus Linarius, *Gegè*. Comune quando passa, p. c. m.
Pyrrhula europæa, *Gemon*. Comune, p. c. m.
Loxia Curvirostra, *Becc-in-cros*. Comunissimo quando passa, p. c.
Carpodacus erythrinus. Scarso (*B*).
Miliaria Projer, *Pravon*. Comune, p. c.
Emberiza Citrinella, *Spajarda*. Comunissimo, p. c. m.
Emberiza Cirlus, Raro.
Emberiza Cia, *Zietta*. Comune (*T*), scarso (*B*), c. m.
†Emberiza leucocephala. Rarissimo.
Emberiza rustica. Scarso (*B*).
Emberiza Hortulanus. Comunissimo, p. c. m.
Emberiza Schœniclus. Comune.
Emberiza pyrrhuloïdes. Non rara (*T*), scarsa (*B*).
†Calcarius nivalis. Rarissimo.
†Calcarius lapponicus. Rarissimo.
Melanocorypha Calandra. Rara, p.
Calandrella brachydactyla, *Calandrina*. Raro.
Alauda arvensis, *Lodola*. Comunissima, p. c. m.
Alauda arborea, *Türlo*. Comunissima, p. c. m.
Galerita cristata, *Lodola col ciuff*. Comune, p.
Agrodroma campestris, *Piossa*. Raro.
†Corydalla Richardi. Rarissimo.
Anthus pratensis, *Guzetta*. Comunissima p. c.
Anthus Spipoletta, *Gazetton*. Comunissimo, p. c.
Anthus trivialis, *Dordina*. Comunissimo, p. c.

Digitized by Google

Budytus flavus, *Ballarina*. Comunissimo, p. c.
Motacilla alba, *Ballarotta*. Comunissima, p. c.
Calobates melanope, *Boarina*. Comunissima, p. c.
Saxicola Oenanthe, *Cubianc*. Comune, c. m.
Saxicola Stapazina. Rara.
Monticola saxatilis, *Corossolon*. Comune, m.
Monticola Cyanus, *Passera solitaria*. Comune, m.
Merula nigra, *Merlo*. Comunissimo, p. c. m.
Merula torquata, *Merlo de montagna*. Comune, m.
Turdus atrigularis. Raro assai.
Turdus pilaris, *Viscarda*. Comunissima, p. c. m.
Turdus viscivorus, *Dress*. Comunissima, p. c. m.
Turdus musicus, *Dord*, *Dort*. Comunissimo, p. c. m.
Turdus iliacus, *Zif*, *Dressin*. Comunissimo, p. c. m.
Aëdon Luscinia, *Rossigneu*. Comunissimo, p. c. m.
Erithacus Rubecula, *Picett*. Comunissimo, p. c. m.
Cyanecula suecica. Raro, p. c.
Cyanecula Wolfi. Raro, p. c.
Ruticilla Phoenicurus, *Morett*. Comunissimo, p. c. m.
Ruticilla titys, *Moretton*. Comune (*T*), scarso (*B*), m.
Pratincola Rubicola, *Scimireu*, *Pizzamei*. Comune, p. c.
Pratincola Rubetra, *Miareu*, *Taragn*. Comune, m.
Sylvia orphæa, *Moneghella*. Comune (*B*), scarsa (*B*), c.
Sylvia cinerea, *Sardagna*, *Sartagnola*. Comunissima, p. c. m.
Sylvia Curruca, *Beccafig zenerin*. Rara, c.
Monachus Atricapillus, *Capnegher*. Comunissima p. c. m.
Monachus hortensis, *Beccafigh gross*. Comune, p. c.
Phylloscopus sibilator, *Tuin*. Raro, p. c.
Phylloscopus Trochilus. Comune (*T*), scarso (*B*), p. c.
Phylloscopus Bonellii. Comune (*T*), scarso (*B*), c.
Phylloscopus rufus. Comune, p. c. m.
Hypolais icterina, *Tuinott*. Comune, p. c.
Hypolais polyglotta. Comune, p. c.
†**Hypolais pallida**. Raro assai.
Acrocephalus streperus, *Pizzigacann*. Comunissima, p. c.
Acrocephalus arundinaceus, *Crécrè*. Comunissimo, p. c.
Acrocephalus palustris. Comune, p. c.

Digitized by Google

Calamodus Schœnobænus. Raro (*T*), frequente (*B*), p.
Calamodus aquaticus, *Risēreu*, *Beccafig de risera.* Comune, p.
Locustella nævia. Raro, p.
†**Cettia Cettii.** Raro, p.
Cisticola cursitans. Comune.
Troglodytes parvulus, *Reattin.* Comunissimo, p. c. m.
Cinclus aquaticus, *Merlo d' aqua.* Comune, m.
Accentor collaris, *Matellot.* Raro, m.
Accentor modularis, *Passeretta de montagna.* Comunissima, p. c. m.
Regulus cristatus, *Stelin.* Comunissimo, p. c. m.
Regulus ignicapillus, *Stelin.* Comune (*T*), scarso (*B*), p. c. m.
Ægithalus pendulinus, *Pendolin.* Raro, p.
Acredula rosea, *Pentin.* Comunissima, p. c. m.
Panurus biarmicus, *Usserin.* Raro, (*T*), frequente (*B*). p.
Parus major, *Parascioeula.* Comunissima, p. c. m.
Parus ater, *Parasciolin.* Comunissima, p. c. m.
Cyanistes cæruleus, *Moneghella.* Comune, p. c.
Pœcile palustris, *Moneghin.* Rara, c.
Lophophanes cristatus, *Parasciolin.* Rara, c.
Sitta cæsia, *Picozzin.* Comune, p. c.
Certhia brachydactyla, *Rampeghin.* Comune, p. c.
Tichodroma muraria, *Rampeghin di cepp.* Raro, m.
Oriolus Galbula, *Galbé.* Comune, p. c.
Ampelis Garrulus. Raro.
Lanius Excubitor, *Gasgetta marina*, *Gascieton.* Rara (*T*), frequente (*B*), p. c.
Lanius minor, *Gasgetta*, *Gascetta del co negher.* Comune p. c.
Lanius Collurio, *Stragazza.* Comunissima, p. c.
Lanius auriculatus, *Gasgetta rossa*, *Gascetta del co ross.* Comune, c.
Muscicapa Atricapilla, *Alett.* Comunissima (*T*), scarsa (*B*), p. c.
Muscicapa collaris, *Alett del col bianc.* Rara (*T*), frequente (*B*).
Erythrosterna parva. Accidentale.
Butalis Grisola, *Alett.* Comunissimo, p. c.
Hirundo rustica, *Rondena.* Comunissima, p. c.
Chelidon urbica, *Darden.* Comunissimo, p. c.

Digitized by Google

Clivicola riparia. Comunissimo, p. c.
Cotile rupestris. Rara (*T*), comune (*B*), m.
Cypselus Apus, *Rondon.* Comunissimo, p. c. m.
Cypselus Melba, *Rondon bianc* o *de mar.* Raro (*T*), frequente (*B*), m.
Caprimulgus europæus, *Tettavacc.* Comune, p. c.
Dryocopus martius, *Piccózz.* Raro, m.
Picus major, *Piccozz ross.* Comune, p. c.
†**Picus medius.** Raro.
Picus minor. Raro, p.
Gecinus viridis, *Pícasc verd.* Comunissimo, p. c. m.
Iynx Torquilla, *Stortacoll.* Comune, p. c.
Cuculus canorus, *Cucù.* Comune, p. c. m.
Alcedo Ispida, *Martin pescou.* Comune, p. c.
Coracias Garrula, *Gaza.* Rara.
Merops Apiaster, *Pia-vesp*, *Usel vespee.* Raro, p. c.
Upupa Epops, *Buba*, *Bubba.* Comune, p. c.
Strix flammea, *Belladonna.* Comune, p. c.
Syrnium Aluco, *Loroc.* Raro (*T*), comune (*B*), p. c. m.
Nyctala Tengmalmi. Rarissima.
Asio Otus, *Piccol dugo.* Comune, c.
Asio accipitrinus. Comune.
Athene Noctua, *Sciguetta.* Comune, p. c.
Scops Giu, *Scisceo.* Comune, p. c.
Bubo maximus, *Grandugo.* Raro (*T*), frequente (*B*), p. c. m.
Circus æruginosus, *Falchett de palud*, *Falc d' acqua.* Raro (*T*), frequente (*B*), p.
Circus cyaneus, *Falchett.* Rara.
†**Circus cineraceus.** Rara.
Circaëtus gallicus. Accidentale.
Pandion Haliaëtus. Rarissimo.
Haliaëtus Albicilla, *Aquila.* Rara.
†**Aquila clanga**, *Aquila.* Rara.
Aquila Chrysaëtus, *Aquila reale.* Rara (*T*), frequente (*B*).
Archibuteo lagopus. Accidentale.
Buteo vulgaris, *Pojana.* Comune, p. c. m.
Pernis apivorus. Raro.

Digitized by Google

Milvus Ictinus. Raro.
Milvus migrans. Raro.
Falco Peregrinus, *Falchett.* Raro (*T*), frequente (*B*).
Hypotriorchis Subbuteo. Raro (*T*), frequente (*B*).
Æsalon regulus. Raro (*T*), frequente (*B*).
Cerchneis Tinnunculus, *Falchett de campanil.* Comunissimo, p.
Cerchneis vespertinus. Raro.
Astur palumbarius. Accidentale (*T*), frequente (*B*).
Accipiter Nisus, *Pojanella.* Comune, p. c.
Gypaëtus barbatus. Raro.
Gyps fulvus. Raro.
Pelecanus Onocrotalus. Raro, accidentale.
Phalacrocorax Carbo. Raro.
Ardea cinerea, *Airon, Sgolgion.* Comune, p.
Ardea purpurea, *Sgolg.* Comune, p.
†Egretta alba. Rarissima, p.
Egretta Garzetta, *Airon bianc.* Rara, p.
Ardeola ralloïdes. Rara, p.
Ardetta minuta, *Sgolgin.* Comunissimo, p. c.
Botaurus stellaris, *Tarabus.* Comune, p.
Nycticorax griseus. Comune (*T*), scarso (*B*).
Ciconia alba, *Sigogna.* Rara, p. c. m.
Ciconia nigra, *Sigogna negra.* Rarissima.
Platalea Leucorodia. Rarissima.
Plegadis Falcinellus, *Sgnepon de mar.* Comune.
Phœnicopterus roseus. Raro.
Cygnus musicus. Raro.
Bernicla brenta. Rarissima.
Bernicla ruficollis. Rara assai.
Anser cinereus, *Oca salvadega.* Rara.
Anser segetum. Comune (*T*), scarsa (*B*).
†Anser albifrons. Rara.
Tadorna cornuta. Rarissima.
Anas Boscas, *Aneda salvadega.* Comunissimo.
Chaulelasmus streperus. Rara (*T*), comune (*B*).
Spatula clypeata, *Cazzuron.* Comune.
Dafila acuta, *Coalunga.* Comune.

Digitized by Google

Mareca Penelope, *Coross.* Comunissimo.
Nettion Crecca, *Garganell.* Comunissima.
Querquedula Circia. Comune.
Fuligula rufina. Raro.
Fulix ferina. Raro (*T*), frequente (*B*).
Fulix Marila. Rara (*T*), frequente (*B*).
Fulix Fuligula. Comunissima.
Fulix Nyroca. Rara (*T*), frequentè (*B*).
Bucephala Clangula, *Quattr' oeucc.* Comune (*T*), scarso (*B*).
†Harelda glacialis. Rarissima.
Œdemia fusca, *Moretton.* Raro.
†Erismatura leucocephala. Raro.
Mergus Merganser, *Resegon.* Raro.
Mergus Serrator. Raro.
†Mergellus Albellus. Rara (*T*), frequente (*B*).
Columba Palumbus, *Tuon.* Comunissimo.
Columba Oenas. Comune.
Columba livia. Comunissimo.
Turtur tenera. Comunissima, p. c.
Perdix saxatilis, *Cotorno.* Comune, m.
Perdix rufa. Scarsa (*B*).
Starna Perdix, *Pernis.* Comune, p. c. m.
Coturnix communis, *Quaja.* Comunissima, p. c.
Synoicus Lodoisiae, *Verr.* p. Un solo esemplare, da me esaminato in carne il giorno dopo la sua presa (*T*).
Tetrao Urogallus, *Cedron.* Raro, m.
Lyrurus Tetrix, *Gall de montagna.* Raro (*T*), frequente (*B*), m.
Bonasa betulina, *Francolin.* Raro (*T*), frequente (*B*), m.
Lagopus mutus. Comune, m.
Rallus aquaticus, *Grugnett.* Comune, p. c.
Ortygometra Porzana, *Gelardina.* Comune, p. c.
Ortygometra Bailloni, *Calchin.* Non comune, p. c.
Ortygometra parva, *Calchin.* Comune, p. c.
Crex pratensis, *Re de quaj.* Comune, p. c.
Gallinula chloropus, *Gelardina gainera.* Comune, p. c.
Fulica atra, *Folega.* Comune, p. c.
Grus communis. Rara.

Digitized by Google

Otis Tarda, *Otarda.* Accidentale.
†**Otis Tetrax.** Accidentale.
Œdicnemus scolopax, *Usell legoratt.* Comune.
Cursorius gallicus. Accidentale.
Charadrius Pluvialis, *Pivié.* Non raro.
†**Squatarola helvetica.** Accidentale.
Eudromias Morinellus. Raro.
Ægialitis curonica, *Gireu.* Comune, p.
Ægialitis Hiaticula, *Gireu.* Comune.
Vanellus Capella, *Vanett.* Comunissima, p.
Haematopus Ostralegus. Accidentale.
Recurvirostra Avocetta. Accidentale.
Himantopus candidus. Accidentale.
Tringa Canutus. Raro.
Pelidna subarquata. Raro.
Pelidna alpina. Raro (*T*), frequente (*B*).
Actodromas minuta. Raro (*T*), frequente (*B*).
Calidris Arenaria. Accidentale.
Machetes Pugnax, *Combattent.* Rara.
Tringoïdes Hypoleucus, *Gireù de fium.* Comune, p.
Totanus Ochropus, *Cubianc.* Comune, p.
Totanus Glareola, *Trentin.* Frequente, p.
Totanus stagnatilis, *Cubianc.* Raro, p.
Totanus Calidris. Rara, p.
†**Totanus fuscus.** Rara, p.
Totanus nebularius, *Sgambetton.* Rarissima, p.
Limosa melanura, *Sgambetton.* Non rara, p.
Limosa rufa. Accidentale.
Scolopax Rusticula, *Gallinazza.* Comune, p. c. m.
Gallinago major, *Sgneppon.* Comune, p. c.
Gallinago cælestis, *Sgneppa.* Comune, p. c.
Gallinago Gallinula, *Sgneppin.* Comune, p. c.
Numenius Arquata. Non raro.
Numenius tenuirostris. Rarissimo.
†**Numenius Phæopus.** Accidentale.
Glareola Pratincola, Rarissima.
Sterna fluviatilis, *Galeden.* Comune.

Digitized by Google

Sterna macrura. Accidentale.
Sternula minuta, Comune.
Hydrochelidon hybrida. Raro.
Hydrochelidon nigra, *Sgarin negher.* Raro (*T*), frequente (*B*).
Hydrochelidon leucoptera. Scarso (*B*).
Chroocephalus minutus. Raro (*T*), frequente (*B*).
Chroocephalus melanocephalus, *Gabian.* Comune (*T*), scarso (*B*).
Chroocephalus ridibundus. Comunissimo.
Rissa tridactyla. Accidentale.
Larus canus. Non rara (*T*), scarsa (*B*).
Larus fuscus. Non comune.
†**Larus marinus.** Accidentale.
Larus cachinnans. Non raro.
Stercorarius pomatorhinus. Accidentale.
Colymbus glacialis. Accidentale.
Colymbus arcticus. Accidentale.
Colymbus septentrionalis. Accidentale.
Podiceps cristatus, *Gorva.* Comune (*T*), scarso (*B*).
Podiceps griseigena. Accidentale.
Podiceps nigricollis. Raro.
Podiceps cornutus. Raro.
Podiceps fluviatilis, *Pisatell.* Comune.

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli che sono sedentarie in Lombardia.[1]

Corvus Corax (*B*).
Corvus Corone (*B*).
2. **Corvus Cornix**, ed erratica (*T*).[2]
3. **Pica rustica.**
1. **Garrulus glandarius.**
Pyrrhocorax alpinus (*B*).
Pyrrhocorax Graculus (*B*).
Nucifraga Caryocatactes(*B*).
1. **Sturnus vulgaris.**
1. **Passer Italiæ.**
Passer domesticus (*B*).
1. **Passer montanus**, ed erratica (*B*).
2. **Coccothraustes vulgaris** (*T*).
1. **Fringilla cœlebs** (*T*).
1. **Ligurinus Chloris.**
†2. **Carduelis elegans** (*T*).
2. **Emberiza Citrinella** (*T*).
†1. **Alauda arvensis.**
†1. **Alauda arborea** (*T*).
Galerita cristata (*B*).
2. **Anthus Spipoletta**, ed erratica.
2. **Anthus pratensis**, ed erratica (*B*).
Calobates melanope.
1. **Merula nigra.**
Merula torquata (*B*).
1. **Turdus viscivorus.**
2. **Erithacus Rubecula**, ed erratica (*T*).
2. **Pratincola Rubicola** (*T*).
†1. **Monachus Atricapillus** (*T*).
2. **Phylloscopus rufus** (*T*).
1. **Troglodytes parvulus**, ed erratica.
Cinclus aquaticus (*B*).
3. **Accentor modularis**, ed erratica (*T*).
1. **Acredula rosea** (*T*).
Regulus cristatus (*B*).

[1] Compilato dai conti E. Turati e C. Borromeo; quando vi sono differenze ho aggiunto la iniziale del nome dell' osservatore.

[2] Ho notato che da qualche anno avviene una sensibile diminuzione negli Uccelli sedentari, al punto che varie specie, una volta comunissime, ora sono diventate molto scarse, e taluna persino rara. Anche per le specie che si debbono considerare come sedentarie, havvi passaggio sia in primavera, sia in autunno. In primavera alcune coppie si fermano sempre per nidificare e rimangono fino all' epoca dell' emigrazione, che è dall' agosto al novembre. Dai primi di dicembre al marzo rimangono tra noi in quantità maggiore o minore, secondo la specie. Ho segnato col n. 1 quelle delle quali si fermano individui numerosi; col n. 2 se pochi; col n. 3 se pochissimi; colla croce (†) se aumentano in primavera (*Turati*).

Digitized by Google

Regulus ignicapillus (*B*).
1. **Parus major** (*T*).
3. **Cyanistes cæruleus** (*T*).
2. **Sitta cæsia** (*T*).
2. **Certhia brachydactyla** (*T*).
2. **Picus major** (*T*).
3. **Gecinus viridis.**
2. **Alcedo Ispida.**
2. **Strix flammea.**
2. **Athene Noctua.**
Syrnium Aluco (*B*).
Bubo maximus (*B*).
Circus æruginosus (*B*).
Aquila Chrysaëtus (*B*).
Accipiter Nisus (*B*).
1. **Buteo vulgaris.**
1. **Cerchneis Tinnunculus.**
Ardea cinerea (*B*).
Gypaëtus barbatus (*B*).
Gyps fulvus (*B*).
2. **Anas Boscas** (*T*).
†3. **Columba Palumbus** (*T*).
1. **Columba livia.**
Perdix rufa (*B*).
2. **Perdix saxatilis.**
1. **Starna Perdix.**
Tetrao Urogallus (*B*).
Lyrurus Tetrix (*B*).
Bonasa betulina (*B*).
Lagopus mutus (*B*).
Rallus aquaticus (*B*).
†1. **Gallinula chloropus.**
1. **Fulica atra** (*T*).
2. **Chroocephalus ridibundus** (*T*).
2. **Podiceps fluviatilis.**

Elenco delle specie di uccelli le quali nidificano in Lombardia. [1]

Corvus Cornix, t. 55.
Pica rustica, t. 101.
Garrulus glandarius, t. 24.
Sturnus vulgaris, t. 28.
†**Pastor roseus.**
Fringilla cœlebs, t. 11.

[1] Per la munificenza del conte Ernesto Turati, e a scopo di beneficenza, venne pubblicata a Milano tra il 1865-71 l'opera di E. Bettoni *Storia Naturale degli uccelli che nidificano in Lombardia*, opera tra le più splendide del genere, notevole per la bellezza e ricchezza delle sue tavole. Il conte Turati nel compilare la seguente lista osserva che ha segnato con croce le specie non menzionate nell'opera suddetta; delle specie citate egli stesso trovò i nidi colle uova e coi pulcini, e ne ha fatto una bellissima raccolta aggiungendovi gli adulti, maschio e femmina, e conservando ai nidi i supporti naturali. Di contro ai nomi delle specie egli ha ricordato la tavola dell'opera citata nella quale il nido di quella specie è figurato.

Digitized by Google

Montifringilla nivalis, t. 110.
Passer montanus, t. 9.
Passer Italiæ, t. 13.
Coccothraustes vulgaris, t. 71.
Ligurinus Chloris, t. 21.
Carduelis elegans, t. 41.
Ægiothus Linarius, t. 70.
Emberiza Citrinella, t. 23.
Emberiza Hortulana, t. 68.
Emberiza Cia, t. 97.
Alauda arborea, t. 61.
Alauda arvensis, t. 60.
†Galerita cristata.
Anthus trivialis, t. 47.
Anthus Spipoletta, t. 63.
†Budytes flavus.
Calobates melanope, t. 62.
Saxicola Oenanthe, t. 54.
Monticola saxatilis, t. 25 e 25 a.
Monticola Cyanus, t. 50.
Merula nigra, t. 14.
Turdus musicus, t. 95.
Turdus viscivorus, t. 19.
Aëdon Luscinia, t. 32.
Erithacus Rubecula, t. 109.
Ruticilla Phœnicurus, t. 26.
Ruticilla titys, t. 46.
Pratincola Rubicola, t. 66.
Pratincola Rubetra, t. 4.
Sylvia orphæa, t. 33.
Sylvia cinerea, t. 45.
Monachus Atricapillus, t. 6.
Monachus hortensis, t. 73.
Phylloscopus Bonellii, t. 29.
Phylloscopus rufus, t. 100.
Hypolais polyglotta, t. 79.
Hypolais icterina, t. 43.
Acrocephalus streperus, t. 10.
Acrocephalus arundinaceus, t. 2.
Troglodytes parvulus, t. 49.
Cinclus aquaticus, t. 105.
Accentor collaris, t. 72.
Accentor modularis, t. 52.
Regulus cristatus, t. 106.
Ægithalus pendulinus, t. 77.
Acredula rosea, t. 12.
Parus major, t. 22.
Parus ater, t. 90.
Cyanistes cæruleus, t. 51.
Sitta cæsia, t. 7.
Certhia brachydactyla, t. 88.
†Tichodroma muraria.
Oriolus Galbula, t. 75.
Lanius Excubitor, t. 87.
†Lanius minor.
Lanius Collurio, t. 59.
Lanius auriculatus, t. 40.
Butalis Grisola, t. 69.
Hirundo rustica, t. 30.
Chelidon urbica, t. 67.
Clivicola riparia, t. 53.
Cypselus Apus, t. 44.
Cypselus Melba, t. 61.
Caprimulgus europæus, t. 15.
Picus major, t. 16.
Picus minor, t. 78.
Gecinus viridis, t. 65.
Iynx Torquilla, t. 48.
Cuculus canorus, t. 92.
Alcedo Ispida, 1, 1 a.
Merops Apiaster, t. 104.
Upupa Epops, t. 27.
Strix flammea, t. 36.
Syrnium Aluco, t. 76.

Digitized by Google

Asio Otus, t. 56.
Athene Noctua, t. 20.
Scops Giu, t. 17.
Bubo maximus, t. 107.
Circus aeruginosus, t. 31, 31 a.
Buteo vulgaris, t. 42.
Cerchneis Tinnunculus, t. 35.
Accipiter Nisus, t. 58.
Ardea purpurea, t. 39.
Ardetta minuta, t. 3.
Anas Boscas, t. 86.
Columba Palumbus, t. 18.
Columba Oenas, t. 93.
Columba livia, t. 80.
Turtur tenera, t. 34.
Perdix saxatilis, t. 94.
Starna Perdix, t. 8.
Coturnix communis, t. 5.
Tetrao Urogallus, t. 108.
Lyrurus Tetrix, t. 85.
Lagopus mutus, t. 82.
†Rallus aquaticus.
Ortygometra Porzana, t. 83.
†Ortygometra parva.
Crex pratensis, t. 91.
Gallinula chloropus, t. 96.
Fulica atra, t. 94.
Œdicnemus scolopax, t. 102.
Tringoïdes Hypoleucus, t. 89.
Scolopax Rusticula, t. 103.
Sterna fluviatilis, t. 84.
†Hydrochelidon nigra.
Chroocephalus ridibundus, t. 98.
†Podiceps fluviatilis.[1]

Nell'elenco delle specie che nidificano in Lombardia, redatto dal conte Carlo Borromeo, vi sono le seguenti specie non registrate dal conte Turati:

Corvus Corax.
Corvus Corone.
Pyrrhocorax alpinus.
Pyrrhocorax Graculus.
Nucifraga Caryocatactes.
Chrysomitris Spinus.
Ægiothus rufescens.
Cannabina Linota.
Serinus hortulanus.
Pyrrhula europæa.
Loxia Curvirostra.
Miliaria Projer.
Emberiza pyrrhuloïdes.
Melanocorypha Calandra.
Motacilla alba.
Merula torquata.
Cyanecula Wolfi.
Phylloscopus Trochilus.
Acrocephalus palustris.
Calamodus schœnobænus.

---

[1] Per tutti gli altri dati richiesti mi riporto all'opera sugli *Uccelli che nidificano in Lombardia* per E. Bettoni. Ho aggiunto altrove le notizie riguardanti la nidificazione delle poche specie segnate con croce da me trovate col nido in Lombardia dopo la pubblicazione dell'opera suddetta. (*Turati*).

Digitized by Google

Calamodus aquaticus.
Cisticola cursitans.
Regulus ignicapillus.
Panurus biarmicus.
Pœcile palustris.
Muscicapa collaris.
Aquila Chrysaëtus.
Ardea cinerea.
Nettion Crecca.
Querquedula Circia.
Perdix rufa.
Bonasa betulina.
Ortygometra Bailloni.
Ægialitis curonica.
Totanus Ochropus.

Elenchi delle specie di uccelli che sono di passaggio regolare nella Lombardia.[1]

Di passaggio in primavera ed autunno.

Lanius minor. Marzo, settembre.
Lanius Collurio. Marzo, settembre.
Lanius auriculatus. Marzo, settembre.
Iynx Torquilla. Marzo, settembre.
Cuculus canorus. Marzo, settembre.
Caprimulgus europæus. Marzo, settembre.
Hirundo rustica. Marzo, settembre.
Chelidon urbica. Marzo, settembre.
Clivicola riparia. Marzo, settembre.
Cotile rupestris. Marzo, novembre.
Cypselus Apus. Aprile, settembre.
Cypselus Melba. Aprile, settembre.
Upupa Epops. Aprile, settembre.
Certhia brachydactyla. Aprile, settembre.
Oriolus Galbula. Aprile, settembre.
Sturnus vulgaris. Aprile, settembre.
Turdus viscivorus. Febbraio, ottobre.
Turdus musicus. Aprile, ottobre.

---

[1] Le tre prime liste sono dovute alle osservazioni del conte Carlo Borromeo.

Digitized by Google

Aëdon Luscinia. Aprile, settembre.
Pratincola Rubetra. Aprile, ottobre.
Monachus Atricapillus. Marzo, settembre.
Monachus hortensis. Marzo, settembre.
Sylvia cinerea. Marzo, settembre.
Acrocephalus arundinaceus. Aprile, settembre.
Parus major. Aprile, settembre.
Motacilla alba. Aprile, settembre.
Anthus Spipoletta. Aprile, ottobre.
Anthus pratensis. Aprile, ottobre.
Anthus trivialis. Aprile, settembre.
Cannabina Linota. Aprile, ottobre.
Columba Palumbus. Marzo, novembre.
Columba Oenas. Marzo, novembre.
Turtur tenera. Marzo, settembre.
Scolopax Rusticula. Marzo, ottobre.
Gallinago major. Marzo, settembre.
Gallinago cælestis. Marzo, settembre.
Gallinago Gallinula. Marzo, settembre.
Ardetta minuta. Aprile, settembre.

Di passaggio quasi esclusivamente in autunno.

Circus æruginosus. Settembre.
Otus vulgaris. Ottobre (a branchi).
Scops Giu. Settembre.
Lanius Excubitor. Settembre.
Corvus Cornix. Ottobre.
Corvus Corone. Ottobre.
Corvus frugilegus. Ottobre.
Turdus pilaris. Novembre.
Turdus iliacus. Ottobre.
Pratincola Rubicola. Settembre.
Ruticilla Phœnicurus. Settembre.
Erithacus Rubecula. Settembre.
Phylloscopus sibilator. Settembre.

Digitized by Google

Troglodytes parvulus. Ottobre.
Regulus cristatus. Novembre.
Cyanistes cæruleus. Novembre.
Parus ater. Settembre.
Calobates melanope. Settembre.
Budytes flavus. Settembre.
Sturnus vulgaris. Settembre.
Agrodroma campestris. Settembre.
Galerita cristata. Ottobre.
Alauda arvensis. Ottobre.
Alauda arborea. Ottobre.
Miliaria Projer. Ottobre.
Emberiza Citrinella. Ottobre.
Emberiza Schœniclus. Ottobre.
Fringilla cœlebs. Ottobre.
Fringilla Montifringilla. Ottobre.
Carduelis elegans. Ottobre.
Chrysomitris Spinus. Ottobre.
Ligurinus Chloris. Ottobre.
Vanellus Capella. Ottobre.
Crex pratensis. Settembre.
Nettion Crecca. Novembre.
Anas Boscas. Novembre.

Di passaggio quasi esclusivamente in primavera.

Butalis Grisola. Aprile.
Gallinago major. Aprile.
Mareca Penelope. Marzo.
Querquedula Circia. Marzo.
Chaulelasmus streperus. Marzo.
Spatula clypeata. Marzo.
Dafila acuta. Marzo.

Digitized by Google

Specie che sono quasi soltanto di doppio passaggio regolare in Lombardia.[1]

Fringilla Montifringilla. Raramente nidifica.
Erithacus Rubecula. Pochi nidificano.
Turdus musicus. Pochi nidificano.
Turdus iliacus.
Phylloscopus Bonellii. Pochi nidificano.
Phylloscopus Trochilus.
Parus ater. Pochi nidificano.
Regulus cristatus. Pochi nidificano.
Regulus ignicapillus.
Ardea cinerea.
Scolopax Rusticula. Raramente nidifica.
Gallinago major.
Gallinago cælestis.
Gallinago Gallinula.
Sternula minuta.
Hydrochelidon nigra. Raramente nidifica.

VENETO.

Verona, distretto di Caprino, vallata Ferrara (Pellegrini Vittorio):

La zona d'osservazione della lunghezza di circa 29 chilometri con in media 5 di larghezza, comprende la vallata che dal confine col Trentino si estende alla pianura di Ri-

[1] Questa lista è fatta dal conte Ernesto Turati il quale osserva: Tra le specie da me conosciute in Lombardia, ve ne sono molte di passo regolare, sia tra quelle sedentarie, sia tra quelle che arrivano per nidificarvi; ve ne sono poi anche di passo irregolare, queste ultime che magari appaiono in quantità per un anno, scompaiono poi per una serie più o meno lunga di anni.

Digitized by Google

vole Veronese, limitata: a levante dalla vetta del monte Cerbiol, dal monte Castel Cuco e dai filoni dei monti Masi e San Marco; a ponente dal versante orientale del monte Baldo; a mezzodì dal piano di Rivole; ed a settentrione dal Trentino. La parte superiore è costituita dalle Alpi boscato-pascolive con prati naturali ed il versante quasi nudo del Baldo. Più in basso si riscontrano i cedui ed i castagneti fruttiferi dei Masi, ed in seguito la coltura agraria con viti e gelsi frastagliata da piccoli colli per lo più nudi. Il territorio che da metri 190 si estende ai 2190 sopra il livello del mare, è intersecato da valli e da torrenti. La massa che compone la parte montuosa consta di calcare secondario a strati più o meno orizzontali. I colli ed i terreni coltivi sono tutti di natura morenica.

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nella provincia di Verona, distretto di Caprino, Rivole e Vallata Ferrara, coi nomi volgari locali e notizie di frequenza, ubicazione, ecc.

Corvus Corax. *Corvo grande.* Sedentario e comune, nidifica sul monte Baldo.

Corvus Cornix. *Corvo molinar.* Comune.

Corvus frugilegus. *Corvo, Grola.* Abbonda sui monti e scende al piano in grossi stuoli, anche sedentario.

Nucifraga Caryocatactes. *Rompinose.* Invernale e piuttosto rara.

Pica rustica. *Gaza mora.* Stazionaria e non comune.

Garrulus glandarius. *Gaza rossa* o *zucona.* Assai comune e sedentaria.

Pyrrhocorax alpinus. *Corvo-merlo.* Di passaggio; vedesi in grandi stormi sul monte Baldo, ove probabilmente nidifica; anche sedentario.

Sturnus vulgaris. *Storlin.* Assai comune.

Digitized by Google

Fringilla cœlebs. *Frenguel.* Comune, di doppio passo e sedentario al piano.

Fringilla Montifringilla. *Montan.* Abbonda nell'autunno.

Passer montanus. *Pasara crautina.* Sedentaría e comune.

Passer Italiæ. *Pasara.* Sedentaria e comunissima.

Coccothraustes vulgaris. *Frison.* Comune in autunno.

Ligurinus Chloris. Stazionario.

Chrysomitris Spinus. *Lugarin.* Di doppio passaggio.

Carduelis elegans. *Gardelin.* Comune di passo e sedentario.

Serinus hortulanus. *Sverzarin.* Frequente, di passo.

Cannabina Linota. *Fainèl.* Sedentario e comune assai sui monti.

Ægiothus Linarius. *Fainèl montin.* Non raro quando passa.

Pyrrhula europæa. *Siolonso.* Non comune.

Loxia Curvirostra. *Beco-in-crose.* Di passaggio irregolare, pochi sedentarî e nidificanti.

Miliaria Projer. *Petonzo.* Raro, si vede in settembre.

Emberiza Citrinella. *Smaiàrda.* Comune sui monti.

Emberiza Cirlus. *Pionza smaiardada.* Non comune.

Emberiza Hortulana. *Ortolan.* Sui monti, passa in agosto e settembre.

Emberiza Cia. Comune in autunno.

Emberiza Schœniclus. *Pionza.* Comune al piano, di passo e sedentario.

Alauda arborea. *Calandra.* Comune di passo e sedentaria.

Alauda arvensis. *Lodola.* Comune di passo e anche sedentaria.

Galerita cristata. *Capelòta.* Sedentaria e comune assai ovunque.

Anthus pratensis. *Sguseta.* Abbondantissima al piano nel settembre, più scarsa in primavera.

Anthus trivialis. *Tordina.* Non raro, è anco sedentario.

Anthus Spipoletta. *Sguseton.* Non comune, vedesi in marzo ed in ottobre.

Budytes flavus. *Boarina.* Comune.

Motacilla alba. *Squassacoa*, *Catarinela.* Assai comune.

Calobates melanope. *Boarina squassacoa.* Sedentaria e non rara.

Saxicola Oenanthe. *Culbianco.* Comune e di doppio passo.

Digitized by Google

Monticola saxatilis. *Squerussolon de montagna.* Comune.

Monticola Cyanus. *Passara solitaria.* Comune assai, nidifica sulle rocce; sedentaria.

Merula nigra. *Merlo.* Stazionario e comune.

Merula torquata. *Gardèna negra.* Non rara, sedentaria sui monti.

Turdus pilaris. *Gardèna.* Di passaggio.

Turdus iliacus. Di passo alla fine dell'autunno.

Turdus musicus. *Tordo da ua.* Di doppio passo, abbonda in autunno.

Turdus viscivorus. *Tordo gazoto.* Rara, sedentaria.

Aëdon Luscinia. *Rosignol.* Non raro e nidificante.

Erithacus Rubecula. *Pitaro.* Assai comune, di doppio passo.

Ruticilla Phœnicurus. *Squerussolo.* Comunissimo alle due epoche del passo.

Ruticilla titys. *Squerussolo moro.* Stazionario e non raro.

Pratincola Rubicola. *Bati-ale.* Frequente e sedentario.

Pratincola Rubetra. *Negrisol.* Non raro.

Sylvia nisoria. *Biancheton becafigo.* Piuttosto abbondante.

Sylvia cinerea. *Bianchèta.* Assai comune in autunno.

Monachus Atricapillus. *Capinero.* Comune e di doppio passo.

Monachus hortensis. *Figarola*, *Becafigo.* Comune.

Phylloscopus sibilator. *Ciuin*, *Verdesin.* Comunissimo in aprile.

Troglodytes parvulus. *Reatín*, *Imperatorin*, *Sbusasese*, *Cercer.* Comune e stazionario ovunque.

Accentor modularis. *Morèta.* Di doppio passaggio.

Regulus cristatus. *Stelin.* Comune e di doppio passaggio.

Regulus ignicapillus. *Stelin dal mostacio.* Comune assai sulla fine dell'autunno, giunge in ottobre.

Acredula rosea. *Speronzola dalla coa longa*, *Ocio de bò.* Non rara.

Parus major. *Speronzola*, *Zifotola.* Comune ovunque.

Cyanistes cæruleus. *Speronzolin*, *Cincibin.* Abbondante in autunno.

Sitta cæsia. *Rampeghin.* Non raro, sedentario.

Certhia brachydactyla. *Rampeghin.* Comparisce in primavera e nell'autunno; anche sedentario.

Digitized by Google

Tichodroma muraria. *Rampeghin de zengia.* Comune sui monti rocciosi, ove è sedentario.

Oriolus Galbula. *Papafigo.* Abbastanza comune al piano.

Lanius Excubitor. *Redestola.* Abbastanza comune in primavera.

Lanius Collurio. *Sàrsacola.* Estiva comune, di passo in primavera ed autunno.

Lanius auriculatus. *Sàrsacola dalla testa rossa.* Non comune.

Muscicapa Atricapilla. *Bati-ale negrisòl.* Non rara.

Hirundo rustica. *Rondèna.* Comunissima in estate.

Chelidon urbica. *Ciprioto.* Comune assai in estate.

Cotile rupestris. *Rondèna de montagna.* Comune ai monti, ove giunge in marzo.

Cypselus Apus. *Rondòn.* Comune in estate.

Caprimulgus europæus. *Tetavache.* Raro.

Picus major. *Pigozzo rosso.* Comunissimo e sedentario sui monti boschivi.

Gecinus viridis. *Pigozzo verde.* Sedentario e non raro nei boschi.

Iÿnx Torquilla. *Storzicol.* Non raro, anche sedentario.

Cuculus canorus. *Cuco.* Non raro, estivo.

Upupa Epops. *Buba, Galletto de montagna.* Rara.

Strix flammea. *Aloco de campanil.* Poco comune, sedentario.

Asio Otus. *Ciusso.* Comune e sedentario, nidificante nei boschi.

Athene Noctua. *Ziveta.* Assai comune, nidifica tra le rocce.

Bubo maximus. *Bubo, Gran Bubo.* Comune e sedentario sui monti.

Circus cyaneus. *Falcheto bianco.* Rara.

Aquila Chrysaëtus. *Aquila reale.* Sedentaria sul Baldo.

Buteo vulgaris. *Poiana, Poiana de zocca.* Comune, sedentaria.

Cerchneis Tinnunculus. *Falcheto torresan.* Abita e nidifica sulle rocce dei monti, sedentario.

Columba Palumbus. *Favazzo.* Non raro.

Columba Oenas. *Colombazzo.* Comune, anco sedentaria.

Turtur tenera. *Tortora salvadega.* Comune sui monti.

Perdix saxatilis. *Cotorno.* Comune sugli alti monti.

Starna Perdix. *Pernise.* Comunissima.

Coturnix communis. *Quaia.* Piuttosto frequente in autunno.

Digitized by Google

Lyrurus Tetrix. *Gal de monte.* Raro sul monte Baldo.

Lagopus mutus. *Pernisa bianca, Gallinella de montagna.* Non raro sul monte Baldo.

Scolopax Rusticula. *Galinazza.* Comune in autunno.

Vicenza, distretti di Asiago, Schio, Valdagno, Arzignano e Vicenza (Molari Arturo):

La periferia delle diverse plaghe di osservazione si estenderebbe per questa volta ai distretti amministrativi forestali di Asiago, di Schio, di Valdagno, di Arzignano e di Vicenza. I confini della citata periferia anche troppo estesa, sarebbero: ad E., i distretti amministrativi di Bassano, Morostica, Thiene e la provincia di Padova; al S., i distretti amministrativi di Barbarano, Lonigo e la provincia di Verona in parte; ad O., la provincia di Verona ed il Tirolo meridionale; a N., il Tirolo.

Il distretto amministrativo di Asiago, od altipiano dei Sette Comuni, ha la complessiva superficie territoriale di ettari 44038, dei quali 24000 circa a bosco la maggior parte resinoso, il rimanente a prato, a pascolo e a coltura agraria adatta a quelle località, eccezione fatta dalle ghiaie sterili e dalle rocce nude. La sua elevazione sul livello del mare varia dai 600 ai 2200 metri. Non ha veri e propri corsi d'acqua perenni, dappoichè la Valgadena e la Val Frenzela che vanno a scaricarsi dalla parte di levante nel Brenta, la Val di Nos e la Valdassa che sboccano nell'Astico a ponente, non sono che torrenti avventizii nell'epoca delle grandi piogge e dello scioglimento delle nevi. È però ricca di buone ed abbondanti sorgenti. Il terreno, di antichissima formazione, presenta due differenti tipi di rocce facilmente distinguibili, cioè le schistose e le calcaree, entrambe soggette a decomposizione, relativamente progressiva per influenza degli agenti atmosferici. Siccome però il detto terreno è abbastanza provveduto d'argilla, di silice e di ossido

Digitized by Google

idrato di ferro, si presta molto favorevolmente alla vegetazione dei boschi nelle essenze aghifoglie e latifoglie e dei pascoli in genere, avvalorata la sua potenza produttiva dalla continua e regolare trasformazione di tutti i detriti vegetali nel terriccio od humus tanto necessario allo sviluppo delle piante in genere.

Il distretto amministrativo di Schio ha la complessiva estensione territoriale di ettari 37840 circa, di cui ettari 10940 circa a bosco in genere, il rimanente a coltura agraria, a prati artificiali ed a pascoli naturali di montagna, fatta eccezione dalle ghiaie e dalle rocce nude come sopra. La elevazione del suolo sopra il livello del mare varia da 100 ad oltre 2000 metri. Ha tre corsi principali d'acqua perenne nei quali vanno a scaricarsi tutti gli altri rivoli secondarii sia perenni che avventizi, e sono: l'Astico che da N. a S. e SSE. lo divide dal distretto amministrativo di Asiago, proveniente dal Tirolo; il Posina che da O. ad E. scende dalla Valle omonima e viene a scaricarsi nell'Astico; il Leogra il quale colla direzione NO.-SE. dalle Valli dei Signori viene a portare le sue acque nel Bacchiglione. Si contano anche fra i monti di questo distretto parecchie sorgenti. Vi si trovano le rocce schistose, calcaree ed in certe località anche plutoniche-cristalline, con minerali di piombo, zinco, rame ec. Non è molto ricco di boschi di essenze aghifoglie o resinose, i quali esistono solamente verso l'estremo limite di confine col Tirolo, vi abbondano invece i boschi di essenze latifoglie, la maggior parte governati a ceduo in buonissimo stato di vegetazione. Sono pure feraci e produttivi i terreni ridotti a coltura agraria, i prati ed i pascoli naturali di montagna.

Il distretto amministrativo di Valdagno ha una superficie territoriale di ettari 17115 di cui 3137 circa a bosco, il rimanente campi, prati, pascoli, ghiaie e rocce nude. L'elevazione sul livello del mare varia da 100 a 1500 metri. L'arteria principale di scarico delle acque nel territorio di questo distretto è l'Agno che da NO. a SE. porta questo nome fintanto che, girando al S. in distretto

Digitized by Google

amministrativo di Vicenza sotto al comune di Montecchio maggiore, assume quello di Guà. Lungo i boscosi pendii dei monti che ne formano il complesso si rinvengono anche parecchie sorgenti. Le roccie vi sono schistose, calcaree, silicee, plutonico-cristalline con minerali di manganese e ferro, e con depositi abbastanza produttivi di lignite. I boschi sono tutti costituiti da essenze latifoglie di vegetazione rigogliosa per la massima parte governati a ceduo ed a ceduo composto. Relativamente fertili e feraci sono i terreni ridotti a coltura agraria o mantenuti a pascolo.

Il distretto amministrativo di Arzignano ha una superficie territoriale di ettari 14416 circa di cui 3822 circa a bosco, il rimanente, come sopra, campi, prati, pascoli, ghiaia e roccie nude. Anche per questo distretto l'elevazione del suolo varia da 100 a 1500 metri sul livello del mare. Il bacino idrografico particolare al distretto è costituito dal torrente Chiampo, il quale lo percorre longitudinalmente con direzione NNO.-SE., girando poi a SO. ed a S. per scaricarsi nell'Adige. L'ossatura, per così dire, dei monti che lo compongono sono le rocce calcaree, schistose, silicee ed in qualche luogo anche plutoniche. Vi si riscontrano parecchie sorgenti. I boschi che ne rivestono le falde, meno piccole eccezioni, sono tutti costituiti da essenze latifoglie, vegete e rigogliose, governate a ceduo ed a ceduo composto. Sono pure fertili e feraci i terreni ridotti a coltura agraria diversa, campi, prati e vigneti ubertosi, non che quelli mantenuti a pascolo naturale.

Da ultimo, il distretto amministrativo di Vicenza ha una superficie territoriale di ettari 491767 circa dei quali ne sono tenuti a bosco 3150 circa, esclusivamente costituiti da essenze latifoglie diverse e governati a ceduo. La elevazione dei colli Berici, i quali con diverse ramificazioni si estendono quasi da N. a S. nella parte occidentale del distretto stesso, non ascende a metri 500 sul livello del mare, e sono pur essi, dove più dove meno, ridotti a coltura agraria, campi, prati, vigneti e frutteti floridissimi. Le ubertose pianure poi, i prati, i campi, le risaie, godono il benefizio

Digitized by Google

di abbondanti e perenni corsi d'acqua, molti derivati dai fiumi Bacchiglione, Retrone ed Astico-Tesina, alcuni da proprie e vere sorgenti, lungo i quali corsi d'acqua esistono piantagioni e siepi alte e folte di essenze diverse latifoglie, piantagioni e siepi che parimenti esistono lungo tutti i fossi di divisione dei fondi a seconda dei proprietarii, e di scolo ai fondi stessi per le soverchie acque piovane, le quali in certe località contribuiscono a mantenere il terreno assai umido ed anche veramente paludoso.

Dal fin qui detto ritorna facile trarne la naturale induzione che gli uccelli in genere, indigeni nel vero senso della parola, stazionarii pel solo periodo della nidificazione, o prettamente di passaggio, abbiano a trovare lungo le diverse valli fresche e boscate, e via pei prati e pei campi del circondario, tutto ciò che meglio si conviene al loro benessere fisico come prediletto nutrimento e come situazioni di dimora o di sosta, ciò che certo non può dirsi, se qui regge tale espressione, del loro benessere morale, giacchè quei pochi e fortunati individui che riescono ad eludere e sfuggire le molteplici e svariate insidie di tanti ed arrabbiati uccellatori e cacciatori, danno segni di tale spavento all'avvicinarsi dell'Uomo, da argomentare benissimo come essi vivono in continua apprensione e senza un momento di quiete.

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nella provincia di Vicenza, distretti di Asiago, Schio, Valdagno, Arzignano e Vicenza, coi nomi volgari locali ed indicazioni di frequenza ecc. [1]

Corvus Corax, *Corvo*, m. sd. n.
Corvus frugilegus, *Corvo*, f. e. n.
Corvus Cornix, *Cornacchia*, f. m. sd. n.

[1] *F.* (frequente), *s.* (scarso), *m.* (monti), *p.* (piano), *sd.* (sedentario), *e.* (erratico), *dp.* (di passaggio), *a.* (accidentale), *n.* (nidifica).

Digitized by Google

Pica rustica, *Gazza mora*, *Gazza ladra*, s. mp. sd. n.
Garrulus glandarius, *Gazza rossa*, e. n.
Pyrrhocorax alpinus, *Zorla*, f. m. sd. n.
Sturnus vulgaris, *Striolo*, f. m. p. e. n.
Fringilla cœlebs, *Finco*, f. dp. n.
Fringilla Montifringilla, *Finco montan*, f. dp.
Passer montanus, *Zeleghetta megiarola*, f. e. n.
Passer Italiæ, *Zelega grossa*, f. mp. sd. n.
Passer domesticus, *Zelega piccola*, f. mp. sd. n.
Coccothraustes vulgaris, *Frison*, s. mp. dp. n.
Ligurinus Chloris, *Verdon*, mp. dp. n.
Chrysomitris Spinus, *Lugarin*, *Lugaro*, f. dp.
Carduelis elegans, *Gardelin*, mp. e. dp. n.
Serinus hortulanus, *Verdolin*, *Trementin*, s. m.
Cannabina Linota, *Faganelo*, f. dp. n.
Ægiothus Linarius, *Organin*, *Cardinalin*, a.
Pyrrhula europæa, *Subioto*, s. e.
Loxia Curvirostra, *Beco in crose*, *Crosnobel*, s. a.
Miliaria Projer, *Petazzo*, s.
Emberiza Citrinella, *Squajardola*, f. mp. e. dp. n.
Emberiza Cirlus, *Zigola*, f. n.
Emberiza Cia, *Pionza*, f.
Emberiza Schœniclus, *Pionza*, f. mp. dp. n.
Alauda arborea, *Berluato*, mp. dp. n.
Alauda arvensis, *Lodola*, f. mp. e. dp. n.
Galerita cristata, *Capellua*, p. sd. n.
Anthus pratensis, *Fista*, *Fistarela*, f. dp.
Anthus trivialis, *Tordina*, f. mp. dp. n.
Anthus Spipoletta, *Fiston*, e. dp.
Budytes flavus, *Boarina zala*, e. dp.
Motacilla alba, *Boarina*, *Batticoa*, f. e. dp. n.
Calobates melanope, *Boarina zala*, dp.
Saxicola Oenanthe, *Culbianco*, s. dp. n.
Saxicola albicollis, *Mozzetto*, dp. n.
Saxicola Stapazina, *Favreto*, a.
Monticola saxatilis, *Coarossolon de montagna*, s. n.
Monticola Cyanus, *Passara solitaria*, s.

Digitized by Google

Merula nigra, *Merlo*, f. mp. dp. n.
Merula torquata, *Merlo dal colaro*, m. sd.
Turdus pilaris, *Gazanela*, *Gardena*, e. dp.
Turdus iliacus, *Tordo siselin*, dp.
Turdus musicus, *Tordo da ua*, f. dp. n.
Turdus viscivorus, *Tordo gazan*, mp. e. dp. n.
Aëdon Luscinia, *Rossìgnolo*, s. mp. dp. n.
Erithacus Rubecula, *Pettorosso*, *Pettaro*, f. e. dp. n.
Cyanecula Wolfi, *Coarossa della regina*, a.
Ruticilla Phœnicurus, *Coarossa*, s. dp. n.
Ruticilla titys, *Coarossa mora*, *Spazacamin*, dp. n.
Pratincola Rubicola, *Favareto*, mp. e. n.
Pratincola Rubetra, *Batiale*, s.
Sylvia nisoria, *Becafigon*, *Biancheton*, s.
Sylvia orphæa, *Biancheton*, *Becafigon*, s.
Sylvia cinerea, *Canevela*, mp. dp. n.
Sylvia Curruca, *Canevela rossa*, *Becafigo zelega*, mp. dp. n.
Monachus Atricapillus, *Caonegro* e *Coarosso*, mp. e. dp. n.
Monachus hortensis, *Becafigo*, f. dp. n.
Phylloscopus sibilator, *Ciuì*, *Ciuin*, dp. n.
Phylloscopus Trochilus, *Ciuì*, *Ciuin*, dp. n.
Phylloscopus Bonellii, *Ciuì*, *Ciuin bianco*, dp.
Phylloscopus rufus, *Ciuì*, *Ciuin*, dp.
Hypolais icterina, *Boscara*, mp. dp. n.
Acrocephalus streperus, *Foracanele*, s.
Acrocephalus arundinaceus, *Canelon*, s.
Calamodus aquaticus, *Risarolo*, s.
Locustella nævia, *Risarolo*, *Fistel*, a.
Troglodytes parvulus, *Rezeto*, *Sgarela*, e. dp. n.
Cinclus aquaticus, *Merlo d' acqua*, s.
Accentor modularis, *Moreta*, dp. n.
Regulus cristatus, *Stelin*, e. dp. n.
Regulus ignicapillus, *Stelin picolo*, e.
Acredula caudata, *Codona*, *Coatimon*, a.
Acredula rosea, *Codona*, *Coatimon*, s. e. dp. n.
Parus major, *Parussola*, s. mp. e. dp. n.
Parus ater, *Montagnola*, s. dp. n.

Digitized by Google

Cyanistes cæruleus, *Fratin*, s. e. dp.
Lophophanes cristatus, *Montagnola col ciufo*, *Parussolin colla cresta*, s.
Certhia familiaris, *Rampeghin picolo*, n.
Certhia brachydactyla, *Rampeghin*, n.
Tichodroma muraria, *Becamuri*, *Becasassi*, s.
Oriolus Galbula, *Brusola*, s. dp.
Lanius Excubitor, *Regestolon*, s. dp.
Lanius minor, *Regestola falcona*, f. mp. dp. n.
Lanius Collurio, *Regestola picola*, f. mp. dp. n.
Lanius auriculatus, *Regestola rossa*, mp. dp. n.
Butalis Grisola, *Batiale*, s. dp.
Hirundo rustica, *Rondinela*, f. mp. dp. n.
Chelidon urbica, *Rondin*, f. mp. dp. n.
Clivicola riparia, *Rondin d' acqua*, s.
Cotile rupestris, *Tartagin*, *Rondin de monte*, s. dp. n.
Cypselus Apus, *Rondon*, f. mp. dp. n.
Cypselus Melba, *Rondon foresto*, dp.
Caprimulgus europæus, *Lattacavre*, *Tettacavre*, s. mp. dp. n.
Dryocopus martius, *Pigozzo nero*, m. sd. n.
Picus major, *Pigozzo rosso*, n.
Picus medius, *Pigozzo rosso*, a.
Gecinus viridis, *Pigozzo verde*, f. mp. n.
Gecinus canus, *Pigozzo verde*, a.
Iynx Torquilla, *Caostorto*, *Storzicolo*, s. mp. dp. n.
Cuculus canorus, *Cuco*, dp. n.
Alcedo Ispida, *Piombin*, f. sd. n.
Upupa Epops, *Galeto de montagna*, dp. n.
Strix flammea, *Barbagian*, f. p. sd. n.
Asio Otus, *Gufo*, *Aloco coi corni*, s.
Athene Noctua, *Zoeta*, *Ziveta*, f. sd. n.
Scops Giu, *Cius*, mp.
Bubo maximus, *Gufo grande*, *Aloco grande*, s.
Circus æruginosus, *Pojana*, *Poja*, s.
Buteo vulgaris, *Pojana*, *Poja*, mp.
Hypotriorchis Subbuteo, *Falcheto balarin*, mp.
Cerchneis Tinnunculus, *Storela*, mp. n.

Digitized by Google

Accipiter Nisus, *Falcheto*, f.
Ardea cinerea, *Sgarza*, p. a.
Ardea purpurea, *Sgarza rossa*, p. a.
Egretta Garzetta, *Sgarzetta*, p. a.
Ardetta minuta, *Trentacoste*, p. a.
Botaurus stellaris, *Tarabuso*, p. a.
Anser cinereus, *Oca salvadega*, a.
Anser segetum, *Oca salvadega*, a.
Anas Boscas, *Mazzorin*, *Arena salvadega*, a.
Mareca Penelope, *Ciosso*, a.
Nettion Crecca, *Sarsegna*, a.
Querquedula Circia, *Creccola*, a.
Fulix Fuligula, *Moreton*, a.
Columba Palumbus, *Colombo salvadego*, dp. n.
Columba Oenas, *Colombo salvadego*, dp. n.
Columba livia, *Colombo salvadego*, n.
Turtur tenera, *Tortorella*, *Tortora*, dp. n.
Perdix rufa, *Pernise rossa*, e. n.
Perdix saxatilis, *Cotorno*, e. n.
Starna Perdix, *Pernisotto*, *Pernise piccola*, f.
Coturnix communis, *Quagia*, dp. n.
Tetrao Urogallus, *Galo cedron*, s. m. sd. n.
Lyrurus Tetrix, *Galo sforcelo*, s. m. sd. n.
Bonasa betulina, *Francolin*, s. m. sd. n.
Lagopus mutus, *Pernise bianca*.
Rallus aquaticus, *Sforzana*, *Girardela*, p. dp.
Ortygometra Porzana, *Requagio negro*, *Girardina*, p. dp.
Ortygometra Bailloni, *Pisoca*, p. dp.
Ortygometra parva, *Requagisto*, p. dp.
Crex pratensis, *Requagio rosso*, dp. n.
Gallinula chloropus, *Viatara*, p. dp.
Fulica atra, *Folega*, p. a.
Grus communis, *Grua*, dp.
Vanellus Capella, *Paonzina*, f. dp.
Totanus Ochropus, *Cul bianco d'acqua*, *Totanin*, p. dp.
Scolopax Rusticula, *Gallinazza*, dp.
Gallinago major, *Ciocheta*, dp.

Digitized by Google

Gallinago cœlestis, *Bechela*, dp.
Gallinago Gallinula, *Becanoto*, dp.
Numenius Arquata, *Arcaza*, a.
Sterna fluviatilis, *Cocalina bianca*, a.
Sternula minuta, *Cocalina piccola*, a.
Hydrochelidon nigra, *Cocalina scura*, a.
Podiceps fluviatilis, *Sottopozzi*, *Sotarol*, a.

Elenco delle specie di uccelli le quali nidificano nella provincia di Vicenza, distretti di Asiago, Schio, Valdagno, Arzignano e Vicenza, colle notizie più importanti in proposito.

Corvus Corax. Una covata di 3-4 uova nel giugno, incubate per 20 giorni da M. e F.

Corvus Cornix. Una covata nel giugno di 3–4 uova; M. e F. prendono parte alla incubazione che dura 20 giorni.

Corvus frugilegus. Una covata nel giugno di 3–4 uova, incubate per circa 20 giorni da M. e F.

Pica rustica. Due covate in maggio e luglio di 5–7 uova, incubate per tre settimane da M. e F.

Garrulus glandarius. Due covate in mag. e lug. di 5–7 uova; M. e F. curano l' incubazione.

Pyrrhocorax alpinus. Una covata nel giugno di 3–4 uova, incubate per 20 giorni dalla sola femmina.

Sturnus vulgaris. Due covate in maggio e luglio di 4–6 uova, incubate per 15 giorni da M. e F.

Fringilla cœlebs. Una a tre covate dal maggio al luglio di 4–5 uova, incubate per 10 giorni dalla sola femmina.

Passer montanus. Una a tre covate dal maggio al luglio di 5–6 uova, incubate per 10 giorni circa da M. e F.

Digitized by Google

Passer Italiæ. Una a tre covate dal maggio al luglio di 5–6 uova, incubate da M. e F. per circa 10 giorni.

Passer domesticus. Una a tre covate dal maggio al luglio di 5–6 uova, incubate per circa 10 giorni da M. e F.

Coccothraustes vulgaris. Una a due covate dal maggio al luglio di 4–5 uova, incubate per 12 giorni.

Ligurinus Chloris. Una a due covate in maggio e luglio di 4–5 uova, incubate per 12 giorni da M. e F.

Carduelis elegans. Una a due covate in maggio e luglio di 5–6 uova, incubate da M. e F. per 10 giorni.

Cannabina Linota. Una a due covate in maggio e luglio di 5–6 uova, incubate da M. e F. per 10 giorni.

Emberiza Citrinella. Una a due covate in maggio e luglio di 4–5 uova, incubate da M. e F. per 10 giorni.

Emberiza Cirlus. Una a tre covate da maggio a luglio di 4–6 uova, incubate da M. e F. per circa 8 giorni.

Emberiza Schœniclus. Una a due covate da maggio a luglio di 4–6 uova, incubate da M. e F. per 10 giorni.

Alauda arborea. Due covate in maggio e luglio di 4–5 uova, incubate dalla sola femmina per 10 giorni.

Alauda arvensis. Due covate in maggio e luglio di 4–5 uova, incubate dalla sola femmina per 10 giorni.

Galerita cristata. Due covate in maggio e luglio di 4–5 uova, incubate dalla sola femmina per 10 giorni.

Anthus trivialis. Due covate in maggio e luglio di 5–6 uova, incubate dalla femmina soltanto per 10 giorni.

Motacilla alba. Due covate in maggio e luglio di 4–6 uova, incubate dalla sola femmina per 10 giorni.

Saxicola Oenanthe. Una a due covate in maggio e luglio di 5–6 uova, incubate per 12 giorni da M. e F.

Saxicola albicollis. Come la specie precedente.

Monticola saxatilis. Due covate in mag. e lug. di 5–6 uova, incubate dalla sola femmina per circa 15 giorni.

Merula nigra. Due a tre covate da aprile a luglio di 4-6 uova, incubate da M. e F. per 15 giorni.

Turdus musicus. Una a due covate da aprile a luglio di 4–5 uova, incubate da M. e F. per 15 giorni.

Digitized by Google

Turdus viscivorus. Come per la specie precedente.

Aëdon Luscinia. Due covate in maggio e luglio di 4–5 uova, incubate per 10 giorni dalla sola femmina.

Erithacus Rubecula. Come per la specie precedente.

Ruticilla Phœnicurus. Come per la specie precedente.

Ruticilla titys. Come sopra.

Pratincola Rubicola. Come sopra.

Sylvia cinerea. Due covate in maggio e luglio di 4–6 uova, incubate da M. e F. per 10 giorni.

Sylvia Curruca. Come sopra.

Monachus Atricapillus. Due covate in maggio e giugno di 4–6 uova, incubate per circa 10 giorni.

Monachus hortensis. Come per la specie precedente.

Phylloscopus sibilator. Due covate in maggio e giugno di 6–8 uova, incubate per circa 8 giorni dalla sola femmina.

Phylloscopus Trochilus. Come sopra.

Phylloscopus Bonellii. Come sopra.

Phylloscopus rufus. Come sopra.

Hypolais icterina. Due covate in mag. e giug. di 4–6 uova, incubate per 10 giorni da M. e F.

Troglodytes parvulus. Due covate in maggio e giugno di 8–10 uova, incubate per 10 giorni da M. e F.

Accentor modularis. Due covate in mag. e giug. di 4–6 uova, incubate dalla sola femmina per 12 giorni.

Regulus cristatus. Due covate in mag. e giug. di 4–6 uova, incubate per 8 giorni dalla sola femmina.

Regulus ignicapillus. Come sopra.

Acredula rosea. Due covate in maggio e luglio di 8-10 uova, incubate da M. e F. per 10 giorni.

Parus major. Come sopra, l' incubazione di 12 giorni.

Parus ater. Come per la specie precedente.

Certhia brachydactyla. Due covate in maggio e luglio di 6–8 uova, incubate per 10 giorni dalla sola femmina.

Lanius minor. Due covate in maggio e luglio di 5–7 uova, incubate per 12 giorni da M. e F.

Lanius Collurio. Come sopra.

Digitized by Google

Lanius auriculatus. Come sopra.

Hirundo rustica. Due covate in maggio e luglio di 5-6 uova, incubate da M. e F. per circa 10 giorni.

Chelidon urbica. Come sopra.

Cotile rupestris. Come sopra, depone 4 a 5 uova.

Cypselus Apus. Due covate in maggio e giugno di 3-5 uova, incubate per circa 12 giorni da M. e F.

Caprimulgus europæus. Una o due covate in maggio e luglio di 1-2 uova, incubate per 20 giorni dalla sola femm.

Dryocopus martius. Una o due covate in maggio e luglio di 5-7 uova, incubate per 15 giorni dalla sola femmina.

Picus major. Come per la specie precedente.

Gecinus viridis. Come per la specie precedente.

Iynx Torquilla. Due covate in maggio e luglio di 5-7 uova, incubate dalla sola femmina per 12 giorni.

Cuculus canorus. Depone le uova in maggio e giugno nei nidi di altri uccelli.

Alcedo Ispida. Due covate in maggio e luglio di 3-4 uova, incubate per 15 giorni.

Upupa Epops. Come sopra, depone 2-3 uova.

Strix flammea. Come sopra, depone 3-4 uova.

Athene Noctua. Come sopra.

Cerchneis Tinnunculus. Come sopra, depone 2-3 uova incubate per 20 giorni.

Columba Palumbus. Due covate in giugno ed agosto di 2 uova, incubate da M. e F. per 20 giorni.

Columba Oenas. Come sopra.

Columba livia. Come sopra, fa anche tre covate.

Turtur tenera. Due covate in giugno e luglio di 2 uova, incubate da M. e F. per 15 giorni.

Perdix rufa. Una covata nel giugno di 10-15 uova, incubate dalla sola femmina per circa 15 giorni.

Perdix saxatilis. Come sopra.

Coturnix communis. Due covate in giug. e lug. di 10-18 uova, incubate dalla sola femmina per 10-12 giorni.

Tetrao Urogallus. Una covata nel giugno di 6-10 uova, incubate dalla sola femmina per 20 giorni.

Digitized by Google

Lyrurus Tetrix. Come sopra, depone 8–12 uova.

Bonasa betulina. Come sopra, depone 6–8 uova incubate per 15 giorni.

Crex pratensis. Due covate in giugno e luglio di 4–6 uova, incubate dalla sola femmina per 12 giorni.

Elenco delle specie di uccelli che sono di passaggio nella provincia di Vicenza, e più specialmente nei distretti di Asiago, Schio, Valdagno, Arzignano e Vicenza, con notizie in proposito:

Fringilla cœlebs. Passa in piccola quantità in marzo e dalla metà di settembre a tutto novembre; qualcuno sverna.

Fringilla Montifringilla. Poco numerosa dalla metà di febbraio a quella di marzo e dalla metà di ottobre a tutto dicembre; alcune svernano.

Coccothraustes vulgaris. Scarso dalla metà di marzo a quella di aprile e dalla metà di settembre a tutto ottobre.

Ligurinus Chloris. Scarso dalla metà di marzo a quella di aprile ed in ottobre e novembre.

Chrysomitris Spinus. Passa tutto ottobre sino a metà novembre, non si vede in primavera.

Carduelis elegans. Dalla metà di marzo a quella di aprile e dalla metà di settembre a tutto ottobre; poco abbondante, alcuni svernano.

Cannabina Linota. Scarso dalla metà di marzo a quella di aprile e dalla metà di ottobre a tutto novembre.

Emberiza Citrinella. Scarso dalla metà di marzo a quella di aprile ed in ottobre e novembre.

Emberiza Schœniclus. Passa in scarso numero dalla metà di marzo a quella di aprile e dalla metà di ottobre a tutto novembre; alcuni svernano.

Alauda arborea. Scarsa in aprile ed ottobre sino alla metà di novembre.

Digitized by Google

Alauda arvensis. Scarsa dalla metà di marzo a quella di aprile ed in ottobre e prima quindicina di novembre.

Anthus pratensis. Scarsa dalla metà di marzo a quella di aprile ed in ottobre.

Anthus trivialis. Scarso in aprile e settembre sino a metà ottobre.

Anthus Spipoletta. Pochi dalla metà di marzo alla metà di aprile e dalla metà di ottobre a quella di novembre.

Budytus flavus. Scarso dalla metà di marzo a quella di aprile e in ottobre.

Motacilla alba. Poche dalla metà di marzo a quella di aprile ed in ottobre.

Calobates melanope. Come la specie precedente.

Saxicola Oenanthe. Scarso in aprile e settembre sino a metà ottobre.

Saxicola albicollis. Come la specie precedente, ma ben poche.

Merula nigra. Scarso dalla metà di febbraio a tutto marzo ed in ottobre sino a metà novembre.

Turdus pilaris. Poche in marzo e dalla metà ottobre a tutto dicembre; alcune svernano.

Turdus iliacus. Pochi dalla metà di febbraio a quella di marzo ed in ottobre e novembre.

Turdus musicus. Scarso in marzo e aprile ed in ottobre sino a metà novembre.

Turdus viscivorus. Scarsa nel marzo e dalla metà ottobre a tutto novembre.

Aëdon Luscinia. Dalla metà di aprile a quella di maggio ed in settembre.

Erithacus Rubecula. Numeroso, in aprile e dalla metà di settembre a tutto ottobre; alcuni svernano.

Ruticilla Phoenicurus. Scarso in aprile ed in settembre sino a metà ottobre.

Ruticilla titys. Come sopra, ma meno frequente.

Pratincola Rubicola. Pochissimi dalla metà di marzo a quella di aprile e dalla metà di settembre a quella di ottobre; alcuni svernano.

Sylvia cinerea. Scarsa in aprile e settembre.

Digitized by Google

Sylvia Curruca. Come sopra e anche nella prima metà di ottobre.

Monachus Atricapillus. Poche dalla metà di marzo a quella di aprile ed in settembre sino a metà ottobre; alcune svernano.

Monachus hortensis. Raro in aprile e dalla metà di agosto a tutto settembre.

Phylloscopus sibilator. Scarso dalla metà di marzo alla metà di aprile e dalla metà di settembre a quella di ottobre.

Phylloscopus Trochilus. Come sopra.

Phylloscopus Bonellii. Come sopra.

Hypolais icterina. Pochi dalla metà di aprile alla metà di maggio e dalla metà di settembre a quella di ottobre.

Troglodytes parvulus. Pochi in marzo ed in ottobre sino a metà novembre; alcuni svernano.

Accentor modularis. Poche in marzo e dalla metà ottobre a tutto novembre.

Regulus cristatus. Pochi dalla metà di marzo a quella di aprile e dalla metà di ottobre a quella di novembre; qualcuno sverna.

Acredula rosea. Poche in marzo ed in novembre sino a metà dicembre; alcune svernano.

Parus major. Scarsa in marzo ed in ottobre sino a metà novembre; svernano.

Parus ater. Scarsa dalla metà di febbraio a quella di marzo e dalla metà di ottobre a quella di novembre.

Cyanistes cæruleus. Poche dalla metà di febbraio a tutto marzo e dalla metà di ottobre a tutto novembre; alcune svernano.

Oriolus Galbula. Scarso nella prima metà di aprile e dalla metà di agosto a quella di settembre.

Lanius Excubitor. Scarsa nella seconda metà di marzo e dalla metà di ottobre a quella di novembre.

Lanius minor. Frequente dalla metà di aprile a quella di maggio e dalla metà di settembre a quella di ottobre, allora più scarsa.

Lanius Collurio. Come sopra.

Digitized by Google

Lanius auriculatus. Come sopra.

Butalis Grisola. Come sopra, ma non frequente.

Hirundo rustica. Abbondante dalla metà di marzo a quella di aprile e nel settembre.

Chelidon urbica. Abbondante in aprile ed in ottobre.

Cotile rupestris. Scarsa dalla metà di marzo a quella di aprile ed in ottobre.

Cypselus Apus. Numeroso in aprile e sulla fine di luglio.

Caprimulgus europæus. Scarso in aprile ed in ottobre.

Iynx Torquilla. Scarso in aprile e settem. sino a metà ottob.

Cuculus canorus. Pochi in aprile e dalla metà di settembre a quella di ottobre.

Upupa Epops. Poche dalla metà di marzo a quella di aprile e dalla metà di settembre a quella di ottobre.

Columba Palumbus. Pochi nel marzo ed in ottobre.

Columba Oenas. Come sopra, ma anche nella prima metà di settembre.

Turtur tenera. Poche in aprile e dalla metà di settembre a tutto ottobre.

Coturnix communis. Numerose dalla metà di aprile a quella di maggio e dalla metà di agosto a quella di ottobre.

Rallus aquaticus. Scarsa in aprile e dalla metà di agosto a quella di settembre; alcune svernano.

Ortygometra Porzana. Scarso in marzo sino a metà di aprile e dalla metà di settembre a tutto ottobre.

Ortygometra Bailloni. Come sopra.

Crex pratensis. Scarso in aprile e dalla metà di settembre a quella di ottobre.

Gallinula chloropus. Scarsa dalla metà di marzo a quella di apr. ed in settem. sino a metà ottob.; qualcuna sverna.

Vanellus Capella. Scarsa dalla metà di marzo a quella di aprile e nell'ottobre sino a metà novembre.

Scolopax Rusticula. Poche dalla metà di marzo a quella di aprile e dalla metà di ottobre a quella di novembre.

Gallinago major. Pochi come sopra e anche nella prima metà di ottobre.

Gallinago cælestis. Come la specie precedente.

Digitized by Google

Vicenza, distretto di Bassano (Ferrari Gaetano e Vittorelli nob. cav. dott. Andrea):

Il distretto di Bassano confina: ad E. colla giogaia Grappa (altitudine metri 1747); al S. colla pianura ed ultima ramificazione dei monti; ad O. col bacino inferiore del torrente Astico; al N. coll'altipiano di Asiago (altitudine media m. 1100). Entro detti confini sono compresi: *a*) il bacino inferiore del Brenta; *b*) le diramazioni e contrafforti meridionali dell'altipiano d'Asiago; *c*) la riva sinistra del torrente Astico.

Il bacino inferiore del Brenta è un complesso di contrafforti alternati da piccole valli con versanti in forte pendìo, di rocce scaglionate, di rupi scoscese e burroni; il tutto ammantato da boschi pascolivi e da pascoli cespugliati. Alla sommità delle due catene di monti formanti il bacino: boschi resinosi, boschi cedui, pascoli e prati.

La parte meridionale dell'altipiano d'Asiago è un assieme di estese diramazioni degradanti a poco a poco verso il lembo di pianura tra il fiume Brenta ed il torrente Astico. Di svariatissimi pendii esse sono al vertice coperte da boschi resinosi; più sotto da boschi cedui alternati da pascoli e prati, finalmente nella parte più bassa, dove prendono forma di collina, da terreni coltivati ad olivi, viti, prati e frutteti.

Il torrente Astico è corso d'acqua perenne e lungo le sue sponde esistono numerosi opifici. Le sponde del fiume Brenta sono popolatissime. Villaggi e caseggiati numerosi. Nessuna industria. (*Ferrari*).

Il distretto di Bassano confina al N. col Trentino, all'E. colla provincia di Treviso, al S. colla provincia di Padova, all'O. col rimanente della provincia di Vicenza. Il territorio bassanese al S. è piano, all'E. ed all'O. montagnoso e con colline, al N. ha la catena della Alpi. (*Vittorelli*).

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Vicenza, distretto di Bassano, coi nomi volgari locali ed alcune notizie. [1]

Corvus Corax. Sedentario.
Corvus frugilegus. Di passo.
Pica rustica, *Gaza nera.* Comune e sedentaria.
Garrulus glandarius, *Gaza rossa.* Comune e sedentaria.
Pyrrhocorax alpinus. Sedentario ai monti.
Pyrrhocorax Graculus. Erratico.
Sturnus vulgaris, *Strullo.* Sedentario ed erratico.
Fringilla cœlebs, *Finco.* Comune ovunque e sedentario.
Fringilla Montifringilla, *Montan.* Di passo.
Montifringilla nivalis. Di passaggio, nidifica ai monti.
Passer montanus, *Zeleghetta.* Comune ovunque.
Passer Italiæ, *Selega.* Comune e nidificante.
Coccothraustes vulgaris, *Frison.* Nidifica scarso ai monti, di passaggio.
Ligurinus Chloris, *Verdon.* Comune e sedentario in collina.
Serinus hortulanus. Erratico.
Carduelis elegans, *Gardellin.* Comune e nidificante.
Chrysomitris Spinus, *Lugaro.* Scarso, di passaggio.
Ægiothus rufescens. Accidentale di passo.
Pyrrhula europæa. Scarso ed erratico, nidifica.
Loxia Curvirostra. Di passo e nidificante.
Emberiza Citrinella, *Fiotto.* Frequente ai colli ove nidifica.
Emberiza hortulana, *Ortulan.* Comune ai colli ove nidifica.
Emberiza Cia. Scarso, nidificante e di passaggio.
Alauda arvensis, *Lodola.* Comune e nidificante.
Alauda arborea, *Berluato.* Comune ai monti ove nidifica.

---

[1] Questo elenco è principalmente dovuto al signor Ferrari, il dottor cav. Vittorelli essendosi limitato a dare risposte molto generiche in proposito. Questi due osservatori resero poi più difficile il mio compito citando quasi sempre le specie col solo nome volgare locale.

Digitized by Google

Galerita cristata, *Capelua*. Frequente, nidifica al piano ed ai colli.
Anthus pratensis. Di passo e nidificante.
Anthus trivialis. Di passo abbondante.
Calobates melanope. Sedentaria.
Saxicola Oenanthe, *Culo-bianco*. Frequente e nidificante ai monti.
Monticola saxatilis. Scarso e nidificante ai monti.
Monticola Cyanus, *Passera solitaria*. Comune ai monti, vi nidifica.
Merula nigra, *Merlo*. Abbondante ovunque, nidificante.
Merula torquata. Di passo.
Turdus pilaris. Di passo.
Turdus iliacus. Di passo.
Turdus musicus, *Tordo da ua*. Di passo e nidificante.
Turdus viscivorus, *Tordo gazzaro*. Sedentaria in collina.
Aëdon Luscinia, *Rossignolo*. Comune e nidificante.
Erithacus Rubecula. Erratico e di passo, nidifica ai monti.
Ruticilla Phœnicurus. Di passo e nidificante.
Pratincola Rubicola. Erratico, nidificante.
Sylvia cinerea. Di passo.
Monachus Atricapillus, *Caonegro*. Sedentaria in collina.
Monachus hortensis, *Becafigo*. Di passo.
Phylloscopus Trochilus, *Fuin*. Comune ai monti, vi nidifica.
Troglodytes parvulus. Sedentario.
Accentor modularis. Di passo.
Regulus cristatus. Di passo e nidificante.
Parus major, *Parussola*. Sedentaria e comune.
Parus ater. Di passo.
Acredula rosea, *Cotimone*. Sedentaria in collina.
Certhia brachydactyla, *Rampegarolo*. Sedentario ai colli.
Lanius Excubitor, *Reiestola*. Comune ai monti, ove nidifica.
Lanius Collurio. Estivo.
Lanius auriculatus. Estivo e nidificante.
Oriolus Galbula. Estivo e nidificante.
Butalis Grisola. Estivo e nidificante.
Hirundo rustica. Abbondante, estiva e nidificante.

Digitized by Google

Chelidon urbica. Abbondante, estivo e nidificante.
Cypselus Apus. Comune nell' estate.
Gecinus viridis, *Pigozzin*, *Spigozzin*. Sedentario e comune.
Iynx Torquilla. Nidificante e di passo.
Alcedo Ispida. Sedentario.
Athene Noctua. Sedentaria.
Buteo vulgaris. Sedentaria.
Falco Peregrinus. Sedentario.
Accipiter Nisus. Sedentario.
Egretta alba. Accidentale di passo.
Mareca Penelope. Accidentale.
Tetrao Urogallus. Sedentario ai monti.
Lyrurus Tetrix. Sedentario ai monti.
Bonasa betulina. Sedentario ai monti.
Perdix saxatilis. Sedentaria ai monti.
Starna Perdix. Sedentaria.
Coturnix communis, *Quaia*. Frequente, nidificante e di passo.
Columba Palumbus. Di passo e nidificante.
Turtur tenera, *Tortora*. Comune, estiva e nidificante.
Grus communis. Passa in grossi branchi.
Scolopax Rusticula. Di passo.

Belluno (Soravia cav. Pietro; Delaito Valentino, pel distretto di Feltre; Tissi Enrico, per quello del Cadore):

Il distretto di osservazione è quello forestale di Feltre, che comprende i due distretti amministrativi di Feltre e Fonzaso e che ha per confini: ad E. dapprincipio la valle del Mis, poi il comune di Sospirolo, indi il torrente Cordevole fino alla confluenza col Piave, ed oltre il Piave, la valle della Rimonta dal detto fiume fino al confine, in montagna, con la provincia di Treviso, territorio del comune di Valdobbiadene; al S. i comuni di Valdobbiadene, Segusino, Pederobba, Cavaso, Possagno, Crespano, della provincia di Treviso, indi il comune di Fietta provincia di Vi-

Digitized by Google

cenza; ad O. il comune di Cismon, provincia di Vicenza, il comune di Grigno e Castello Tesino del Trentino; al N. prima i comuni di Gosaldo e di Tiser del distretto di Agordo, indi i comuni di Fiera, Mezzan, Imeo e Canal San Bovo del distretto di Primiero, Trentino; poi il comune di Ciuse Tesino, Trentino, o più precisamente i beni patrimoniali di detto comune, Tornarezza, Valle Orsella e Vallaricca.

Il distretto forestale di Feltre è circondato dalla parte di tramontana dalla catena Alpina di secondo ordine (mancanti di granito) Cimoneghe, Alvis, Ramezza, Pietena, Vette, Monserpian, Vallazza e Coppolo. Parallela a detta catena trovasi dal lato di mezzogiorno un' altra di monti di terzo ordine Garda, Col di Tucche, Tomatico, Sassumă, Fontanasecca, Cinespa e Grappa, i contrafforti dei quali protendonsi verso mezzogiorno fino alla pianura trevigiana e bassanese. Fra l' una e l' altra delle due indicate catene di monti, epperò in direzione da E. ad O., apresi la larga vallata del Piave, che nell' istesso senso è in diretta comunicazione e continuità con la valle Feltrina propriamente detta, e questa pel valico alpino dei Colli Alti, al termine della valle di Seren, e per la valle di Cismon mette nella valle del Brenta. Le massime altezze delle Alpi di secondo ordine variano da 2000 a 3000 metri e di quelle di terzo da 1200 a 1700. Il punto più basso di tutto il territorio è sul letto del Piave al confine con la provincia di Treviso, 100 metri circa, ed il più alto l' estrema punta delle Cimoneghe, 3000. Nella catena Alpina secondaria la vegetazione arborea finisce a metri 1800 di elevazione in media; in quella di terzo ordine sussiste quasi dappertutto fino alle estreme cime, meno che sulla Grappa e sul Tomatico.

Questo territorio ha una costituzione topografica svariatissima, imperocchè presenta valli aperte con vasti tratti di piano, dominate da colline e monticelli; numerosi altipiani, valli ristrette e tortuose, dolci declivi, aspre chine, rocce a picco; insomma il suolo possiede tutte le accidentalità immaginabili, dal palude al più ardito dirupo. È facile l' indurre che con tanta varietà di condizioni altime-

Digitized by Google

triche la flora sia ricchissima; e difatti, parlando di sole piante legnose, se ne ha qui di tutte le specie, dalla quercia peduncolata al larice ed al pino mugo, dal pinocchio falso e dal pugnitopo all'*Alnus incana* ed alla *Dryas octopetala*. La fauna è parimente ricca e conta ogni genere di pennuti e di quadrupedi, dall'uccello di palude e di marina al Roncaso ed all'Urogallo, dalla Lontra al Camoscio.

Fiumi, torrenti e rigagnoli solcano ed attraversano il paese in tutte le direzioni. Buona parte delle più aperte valli è occupata ed ingombra di ghiaie e sabbia condottevi dalle piene dei fiumi e torrenti. Non sono in gran numero nè molto estesi, ma neppure mancano i paludi, i piccoli stagni e le sorgive, dimore predilette degli uccelli acquatici.

Il clima passa a tutti gli eccessi. In certi punti s'hanno le fitte nebbie delle maremme, in altri l'aria infocata del deserto, e ciò per lo stato igrometrico dell'aria. Quanto poi a quello termico basti il dire che in luglio del 1872 il termometro segnò a Feltre + 26 R. e nel dicem. 1873 — 21 R. La meteorologia s'addimostra pur essa generosa dispensatrice d'ogni genere di fenomeni. Violentissimi temporali, piogge frequenti, grandine, nevi, brine ec. si succedono quasi sempre a brevi intervalli. (*Delaito*).

La regione conosciuta sotto la denominazione di Cadore, e che forma l'oggetto delle presenti osservazioni ornitologiche, è posta tra le Alpi orientali e comprende più precisamente nella suddivisione delle Alpi bellunesi quelle Ampezzane, Cadorine e di Misurina. Geograficamente e per quanto si riferisce al territorio nazionale è limitata tra 46°, 17′ e 46°, 29′ di lat. boreale e tra 29°, 47′ e 30°, 25′ di long. orientale dell'isola Ferro. Ha per confini: a N. la valle che dal campo di Toblach (m. 1204) fino allo sbocco presso Innichen (m. 1166) del torrente Sesto o Sexten nella valle Drava; a E. il torrente Sesto, il passo di Montecroce (m. 1634), il Padola fino al suo sbocco nel Piave a S. Stefano di Comelico (m. 923) e i monti di Terra Grande, il passo della Mauria, il Cridola e il Duranno; a S. il distretto ammi-

Digitized by Google

nistrativo di Langarone e la plaga bellunese; ad O. la linea segnata dai monti La Rocchetta, Pelmo Sformoi e Rocchetta.

Amministrativamente la regione è divisa in due distretti, quello di Pieve di Cadore e quello di Auronzo. È percorsa da tre principali vallate: quella del Boite che formasi a NO. di Batestagno nel territorio austriaco, quella dell'Ansiei che ha origine a S. delle Cascine di Casera Vecchia nei pressi di Misurina, e finalmente della principale corrente del Cadore, il Piave, che nasce dall' alta valle del Sesis, su quella falda del monte Peralba che conduce alla forcella omonima. Accoglie nelle sue acque quelle del Boite a Perarolo e quelle dell'Ansiei presso i Treponti.

Il Cadore possiede monti di prima grandezza e tra i principali vanno annoverati: 1° Il Tofana m. 3269; 2° La Rocchetta m. 2371; 3° L'Antelao m. 3255; 4° Le Marmarole m. 3129; 5° Il Sorapiss m. 3291; 6° Il Cristallo m. 3244; 7° Il Codino con Campodoro m. 2234; 8° Le tre cime di Lavaredo m. 2963; 9° Il monte Piana m. 2296; 10° Croda di Val dei Toni o Zivölferkofer m. 3085; costituiti in buona parte di calcari dolomitici e ricoperti fino all'altitudine di circa 2000 metri di vegetazione arborea, cespugliosa ed erbosa.

La configurazione del suolo è propria delle regioni alpine: dai terreni pianeggianti e dati alla agricoltura nel fondo delle valli e in vicinanza ai paesi passa per le erte falde boscate e pascolive dei monti fino ai più elevati dirupi e pinacoli dei massi dolomitici che rendono bella ed interessante questa regione. Le vallate, sia principali, che secondarie, or ampie ed or asserragliate tra rupi, percorrono la regione in guisa da offrire all' osservatore tutta la diversità del paesaggio alpino e da indurre quelle differenze locali di clima che influiscono sulla vegetazione. Il clima generale è freddo e asciutto, discendendo in qualche invernata il termometro centigrado a — 23° e non spingendosi generalmente sopra lo zero, durante l' estate sale oltre i 26°. Le nevi generalmente sono abbondanti, come persistenti sono i venti di settentrione nella primavera e nel-

Digitized by Google

l'estate. Le piogge estive ed autunnali sono abbastanza copiose, ma di rado sono molto persistenti, nè presentano quella stabilità nell'epoca di arrivo che è propria dei paesi più temperati.

L'agricoltura è limitata alla non abbondante produzione di cereali, come gran turco, saraceno, frumento, segala, orzo, avena; di leguminose, come le fave e fagioli; di tuberi e di qualche altra pianta di domestica utilità come lino, canape ec. nonchè di piante ortensi. Assai più importante è al contrario l'allevamento dei boschi, i quali con vegetazione lussureggiante, occupano circa un terzo della totale superficie territoriale. Dal pino cembro e nano che crescono nell'estremo limite della vegetazione, s'incontra, discendendo, il larice, l'abete rosso, il pino silvestre, l'abete bianco, il pino nero, il faggio quali essenze primarie; gli aceri, frassini, ontani, citisi, noccioli, sorbi, pioppi, salici ec. quali secondarie. I prati e pascoli occupano pur essi circa il 40 per cento della complessiva superficie territoriale e se non sono ubertosi quanto con una più razionale ed intensiva coltura potrebbonsi ottenere, non mancano tuttavia di somministrare ottimi e profumati foraggi.

Non differentemente dalla flora, che nelle Alpi assume un carattere speciale, si comporta la fauna, la quale comprende pennuti e quadrupedi propri di questa regione. Omettendo in questi cenni brevissimi di accennare dei primi, tra i secondi si rammenta la frequente presenza tra questi monti dei Camosci, Caprioli, Volpi, Lepri, Scoiattoli, Tassi, Faine, Donnole, Martore ec. (*Tissi*).

Digitized by Google

Elenco generale delle specie di uccelli che si trovano nella prov. di Belluno; coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione, ecc.[1]

Corvus Corax, *Corf*, *Corvo* (B.); *Corvo*, *Corf*, *Crò*, *Corzh* (F.); *Corvo*, *Corvo da croda*, *Corf* (C.). Scarso, erratico ed invernale nel Feltrino; nidificante ai monti nel Cadore.

Corvus Corone, *Cornacia*, *Corniola* (B.); *Cornazh*, *Cornazha*, *Cornacia* (F.); *Cornacia*, *Corniola* (C.). Invernale nel Feltrino; nidificante nel Cadore e frequente.

Corvus Cornix, *Corf del mantél* (B. F.); *Corvo biso*, *Corvo da bosch*, *Corf.* (C.). Frequente e sedentaria.

Corvus frugilegus, *Corf*, *Corvo* (B.); *Corvo*, *Corf*, *Crò*, *Corzh* (F.); *Corvo*, *Corf* (C.). Frequente d'inverno e anco nidificante e sedentario.

Nucifraga Caryocatactes, *Gaia noselera*, *Gaia todesca* (B.), *Gaia noselera*, *Gaia mata* (F.); *Gaia de nosele* (C.). Scarsa, ma sedentaria e nidificante ai monti; in aprile e settembre fa un passaggio.

Pica rustica, *Gaza*, *Gaia*, *Chéca* (*B.*); *Gazha*, *Gada*, *Chéca* (F.); *Gaza*, *Chéca* (C.). Comune e sedentaria.

Garrulus glandarius, *Gaia*, *Gaia marina*, *Gajola* (B.); *Gaia* (F.); *Gaia*, *Gaiola* (C.). Comune e sedentaria.

Pyrrhocorax alpinus, *Zurla* (B.), *Paola*, *Zhorla*, *Zhurla* (F.); *Zhorla dal bech zal* (C.). Comune, gregario e sedentario ai monti.

Pyrrhocorax Graculus, *Zurla dal bech ross* (B.); *Paola*, *Zhorla*,

---

[1] Questo elenco è compilato dal cav. P. Soravia, ispettore forestale di Belluno; egli si è dato moltissima pena per la inchieste ornitologica nella sua provincia, coadiuvato dai sotto-ispettori forestali del Cadore (Tissi) e del Feltrino (Delaito); ai quali dobbiamo le notizie raccolte. Queste notizie sono poi state pubblicate col titolo: *Gli Uccelli della provincia di Belluno*, a Feltre nel 1888, a mia insaputa. Ho distinto colle iniziali *B. F. C.*, i nomi volgari dei distretti di Belluno, Feltre e Cadore.

Digitized by Google

Zhurla (F.); *Zhorla dal bech ross* (C.). Scarso, ma sedentario ai monti.

Sturnus vulgaris, *Stornél* (B. F. C.). Abbondante di doppio passo nel Feltrino; scarso al piano nel Cadore.

Fringilla cœlebs, *Zhavátol*, *Finco*, *Finch* (B. F. C.). Frequente, nidificante e di doppio passaggio.

Fringilla Montifringilla, *Chéch*, *Montan* (B.); *Chéch* (F.C.). Frequente di passo in novembre e febbraio.

Montifringilla nivalis, *Talóch bianco* (B. C.). Frequente e sedentario ai monti nel Cadore.

Petronia stulta, *Matón da croda*, *Talóch ross* (F. C.). Scarsa ai monti, ma nidificante e sedentaria.

Passer montanus, *Sansiról*, *Zhelega*, *Panegas de montagna* (B.); *Zhilighéta* (F.); *Panegás de montagna* (C.). Frequente, sedentaria ed erratica.

Passer Italiæ, *Panegasson*, *Panegás* (B.); *Zhilega*, *Zhelega*, *Zhiliga de razha grande*, *Zhiligót* (F.); *Zhelega* (C.). Frequente, sedentaria ed anco di doppio passaggio.

Passer domesticus, *Panegás*, *Panegás nostran* (B.); *Panegás nostran* (C.). Frequente e sedentaria, nel Cadore sembra essere in aumento.

Coccothraustes vulgaris, *Sfrisón* (B.); *Frisón* (F.); *Frisón*, *Sfrisón* (C.). Frequente, nidificante e di passo; sembra essere in diminuzione.

Ligurinus Chloris, *Zheránt*, *Zharánt* (B. F.); *Zheránt*, *Feránt* (C.). Frequente, nidificante e di doppio passaggio.

Chloroptila Citrinella, *Sfredelin foresto* (B.); *Fraselin foresto* (F.); *Fredelin* (C.). Frequente e nidificante nel Cadore.

Chrysomitris Spinus, *Lugár*, *Lugrin*, *Lugret* (B.); *Lugherin* (F.); *Lugherin*, *Lugher* (C.). Frequente di doppio passo e anco nidificante.

Carduelis elegans, *Gardelin* (B. F. C.). Frequente, sedentario e di doppio passo.

Serinus hortulanus, *Sfredelin* (B.); *Fraselin* (F.), *Fredelin* (C.). Scarso, nidificante e di passo.

Cannabina Linota, *Faganél* (B. F.); *Faganél nostran* (C.). Frequente al piano, nidificante e di passo.

Digitized by Google

Ægiothus Linarius, *Lugherin todesco*, *Cecè*, *Cercè grande* (B.); *Lugherin todesco* (F.); *Conglit*, *Conglich* (C.). Di scarso e casuale passaggio nel Feltrino; scomparso da circa 20 anni nel Cadore.

Ægiothus rufescens, *Cecè*, *Cercè*, *Lugherin tedesco* (B. F.). Frequente e nidificante ai monti nel Cadore.

Pyrrhula europæa, *Subiot* (B.); *Subiót*, *Finch-subiót* (F.); *Subiót*, *Subióto* (C.). Frequente e sedentario, nidificante ai monti.

Loxia Pityopsittacus, *Crosnobel gran* (B.); *Becostorto*, *Osel todesco*, *Crosnobel grando* (C.). Scarso, ma nidificante e anco di doppio passo nel Cadore.

Loxia Curvirostra, *Crosnobel* (B. F.); *Becostorto*, *Osel todesco*, *Crosnobel piccolo*, dal tedesco Krummschnabel (C.). Frequente e nidificante nel Cadore; scarso e di passo nel Feltrino.

Miliaria Projer, *Pióch* (F.). Abbondante, nidificante al piano e anco di doppio passo nel Feltrino.

Emberiza Citrinella, *Verda* (B.); *Tarasega* (F.); *Verda bella* (C.). Frequente, nidificante e di doppio passo.

Emberiza Cirlus, *Verda brutta* (C.). Comune, nidificante e di doppio passo nel Cadore.

Emberiza Hortulana, *Ortolán* (B. F. C.). Frequente al piano, nidificante e di doppio passaggio.

Emberiza Cia, *Cip* (B.); *Zhit-gnoch* (F.). Frequente ai monti nel Feltrino, di doppio passaggio.

Emberiza Schœniclus, *Cia* (B.); *Péuca* (F.). Frequente di doppio passo al piano.

Calcarius nivalis, *Taloch bianco* (F.); *Osel della neve* (C.). Frequente ai monti nel Cadore, ove nidifica;[1] scarso di passo invernale nel Feltrino.

Melanocorypha Calandra, *Calandra* (B); *Calandra*, *Lodola can-*

[1] Questa notizia, che ritengo erronea, è forse dovuta al nome volgare in comune col Fringuello alpino (*M. nivalis*) che è davvero sedentario e nidificante nel Cadore.

Digitized by Google

tarina (F.). Di doppio passo, frequente e nidificante al piano nel Feltrino.

Calandrella brachydactyla, *Calandra* (B.); *Calandrina* (F.). Scarso di doppio passo e nidificante nel Feltrino.

Alauda arborea, *Calandra* (B.); *Antióla* (F.); *Calandra nostrana* (C.). Frequente, nidificante e di doppio passaggio.

Alauda arvensis, *Lodola* (B. F. C.). Comune, nidificante e di doppio passo; raramente sverna.

Galerita cristata, *Capelúa* (B.); *Capelúga* (F.); *Lodola col zhuf* (C.). Assai rara, di doppio passaggio.

Anthus pratensis, *Fista* (B.); *Zhit* (F.); *Fista piccola* (C.). Frequente e nidificante nel Cadore; abbondante, ma soltanto ai due passi, nel Feltrino.

Anthus trivialis, *Tordina*, *Pitaréla* (B.); *Tordina* (F.); *Tordina*, *Pitaróla* (C.). Comune, nidificante e di doppio passo.

Anthus Spipoletta, *Fistón* (B.); *Zhitón* (F.); *Fista granda* (C.). Frequente, nidificante e di doppio passaggio.

Budytes flavus, *Boarola zhala* (B.); *Pacéch* (F.); *Coacassola zhala*, *Coacassola bella* (C.). Frequente al piano; nidificante nel Cadore, di solo passaggio nel Feltrino.

Budytes cinereocapillus, *Boarina* (B.), *Coacassola*, *Cassola* (C.). Frequente al piano, nidificante e di doppio passo nel Cadore.

Budytes borealis, ? *Coacassola*, *Boarola* (B.). Di dubbiosa comparsa.

Motacilla alba, *Codacassola* (B.); *Boarina*, *Boarola* (F.); *Coacassola negra*, *Coacassola brutta* (C.). Frequente, nidificante e di doppio passo.

Calobates melanope, *Boarola* (B.); *Passerin* (F.); *Coacassola de montagna* (C.). Frequente, nidificante, di doppio passo e anche sedentaria.

Saxicola Oenanthe, *Culbianco* (B.); *Culbianch* (F.), *Cubianco*, *Pavarín grand* (C.). Frequente, nidificante e di doppio passo.

Saxicola albicollis, *Cubianco de montagna* (C.). Frequente (?), nidificante e di doppio passo nel Cadore.

Digitized by Google

Monticola saxatilis, *Codarossolón* (B.); *Codarossón*, *Coarosson* (F.); *Codarossón de montagna*, *Codaross salvarego* (C.). Nidificante e di doppio passo; frequente nel Cadore, scarso nel Feltrino.

Monticola Cyanus, *Passera*, *Passera solitaria* (F.). Scarsa, nidificante ai monti e di doppio passo nel Feltrino.

Merula nigra, *Merlo* (B. F.); *Merlo da bosco* (C.). Comune; sedentario, erratico e di doppio passo.

Merula torquata, *Colaina* (B.); *Tordo dalla colana*, *Tordo fassán* (F.); *Tordo dalla colaina*, *Tordol* (C.). Frequente e nidificante ai monti; anco di passo; più scarso nel Feltrino.

Turdus pilaris, *Tordo smarêr* (B.); *Gardena*, *Tordo della coa negra* (F.); *Tordo negro* o *ciach*, *Tordol* (C.). Abbondante: nidifica nel Cadore ed è soltanto di passo nel Feltrino.

Turdus iliacus, *Tordo zheselin* (B. C.); *Tordo zhisilót* (F.). Frequente di doppio passaggio.

Turdus musicus, *Tordo da ua* (B. F.); *Tordin* (F.); *Tordo zhit* (C.). Abbondante, nidificante ai monti e di doppio passo.

Turdus viscivorus, *Tordo gazhér* (B.); *Tordo gajér* (F.); *Tordo gaión*, *Tordol* (C.). Frequente, sedentaria ai monti e di doppio passo.

Aëdon Luscinia, *Russignól* (B. F. C.). Nidificante e di doppio passo; scarso nel Cadore, abbondante nel Feltrino.

Erithacus Rubecula, *Bet*, *Betúz*, *Betarél* (B.); *Betúzh*, *Betarél*, *Pitarél* (F.); *Betarél*, *Bét* (C.). Frequente e nidificante ai monti; scarso nell' inverno.

Cyanecula Wolfi, *Codarossól da palúch* (B.); *Codaross dal peto turchin* (F.). Di scarso passaggio in marzo nel Feltrino.

Ruticilla Phœnicurus, *Codarossól* (B.); *Codaróss*, *Coarós* (F.); *Codarós* (C.). Frequente di doppio passo e nidificante nel Cadore; di solo passaggio nel Feltrino.

Ruticilla titys, *Codarossol da sass* (B.); *Codarossol negro*, *Codaross de montagna* (F.); *Codaros spazzacamin* (C.). Frequente e nidificante ai monti nel Cadore; comune di solo passo nel Feltrino.

Digitized by Google

Pratincola Rubicola, *Batiale* (B. C.); *Zhimalét*, *Zhimal* (F.). Comune, nidificante e di doppio passo.

Pratincola Rubetra, *Machét* (B.). Frequente al piano, nidificante e di doppio passo.

Sylvia orphæa, *Bianchetón* (B. C.). Frequente al piano, nidificante e di passaggio nel Cadore.

Sylvia cinerea, *Boscardela* (B. F.); *Bianchét de bosch* (C.). Frequente, nidificante e di doppio passo.

Sylvia subalpina, *Monegheta* (B); *Boscardeléta* (F.). Scarsa, ma nidificante e di doppio passo.

Sylvia Curruca, *Boscardela* (B.); *Biancheta* (C.). Comune, nidificante e di doppio passo.

Monachus Atricapillus, *Caonero*, *Codazhil* (B.); *Caonegro* (F. C.). Scarsa, nidificante e di doppio passaggio.

Monachus hortensis, *Bianchét* (B. F. C.). Raro, nidificante e di doppio passo.

Phylloscopus sibilator, *Zalét* (B.); *Ciuit* (F.); *Zhuit*, *Ciuit* (C.). Frequente, nidificante e di doppio passo.

Phylloscopus Trochilus, *Ocio de bô* (B.); *Tuio*, *Ocio de bò* (C.). Frequente, nidificante e anche sedentario nel Cadore.

Phylloscopus Bonellii, *Dalin* (B.); *Tuio* (C.). Frequente, nidificante e di doppio passo nel Cadore.

Hypolais polyglotta, *Zalet* (B.); *Canevaról* (F.). Estivo, frequente e nidificante nel Feltrino.

Acrocephalus palustris, *Segalin*, *Zalet* (B.); *Canelin* (F.). Scarsa, estiva e nidificante al piano.

Acrocephalus arundinaceus, *Canelón* (B.); *Canaról*, *Becafigo da palù* (F.). Estivo, frequente e nidificante al piano nel Feltrino.

Calamodus schœnobænus, *Canelin* (B.).; *Palughin* (F.). Estivo, frequente e nidificante al piano nel Feltrino.

Troglodytes parvulus, *Reüzhol* (B.); *Regùz*, *Oselét del bosch*, *Galinazhéta* (F.); *Reuz*, *S-ciaruzol*, *Tre-tre*, *Ros-ciuz* (C.), Frequente ovunque, nidificante e anche di doppio passaggio.

Cinclus aquaticus, *Merlo d'acqua* (B. C.); *Merlo da acqua* (F.). Frequente e sedentario.

Digitized by Google

Accentor collaris, *Talóch griso* (B.); *Talóch*, *Moséca* (F.); *Talóch*, *Grison da croda*, *Maton* (C.). Sedentario ai monti; scarso nel Cadore, frequente nel Feltrino.

Accentor modularis, *Negróla* (B.); *Negróla*, *Moreta* (F. C.). Frequente, di doppio passo e nidificante nel Cadore.

Regulus cristatus, *Stelin* (B.); *Stélin*, *Caodóro* (F.); *Papa-moschin* (C.). Frequente, nidificante e di doppio passaggio.

Regulus ignicapillus, *Stelin* (B.); *Stélin*, *Caodóro* (F.). Scarso, nidificante ai monti e di doppio passo nel Feltrino.

Acredula rosea, *Codazhin*, *Codazhil* (B.); *Coalonga*, *Ocio de bŏ* (F.); *Perussola dalla coda longa* (C.). Comune; nidificante e di doppio passo nel Cadore, sedentaria nel Feltrino.

Parus major, *Parussola*, *Potaséca* (B.); *Peruzhola*, *Zerpignola* (F.); *Perussola granda* (C.). Frequente, nidificante e di doppio passo.

Parus ater, *Parussola todesca* (B.); *Peruzhola todesca* (F.); *Perussola todesca*, *Perussola da chéba* (C.). Frequente, nidificante ai monti e di doppio passo.

Cyanistes cæruleus, *Frarótol* (B.); *Peruzholin* (F.); *Perussola turchignola* (C.). Frequente, ma soltanto di doppio passaggio.

Pœcile palustris, *Parussola de la calota* (B.). Frequente, nidificante e di doppio passo.

Pœcile borealis, *Perussola moscona*, *Perussola bianchizha* (C.). Frequente e nidificante ai monti nel Cadore.

Lophophanes cristatus, *Perussola col zhuf* o *suffo* (C.). Frequente e sedentaria ai monti nel Cadore.

Sitta cæsia, *Becarán* (B.); *Becalegn medan*, *Becalegn curgiós* (F.). Scarso, ma sedentario nel Feltrino.

Certhia familiaris, *Becalégn* (B.); *Becalegnét* (F.); *Becalén* (C.). Frequente e sedentario ai monti.

Certhia brachydactyla, *Becalégn* (B.); *Becalegnét* (F.); *Becalén piccolo* (C.). Comune e sedentario.

Tichodroma muraria, *Becasás*, *Piombin da croda* (B.); *Becasás*, *Becamur*, *Osel della Madonna* (F.); *Osel dall' ojo* (C.). Fre-

Digitized by Google

quente e sedentario ai monti nel Cadore, più scarso nel Feltrino.

Oriolus Galbula, *Repéndol* (B.); *Compare-piero* (F.); *Barba-piero* (C.). Estivo e nidificante, più scarso nel Cadore.

Lanius Excubitor, *Redéstola* (B.); *Redestol falconier* (F.). Scarsa, ma nidificante nel Feltrino.

Lanius minor, *Requestolon lor* (B.); *Redestolón* (F.); *Revést de montagna* (C.). Estiva, scarsa e nidificante nel Cadore; più frequente nel Feltrino.

Lanius Collurio, *Redéstol* (B. F.); *Revést da campagna* (C.). Estiva, frequente e nidificante.

Lanius auriculatus, *Redést bastard* (B.); *Redéstol* (F.). Estiva, frequente e nidificante.

Muscicapa collaris, *Batiale* (B. F.). Estiva, nidificante e piuttosto frequente nel Feltrino.

Muscicapa Atricapilla, *Batiale* (B. F.). Estiva, nidificante e di doppio passo; frequente.

Butalis Grisola, *Batialón* (B.); *Machét* (F.). Estivo, scarso e nidificante.

Hirundo rustica, *Zhiliga* (B.); *Zhisila* (F.); *Zhiria*, *Zhiliga* (C.). Abbondante, estiva, nidificante e di doppio passaggio.

Chelidon urbica, *Rondol* (B.); *Rondolét dal cul bianch* (F.); *Rondina dal cu bianco* (C.). Abbondante, estivo, nidificante e di doppio passo.

Cotile rupestris, *Róndol* (B.); *Rondolét de croda*, *Rondolét griso* (F.); *Róndol da croda* (C.). Frequente ai monti e anco sedentaria nel Cadore; meno comune ed estiva nel Feltrino.

Cypselus Apus, *Róndol*, *Sbiro* (B.), *Rondón*, *Sbiro* (F.); *Rondolón*, *Sbiro* (C.). Comune, estivo, nidificante e di doppio passaggio.

Cypselus Melba, *Rondól grand* (B.); *Rondolón*, *Rondón de zhime* (F.); *Rondol de montagna* (C.). Estivo e frequente ai monti, ove nidifica.

Caprimulgus europæus, *Tetavache* (B. F.); *Tetavace* (C.). Estivo e comune.

Dryocopus martius, *Pigót negro* (B.); *Pigozh negro*, *Pigozhon*,

Digitized by Google

Becalegnón (F.); *Becalegn negro*, *Pigót moro* (C.). Frequente e sedentario ai monti.

Picus major, *Pigót todesch* (B.); *Pigozh*, *Becazóch* (F.); *Becalegn ross* (C.). Comune e sedentario.

Picus medius, *Pigót ross* (B.); *Pigozh*, *Becazóch* (F.). Scarso, ma sedentario nel Feltrino.

Picus minor, *Becalegn* (B.); *Pigozhét*, *Becazóch* (F.); *Becalegn* Frequente e sedentario.

Gecinus viridis, *Pich*, *Pigót* (B.); *Becalegn*, *Pigozh verdo* (F.); *Pigót verdo* (C.). Comune e sedentario.

Gecinus canus, *Pigót* (B.); *Pigózh*, *Becazóch* (F.). Scarso, ma sedentario ai monti nel Feltrino.

Iÿnx Torquilla, *Codatórcol* (B.); *Coatórcol* (F.); *Contorcol* (C.). Di doppio passaggio, scarso nel Cadore, frequente nel Feltrino.

Cuculus canorus, *Cuch* (B. F.); *Cuco*, *Cuch* (C.). Estivo e frequente.

Alcedo Ispida, *Piombin da acqua*, *Piombin* (B. F.). Frequente e sedentario al piano nel Feltrino.

Upupa Epops, *Búbola* (B.); *Pochéta*, *Galét* (F.), *Galét de montagna* (C.). Scarsa, estiva e nidificante.

Strix flammea, *Barbagian* (B. F. C.). Scarso, ma sedentario.

Syrnium Aluco, *Sbarégol* (B.); *Sbéregh* (F.). Scarso ai monti, ma sedentario.

Nyctala Tengmalmi, *Zhiveta da croda* (B.); *Zhivitn da croda*, *Zhivitón* (F.); *Zhuita da campagna* (C.). Scarsa, ma sedentaria nel Cadore.

Asio Otus, *Cióch* (B.); *Burububû* (F.); *Ciò* (C.). Frequente e sedentario nel Cadore, più scarso nel Feltrino.

Athene Noctua, *Zhiveta* (B.); *Zhivita*, *Zhuita*, *Zhoéta* (F.); *Zhuita* (C.). Sedentaria; frequente nel Cadore, più scarsa nel Feltrino.

Scops Giu, *Zhus* (B. F. C.). Estivo, frequente e nidificante.

Bubo maximus, *Dugo* (B. F. C.). Sedentario; frequente nel Cadore, meno comune ed erratico nel Feltrino.

Circus æruginosus, *Falchét paluder* (B.). Scarso, di doppio passo al piano.

Digitized by Google

Circus cyaneus, *Falchét* (B.); *Auzhel dalle pite*, *Falchét* (C.). Frequente e nidificante nel Cadore.

Circus cineraceus, *Falchét* (B.); *Falchét*, *Galinél* (C.). Non rara, sedentaria e nidificante nel Cadore.

Circaëtus gallicus, *Astór* (C.). Frequente e sedentario ai monti nel Cadore.

Aquila Chrysaëtus, *Aquila* (B. F. C.). Scarsa, ma sedentaria ai monti.

Buteo vulgaris, *Pojana* (B. C.); *Pojana*, *Guia*, *Avión* (F.). Frequente, nidificante e di doppio passo nel Cadore; sedentaria nel Feltrino.

Pernis apivorus, *Pojana* (B.). Scarso e forse nidificante al piano.

Falco Peregrinus, *Falchét* (B. C.); *Falchét*, *Oselazh* (F.). Sedentario ai monti; scarso nel Cadore, frequente nel Feltrino.

Hypotriorchis Subbuteo, *Falchét* (B. F.). Frequente di doppio passo nel Feltrino.

Æsalon regulus, *Falchét* (B.); *Astoréla*, *Storéla* (F.). Frequente di doppio passo e forse nidificante nel Feltrino.

Cerchneis Tinnunculus, *Storéla* (B.); *Falchèt de tore*, *Storéla da campanil* (F.). Scarso, ma sedentario.

Cerchneis Naumanni, *Galinél*, *Storéla piccola* (F.). Estivo e non raro nel Feltrino.

Cerchneis vespertinus, *Falchét*, *Storéla* (B.). Comune, estivo e nidificante.

Astur palumbarius, *Sparvier da colombi* (B.); *Astór* (F. C.). Frequente e sedentario ai monti, più scarso nel Feltrino.

Accipiter Nisus, *Sparvier*, *Filandél* (B.); *Sparvier*, *Falchetin* (F.), *Galinél* (C.). Frequente e sedentario.

Gypaëtus barbatus, *Storázh*, *Falcón* (F.). Scarsa, ma sedentaria sugli alti monti del Feltrino.

Ardea cinerea, *Airón* (B.); *Airon zhenerin* (F.). Scarso al piano in aprile.

Ardea purpurea, *Airón* (B.). Scarso, di doppio passo al piano.

Egretta alba, *Airón bianco* (B. F.). Di casuale comparsa d' inverno al piano.

Ardea Garzetta, *Airón bianco* (B.). Rara, di doppio passo al piano.

Digitized by Google

Ardetta minuta, *Tarabús* (B.); *Tarabusét* (F.). Di scarso passaggio e forse nidificante al piano.

Botaurus stellaris, *Tarabúso* (B. F.). Accidentale nel Cadore, frequente al piano di doppio passo nel Feltrino.

Nycticorax griseus, *Airon dal becol negro* (B.); *Tarabúso zhenerin*, *Tarabús dalle ongie col péten* (F.). Scarso al piano, di passo in aprile.

Ciconia alba, *Zhicogna* (B.). Scarsa di doppio passaggio al piano.

Anser cinereus, *Oca grande* (B.); *Och*, *Oca salvarega* (F.). Di scarso passaggio, specialmente in marzo, nel Feltrino.

Anser segetum, *Oca pizhola* (B.); *Och*, *Oca salvarega* (F.). Di scarso passaggio in marzo.

Anas Boscas, *Anera salvarega*, *Mazurin* (B.); *Anera grossa*, *Mazhorin* (F. C.). Frequente, di doppio passaggio e anche nidificante al piano nel Feltrino.

Dafila acuta, *Anera subiota* (B.); *Anera vis-ciarola*, *Anera della coa longa* (F.). Di scarso doppio passaggio al piano.

Spatula clypeata, *Anera salvarega* (B.); *Anerón* (F.). Di scarso passaggio al piano in aprile.

Mareca Penelope, *Anera medana* (B.). Di scarso doppio passo al piano.

Nettion Crecca, *Crecola* (B.); *Crecola*, *Crecoléta* (F.). Frequente di doppio passo al piano.

Querquedula Circia, *Crecola* (B.); *Crecoléta* (F.). Di passo abbondante in marzo ed aprile.

Fulix ferina, *Moréta* (B.). Di scarso doppio passo.

Fulix Fuligula, *Moréta* (B.); *Crecola mora* (F.). Di doppio passaggio abbondante.

Mergus Merganser, *Anerón dal bech sotil* (F.). Di scarso passaggio nell' inverno.

Columba Palumbus, *Grotón dalla colana* (B.); *Colombo salvarego*, *Grotón* (F.); *Colombo salvarego* (C.). Frequente, nidificante e di doppio passo.

Columba Oenas, *Grotón* (B.); *Colombo salvarego* (F. C.). Frequente, nidificante e di doppio passo nel Cadore; più scarsa e di solo passo nel Feltrino.

Digitized by Google

Turtur tenera, *Tortora*, *Tortorela* (B. C.); *Tortorela* (F.). Estiva e nidificante; frequente nel Cadore, scarsa nel Feltrino.

Perdix saxatilis, *Cotorno* (B.); *Cotorno*, *Catórn* (F.); *Cotorno*, *Catór* (C.). Frequente e sedentaria ai monti.

Starna Perdix, *Pernise* (B. C.); *Pernise*, *Parnis* (F.). Frequente, nidificante e anche di doppio passo.

Coturnix communis, *Quaja*, *Quajót* (B. F. C.). Frequente, nidificante e di doppio passo; raramente sverna.

Tetrao Urogallus, *Gal çedron* (B.); *Zhedron*, *Galzhedrón* (F.); *Gal zhedrón*, *Grotón* (C.). Scarso, sedentario ai monti; va diminuendo.

Lyrurus Tetrix, *Forzhél*, *Gal forzhél* (B. F.); *Gal forzhél*. *Gal lauriót* (C.). Scarso e sedentario ai monti; va diminuendo.

Bonasa betulina, *Francolin* (B. F. C.). Sedentario ai monti; frequente nel Cadore, più scarso nel Feltrino.

Lagopus mutus, *Galina bianca* (B.); *Galineta*, *Biancheta* (F.); *Pita bianca*, *Pita da giara* (C.). Frequente e sedentario ai monti.

Rallus aquaticus, *Sforzhana* (B. C.); *Sforzhanòn* (F.). Frequente, nidificante e di doppio passo al piano nel Feltrino.

Ortygometra Porzana, *Forzana*, *Pit* (B.); *Ral*, *Realét*, *Ralet* (F.). Frequente, nidificante e di doppio passo al piano nel Feltrino.

Ortygometra Bailloni, *Fogieta* (B.); *Sforzhanéla* (F.). Scarsa di doppio passo al piano.

Ortygometra parva, *Fogieta* (B.); *Sforzhanéla* (F.). Scarsa, di doppio passo al piano.

Crex pratensis, *Re da quaje* (B.); *Baréch*, *Requajo* (F.). Frequente, nidificante e di doppio passo nel Feltrino.

Gallinula chloropus, *Sfogio* (B. F.). Comune, nidificante e di doppio passo al piano nel Feltrino.

Fulica atra, *Fólega* (B. F. C.). Accidentale nel Cadore; di scarso doppio passo nel Feltrino.

Grus communis, *Grua*, *Gru* (B. F. C.). Di casuale comparsa.

Otis Tetrax, *Dindio* o *Dinzio salvarego* (F.). Di casuale comparsa in autunno e nella primavera.

Digitized by Google

Œdicnemus scolopax, *Corlicón* (B. F.). Scarso, ma nidificante e di doppio passo nel Feltrino.

Charadrius Pluvialis, *Coridór* (B. F.). Scarso, di doppio passaggio nel Feltrino.

Eudromias Morinellus, *Corlich* (B.). Di scarso passaggio in aprile ed agosto.

Ægialitis curonica, *Corlichét* (B.); *Corlich* (F.). Scarso, ma nidificante e di doppio passo nel Feltrino.

Ægialitis Hiaticula, *Corlicón* (B.); *Coridorón* (F.). Scarso, di passo in primavera nel Feltrino.

Vanellus Capella, *Paonzhin* (B.); *Pavonzhin* (F.). Scarsa di doppio passo.

Tringoïdes Hypoleucus, *Gravotól* (F.). Frequente, nidificante e di doppio passo nel Feltrino.

Totanus Ochropus, *Culbianch da acqua* (B. F.). Scarso al piano da settembre a maggio.

Scolopax Rusticula, *Galinazha* (B. F. C.). Frequente, nidificante e di doppio passo.

Gallinago major, *Ciochéta* (B. F.). Di scarso doppio passaggio nel Feltrino.

Gallinago cælestis, *Becanót* (B. F. C.). Scarsa nel Cadore al piano; frequente da luglio a mezzo aprile nel Feltrino.

Gallinago Gallinula, *Becaréla* (B. F.). Frequente al piano dalla metà di ottobre alla metà di aprile.

Numenius Arquata, *Arcada* (B.). Di casuale comparsa.

Hydrochelidon nigra, *Zhisilón de mar* (F.). Di scarsa comparsa al piano nel maggio.

Chroocephalus ridibundus, *Cocál* (B. F.). Accidentale al piano d'inverno.

Podiceps cristatus, *Sotaról* (B.) Di scarso doppio passo al piano.

Podiceps cornutus, *Sotaról* (B.). Di casuale passaggio in aprile ed agosto.

Podiceps nigricollis, *Sotaról* (B.). Di scarso passaggio in aprile ed agosto.

Podiceps fluviatilis, *Ral* (B.); *Pít da acqua* (F.). Scarso, ma sedentario nel Feltrino.

Digitized by Google

Udine[1] (Vallon Graziano):

La provincia del Friuli racchiude in sè tutte le specie di terreno e tutte quelle delle acque. Noi abbiamo le Alpi che la delimitano completamente a settentrione e la dividono dalle provincie dell'Austria Ungheria; i colli, che occupano buona parte del suolo e che cominciano al basso limite dei monti; i piani, coltivati a granaglie, viti e gelsi; l'estese praterie, non sempre fertili a cagione del terreno ghiaioso; i terreni acquitrinosi, ricoperti da una vegetazione ubertosa e finalmente i terreni paludosi. La provincia conta molti fiumi, fiumi-torrenti, laghi, 19 chilometri di litorale ed altrettanti di laguna. I boschi abbondano in generale sui monti della Carnia, ve ne sono però di abbastanza estesi anche in pianura; i colli sono per buona parte coltivati, del resto coperti d'una discreta vegetazione. Nel piano, come è già detto, vengono coltivati soltanto i gelsi e le viti e tranne nei siti ove i ruscelli o in generale le acque abbondano, imprimendo ai terreni adiacenti un carattere particolare, mancano gli alberi e persino le piante basse.

Nel distretto di Udine, che giace in perfetta pianura, abbiamo due torrenti, asciutti la maggior parte dell'anno, ma che pure mantengono sufficiente verdura alle loro sponde; contiamo alcune roggie che non seccano mai e che quindi danno vita ad una gran quantità di piante, che in certi punti formano dei folti boschetti o almeno una serie densa e continuata di siepi. È qui soltanto che gli uccelli insettivori possono trovare comoda stanza, e difatti all'epoca dei due passi varie specie e masse d'individui vi si fermano per qualche tempo. I granivori di passo tirano via, fatta forse eccezione per la Peppola (*Fringilla Montifringilla*) che ho incontrata di frequente nei campi coltivati. Ad eccezione della Poiana comune (*Buteo vulgaris*) e del Gheppio

[1] Per il distretto di Udine le osservazioni sono state fatte costantemente tutto l'anno; per quello di Codroipo soltanto durante l'epoca della nidificazione; per la provincia in generale, a seconda della possibilità, la maggior parte però nell'autunno e nell'inverno. (*Vallon*).

Digitized by Google

(*Cerchneis Tinnunculus*) che sono sedentarî, non incontriamo che rari assai degli Sparvieri (*Accipiter Nisus*) giovani o qualche Albanella (*Circus*); gli altri Rapaci continuano le loro strade e non pagano quindi nessun tributo al distretto. Degli acquatici non parliamo neppure, sebbene nelle roggie sia stato ucciso più d'una volta il Germano reale (*Anas Boscas*). Comunissimi nelle praterie sono le Lodole (*Alauda*), lo Strilozzo (*Miliaria Projer*), la Quaglia (*Coturnix communis*); abbastanza frequente l'Ortolano (*Emberiza Hortulana*), il Cardellino, il Verdone, la Sterpazzola, il Saltimpalo, ec. In generale, diciamolo subito, il distretto è povero di specie non solo, ma anche di individui.

Da siffatta povertà, passiamo all'esuberante ricchezza; il distretto di Codroipo è un vero Eldorado. Qui le specie sono molteplici, il numero degli individui incalcolabile. Gran parte del terreno è acquitrinoso ed un' infinita quantità di ruscelli, di piccoli fiumi, di roggie, di canali, lo solca in tutte le direzioni. La vegetazione in certi punti è imponente, ricca dappertutto; il terreno è perfettamente piano e la terra, parlando in generale, molto produttiva. Vi crescono bene anche le viti e non di rado incontransi, specialmente laddove le acque non padroneggiano troppo, degli estesi vigneti, fiancheggiati dagli immancabili gelsi. Le granaglie producono sufficientemente, e così la canape. Molini abbondano ed è ben naturale in siti dove i fiumi ed i canali sono così frequenti.

È facile a comprendere che in siffatti luoghi straricchi di tutto quello che può allettare gli uccelli, essi vi prendano dimora, e che quindi il materiale offrentesi allo studioso di Ornitologia sia della più alta importanza. In primavera e in estate il numero degli uccelli nidificanti è addirittura favoloso; non si fanno più di venti passi da un nido all'altro per le specie d'indole gregaria; talvolta anzi uno sta disopra dell'altro. Mi è occorso spesso di trovare p. es., un nido di Capinera (*Monachus Atricapillus*) nel cespuglio, che cresceva al piede d'un albero, nel quale il Codibugnolo aveva fabbricato l'artistica sua culla; oppure di

Digitized by Google

rinvenir nei bassi giunchi il nido della Cannajola verdognola (*Acrocephalus palustris*) e sospeso a quello su d'un ramo più alto, l'impareggiabile costruzione del Pendolino (*Ægithalus pendulinus*); il Tordo, la Cingallegra e l'Usignuolo, li ho trovati nidificanti nel medesimo albero, la Sterpazzola (*Sylvia cinerea*) con la Ballerina (*Motacilla alba*), ec.

Secondo le mie osservazioni non meno di sessantasei specie vi nidificano, altre tre ne posso aggiungere per osservazioni altrui, delle quali punto non dubito, per cui abbiamo in un distretto soltanto quasi la metà del complessivo (148) delle specie che nidificano nell'intera provincia. Fino ad oggi, anno per anno, ho scoperto qualche nuova specie prolificante ed ho radunato in proposito un rilevante materiale di studio. Le specie più rare di Sylvie hanno qui stanza estiva, in generale gran parte dei Boscherecci vi nidificano, lo stesso dirò di alcuni Pigliamosche, di alcune Cincie, dei Tordi, delle Cutrettole, delle Sciabiche, ec. Durante i due passi incontriamo buon numero di uccelli di ripa, vari acquatici e gabbiani. Anche i Rapaci hanno i loro rappresentanti, specialmente in primavera e qualche specie vi nidifica.

Elenco generale delle specie di uccelli che si trovano nella provincia di Udine, coi nomi volgari locali ed indicazioni di frequenza ecc., nonchè notizie sulla migrazione e sulla nidificazione ecc.[1]

Corvus Corax, *Corvàtt.* Scarso, sedentario forse ai monti, erratico nell'autunno.

Corvus Corone, *Çòre.* Abbastanza frequente, nidifica sui monti della Carnia.

---

[1] Il signor Vallon mentre si stampava la mia *Avifauna Italica* aveva sotto il torchio un lavoro speciale sugli uccelli di questa provincia,

Digitized by Google

Corvus Cornix, *Çòre*. Frequente ovunque.

Corvus frugilegus, *Corvàtt*. Invernale a branchi; 2.

Lycos Monedula, *Çòre*. Non comune in branchetti.

Nucifraga Caryocatactes, *Fráche nólis*. Scarsa, nidifica nei boschi montuosi della Carnia; in ottobre per pochi giorni vedonsene molte sulle colline, nel 1885 questo passo fu eccezionalmente abbondante.

Pica rustica, *Badàscule*, *Chèche*. Comunissima e sedentaria; nidifica in marzo ed aprile, usualmente sugli alberi più alti; il 1° maggio 1884 trovai però un nido nel folto di un cespo a 20 cent. dalla superficie dell'acqua. Depone 5-7 uova, incubate dai due genitori per 19-21 giorni; 3.

Garrulus glandarius, *Chèche*, *Giàje mate*. Comune ovunque e sedentaria, nidifica nell'aprile e maggio; 5-7 uova incubate per 2 settimane; 10.

Pyrrhocorax alpinus, *Mièrli di mòntagne*. Comune e sedentatario ai monti, nidifica sopra Pontebba.

Sturnus vulgaris, *Sturnèll*. Comune e stazionario. Due covate, aprile e giugno; 5-6 uova, incubate 15 giorni dalla femmina; 161.

Pastor roseus, *Mièrli ross*. Avventizio, un giovane fu colto presso Udine il 21 settembre 1884.

Fringilla cœlebs, *Franzèll*. Comunissimo e sedentario. Cova in maggio 5-6 uova M. e F. per 14 giorni; 16056.

Fringilla Montifringilla, *Montàn*, *Zavàtul*. Invernale abbondante. Anco nidificante, in maggio-giugno, dunque sedentaria; 3460.

Petronia stulta. Non comune, nidifica presso Sacile.

Passer montanus, *Passere di çiàmp*. Comunissima. Fa varie covate di 4-7 uova da aprile ad agosto; 11800.

---

frutto di sette anni di continue e pazienti ricerche; esso vide la luce nel *Bullettino* della Società adriatica di Scienze Naturali in Trieste (Vol. IX, n. 2, 1886), col titolo: *Note sull' Avifauna del Friuli*. Mi sono specialmente giovato qui del pregevole lavoro. Il numero dato in fine alle notizie di molte specie indica quello degli individui notati dal signor Vallon sul mercato di Udine dal 15 agosto a tutto il 31 dicembre 1886.

Digitized by Google

Passer Italiæ, *Pàssare tàliane*. Comunissima e sedentaria. Fa varie covate da marzo-agosto di 4-7 uova; covano M. e F. per 15 giorni; 722.

Passer domesticus, *Pàssare*, *Pàeserot*, il masch. Comune e sedentaria. Fa varie covate di 4-7 uova da marzo ad agosto, incubano M. e F. per 15 giorni; 125.

Coccothraustes vulgaris, *Frisòtt*. Comune e nidificante, emigra nell'inverno. Fa due covate di 3-5 uova in maggio e luglio; covano M. e F. per 14-16 giorni; 679.

Ligurinus Chloris, *Ciràut*. Comune e sedentario. Fa due covate di 4-6 uova in maggio-luglio; incuba la sola femmina per 15 giorni; 537.

Chrysomitris Spinus, *Lùjar*. Comune da ottobre ad aprile; fors'anche nidificante; 719.

Carduelis elegans, *Gardèl*. Frequente, talvolta sverna. Cova 5-6 uova da marzo-giug.; M. e F. per 12-15 giorni; 407.

Serinus hortulanus, *Sverzelìn*. Raro, ma nidific. nel giugno; 6.

Cannabina Linota, *Faganèll*. Assai comune nell'autunno; 1228.

Ægiothus rufescens, *Sverzùl*. Raro, giunge irregolarmente al piano in novembre e dicembre, nidifica molto probabilmente ai monti; 7.

Pyrrhula europæa, *Sivilòtt*. Comune, nidifica ai monti nel maggio, giunge al piano per emigrare, tornando in aprile; 5.

Loxia Curvirostra, *Bec in cros*, *Crosnòbl*. Abbastanza comune nei boschetti, al piano ed in collina nel dicembre; 1.

Euspiza melanocephala, *Re di Ortolán*. Piuttosto raro, estivo. Cova in maggio 4-5 uova per 15 giorni; 1.

Miliaria Projer, *Sdrunàl*, *Petàss*. Abbondantissimo nell'estate, più scarso nell'inverno. Fa due covate, aprile e giugno di 3-6 uova, incubate da M. e F. per 15-16 giorni; 500.

Emberiza Citrinella, *Smajàrd*. Comunissimo e sedentario. Cova nel maggio 3 4 uova, 2163.

Emberiza Cirlus. Raro e di comparsa irregolare nell'autunno; 3.

Emberiza Hortulana, *Ortolàn*. Estivo e abbondante. Cova nel maggio-giugno 3-5 uova per 15 giorni; 11.

Digitized by Google

Emberiza cæsia. Di comparsa accidentale; 5.

Emberiza Cia, *Cipp.* Comune assai e nidificante. Cova nel maggio e giugno 4 uova; 826.

Emberiza rustica. Accidentale, il 4 dicembre 1886; 1.

Emberiza pusilla. Accidentale.

Emberiza Schœniclus, *Ciù.* Assai comune e sedentario. Fa due covate, maggio e luglio, 4-6 uova per 15 giorni; 460.

Emberiza pyrrhuloïdes. Accidentale.

Calcarius nivalis, *Ortolàn di montagne.* Non raro, invernale.

Melanocorypha Calandra, *Calándre* (?). Rara, invernale; 1.

Calandrella brachydactyla, *Lodùle di campàgne.* Accidentale.

Alauda arborea, *Calandrâtt.* Comune e sedentaria. Cova in aprile 3-5 uova; 617.

Alauda arvensis, *Lodùle.* Comunissima e sedentaria. Fa tre covate, marzo, maggio e luglio, 4-6 uova; incubano M. e F. per 15 giorni; 1709.

Galerita cristata, *Lodùle çhapelùde.* Comune e sedentaria. Fa tre covate, marzo, maggio e luglio, 3-6 uova; cova la sola F. 13-14 giorni; 68.

Agrodroma campestris, *Calandròn* (?). Scarso, nidificante. Cova nel maggio 5 uova per 15 giorni; 2.

Corydalla Richardi, *Calandrìn.* Raro, nidificante. Cova nel maggio 4 uova.

Anthus pratensis, *Uìte.* Comunissima e sedentaria. Fa due covate, aprile e giugno, di 5-6 uova; 7790.

Anthus trivialis, *Dordìn.* Comune di passo e nidificante. Cova nel maggio 4-5 uova per 14 giorni; 4657.

Anthus Spipoletta, *Uìtatt.* Frequente nell'autunno; 766.

Budytes flavus, *Pastorèle zàle.* Estivo e comune. Cova nel maggio 5-6 uova la sola femmina per 13 giorni; 12.

Budytes cinereocapillus. Scarsa ed estiva. Cova in maggio e giugno; 1.

Motacilla alba, *Pastorèle blànçhe, Scassaçòde.* Comune, sedentaria. Due covate, aprile-giugno 4-7 uova, sola femmina per 15 giorni; 159.

Calobates melanope, *Armentarèsse, Boarine.* Comune e seden-

Digitized by Google

taria. Due covate, aprile-giugno, 4-6 uova; covano M. e F. per 14 giorni; 97.

Saxicola Oenanthe, *Culètt.* Comune ed estivo. Cova nel maggio 4-6 uova; 762.

Saxicola Stapazina, *Favrètt.* Scarsa, ma nidificante. Cova nel maggio 6 uova.

Monticola saxatilis, *Codàross di montagne.* Estivo. Cova in giugno 5-6 uova; M. e F. per 14-16 giorni; 28.

Monticola Cyanus, *Pásser solitári.* Scarsa ed estiva. Cova in maggio-giugno 5 uova; 18.

Merula nigra, *Miérli.* Comunissimo e sedentario. Fa due covate, marzo-giugno, 4-6 uova; M. e F. per 13-16 giorni; 154.

Merula torquata, *Miérli de goláine.* Non raro e apparentemente sedentario ai monti; nidifica nel maggio.

Turdus pilaris, *Zenevròn.* Abbondante da novem. a marzo; 30.

Turdus iliacus, *Sgrisul.* Di passo copioso in novembre e marzo; 171.

Turdus musicus, *Dórde.* Frequente e nidificante. Cova in aprile e giugno, 3-5 uova per 15 giorni; 1605.

Turdus viscivorus, *Dórde.* Comunissima e nidificante. Fa due covate, marzo-giugno, 3-5 uova, incubate per 15 giorni; 93.

Aëdon Luscinia, *Rusignùl.* Estivo e comunissimo. Cova in maggio-giugno 4-6 uova; M. e F. per 15 giorni; 28.

Erithacus Rubecula, *Petaròss.* Comunissimo e sedentario. Cova in maggio-giugno 6 uova, M. e F. per 15 giorni; 941.

Cyanecula Wolfi, *Petaròss turchin.* Scarso di passo autunnale; 1.

Ruticilla Phœnicurus, *Codaròss.* Estivo e comune; 519.

Ruticilla titys, *Scodaròss.* Non comune, invernale; 2.

Pratincola Rubicola, *Porçhiarùte*, *Grisùtt*, *Grisùte.* Comune e sedentario. Cova in aprile e giugno 6 e 4-5 uova per 15 giorni; 497.

Pratincola Rubetra, *Grisùtt.* Estivo e piuttosto scarso. Cova in maggio-giugno 5-6 uova per 13-15 giorni; 701.

Sylvia nisoria, *Blançhetòn.* Estiva e non rara. Nidifica in maggio-giugno, 5-6 uova incubate dalla femmina per 15 giorni; 1.

Digitized by Google

Sylvia orphæa, *Moratulòn*. Piuttosto rara ed estiva. Cova in maggio-giugno, 3-5 uova incubate dalla fem., 15 giorni.

Sylvia cinerea, *Moràtule*. Comunissima ed estiva. Fa due covate, aprile e giugno, 4-6 uova incubate 11-12 giorni; 79.

Sylvia Curruca, *Moràtule*, ? *Çhacurùte*. Rara ed estiva. Fa due covate, aprile e giugno; 4-6 uova covate da M. e F., 15 giorni; 54.

Monachus Atricapillus, *Caponeri*. Comunissima, forse sedentaria. Fa due covate, maggio e luglio, 4-6 uova da M. e F. per 15 giorni; 198.

Monachus hortensis. Estivo e non tanto comune; 304.

Agrobates familiaris. Accidentale; 1.

Phylloscopus sibilator, *Çiu-çàu*. Comune ed estivo. Una covata in maggio di 5-6 uova, incubate 13 giorni; 76.

Phylloscopus Trochilus, *Papemosçhin*. Abbondante ed estivo. Cova in aprile 5-7 uova per 13 giorni; 507.

Phylloscopus rufus, *Papemosçhin*. Piuttosto scarso. Cova in aprile 5-7 uova per 13 giorni; 1.

Hypolais icterina, *Beccafigo*, (*Papefigh*) (?). Estivo e scarso. Cova in maggio-giugno 4-6 uova.

Hypolais polyglotta, *Uètt*. Estivo e comune. Cova in giugno 5 uova; incubano M. e F; 52.

Acrocephalus palustris. Estiva e piuttosto comune. Cova in maggio-giugno 3-5 uova, la sola femmina per 13 giorni; 27.

Acrocephalus streperus. Estiva e piuttosto rara. Cova in maggio-giugno 5 uova.

Acrocephalus arundinaceus, *Re di Rusignùl*. Estivo e comune. Cova in mag.-giug. 3-6 uova per 14-17 giorni; 1.

Calamodus schœnobænus. Estivo, nidificante, ma scarso; cova nel maggio.

Calamodus aquaticus. Comune ed estivo. Nidifica in maggio-giugno, uova 4-5 covate dalla femm. per 15 giorni; 14.

Lusciniola melanopogon. Scarsa, ma nidificante nel giugno, depone 3-5 uova.

Locustella nævia. Scarso nell' autunno.

Potamodus luscinioïdes. Accidentale.

Digitized by Google

Cettia Cettii, *Rusignùl matt.* Abbastanza comune e sedentario. Fa due covate in aprile e giugno, 4-5 uova incubate per 14 giorni.

Troglodytes parvulus, *Favìte.* Comune e sedentario. Cova 7 uova nel maggio per 15 giorni; M. e F; 20.

Cinclus aquaticus, *Mièrli d' àghe.* Frequente e sedentario. Cova la femmina 4-6 uova per 15-16 giorni nel maggio; 1.

Accentor collaris. Frequente e sedentario; 15.

Accentor modularis, *Passare çharandine.* Comune, nidificante. Fa due covate, maggio-luglio di 4-6 uova; 294.

Accentor montanellus. Accidentale.

Regulus cristatus, *Stelìn.* Frequente e sedentario. Cova in maggio; 11.

Regulus ignicapillus, *Repipìn.* Abbondante e sedentario. Cova in maggio; 13.

Ægithalus pendulinus, *Mulinarie.* Estivo e frequente. Cova in maggio-giugno 4-5 uova per 15-17 giorni; M. e F.

Acredula caudata, *Parùssole de còde lunge.* Accidentale.

Acredula rosea, *Parùssole de còdè lunge.* Comunissima e sedentaria. Cova in aprile e giugno 10-14 uova; M. e F. per 15 giorni; 3.

Parus major, *Parùssule.* Comune e sedentaria. Fa due covate, maggio e luglio di 8-10 e 6-9 uova, incubano 12-15 giorni M. e F; 216.

Parus ater, *Parùssule mate.* Piuttosto comune, nidificante.

Cyanistes cæruleus, *Parussulìn.* Piuttosto scarsa, sedentaria. Cova in maggio 6-8 uova per 12-15 giorni; M. e F; 13.

Pœcile palustris, *Parùssule grise.* Comune e nidificante; covano M. e F. in aprile-maggio 7-11 uova per 15 giorni. Passa in marzo ed ottobre; 4.

Lophophanes cristatus. Piuttosto rara, sedentaria ai monti; nidifica nel giugno, 5 uova.

Sitta cæsia, *Çui.* Comune, nidificante in aprile e maggio, depone 6-8 uova incubate dalla fem. per 12-14 giorni.

Certhia brachydactyla, *Rampigìn.* Frequente e nidificante.

Digitized by Google

Tichodroma muraria, *Ragnàr*. Scarso e nidificante ai monti.

Oriolus Galbula, *Luri*, (*Pápefig*). Estivo e frequente. Una covata, fine aprile e maggio, 4-5 uova incubate da M. e F. 15 giorni; 14.

Ampelis Garrulus. Accidentale, molti presi nel 1876.

Lanius Excubitor, *Giàrle zìmule*. Non rara, invernale; 8.

Lanius minor, *Giàrle zìmule*. Estiva e frequente. Cova in maggio e giugno 4-7 uova per 13-15 giorni; 57.

Lanius Collurio, *Giàrle fajàne*. Estiva e comunissima. Cova in maggio-giugno 5-6 uova per 14-16 giorni, la sola femmina; 352.

Lanius auriculatus, *Giàrle*. Estiva e piuttosto rara. Cova in maggio-giugno 5-6 uova 14-16 giorni, la sola femmina; 20.

Muscicapa Atricapilla. Piuttosto comune, estiva. Cova in maggio-giugno 6 uova per 13-15 giorni, M. e F.; 207.

Butalis Grisola, *Sçhassealis*, (*Batiàlis*). Estivo e frequente. Cova in maggio-giugno 3-5 uova 14 giorni, M. e F.; 200.

Hirundo rustica, *Cisìle*. Abbondante dal marzo al settembre; due covate, maggio e luglio; 4 a 6 uova covate dalla sola femmina per 15-16 giorni.

Chelidon urbica, *Rondìn*. Comune dal marzo all'ottobre; due covate, maggio e luglio, 4 a 6 uova; incubate per 14 giorni dalla sola femmina.

Clivicola riparia, *Ròndul*. Raro assai.

Cypselus Apus, *Rondòn*, *Sbìro*. Comune ed estivo. Fa due covate in maggio e luglio, di 2-3 uova, covate dalla sola femmina per 15 giorni.

Caprimulgus europæus, *Bochàss*. Estivo e frequente; giunge in aprile, nidifica in maggio, parte nel settembre.

Dryocopus martius, *Picc*. Scarso e sedentario ai monti.

Picus major, *Picc de coròne*. Comune e sedentario, nidifica in maggio; 2.

Picus medius, *Picc mezzàn*. Accidentale.

Picoïdes tridactylus. Scarso, ma sedentario ai monti.

Gecinus viridis, *Picc verd*. Comune e sedentario; nidifica nel maggio; 9.

Digitized by Google

Gecinus canus, *Picc gris.* Scarso e, pare, sedentario.

Iynx Torquilla, *Furmiàr*, *Cuell stuàrt.* Estivo e comune, 10.

Cuculus canorus, *Cucc.* Estivo e frequente; giunge in aprile parte in ottobre, Depone le uova nel maggio; i pulcini nascono dopo 15-16 giorni; 5.

Alcedo Ispida, *Plombìn.* Comune e sedentario. Fa credo due covate, maggio e giugno; uova 5-7, incubazione 15 giorni; 2.

Ceracias Garrula, *Giàje marine.* Rara, di solo passo in aprile e settembre.

Merops Apiaster, *Ucièl biel verd.* Accidentale nel marzo.

Upupa Epops, *Giallùt dé bièle creste.* Estiva e non rara; 1.

Strix flammea, *Çuite*, *Barbezuan.* Comunissimo e sedentario. Nidifica in aprile, 5 a 7 uova covate per 3 settimane; 7.

Syrnium Aluco, *Alòcc.* Piuttosto raro.

Syrnium uralense. Accidentale.

Nyctala Tengmalmi. Rarissima.

Asio Otus, *Catùss.* Non raro e nidificante nel maggio, passa in settembre; 1.

Asio accipitrinus, *Catùss pìzzul.* Comune e nidificante; passa in aprile e settembre. Depone in aprile 4-7 uova, incubate dalla femmina per 21-23 giorni.

Athene Noctua, *Çuss.* Comunissima e sedentaria. Nidifica in aprile maggio, 5 a 6 uova incubate in 16-17 giorni; 70.

Scops Giu, *Catùss*, (*Çuss*). Estivo e frequente; giunge nel marzo, nidifica in maggio, deponendo 6 uova, parte in agosto.

Bubo maximus, *Barbezuan grand*, (*Dug*). Non raro e nidificante in aprile-maggio; 2.

Circus aeruginosus, *Pojàne col ciaf blanc.* Comune e nidificante; di passaggio in marzo, settembre ed ottobre. Una covata in maggio, 4 a 6 uova incubate per 20 giorni dalla sola femmina.

Circus cyaneus. Piuttosto rara, di passo in aprile ed ottobre.

Circus Swainsoni. Assai rara.

Circus cineraceus. Non tanto rara, di passo in ottobre.

Digitized by Google

Pandion Haliaëtus. Accidentale.

Circaëtus gallicus. Piuttosto raro.

Haliaëtus Albicilla. Scarsa.

Aquila Chrysaëtus, *Acuile.* Non rara e nidificante.

Aquila clanga. Accidentale.

Archibuteo lagopus. Di accidentale comparsa nell'inverno.

Buteo vulgaris, *Pojàne.* Comune e sedentaria; fa una covata di 3-4 uova in aprile, incubazione 3 settimane M. e F.

Pernis apivorus. Non comune, ma nidificante; di passo in aprile. Una covata di 2 uova, nel giugno.

Milvus Ictinus. Accidentale.

Falco Peregrinus. Raro.

Hypotriorchis Subbuteo. Accidentale.

Æsalon regulus, *Falcùzz.* Abbastanza frequente di passo nella prima metà di settembre; 2.

Cerchneis Tinnunculus, *Falcùzz di çiámpanil.* Assai comune e sedentario. Fa una sola covata in aprile di 4 a 6 uova, incubate 20-22 giorni; 2.

Cerchneis vespertinus, *Balarin* (?), *Vidul* (femm.). Frequente di passo nella seconda metà d'aprile; 2.

Astur palumbarius, *Astòr.* Rarissimo.

Accipiter Nisus, *Sparvál.* Frequente, di passo nel settem.; 9.

Gyps fulvus. Scarso, ma sedentario sugli alti monti. Vi nidifica nel marzo.

Ardea cinerea, *Airón blanc.* Frequente e sedentario. Nidifica in aprile-maggio.

Ardea purpurea, *Airón.* Estivo, forse nidificante.

Egretta alba. Rara, ne vidi un solo.

Egretta Garzetta, *Sgarzètt blanc.* Non rara.

Ardeola ralloïdes, *Sgarzètt.* Non rara.

Ardetta minuta, *Sgarzètt pizzul.* Piuttosto frequente.

Botaurus stellaris, *Tarabùs.* Comune e nidificante. Cova 4 uova nel maggio.

Nycticorax griseus, *Sgarz cenerìn.* Comune e nidificante. Cova 4 uova nel giugno.

Ciconia alba, *Cicògne.* Rara di passo.

Cygnus musicus, *Cigno, Ceseno.* Di casuale comparsa.

Digitized by Google

Anser cinereus, *Oçhe salvàdie.* Di scarso passo in marzo; 1.

Anser segetum, *Oçhe salvàdie.* Scarsa, invernale.

Anas Boscas, *Mazorèn.* Comunissimo e sedentario. Cova la femmina sola 8-15 uova per 24-26 giorni in aprile-maggio; 137.

Spatula clypeata, *Palòte.* Scarso ed invernale.

Dafila acuta. Non rara ed invernale.

Mareca Penelope, *Çhoss.* Comunissimo da settem. a mag.; 12.

Nettion Crecca, *Cercìgne.* Invernale, frequente, forse nidificante. Cova in maggio; 2.

Querquedula Circia, *Crècule.* Non rara, nidificante. Cova la sola femmina 10-13 uova nel maggio per 21 giorni; 3.

Fuligula rufina, *Majàs* (?). Raro, invernale.

Fulix ferina, *Cauross.* Invernale e comune; 5.

Fulix Marila, *Moro.* Invernale e assai rara.

Fulix Fuligula, Invernale e non rara.

Fulix Nyroca, Rara ed invernale.

Bucephala Clangula, *Blancón.* Invernale, non raro.

Mergus Merganser, *Sérule.* Raro, invernale.

Mergus Serrator, *Sérule.* Scarso ed invernale.

Mergellus Albellus, *Sérule.* Scarsa ed invernale.

Columba Palumbus, *Colomb salvàdi.* Frequente e nidificante. Varie covate di 2 uova da aprile; covano M. e F; 2.

Columba Oenas, *Colòmb.* Non rara, nidificante; 3.

Columba livia, *Colòmb.* Sedentaria lungo il Natisone; 5.

Turtur tenera, *Tortorèle.* Comune ed estiva. Fa varie covate di 2 uova dal maggio; incubano M. e F.

Perdix saxatilis, *Catór.* Comune assai e sedentaria. Cova nel maggio 14 uova per 24-25 giorni; 201.

Starna Perdix, *Pernis*, *Pernigótt.* Comunissima e sedentaria. Cova nel maggio 15 uova per circa un mese; 214.

Coturnix communis, *Cuàje.* Comune assai. Cova in giugno-luglio 9-14 uova, la femmina per 18-21 giorni; 2054.

Tetrao Urogallus, *Giall çedron.* Scarso e sedentario ai monti. Cova la sola femmina nel giugno 9-10 uova per un mese; 12.

Lyrurus Tetrix, *Gialìne forcèle.* Frequente e sedentario. Cova

Digitized by Google

la sola femmina 8-12 uova per 25-26 giorni nel giugno; 27.

Bonasa betulina, *Francolìn*. Non raro e sedentario. Cova la sola femmina 8-13 uova, 20 giorni nel giugno.

Lagopus mutus, *Francolìn blanch.* Frequente e sedentario; 2.

Rallus aquaticus, *Giarègule.* Comune, invernale e nidific.; 51.

Ortygometra Porzana, *Cuèrin.* Comune ed estivo. Cova 8 uova nel maggio; 19.

Ortygometra parva, *Cuèrin pìzzul.* Non sempre comune, di passo; 2.

Crex pratensis, *Re di Cuàje.* Estivo e comune. Cova nel giugno 7-10 uova per 20-22 giorni; 53.

Gallinula chloropus, *Re di Giarègule.* Frequente e sedentaria. Cova 10 uova nel maggio; 5.

Fulica atra, *Fòlighe.* Non comune, invernale, forse sedentaria. Cova 8-10 uova nel maggio; 2.

Grus communis, *Grùe.* Accidentale.

Otis Tarda. Accidentale nel gennaio 1887.

Otis Tetrax, *Totanéll* (?). Rara assai.

Œdicnemus scolopax, *Clàme plòe*, *Durigàtt*, *Còu.* Comune. Cova 4 uova per 15 giorni nel maggio la sola femm.; 1.

Charadrius Pluvialis, *Corridòr*, *Clàme plòè.* Frequente, invernale; 7.

Squatarola helvetica, *Tòtul.* Piuttosto rara, invernale.

Eudromias Morinellus, *Corridòr pìzzul.* Invernale.

Ægialitis cantiana, *Buulìn*, *Vòli di bò* (?). Scarso, sedentario. Covano per 15 giorni nel maggio 4 uova M. e F.

Ægialitis Hiaticula, *Pernìs di pràd.* Frequente di passo.

Vanellus Capella, *Pavoncìn.* Comunissima ai due passi. Dubbiosamente nidificante; 3,

Himantopus candidus. Non tanto raro.

Pelidna subarquata. Assai raro.

Pelidna alpina, *Bisighìn.* Invernale e comunissimo.

Actodromas minuta. Raro.

Machetes Pugnax: Abbastanza frequente, invernale e di passo.

Tringoïdes Hypoleucus. Non molto frequente, di passo.

Totanus Ochropus, *Pivuìcc.* Non raro e pare sedentario.

Digitized by Google

Totanus Glareola, *Pivuìcc pìzzul.* Frequente, forse nidific.; 2.
Totanus Calidris, *Pivuìcc.* Non rara, sedentaria.
Scolopax Rusticula, *Galinàzze*, *Gialinàzze falcùzze.* Comune. Cova 4 uova, la sola femmina in aprile e giugno; 545.
Gallinago major, *Çrochète.* Scarso, di passaggio; 4.
Gallinago cælestis, *Becanòtt.* Frequente, pare nidificante. Cova 4 uova la femm. in aprile-maggio per 16 giorni; 399.
Gallinago Gallinula, *Becanéle.* Frequente di passo; 205.
Numenius Arquata, *Arcàze.* Invernale e frequente.
Numenius tenuirostris, *Arcàzuil.* Invernale e raro; 1.
Glareola Pratincola. Accidentale.
Sterna fluviatilis, *Rondìn di mar.* Estiva e comune.
Sternula minuta, *Cisíle di mar.* Estivo, non raro.
Hydrochelidon nigra, *Cisíle di mar.* Abbastanza frequente; 2.
Chroocephalus melanocephalus. Piuttosto comune; 2.
Chroocephalus ridibundus, *Cocàl.* Assai frequente.
Larus canus, *Cocaline.* Abbastanza frequente nel marzo e nel settembre.
Stercorarius pomatorhinus. Di casuale comparsa.
Colymbus arcticus. Rara ed invernale.
Colymbus septentrionalis. Rara assai ed invernale.
Podiceps cristatus. Non raro, forse nidificante; 1.
Podiceps griseigena. Raro.
Podiceps fluviatilis, *Frísul.* Comunissimo e nidificante. Covano M. e F. 4-6 uova per 21 giorni nel maggio; 2.

Udine, distretto di Cividale (Del Torre nob. Francesco):

Le osservazioni che comunico, si estendono per la maggior parte alla regione pedemontana e delle Prealpi, nonchè ai monti più prossimi alle vallate del Natisone e dell'Isonzo superiore. Non comprendo in esse la regione piana, delle basse cosiddetta, ove regnano estesi prati e paludi. Più frequentemente che non convenga, si confonde la regione piana colla montana della nostra provincia, chè

Digitized by Google

se i confini naturali del Friuli per altri riguardi lo assimilino in una sola regione tanto piana come montana, nondimeno anche le flore, di cui finora m'occupai precipuamente, nè delimitano affatto i due aspetti diversi.

La vallata del Natisone, con tutto il paese compreso fra questo e l'Isonzo, e massime la valle dell'Iudrio ove presso Preposto, ad Albana, ho un luogo di villeggiatura, sono i punti ove io feci le poche osservazioni che qui espongo. Nella regione montana si parlano dialetti slavi, ed i nomi delle specie sono affatto diversi. Generalmente però i nostri contadini, ed i cacciatori stessi, non distinguono molto i nostri uccelli, chè eccettuate le specie più comuni di selvaggina o di uccelletti che si prendono alle reti, non curano le altre; così i diversi Falchi piccoli non vengono bene distinti e sono generalmente detti, *Falcuzz*, *Vidul;* e le grosse specie *Pojana*, *Cagnass*, ec.

La regione delle nostre prealpi ove domina il terreno calcare magnesiaco, ricco di fenditure e di antri, e la marna e l'argilla nelle colline, è povero di fonti, e scarseggia in generale di siti umidi, poichè nonostante le frequenti pioggie i fossati ben tosto si asciugano e talvolta si può percorrere lungo tratto senza trovar acqua. Boschi mancano quasi affatto, e gli alberi d'alto fusto, castagni e roveri, vanno mancando sempre più; le selve pure vengono sempre più devastate, e d'anno in anno si vanno sempre più mostrando le conseguenze del diboscamento. I monti più alti della valle del Natisone e generalmente tutta la catena delle Alpi Giulie presentano faccie nude di macigni ermi e desolati. Verso il piano le grandi estensioni di campi non sono interrotte da alcun albero d'alto fusto e fino i pioppi lungo i corsi d'acqua si fanno più scarsi. Il legname è caro da noi, e si rovina ogni cespuglio appena comincia ad avere qualche ramo da utilizzare. [1] Le grandi siepi che

[1] Passeggiando adesso lungo i boschi si vedono distintamente i nidi di Gazze, Ghiandaie ed altri uccelli, in posti ove una volta anche alla stagione presente, ove tutto è nudo, i rami erano fitti in modo da impedirne la vista.

Digitized by Google

molti anni fa cingevano i campi sono scomparse affatto, sostituite da muri secchi.

Il Friuli più occidentale, verso la Carnia, è più gaio; è però da me poco conosciuto non essendovi stato che ben poco. Da noi mancano le Conifere; i nostri monti più alti o sono nudi come dissi, o v'ha qualche boschetto di faggi; più basso sulle prealpi dominano le selve, ma in pochi luoghi sono fitte; lungo i burroni scavati dai torrentelli alpini, dominano assai i rovi, e là amano nascondersi diverse specie d'uccelli. Il canale del Fella è pure simigliante alla nostra regione; mentre invece in Carnia dominano i boschi d'abeti, e l'acqua è più abbondante, onde quasi tutte le pendici sono coperte di prati verdi e lussureggianti.

Da noi mancano pure i luoghi acquitrinosi e paludosi, che si trovano nelle vicinanze di Fogliano ed in Centauris; e questi ristrettissimi spazii vanno pure soggetti al prosciugamento pei canalicoli praticativi.

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Udine, distretto di Cividale, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, nidificazione, ecc.

Corvus Corax, *Corvatt.* Raro. Una coppia nidifica da assai lungo tempo in febbraio a Prestento in una parete di roccia; in montagna se ne vede alcuno tutto l'anno, scendono al piano sul principiare dell'inverno.

Corvus Corone, *Çore.* Nidifica sul Matajur nei cespugli di quelle rocce scoscese, scende al piano in stormi innumerevoli nell'autunno e nell'inverno.

Corvus Cornix, *Çore, Cornila, Cornile.* Frequente tutto l'anno sui monti e nelle vallate montuose.

Corvus frugilegus. Raro da noi certamente, io non ne ho veduti che pochi nelle mie escursioni.

Digitized by Google

Lycos Monedula. Per quanto ho potuto raccogliere da informazioni, credo debba essere ben rara. Da noi nidifica sulla torre della chiesa di Aquileia.

Nucifraga Caryocatactes, *Fráche nòlis.* Vive certamente in abbondanza ancora nelle vallate del Fella e del But in Carnia, e vi nidifica; ma non si avvicina all' abitato che in inverno; ne uccisi quest' anno il 15 novembre ad Albana sull' Iudrio.

Pica rustica, *Badascule, Chèche.* Comune e sedentaria.

Garrulus glandarius, *Giaje, Giaje màte.* Comune e sedentaria.

Pyrrhocorax Graculus, *Çuvrin, Çorin.* Abbonda discretamente in Carnia.

Pyrrhocorax alpinus, *Çuvrin, Çorin.* Quest' anno (1888) è abbondantemente disceso al piano in novembre, quando ve n' erano sempre in vendita sul mercato, uccisi presso il paese. Nidifica ai monti tra i cespugli sulle rupi scoscese; abbonda ed è sedentario sul Matajur.

Sturnus vulgaris, *Sturnell.* Frequentissimo in Cividale e nei villaggi vicini. Vi nidifica sui tetti.

Pastor roseus. Qui da noi rarissimo certo.

Fringilla cœlebs, *Franzell, Sfranzell.* Comune e sedentario.

Fringilla Montifringilla, *Montán.* Comune, nidifica ai monti.

Passer Italiæ, *Passerat, Passerott* (i piccoli), o *Passere dal becc grues.* Comune, sedentaria.

Passer montanus, *Passere minude.* Comune, sedentaria.

Coccothraustes vulgaris, *Frisott, Sfrisott.* È al presente più raro che anni fa; sedentario.

Ligurinus Chloris, *Çirant, Semenzarul.* Se ne vedono tutto l' anno sulle prealpi, frequenti assai in inverno al piano.

Chrysomitris Spinus, *Lújar, Lujer.* Comune, qualcuno nidifica.

Carduelis elegans, *Gardelín,* (*Gardel*). Comune, sedentario.

Serinus hortulanus, *Sverzelin.* Assai raro, ne uccisi e ne vidi da anni uno solo.

Cannabina Linota, *Faganell.* Raro da noi.

Pyrrhula europæa, *Sivilott.* Io ritengo che vi sieno le due forme; la più piccola si vede da noi solo nell' inverno

Digitized by Google

ed ha sempre il becco insozzato di resina, la più grande si vede anche in primavera.

Loxia Curvirostra, *Becc in cross*, *Becc stuart*. Fui assicurato dal sig. Riccardo Milesi che nidifica in Carnia, ed ebbi i giovani a Gorizia.

Euspiza melanocephala, *Re d'Ortolan*. È raro.

Miliaria Projer, *Sdrunàl*, *Sdárnali*, *Trentacingliris*. Comunissimo in pianura tutto l'anno nei campi, massime poi l'inverno.

Emberiza Citrinella, *Smajàrd*. Comune e sedentario.

Emberiza Hortulana, *Ortolan*. Era già più frequente sulle colline prossime a Cividale; vi nidifica.

Emberiza Cirlus. Assai raro.

Emberiza Cia, *Cipp*, *Zipp*. Trovasi tutto l'anno nei boschi montuosi.

Emberiza Schœniclus, *Ciu*. Si vede al piano, ove è sedentario e nidificante.

Calcarius nivalis, *Ortolan di montagne*, *Ortolan de nev*. Invernale e di rarissima comparsa.

Melanocorypha Calandra, *Calandre*. Da noi si vede a piccoli branchetti tutto l'anno sulle colline, in piano più frequente l'inverno.

Alauda arborea, *Calandrat*. Comune.

Alauda arvensis, *Lódule*. Sedentaria.

Galerita cristata, *Lodule Çhapelute* o *Çhapeluto*, *Lodi Çhapelate*. Spessissimo sta lungo le strade maggiori perchè cerca nutrimento nello sterco dei cavalli; è sedentaria.

Anthus pratensis, *Uìte*. Ne vidi in abbondanza lo scorso luglio in Carnia sui monti sopra Paluzza; comunissima ed in autunno assai abbondante al piano.

Anthus trivialis, *Dòrdine*. Nidificante, ma non comune.

Anthus Spipoletta, *Uìtatt*. Ne vedo tutto l'anno in un sito acquitrinoso in piano detto Bocavizza.

Calobates melanope, *Pastorèle zale*. È abbastanza frequente da noi tutto l'anno e sedentaria.

Motacilla alba, *Bándule*, *Codebándule*, *Pastorele blanche*, *Scassecode*. Comune e sedentaria.

Digitized by Google

Saxicola Oenanthe, *Culett*. Lo vidi sul Matajur, ed è comune sui nostri prati alpini anche altrove.

Monticola saxatilis, *Codaross*, *Scodaross di montagne*. Nidificante sulle nostre prealpi.

Monticola Cyanus, *Passer solitari*. Rarissima da noi.

Merula nigra, *Merli*, *Merlott*. Comune e sedentario.

Merula torquata, *Merli de goláine*. Da noi manca, il sig. Riccardo Milesi lo vide in Carnia.

Turdus pilaris, *Zanevron*, *Zenevron*. Invernale, forse sedentaria ai monti; ai primi di settembre la trovai abbondantissima sul Matajur, ove fui assicurato che alcuni rimangono tutto l'anno. Nidifica?

Turdus iliacus, *Sgrisul*, *Dordei pizzul*. Sedentario sui monti ed invernale; ho veduto i nidiacei.

Turdus musicus, *Dordei*. Nidifica sulle prealpi frequente.

Turdus viscivorus, *Dorde*, *Giardule*, *Sgardule*. Sedentaria; se ne vedono alcune volte delle più grosse con colori più sbiaditi.

Aëdon Luscinia, *Rusignul*. Estivo.

Erithacus Rubecula, *Scrizz*, *Petaross*, *Pettiross*. Comune sedentario, erratico nell'inverno.

Cyanecula Wolfi, *Petaross turchin*. Accidentale, io ne uccisi uno solo, ma nessuno di qui lo conosceva; un altro lo ebbe il sig. Policarpo Candotti di Premariacco, è rarissimo.

Ruticilla Phœnicurus, *Scodaross*. Comune, estivo.

Ruticilla titys. Sedentario; nidifica ai monti.

Pratincola Rubicola, *Armentarutt*. Sedentario.

Pratincola Rubetra, *Grisett*, *Grisutt*. Nidificante.

Sylvia nisoria. Scarsa, estiva.

Sylvia Curruca. Scarsa, estiva.

Sylvia cinerea. Estiva, la più frequente; questa e le due precedenti diconsi *Morátule*.

Monachus Atricapillus, *Caponeri*. Divenne rara, tempo addietro si vedeva da noi più abbondante.

Monachus hortensis, *Becafigo*, *Papefig*. Estivo.

Phylloscopus sibilator, *Uitt*, ma da noi conosciuto più col

Digitized by Google

nome di *Crù-Crau*. Estivo, nidifica nei saliceti lungo l' Iudrio.

Phylloscopus Trochilus. Estivo, nidifica sui salici.

Phylloscopus Bonellii, Estivo e nidificante.

Troglodytes parvulus, *Favita*. Sedentario.

Cinclus aquaticus, *Mierli d'aghe*. Sedentario lungo l' Iudrio e il Natisone. Pone il suo nido in luoghi di difficile accesso, non vi va direttamente, ma si ferma a distanza e lo raggiunge nuotando o camminando.

Accentor collaris, *Passer solitari*. Invernale e sedentario ai monti. Ne uccisi uno il 21 dicembre 1888, non si vede tutti gli anni.

Accentor modularis, *Çharandine*, *Passere çharandine*. Comune, nidifica.

Regulus cristatus, *Repipin*. Nidifica ai monti, scende nell' inverno.

Regulus ignicapillus, *Repipin*. Sedentario.

Acredula rosea, *Parussule de code lunge*, *Muiniute*. Sedentaria; fa il nido con bambagia di pioppo.

Parus major, *Parussule*, *Parussulatt*. Frequente e sedentaria; trovai nel nido 12 e 16 piccini, mi venne detto che trovansi anche 20.

Parus ater, *Parussule mate*. Sedentaria.

Cyanistes cæruleus, *Parussulin*. Sedentaria, nidifica ai boschi.

Cyanistes cyaneus. Mi ricordo di averne veduti presi da cacciatori alle panie colla Civetta, ed io stesso anni fa l' ho presa rare volte nell' istesso modo.

Pœcile palustris. Comune.

Sitta cæsia, *Rampighin*. Frequente discretamente e sedentario.

Certhia brachydactyla, *Rampighin*. Nidifica nei boschi; nell' inverno viene nei coltivi.

Tichodroma muraria. Manca da noi; in Carnia lo vide spesso il sig. Riccardo Milesi.

Oriolus Galbula, *Luri*, *Lurli*, *Bècafigo*. Nidificò vari anni di seguito nel mio orto di casa, da noi è comune ovunque in estate.

Ampelis Garrulus. Nell' anno 1872 se ne presero molti a

Digitized by Google

Cormons e qui in Cividale, (ne ebbimo dei vivi, non mangiavano che ginepro).

Lanius Excubitor, *Giarle zimule.* Invernale, forse sedentaria.

Lanius minor. Estiva.

Lanius Collurio, *Giarle*, *Giarla*, *Garle*, (*Garlett* il piccolo). Estiva.

Hirundo rustica, *Rondinele*, *Çisile*, (*Sisila*). Estiva.

Chelidon urbica, *Rondin*, *Rondul*, *Çisilin.* Estivo.

Clivicola riparia. Scarso.

Cotile rupestris. Veduto sulle rupi di Prestento.

Cypselus Apus. Comune assai ed estivo; nidifica in una torre che fa parte della nostra abitazione, in giugno.

Caprimulgus europæus, *Boçhass*, *Bochass.* Estivo.

Dryocopus martius, *Picc neri.* Da noi manca, il sig. Milesi mi disse che è frequente e sedentario in Carnia, specialmente presso Paluzza.

Picus major, *Picc*, *Picott.* Frequente da noi nei boschi e nel piano in tutte le stagioni; nidificò in Albana nell'orto di casa in un vecchio pero nel luglio.

Gecinus viridis, *Picc verd*, *Picott.* È assai frequente da noi e sedentario; i giovani volano in luglio.

Gecinus canus. Confuso col precedente, ne ho uccisi diversi ch'io pure prima d'ora teneva per giovani del precedente, è abbastanza frequente e sedentario.

Iynx Torquilla, *Furmiar*, *Cuel stuart.* Estivo.

Cuculus canorus, *Cucc*, *Cuchucc.* Estivo.

Alcedo Ispida, *Piombin.* È molto comune ovunque e sedentario da noi anche lungo i più piccoli corsi d'acqua.

Coracias Garrula, *Giaje marine.* Molto rara.

Merops Apiaster. Rarissimo, ne ebbi uno nel luglio 1885.

Upupa Epops, *Uciell de bile creste.* Soltanto in primavera nei prati al largo; forse estiva.

Strix flammea, *Çuite*, *Ciuite*, *Barbezuan.* Nidifica anche sul campanile del Duomo della città; sedentario.

Syrnium Aluco, *Alocc.* Nidificante.

Asio accipitrinus, *Catuss pizzul.* Non raro.

Asio Otus. Sedentario.

Digitized by Google

Athene Noctua. Sedentaria.

Scops Giu, *Catúss*, *Giù*, *Çiucch.* Estivo e comune.

Bubo maximus, *Barbezuan grand*, *Dug.* Sedentario, erratico nell' inverno; nidifica ai monti.

Circaëtus gallicus, *Cagne.* Nidifica ai nostri monti e ne ebbi i pulcini; è frequente in grandi stuoli alle epoche del passo; sarebbe anche sedentario.

Archibuteo lagopus, *Pojana*, *Pojane.* Compare negli inverni rigidi, ne ebbi una nel febbraio 1886.

Buteo vulgaris, *Pojane*, *Cagne.* Sedentaria, erratica d' inverno.

Pernis apivorus. Accidentale.

Falco Peregrinus, *Falcon*, *Falcuzz.* È raro.

Hypotriorchis Subbuteo, *Falcuzz.* Raro.

Cerchneis Tinnunculus, *Falcuzz*, *Vidul.* Nidifica in quantità ed è sedentario nelle rocce del Natisone e sulla torre del Duomo.

Cerchneis vespertinus, *Balarin*, *Vidul.* Qualche coppia nidifica sui nostri monti, così sopra Brisçhis, però non è comune.

Astur palumbarius, *Cagne*, *Cagnass*, *Cagnasse.* Di passo in primavera ed autunno.

Accipiter Nisus, *Sparvel*, *Falcuzz*, *Vidul.* Sedentario.

Gypaëtus barbatus. Il sig. Riccardo Milesi m'assicurò ch'esso è ben conosciuto in Carnia e distinto col nome germanico di *Gamsgeier.*

Vultur Monachus. Ne furono uccisi in Carnia ed uno lo possiede anche il suddetto sig. Milesi nella sua raccolta.

Gyps fulvus, *Variul* ? (*Avariul* ?). È frequente e nidificante, ne ebbi due uccisi l'anno scorso a Montefosca sopra Stupizza in luglio e ne vidi pure molti in Carnia, compariscono tosto ov' è una carogna.

Ardea cinerea, *Garze*, *Sgarze*, *Crotar.* Invernale, di passo.

Ardea purpurea, *Airon*, *Crotar.* Ne uccisi diversi in maggio.

Egretta alba. Alle basse, vedesi di rado nell' autunno.

Egretta Garzetta. Alle basse in primavera.

Botaurus stellaris, *Tarabus*, *Peçhecrots.* Frequente alle basse, ne ebbi uno il 21 gennaio 1886.

Digitized by Google

Nycticorax griseus, *Sgarz çenerin.* Viene ucciso di frequente in maggio.

Ardetta minuta. Comunissimo in maggio, di solo passo.

Ardeola ralloïdes. Di passaggio, specialmente in primavera.

Ciconia alba. Ne vidi una uccisa ad Udine l'anno scorso; molti anni addietro, mi raccontava il padre mio, d'averne uccise frequentemente l'autunno lungo l'Iudrio, ora non si vede mai.

Anser cinereus, *Oçhe*, (*Ocie*). Di passo in marzo.

Anser segetum, *Oçhe*, *Ocie.* Vengono uccise in febbr. e marzo.

Anas Boscas, *Mazurin.* Se ne vedono raramente d'inverno nel Natisone.

Mareca Penelope, *Çhoss.* Non raro.

Nettion Crecca, *Cercégne.* Frequente di passo in marzo.

Querquedula Circia, *Crecule.* Frequente nel marzo.

Mergus Merganser. Ne ebbe uno il sig. Candotti di Premariacco ucciso nel Natisone presso quel villaggio.

Mergus Serrator. Ne vidi sul mercato ad Udine.

Mergellus Albellus. Invernale.

Columba Palumbus, *Colomb de corone.* Comune.

Columba livia, *Colomb salvadi.* Sedentaria e nidificante tra le rupi in caverne.

Turtur tenera, *Tortorele.* Nidificante nei boschi e sul Natisone tra le rocce.

Perdix saxatilis, *Cotór*, *Catórs.* Sedentaria, diventa erratica nell'inverno; diminuisce.

Starna Perdix, *Pernis*, *Pernigot* il giovane. Sedentaria, erratica nell'inverno.

Coturnix communis. Comune e nidificante.

Tetrao Urogallus, *Giall Cedron.* Nidifica sopra Paluzza in diversi punti in Carnia; abbastanza frequente ancora in quei boschi, ove è affatto sedentario; i pastori ed i loro cani fanno strage dei giovani.

Lyrurus Tetrix, *Giall forcell*, *Gialline forçele* la fem. Ne uccisi lo scorso agosto in Carnia sopra Paularo; vi è sedentario.

Bonasa betulina, *Francolin di bosc.* È nidificante in Carnia.

Lagopus mutus, *Francolin blanc di mont.* Ne vidi in Carnia

Digitized by Google

quest' anno, abitano molto più in basso di quello che si crede. Ivi però è sedentario e ben difficilmente diviene erratico.

Rallus aquaticus. Invernale e di passo.

Ortygometra Porzana. Di passo specialmente in primavera.

Ortygometra parva. Di passo primaverile.

Ortygometra Bailloni. Di passo primaverile.

Gallinula chloropus. Vedesi raramente in primavera.

Fulica atra. Non comune, nidificante.

Crex pratensis. Estivo e nidificante.

Otis Tarda. Accidentale.

Otis Tetrax. Accidentale.

Vanellus Capella. Scarsa in autunno, abbondante in marzo.

Scolopax Rusticula. Passa dal febbraio all' aprile e dal settembre al novembre; forse nidifica ai monti.

Gallinago major. Passa in aprile e maggio, più scarso in agosto e settembre.

Gallinago cælestis. Trovasi in febbraio e marzo ed è più comune in ottobre e novembre.

Gallinago Gallinula. Assai raro in aprile ed ottobre.

Podiceps fluviatilis. Scarso, ma sedentario.

Padova (Arrigoni degli Oddi conte Ettore):

Elenco generale delle specie di uccelli che sono state osservate nella provincia di Padova, coi nomi volgari locali ed indicazioni sulla frequenza, ecc. [1]

Corvus Corax, *Corvon de montagna.* Accidentale.

Corvus Corone, *Gróla*, *Córvo.* È frequente.

---

[1] Compilato dal conte Ettore Arrigoni degli Oddi di Padova zelante cultore della Ornitologia, il quale ha pubblicato molte notizie interessanti sull' Ornis del Padovano e formato una ricca collezione degli uccelli di quella provincia.

Digitized by Google

Corvus Cornix, *Gróla*, *Córvo*, *Cornácia*, *Grola zenerina*. È comune, frequenta i luoghi acquitrinosi.

Corvus frugilegus, *Gróla*, *Córvo*. È comune ovunque.

Lycos Monedula. Accidentale, di comparsa irregolare.

Nucifraga Caryocatactes. Accidentale.

Pica rustica, *Chéca*, *Gáza chéca*, *Gáza de la cóa longa*. È più frequente al colle che al piano, sedentaria.

Garrulus glandarius, *Féra*, *Gáza féra*, *Gáza rabiosa*. Comune tanto al piano che al colle, sedentaria.

Pyrrhocorax alpinus. Accidentale.

Sturnus vulgaris, *Striòlo*, *Stornèlo*, *Strùlo*. Comunissimo ovunque; anche sedentario.

Pastor roseus. Accidentale.

Fringilla cœlebs, *Finco*, *Fringuèlo*. Comune tanto al piano che al colle, sedentario.

Fringilla Montifringilla, *Finco montán*, *Montanélo*. È comune.

Petronia stulta, *Sélega foresta*, *Sélega da la macia zala*. È poco frequente, si tiene più al colle.

Passer montanus, *Sélega megiaróla*, *Megiaróla*. È comunissima e sedentaria.

Passer Italiæ, *Sélegon*, *Sélega grossa*, *Becacópi*. È comunissima e sedentaria.

Passer domesticus. Accidentale.

Coccothraustes vulgaris, *Frisón*, *Sfrison*. Ovunque comune, anche sedentario.

Ligurinus Chloris, *Schiaranto*, *Schiarante*, *Verdon*, *Zaranto*. Ovunque comune, sedentario.

Chloroptila Citrinella. Accidentale.

Chrysomitris Spinus, *Lugarin*. Comune, si tiene più al colle.

Carduelis elegans, *Gardelín*, *Cardelín*. Comune, sedentario.

Serinus hortulanus, *Frisarín*, *Sverzerín*. Abbastanza frequente.

Cannabina Linota, *Faganélo*, *Montanélo*. Comunissimo.

Ægiothus Linarius. Accidentale nell' autunno.

Ægiothus rufescens. Accidentale nell' autunno.

Carpodacus erythrinus. Accidentale.

Loxia Curvirostra. Accidentale; dicesi capiti nell' autunno.

Pyrrhula europæa, *Finco subiòto*. Poco frequente al colle.

Digitized by Google

Euspiza melanocephala. Accidentale, anzi dubbioso.

Miliaria Projer, *Fistón*, *Strilózo*, *Petásso*. Frequente, sedentario. È più abbondante nelle località paludose.

Emberiza Citrinella, *Squaiardóla*, *Ortolán zalo*. È frequente forse più al colle, sedentario.

Emberiza Cirlus, *Cia*, *Zia*, *Sia*, *Piónsa mora*. È poco frequente, predilige il colle.

Emberiza Cia, *Sía*, *Sióto*. È poco frequente al colle.

Emberiza Hortulana, *Ortolan*, *Duraldì*. È comune.

Emberiza Schœniclus, *Sélega palugána*, *Piónza*, *Sía*, *Ziáto* o *Ciáto de palú*. È comune specialmente nei luoghi acquitrinosi.

Emberiza pyrrhuloïdes. Di comparsa irregolare e raro assai.

Calcarius nivalis. Accidentale, di comparsa irregolare.

Melanocorypha Calandra. Di comparsa irregolare.

Calandrella brchydactyla, *Calandrín*, *Berluáto* o *Lodolín foresto*. È poco frequente, anzi quasi raro.

Otocorys alpestris. Di comparsa irregolare e rara assai.

Alauda arborea, *Belluàto*, *Berluàto*, *Lodolìn*. È frequente anche al colle.

Alauda arvensis, *Lódola*, *Calandrión* (♂), *Odola*, *Alodóla*. È comunissima e sedentaria.

Galerita cristata, *Capelúa*, *Capilúa*, *Capelúda*. È comune e sedentaria.

Agrodroma campestris, *Gambalónga*, *Tordína foresta*. È poco frequente.

Corydalla Richardi. Accidentale.

Anthus pratensis, *Fista*, *Fistaréla*. È comunissima.

Anthus cervinus. Accidentale.

Anthus trivialis, *Tordína*. È comune forse più al colle.

Anthus Spipoletta, *Fistázza*. È comune specialmente in luoghi acquitrinosi.

Budytes flavus, *Boarína*, *Boarináto*. È comune.

Budytes cinereocapillus, *Boarína*, *Boarináto*. È comune nei luoghi acquitrinosi.

Motacilla alba, *Sguasseróto*, *Coalónga*, *Batticóa*, *Scássola*. È comune special. nei luoghi acquitrinosi e sedentaria.

Digitized by Google

Calobates melanope, *Sguassacóa*, *Batticóa zala*. È frequente più specialmente nei luoghi acquitrinosi, sedentaria.

Saxicola Oenanthe, *Culbiánco*, *Zoparólo*. È comune sul colle. Si incontra in piccolo numero anche nelle valli dell' estuario.

Saxicola albicollis, *Culbiánco*, *Culbianco foresto*. È poco frequente.

Saxicola Stapazina. È poco frequente.

Monticola saxatilis, *Coarussolón*, *Coarussolón foresto*. È poco frequente al colle.

Monticola Cyanus, *Pássara*, *P. solitaria*, *Merlo foresto*. È poco frequente al colle e sulla Rocca di Monselice.

Merula nigra, *Merlo*, *Merlo montagnólo* (♂ non perfett. adulto), *M. terragnólo*. *Merla* (♀). È comunissimo, sedentario.

Merula torquata. Di comparsa irregolare e rara.

Turdus pilaris, *Gazanèla*. È comune.

Turdus iliacus, *Sisilín*, *Tordo cisilín*, *T. spinaról*. È frequente.

Turdus musicus, *Tordo*, *Tordín*, *Tordo da úa*. È più o meno comune secondo le annate.

Turdus viscivorus, *Gazáro*, *Tordo gazáro*, *Gazér*. È frequente e sedentaria.

Aëdon Luscinia, *Usignólo*, *Rusignólo*. È comune.

Erithacus Rubecula, *Béto*, *Petarélo*, *Petusséto*, *Petússo*, *Petirosso*. È comune.

Cyanecula Wolfi, *Coárossa foresta*. È poco frequente al colle.

Cyanecula suecica. Accidentale.

Calliope camtschatkensis, Accidentalissima.

Ruticilla Phœnicurus, *Coárossa*, *Squarúsola*. È più comune al colle che al piano.

Ruticilla titys, *Coárosso moro*. È abbastanza frequente al colle.

Pratincola Rubicola, *Batiàle*, *Favaréto*. È comunissimo e sedentario.

Pratincola Rubetra, *Batiàle*, *Favaréto*, *B. foresto*. È abbastanza frequente.

Sylvia nisoria, *Beccafigón*, *Bianchettón*. È frequente specialmente nei luoghi acquitrinosi.

Sylvia orphæa, *Caonero foresto*, *Bianchettón*. Poco frequente.

Digitized by Google

Sylvia cinerea, *Bianchéta*, *Canevaróla*, *Canéto*. È abbastanza frequente.

Sylvia Curruca, *Bianchéta*. È poco frequente.

Sylvia subalpina. Accidentale.

Monachus Atricapillus, *Caonero* (♂). *Caorosso* (♀). È comune nell'estate, forse sedentaria.

Monachus hortensis, *Becafígo*. È comunissimo, più specialmente al colle.

Pyrophthalma melanocephala. Accidentale.

Melizophilus undatus. Accidentale.

Phylloscopus sibilator, *Zaléto*, *Ciuin*, *Becafígo*, *Zaléte*. È comune.

Phylloscopus Trochilus. È comune.

Phylloscopus Bonellii, *Ciuin*, *Zaléto*. È poco frequente (?).

Phylloscopus rufus, *Ciuin*, *Tuin*, *Papamoschín*, *Zaléto*. È comune.

Hypolais icterina, *Canevaróla*, *Zaléto*. È comune.

Hypolais polyglotta, *Canevaróla*, *Zaléto*. È comune.

Acrocephalus palustris. Accidentale, anzi dubbiosa.

Acrocephalus streperus, *Canaróla*, *Canéto*, *Foracanéle*. È comune nei luoghi acquitrinosi.

Acrocephalus arundinaceus, *Sélega palugána*, *Palugána*, *Fraréttа*, *Canelón*, *Canevarolón*. È molto comune nei luoghi acquitrinosi.

Calamodus schœnobænus, *Risarólo*, *Canéto*. È comune nei luoghi acquitrinosi.

Calamodus aquaticus. Comune.

Lusciniola melanopogon. Non tanto comune.

Locustella nævia. Raro.

Potamodus luscinioïdes. Rara, anzi dubbiosa.

Cettia Cettii. Accidentale, dubbioso.

Cisticola cursitans, *Canéto*, *Czin de palù*, *Papamoschìn*. Sarebbe abbastanza frequente nei luoghi paludosi.

Troglodytes parvulus, *Roséto*, *Reséto*, *Galinazín*. È comunissimo.

Cinclus aquaticus. Di comparsa casuale.

Accentor collaris. Assai raro.

Accentor modularis, *Moréta*, *Palugána*, *Sélega palugana*. È comune.

Digitized by Google

Regulus cristatus, *Stellín*, *Repipin*, *Oselín da la bela cresta*. È più frequente al colle.

Regulus ignicapillus, *Stellín*, *Repipin*. È comune.

Ægithalus pendulinus, *Pendolín*. È frequente nei luoghi acquitrinosi.

Acredula caudata. Rara.

Acredula rosea, *Ocio*, *Ocieto de bò*, *Coéta*, *Coalónga*, *Sperussolín*. È comune e sedentaria.

Panurus biarmicus, *Organéto*, *Ussarín*, *Mustacín*. È frequente in alcune località acquitrinose.

Parus major, *Parússola*, *Perússola*, *Sperussola*, *Cinciara*, *Beduína*, *Fuffignón*, *Finfignón*. È comunissima e sedentaria.

Parus ater, *Parússola móra*, *P. tódesca*, *P. de monte*. È abbastanza frequente, scarsamente però sedentaria.

Cyanistes cæruleus, *Parussoléta*, *Parussolín*, *Parussóla montagnola*, *Fratín*. È comune e sedentaria.

Pœcile palustris, *Parússola mora*, *P. montagnóla*, *P. forésta*. Poco frequente, sedentaria.

Lophophanes cristatus. Accidentale.

Sitta cæsia, *Roegantín*, *Rovegantín*, *Rovegárolo*. È comune forse più al colle; sedentario.

Certhia brachydactyla, *Roegantín macià*. È poco frequente al colle e sedentario.

Tichodroma muraria, *Rampeghìn de monte*, *Ale de fógo*, *Becassíssi*. È poco frequente al colle.

Oriolus Galbula, *Miliésa*, *Barbapiéro*, *Megióra*, *Brúsola*. È com.

Ampelis Garrulus. Di comparsa accidentale.

Lanius Excubitor, *Regéstola lóra* o *falconiéra*, *Redéstola lóra* o *falconiéra*, *Redestolón*. È abbastanza frequente e pare sedentaria.

Lanius minor. Frequente ed estiva.

Lanius Collurio, *Gavazúa*, *Cavazúa*, *Redéstola*, *Regéstola*. È comune.

Lanius auriculatus, *Cavazúa*, *Sgavazúa*, *Redéstola* o *Regéstola bianca* o *foresta*. È abbastanza frequente.

Muscicapa collaris, *Favaréto*. Da notizie assunte poco frequente al colle (?). Io non la ho mai veduta.

Digitized by Google

Muscicapa Atricapilla, *Favaréto*, *Batiále moro*, *Becafígo foresto*. Abbastanza frequente.

Butalis Grisola, *Griséto*, *Batiále*, *Canéto*, *Risarólo*. È frequente.

Hirundo rustica, *Rondine*, *Rondina*, *Sisíla*, *Çisila*, *Rondinéla*. È comune.

Hirundo rufula. Accidentale, anzi dubbiosa.

Chelidon urbica, *Rondín*, *Tartagín*. È comunissimo.

Clivicola riparia, *Rondín*, *Tartagín*. È comunissimo.

Cotile rupestris. Accidentale.

Cypselus Apus, *Rondón*, *Sbíro*. È comunissimo.

Cypselus Melba. Accidentale.

Caprimulgus europæus, *Bocássa*, *Tetaváche*. È comune.

Picus major, *Pigoséta*, *Batilégno*. È comune e sedentario.

Picus medius. Di comparsa casuale.

Picus minor, *Pigoséto*. È poco frequente al colle e sedentario.

Picoïdes tridactylus. Accidentale.

Gecinus viridis, *Pigosón*, *Spigosón*. È comune e sedentario.

Gecinus canus. Accidentale.

Iÿnx Torquilla, *Caostórto*, *Storzicóllo*. È comune, qualcuno sverna.

Cuculus canorus, *Cúco*. È comune.

Alcedo Ispida, *Piombín*, *Osélo de la Madóna*. È comune e sedentario lungo l'acqua.

Merops Apiaster. Accidentale.

Coracias Garrula. Accidentale.

Upupa Epops, *Úpupa*, *Galéto de monte*, *Bubú*, *Galéto mejarólo*, *Galéto de marzo*. È comune.

Strix flammea, *Alóco*, *Balúco*, *Barbagiáni*. È comunissimo e sedentario.

Syrnium Aluco, *Alóco salvádego*, *A. de palü*. È poco frequente.

Nyctala Tengmalmi. Accidentale.

Athene Noctua, *Çoeta*, *Zoeta*, *Çoetón*. È comune e sedentaria.

Scops Giu, *Ciö*, *Ciü*. È comune.

Bubo maximus, *Gúfo majór*. Da notizie assunte lo crederei poco frequente al colle in date località, p. e., Colle di Ca-Barbaro in distretto di Monselice, ec.

Asio Otus, *Alocón*, *Çoetón*. È abbastanza frequente.

Digitized by Google

Asio accipitrinus, *Alocón*, *Çoetón de vále*. È poco frequente nei luoghi paludosi.

Circus æruginosus, *Pógia*, *Pója de vále*. È comune e sedentario.

Circus cyaneus, *Pója bianca*, *Pója bianca de vále*. È poco frequente, ma sedentaria.

Circus Swainsoni. Accidentale.

Circus cineraceus. Accidentale.

Pandion Haliaëtus. Di comparsa irregolare.

Haliaëtus Albicilla, *Aquilóto*, *Aquila de mar*. È poco frequente nelle valli dell' estuario.

Circaëtus gallicus. Accidentale.

Aquila Chrysaëtus. Di rara comparsa.

Aquila clanga. Accidentale.

Archibuteo lagopus. Di comparsa irregolare.

Buteo vulgaris, *Pója*, *Pógia*, *Pójana*. È comune e sedentaria.

Pernis apivorus. Di casuale comparsa.

Milvus Ictinus. Accidentale.

Milvus migrans. Raro assai, anzi dubbioso.

Falco Peregrinus, *Falchéto foresto*, *Falchettón*. Poco frequente.

Hypotriorchis Subbuteo, *Falchéto*, *Balarin*, *Storéla*. È comune.

Æsalon regulus, *Falchetín*, *Falchéto*, *Storéla*. È poco frequente.

Cerchneis Tinnunculus, *Falchéto*, *Storéla*. È comune e sedentario.

Cerchneis Naumanni. Di accidentale comparsa.

Cerchneis vespertinus, *Falchéto balarín*. Poco frequente.

Astur palumbarius. Accidentale.

Accipiter Nisus, *Storéla*, *Falchéto*. È comune e sedentario.

Gyps fulvus. Accidentale.

Pelecanus Onocrotalus. Di casuale comparsa.

Phalacrocorax Carbo, *Smágo*, *Corvo marín*. È poco frequente.

Ardea cinerea, *Airón*, *Gárzo*, *Sgárzo*, *Sgárdo zenerín*. È comune nelle paludi e sedentario.

Ardea purpurea, *Sgárzo*, *Airón*, *Sgárdo rosso*. Comune.

Egretta alba, *Sgárdo bianco*. Poco frequente (?). È specie molto localizzata.

Egretta Garzetta, *Sgarzétta* o *Garzétta bianca*. Poco frequente.

Digitized by Google

Ardeola ralloïdes, *Dragòn*, *Sgardéla*, *Guà dal zúfo*. Poco frequente.

Ardetta minuta, *Trentacóste*, *Centocóste*, *Sgarzétta*. È comune.

Botaurus stellaris, *Strabúso*, *Strabúsine*, *Tarabúso*, *Osélo cavaláro* (!). Comune e sedentario.

Nycticorax griseus, *Guà*, *Airón foresto*. È abbastanza frequente.

Ciconia alba. Accidentale.

Ciconia nigra. Accidentale.

Platalea Leucorodia. Accidentale.

Plegadis Falcinellus. Di casuale comparsa.

Cygnus Olor. Di rara comparsa.

Cygnus musicus, *Zigno*, *Cigno*. È poco frequente.

Bernicla brenta. Accidentale.

Anser cinereus. *Oca granda*, *O. salvádega*. È poco frequente.

Anser albifrons. Accidentale.

Anser segetum, *Oca*, *Oca faraóna*, *Oca salvádega*. È abbastanza frequente.

Tadorna cornuta, *Chérso*. È poco frequente.

Anas Boscas, *Ànara salvádega*, *Ànara da zógolo*, *Ànera*, *Arena* (♀). *Mázorin*, *Mázzoro* (♂). È comunissimo e sedentario.

Chaulelasmus streperus, *Trésso*, *Pignólo* (♂). *Pignóla* (♀). È poco frequente.

Spatula clypeata, *Fófano* (♂). *Fófana* (♀). *Fófanáchio*, *Palóto*. È comune.

Dafila acuta, *Colánzo*, *Asiáo*, *Asiá* (♂). *Asiáda* (♀). È comune.

Mareca Penelope, *Ciòsso* (♂). *Ciosséta* (♀). È comunissimo, e anche sedentario.

Nettion Crecca, *Sarsegnóla*, *Sarségna*. È comunissima e sedentaria.

Querquedula Circia, *Rochéto*, *Sarségna*, *Crécola*. È comunissima.

Fuligula rufina. Assai raro.

Fulix ferina, *Magásso*, *Magassón monáro* (♂). *Magassóna* (♀). È comunissimo.

Fulix Fuligula, *Penacín*, *Spernacín*, *Magasséto*, *Moretón*, *Magásso moro*. È comune.

Digitized by Google

Fulix Marila, *Campanatón*, *Moretón*. È quasi rara. Ne tengo due esemplari, il ♂ da valle Morosina, febbraio 1881; la ♀ da Piove di Sacco, 12 gennaio 1887.

Fulix Nyroca, *Ànara bastarda*, *Magasséto rosso*. È abbastanza frequente.

Bucephala Clangula, *Campanáto*, *Quatroci* (♂). *Campanéle* (♀). È abbastanza frequente, più gli individui giovani (*Campanéle*) che gli adulti.

Harelda glacialis. Di comparsa irregolare.

Œdemia fusca, *Orco marin*, *Chérso foresto*. È poco frequente, specialmente gli adulti.

Erismatura leucocephala. Accidentale.

Mergus Merganser, *Serolón*, *Serolón de Pó*. È quasi raro.

Mergus Serrator, *Sérola*, *Spérga*. È frequente, meno lo sono gli adulti.

Mergellus Albellus, *Seroléta*, *Pisagò*, *Pisegrù*, *Anzoleto*. È frequente, meno lo sono gli adulti.

Columba Palumbus, *Colombásso*, *Colombo salsáro*, *Favarăsso*. È frequente.

Columba Oenas, *Colombo salsáro*, *Colombo salvádego*. Lo crederei frequente.

Columba livia. Non comune.

Turtur tenera, *Tórtora*, *T. salvádega*. È comune.

Syrrhaptes paradoxus. Accidentale.

Perdix rufa. Di casuale comparsa.

Perdix saxatilis. Di casuale comparsa.

Starna Perdix, *Pernise*, *Pernisa*, *Spernisa*. Una volta era comune in provincia, ora se ne trovano poche in certe località dei colli Euganei (colle di Arquà Petrarca, del Catajo ec.); vi è sedentaria.

Coturnix communis, *Quaja*, *Quagia* (♀), *Quajo*, *Quagio* (♂), *Quajastróni* (juv). È comunissima e qualcuna sverna in provincia.

Rallus aquaticus, *Sforzána*, *Viatára*. È comune e sedentaria.

Ortygometra Porzana, *Quagína*, *Quájna*, *Gerardélo*, *Realéto*. È comune.

Digitized by Google

Ortygometra Bailloni, *Realéto*, *Fiorín*, *Cavalarín*, *Gerardélo*. È frequente.

Ortygometra parva, *Gerardélo*, *Fiorin* ecc. È comune.

Crex pratensis, *Requagio*, *Requajo*, *R. rosso*. È comune.

Gallinula chloropus, *Viatára*, *Sforzána*, *Sfógio*. È comune e sedentaria.

Fulica atra, *Foléga*. È comunissima e sedentaria.

Grus communis. Di comparsa accidentale.

Anthropoïdes virgo. Di dubbiosa comparsa accidentale.

Otis Tarda. Accidentale.

Otis Tetrax. Di comparsa irregolare.

Œdicnemus scolopax, *Pivarón*, *Ciurlicón*. È abbastanza frequente e sedentario.

Cursorius gallicus. Accidentale.

Charadrius Pluvialis, *Pívaro*, *Corídor*. È secondo le annate più o meno comune.

Squatarola helvetica, *Barusóla*. È frequente.

Eudromias Morinellus, *Pivaréto*, *Coridór*. È poco frequente.

Ægialitis cantiana, *Muneghéta*, *Coridoréto*, *Zurlichéto*. È comune.

Ægialitis curonica. Comune.

Ægialitis Hiaticula, *Pivaréto*, *Muneghéta da la colána*, *Ocio d'oro*. È comune.

Vanellus Capella, *Paonsína*, *Felizéta*. È comune, dubbiosamente sedentaria.

Strepsilas Interpres. Accidentale.

Himantopus Ostralegus, *Caenáno*, *Caenásso*, *Galinássa de mar*. È poco frequente.

Himantopus candidus, *Sgambérlo*, *Sgambírlo*. È poco frequente.

Recurvirostra Avocetta. Accidentale.

Limicola platyrhyncha, *Biseghín rigá*. È piuttosto frequente.

Pelidna subarquata, *Biseghín rosso*, *B. d' istá*. È comune.

Pelidna alpina, *Biseghín*, *Lodoléta marina*. È comune.

Actodromas minuta, *Biseghín*, *B. novélo*. È comune.

Actodromas Temmincki, *Biseghín novélo*. È poco frequente, forse perchè confuso colla precedente.

Calidris Arenaria, *Biseghín del sabión bianco*. È piuttosto frequente; varii esemplari sono nella mia collezione.

Digitized by Google

Machetes Pugnax, *Gambetón*, *Tótano muto*. È comune. Un individuo ♂ ad. nel caratteristico abito nuziale è nella mia collezione, fu ucciso nell'estuario veneto ai 15 maggio del 1883.

Tringoïdes Hypoleucus, *Tramontanéla*, *Cialdín*. È comune.

Totanus Ochropus, *Culbiánco*. È comune.

Totanus Glareola, *Totanélo*, *Culbianco*. È piuttosto comune. Mi mancano i dati positivi.

Totanus Calidris, *Totáno*, *Totánon*. È comune e sedentaria.

Totanus stagnatilis. Dubbiosamente accidentale.

Totanus fuscus, *Tótano bastardo*, *Tótano negro*, *T. moro*. È com.

Totanus nebularius, *Totanón*, *Gambetón*. È piuttosto frequente.

Limosa melanura, *Vétola*, *Gambéton rosso*. È frequente.

Limosa rufa. Accidentale.

Scolopax Rusticula, *Galinássa*, *Becássa*. È comune.

Gallinago major, *Ciochéta*, *Becanóto*. È abbastanza frequente.

Gallinago cælestis, *Becanóto*, *Becanóto muto*. È comune, pare sedentaria.

Gallinago Gallinula. *Becanéla*. È comune.

Numenius Arquata, *Arcája*, *Arcáza*. È comune.

Numenius tenuirostris. Accidentale.

Numenius Phæopus, *Taragnóla*, *Arcáza*. È comune.

Glareola Pratincola. Accidentale.

Sylochelidon caspia. Accidentale.

Thalasseus cantiacus. Accidentale.

Gelochelidon anglica. Accidentale.

Sterna fluviatilis, *Giagă*, *Crocalína*, *Scagózza*. È comune.

Sternula minuta, *Giagă picola*, *Crocalína*, *Cocaléta*. È comune.

Hydrochelidon hybrida. Accidentale.

Hydrochelidon leucoptera, *Crocalina*, *Crocalina nera*. Poco frequente.

Hydrochelidon nigra, *Crocaléta negra*, *Crocalina nera*, *C. negra*. È comune.

Chroocephalus minutus. Accidentale.

Chroocephalus ridibundus, *Cocál*, *Crocál*. È comune.

Chroocephalus melanocephalus, *Crocál*, *Cocál*, *Crocál a testa nera*. È frequente.

Digitized by Google

Larus canus, *Magoghéta*, *Crocál*. È piuttosto frequente.

Larus cachinnans, *Magóga*, *Báo*, *Crocalón*, *Cocále* (ad.), *Martin* (juv.). Comune e sedentario.

Stercorarius pomatorhinus. Accidentale.

Fratercula arctica. Accidentale.

Colymbus glacialis, *Bagiánte*, *Smergón*, *Smagón*. È poco frequente (?).

Colymbus septentrionalis, *Bagiánte macià*, *Smergón macià*. È piuttosto frequente.

Colymbus arcticus, *Bagiánte*, *Smérgo*, *Smergón*. È frequente.

Podiceps cristatus, *Cavriòl*, *Cavriòla*, *Fisolon de mar*. Comune.

Podiceps griseigena, *Smerghéta*, *Smergo*. È piuttosto frequente.

Podiceps nigricollis, *Cavriòla*, *Fisola de mar*. È comune.

Podiceps fluviatilis, *Fisolo*, *F. canariòl*, *Fisoléto*, *Strapozéto*, *Sotaròl*.[1] È comune e sedentario.

Rovigo, distretto di Badia Polesine (Dal Fiume Camillo):

La zona delle mie osservazioni comprende il distretto di Badia Polesine nella provincia di Rovigo e il vicino comune di Castagnaro in quella di Verona; più, parte del fiume Adige. I suoi confini adunque sarebbero i seguenti: 1° La riva sinistra del fiume Adige; 2° Il comune di Villa Bartolomea nella provincia di Verona; 3° La riva sinistra del fiume Po; 4° Il distretto di Lendinara nella provincia di Rovigo. Tutto questo territorio è piano: oltre ai fiumi Po ed Adige comprende i minori Adigetto e Tartaro ed altri importanti canali specialmente la fossa Maestra che scola le acque delle valli Veronesi. Tutto il territorio è coltivato coi diversi sistemi moderni di agricoltura. Nel di-

[1] Devo avvertire che i nomi volgari sono attinti a fonti sicure dai più provetti cacciatori delle varie località della provincia. Per gli Svassi, le Strolaghe, le Anitre ed i Smerghi il più o meno frequente quasi sempre si riferisce ai giovani, giacchè si sa quanto siano più rari gli adulti. (*Arrigoni*).

Digitized by Google

stretto di Badia Polesine e specialmente nel comune di Bagnolo di Po vi sono le così dette valli di Runci; queste alcuni anni di pioggia sono allagate e allora abbondano gli uccelli acquatici nidificandovi i seguenti: *Fulica atra*, *Rallus aquaticus*, *Gallinula chloropus*, *Hydrochelidon nigra*, *Podiceps fluviatilis* e altre specie ancora; invece negli anni asciutti l'acqua è scarsa e gli uccelli mancano. Il comune di Castagnaro comprende parte delle valli Veronesi, queste una volta erano paludi ora sono in asciugamento tanto che nell'estate sentono bisogno d'acqua. Alcuni inverni però, come quest'anno (1887), sono in parte allagate, allora compariscono gli uccelli di ripa e quelli acquatici.

In generale il distretto è povero di uccelli, poichè l'agricoltura stessa impedisce la propagazione di questi. Quanti nidi di Quaglia vengono distrutti dai falciatori e dai mietitori! I vecchi alberi vengono tagliati e le nuove piantagioni offrono poca sicurezza pegli uccelli nel tempo della nidificazione. I cacciatori ed i mezzi di distruzione sono aumentati, le sole Passere per quante se ne distrugga, sono in notevole aumento.

Elenco generale delle specie di uccelli osservate nella provincia di Rovigo, distretto di Badia Polesine, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, ec.

Corvus Corone, *Corvo*, *Grola*, *Cornacia*. Scarsa.

Corvus Cornix, *Corvo*, *Grola*, *Cornacia munara*, *Cornacia senarina*. Scarsa, sedentaria.

Corvus frugilegus, *Corvo*, *Grola*, *Cornacia*. Abbondante.

Lycos Monedula, *Cornacia de tore*. Ve ne sono due colonie numerose nelle vicine città di Rovigo e Lendinara; qui scarsa.

Pica rustica, *Gaza mora*, *Gaza da la coa longa*. Comune, sedentaria.

Digitized by Google

Garrulus glandarius, *Gaza rossa*, *Gaza magiona*. Comune, sedentaria.

Sturnus vulgaris, *Stórlo*. Molto abbondante e sedentario.

Pastor roseus, *Storlo color de rosa*. Rarissimo, comparve solo in maggio.

Fringilla cœlebs, *Finco*. Comune e sedentario.

Fringilla Montifringilla, *Finco montan*. Rara.

Passer montanus, *Passara megiarola*, *Sélega megiarola*. Comune e sedentaria.

Passer Italiæ, *Passara*, *Sélega*. Sedentaria e comune.

Coccothraustes vulgaris, *Becogrosso*. Sedentario e comune.

Ligurinus Chloris, *Garziero*, *Scerante*. Sedentario e comune.

Chrysomitris Spinus, *Lugarin*. Poco comune.

Carduelis elegans, *Gardelin*. Comune e sedentario.

Serinus hortulanus, *Sfrisarin*. Raro.

Cannabina Linota, *Faganelo*. Comune.

Pyrrhula europæa, *Subioto*. Rarissimo.

Loxia Curvirostra, *Beco in crose*. Rarissimo.

Miliaria Projer, *Petonzo*. Scarso.

Emberiza Citrinella, *Squajardola*. Comune.

Emberiza Hortulana, *Ortolano*. Poco comune.

Emberiza Schœniclus, *Pionza*. Comune.

Emberiza pyrrhuloïdes, *Pionza*. Scarsa, ma sedentaria.

Melanocorypha Calandra, *Calandra*. Rara.

Calandrella brachydactyla, *Lodolin*. Rarissimo. Ne uccisi uno il 18 ottobre 1875 nelle valli Veronesi.

Alauda arborea, *Barluato*. Scarsa.

Alauda arvensis, *Lodola*. Abbondante e sedentaria.

Galerita cristata, *Capéluga*. Comune e sedentaria.

Anthus pratensis, *Fista*. Comune.

Anthus trivialis, *Tordina*. Comune.

Anthus Spipoletta, *Fiston*. Scarsa.

Budytes flavus, *Boarina*. Comune.

Budytes cinereocapillus, *Boarina*. Comune.

Motacilla alba, *Boarina*. Abbondante e sedentaria.

Calobates melanope, *Boarina*. Comune e sedentaria.

Saxicola Oenanthe, *Cul bianco*. Scarso.

Digitized by Google

Monticola saxatilis, *Coa rossa de monte.* Rarissimo.
Monticola Cyanus, *Passara solitaria.* Rarissima.
Merula nigra, *Merlo.* Abbondante e sedentario.
Merula torquata, *Merlo dal petto bianco.* Rarissimo.
Turdus pilaris, *Tordo.* Comune.
Turdus iliacus, *Tordo.* Scarso.
Turdus musicus, *Tordo da ua.* Comune.
Turdus viscivorus, *Tordo gazaro.* Comune e sedentaria.
Aëdon Luscinia, *Rossignolo.* Comune, nidificante.
Erithacus Rubecula, *Petorosso.* Comune.
Cyanecula Wolfi, *Coarosso foresto.* Rarissimo.
Ruticilla Phœnicurus, *Coarossa.* Scarso.
Ruticilla titys, *Coarossa.* Scarso.
Pratincola Rubicola, *Batiale.* Comune, nidifica.
Pratincola Rubetra, *Batiale.* Scarso.
Sylvia nisoria, *Rossignolo bastardo.* Comune, nidifica.
Sylvia cinerea, *Biancheto.* Scarsa, nidificante.
Sylvia Curruca, *Canevarola.* Comune, nidifica.
Monachus Atricapillus, *Caonero.* Comune, nidifica.
Monachus hortensis, *Becafigo.* Scarso.
Phylloscopus sibilator, *Luí*, *Caneto.* Comune.
Phylloscopus Trochilus, *Luì*, *Caneto.* Comune.
Phylloscopus rufus, *Luí*, *Caneto.* Scarso.
Hypolais icterina, *Canevarola.* Scarso.
Hypolais polyglotta, *Canevarola.* Nidificante, ma scarso.
Acrocephalus streperus, *Canevarola.* Nidificante e comune.
Acrocephalus arundinaceus, *Passara palugana.* Com. e nidif.
Calamodus aquaticus, *Caneto.* Nidificante e comune.
Cisticola cursitans, *Caneto.* Scarso, ne ebbi uno l'agosto di quest' anno.
Troglodytes parvulus, *Rusetto.* Comune.
Accentor modularis, *Moretta.* Comune.
Regulus cristatus, *Stellin.* Comune.
Regulus ignicapillus, *Stellin.* Scarso.
Ægithalus pendulinus, *Pendolin.* Nidificante e raro.
Acredula caudata, *Ocio de bo.* Rarissima, ne uccisi una nell' inverno dell' anno 1874.

Digitized by Google

Acredula rosea, *Ocio de bo.* Abbondante sedentaria.

Panurus biarmicus, *Mustacin, Organeto de la China.* Rarissimo.

Parus major, *Sparussola, Cinciribin.* Comunissima e sedentaria.

Parus ater, *Cinciribin, Sparussolin.* Scarsa di passaggio in autunno.

Cyanistes cæruleus, *Fratin, Cinciribin, Celestin.* Comune e sedentaria.

Pœcile palustris, *Cinciribin sénarin.* Comune e sedentaria.

Sitta cæsia, *Ciò-ciò, Rampeghin.* Comune e sedentario.

Certhia brachydactyla, *Rampeghin.* Scarso. Io ne ebbi pochi individui.

Tichodroma muraria, *Rampeghin de monte.* Rarissimo; ne uccisi uno il 22 ottobre 1877, altri due furono presi nel settembre 1885.

Oriolus Galbula, *Melesia.* Nidificante e comune.

Lanius Excubitor, *Resestola falconiera.* Scarsa.

Lanius minor, *Resestola falconiera.* Nidificante, ma scarsa.

Lanius Collurio, *Resestola.* Nidificante ed abbondante.

Lanius auriculatus, *Resestola da la testa rossa.* Rara, ma nidificante.

Butalis Grisola, *Batiale.* Scarso.

Hirundo rustica, *Rondenina, Sisila, Rondinela.* Comune ed estiva.

Chelidon urbica, *Tartagin.* Estivo e comune.

Clivicola riparia, *Tartagin.* Comune.

Cypselus Apus, *Rondon.* Comune, estivo.

Cypselus Melba, *Rondon bianco, Rondon marin.* Rarissimo.

Caprimulgus europæus, *Bocassa.* Estivo e comune.

Picus major, *Pigosso.* Comune e sedentario.

Picus medius, *Pigossetto.* Rarissimo, ma sedentario.

Picus minor, *Pigossetto.* Scarso e sedentario.

Gecinus viridis, *Pigosso verde.* Comune, sedentario.

Iynx Torquilla, *Storzicolo.* Abbastanza comune e nidificante.

Cuculus canorus, *Cucco.* Estivo ed abbondante.

Alcedo Ispida, *Piombin.* Comune e sedentario.

Coracias Garrula, *Gaza marina.* Rarissima.

Digitized by Google

Merops Apiaster, *Vesparolo*. Rarissimo.
Upupa Epops, *Galeto de monte*. Nidificante, ma scarsa.
Strix flammea, *Aloco*, *Barbagian*. Comune e sedentario.
Syrnium Aluco, *L'Osel cavalaro*, *Soeton*, *Aloco*. Comune e sedentario.
Asio Otus, *Aloco*. Comune, sedentario.
Asio accipitrinus, *Aloco de vale*. Comune e sedentario. Alcuni autunni abbondante.
Athene Noctua, *Soeta*. Comune e sedentario.
Scops Giu, *Ciù*. Scarso, estivo.
Bubo maximus, *Gran duca*. Rarissimo
Circus æruginosus, *Poja*, *Pojana*. Comune.
Circaëtus Gallicus, *Aquiloto*. Rarissimo.
Aquila Chrysaëtus, *Aquila reale*. Rarissima. So di una sola cattura.
Buteo vulgaris, *Poja*. Comunissima e sedentaria.
Milvus Ictinus, *Forfeson*. Rarissimo.
Falco Peregrinus, *Falchetton*. Rarissimo.
Hypotriorchis Subbuteo, *Falchetto*. Scarso.
Æsalon regulus, *Falchetto*. Scarso.
Cerchneis Tinnunculus, *Storela*, *Falchetto*. Comunissimo e sedentario.
Cerchneis Naumanni, *Falchettin*. Rarissimo.
Cerchneis vespertinus, *Falchetto*. Rarissimo.
Astur palumbarius, *Falco palombaro*. Rarissimo.
Accipiter Nisus, *Pogianelo*, *Falchettin*. Comune.
Phalacrocorax Carbo. Rarissimo, ne ebbi uno ucciso lungo l'Adige vicino a Badia Polesine nel dicembre 1878.
Ardea cinerea, *Sgarzo*. Scarso.
Ardea purpurea, *Sgarzo*. Scarso.
Egretta alba, *Airon*. Scarsa.
Egretta Garzetta, *Sgarzetta*. Scarsa.
Ardeola ralloïdes, *Sgarzetta*. Scarsa.
Ardetta minuta, *Trenta coste*. Estivo e comune.
Botaurus stellaris, *Tarabuso*. Sedentario, ma scarso.
Nycticorax griseus, *Sguà*. Scarso.
Ciconia alba, *Sigogna*. Rarissima.

Digitized by Google

Plegadis Falcinellus. Rarissimo, fu preso una sol volta.
Cygnus musicus, *Signo.* Rarissimo.
Anser cinereus, *Oca salvadega.* Rara.
Anser segetum, *Oca salvadega.* Scarsa.
Anas Boscas, *Mázoro* il maschio, *Anara* la femmina. Comune assai e sedentario.
Chaulelasmus streperus, *Albaro.* Scarsa.
Spatula clypeata, *Paloto.* Comune.
Dafila acuta, *Colanzo.* Molto comune.
Mareca Penelope, *Fio.* Molto comune.
Nettion Crecca, *Sarségna.* Sedentaria e molto comune.
Querquedula Circia, *Rochéto.* Comune.
Fulix ferina, *Munarasso*, *Moretton.* Comune.
Fulix Fuligula, *Moretta.* Scarsa.
Fulix Nyroca, *Moretta.* Comune, anche sedentaria.
Bucephala Clangula, *Quattroci.* Raro.
Mergus Merganser, *Imperga.* Rarissimo; ne vidi due uccisi nell' inverno del 1883.
Mergus Serrator, *Imperga.* Raro.
Mergellus Albellus, *Imperga.* Scarsa.
Columba Palumbus, *Colombo salvadego*, *Favazo.* Comune.
Columba Oenas. *Colombo salvadego.* Scarsa.
Columba livia, *Colombo torresàn.* Scarso.
Turtur tenera, *Tortora.* Comune ed estiva.
Starna Perdix, *Pernise.* Rara, ma sedentaria.
Coturnix communis, *Quagio.* Comune, abbondante, qualcuna rimane l' inverno.
Lagopus mutus. Nell' inverno dell' anno 1875 nelle valli Veronesi e precisamente nella località chiamata *La Torretta* vennero uccisi due individui; io ne vidi uno a Legnago in carne.
Rallus aquaticus, *Sforzana*, *Beccarossa.* Comune e sedentaria.
Ortygometra Porzana, *Girardina.* Comune.
Ortygometra Bailloni, *Cavalarin.* Comune.
Ortygometra parva, *Cavalarin.* Comune.
Crex pratensis, *Re de quagie.* Scarso.
Gallinula chloropus, *Viatara.* Sedentaria, ma scarsa.

Digitized by Google

Fulica atra, *Folega*. Comune e sedentaria.
Grus communis, *Gru*. Di passaggio accidentale; rara.
Œdicnemus scolopax. Rarissimo.
Charadrius Pluvialis, *Piviere*. Scarso.
Ægialitis curonica, *Piviere*. Comune.
Vanellus Capella, *Paonzina*, *Ciniga*. Com. abbond. alcuni anni.
Himantopus candidus, *Gambetton*. Rarissimo.
Pelidna subarquata, *Totanin*, *Biseghin*. Scarso.
Actodromas minuta, *Biseghin*. Comune.
Machetes Pugnax, *Gambetton*. Comune.
Tringoïdes Hypoleucus, *Cul bianco*. Comune.
Totanus Ochropus, *Cul bianco*. Scarso.
Totanus Glareola, *Cul bianco*, *Totano*. Comune.
Totanus Calidris, *Totano*. Comune.
Totanus fuscus, *Totano*. Comune.
Terekia cinerea. Nell'ottobre dell'anno 1876 andando a caccia di Lodole nelle valli Veronesi in compagnia di mio fratello, questi uccise un piccolo trampoliere che non potei allora determinare; alcuni giorni dopo acquistai l'*Ornitologia* del Savi e dai caratteri tanto evidenti conobbi essere stata una *Terekia cinerea;* allora io non raccoglievo uccelli, e disgraziatamente non venne imbalsamata.
Limosa melanura, *Gambetton*. Scarsa.
Scolopax Rusticula, *Galinazza*. Scarsa; fu abbondante solo l'autunno dell'anno 1873.
Gallinago major, *Ciochèta*. Scarso.
Gallinago cælestis, *Becanoto*. Comune, alcuni anni abbondante, l'estate del 1873 specialmente.
Gallinago Gallinula, *Becanela*. Scarso.
Numenius Arquata, *Arcaza*. Raro.
Sterna fluviatilis, *Crocalina*. Comune.
Sternula minuta, *Crocalina*. Scarso.
Hydrochelidon hybrida, *Crocalina*. Rarissimo.
Hydrochelidon nigra, *Crocalina*. Estiva e comune.
Chroocephalus minutus, *Crocalina*, Rarissimo, ne uccisi un solo individuo nell'ottobre 1882 nelle valli Veronesi.

Digitized by Google

Chroocephalus ridibundus, *Crocale*. Comune.

Larus canus, *Gatto de mare*, *Crocalo*. Scarsa.

Larus cachinnans. Rarissimo, ne vidi uno lungo l'Adige.

Megalestris Catarrhactes. Rarissimo, all'eccezione dell'individuo che mandai al R. Museo Zoologico di Firenze, non conosco altre catture.

Colymbus glacialis. Nel dicembre 1878 ne fu ucciso una lungo l'Adige, non conosco altre catture; rarissima.

Podiceps cristatus, *Fisolo*. Raro.

Podiceps nigricollis, *Fisolo*. Raro.

Podiceps fluviatilis, *Strapozzeto*. Comune e sedentario.

Elenco delle specie di uccelli le quali nidificano nella provincia di Rovigo, distretto di Badia Polesine, colle notizie più importanti in proposito.

Corvus Cornix. L'unico nido di questa specie lo trovai il 26 giugno 1878, con 5 uova.

Pica rustica. Nidifica nei mesi d'aprile e maggio; le uova sono da 4 a 7; la durata dell'incubazione di giorni 21 circa.

Garrulus glandarius. Nidifica in aprile, uova da 4 a 7; cova 16 o 17 giorni.

Sturnus vulgaris. Due covate all'anno; però osservai che non tutti, ma ben pochi, rimangono per la seconda covata; questa osservazione la faccio da molti anni avendo in vicinanza un'alta fabbrica dove ogni anno nidificano gli Storni. Cova solo la femmina 6 a 7 uova in aprile e giugno.

Fringilla cœlebs. Cova anche il maschio, fa due covate in maggio e giugno di 5 a 6 uova.

Passer montanus. Due ed anche tre covate di 4 o 5 uova in maggio e luglio; cova anche il maschio.

Digitized by Google

Passer Italiæ. Due ed anche tre covate come la precedente.

Coccothraustes vulgaris. Due covate di 4 a 5 uova in maggio e luglio; cova anche il maschio.

Ligurinus Chloris. Due covate di 4 a 5 uova, da aprile a luglio; il maschio non cova, dura l'incubazione 15 giorni.

Carduelis elegans. Una sola covata in giugno e luglio, che dura 15 giorni; il maschio non cova.

Emberiza pyrrhuloïdes. Da 4 a 5 uova.

Alauda arvensis. Nidifica dai primi giorni di marzo a luglio, fa due a tre covate di 5 a 6 uova; il maschio cova.

Galerita cristata. Due covate di 4 a 6 uova; il maschio pure cova, l'incubazione dura 14 giorni circa.

Motacilla alba. Il maschio non cova; fa due covate di 5 a 8 uova da aprile a giugno.

Calobates melanope. La femmina sola cova 5 a 6 uova; fa due covate da aprile a giugno.

Merula nigra. Due ed anche tre covate da marzo ad agosto di 5 a 6 uova; il maschio cova.

Turdus viscivorus. Due covate, il resto come sopra.

Aëdon Luscinia. Una sola covata in maggio di 5 a 6 uova; cova pure il maschio.

Pratincola Rubicola. Due covate di 5 a 6 uova da aprile a luglio; il maschio non cova.

Sylvia nisoria. Una sola covata di 4 a 6 uova in maggio e giugno; il maschio non cova.

Sylvia cinerea. Due covate, aprile e luglio di 4 a 5 uova.

Sylvia Curruca. 4 a 6 uova, cova anche il maschio.

Monachus Atricapillus. Due covate da aprile a luglio di 4 a 6 uova; vi prende parte anche il maschio.

Hypolais polyglotta. In giugno mi fu recato un nido con 5 pulcini.

Acrocephalus streperus. Sono certo che nidifica, però non trovai mai il nido.

Acrocephalus arundinaceus. Una covata di 5 uova in maggio; cova anche il maschio; la durata dell'incubazione è di 15 giorni.

Calamodus aquaticus. Nidifica; però io non ebbi mai il nido.

Digitized by Google

Ægithalus pendulinus. Una volta il nido, tanto bello, si trovava abbondante nelle valli Veronesi, io però in questi anni di osservazione non ne vidi che uno solo, che conteneva 5 uova.

Acredula rosea. Una sola covata con fino 18 uova, nell'aprile; la durata dell' incubazione sarebbe di 15 giorni.

Parus major. La prima covata di 8 a 12 uova, cova pure il maschio; la seconda covata di 4 a 6 uova.

Cyanistes cæruleus. Come sopra.

Pœcile palustris. Come sopra.

Sitta cæsia. Da aprile a maggio 5 ad 8 uova; la durata dell' incubazione sarebbe di 15 giorni.

Lanius minor. Fa una sola covata di 5 a 6 uova; cova anche il maschio.

Lanius Collurio. In giugno una sola covata di 5 a 6 uova.

Lanius auriculatus. Nidificò quest' anno da noi.

Hirundo rustica. Fa due covate in mag. e lug. di 5 a 6 uova.

Chelidon urbica. Fa due covate in maggio e luglio, la femmina sola cova per 13 a 14 giorni.

Cypselus Apus. Una sola covata in mag.-giug. di 4 a 5 uova.

Caprimulgus europæus. Una o due uova deposte nel mese di luglio.

Oriolus Galbula. Una sola covata in giug., le uova sono 5 o 6.

Picus major. Depone 4 a 6 uova da aprile a giugno; il maschio pure cova.

Picus medius. Ebbi i nidiacei.

Picus minor. Nidifica, ma non ebbi il nido.

Gecinus viridis. Depone da 6 ad 8 uova in aprile e giugno; cova pure il maschio; l' incubazione dura 17 giorni.

Iÿnx Torquilla. In maggio e giugno depone 6 ad 8 uova, trovai a covare anche il maschio.

Cuculus canorus. Depone nei nidi degli altri uccelli le proprie uova; ne trovai nel nido del *Monachus Atricapillus* e dell' *Acrocephalus arundinaceus.*

Alcedo Ispida. Da aprile a giugno depone 6 a 7 uova.

Upupa Epops. Trovai a covare la sola femmina in un nido con 7 uova nel mese di giugno.

Digitized by Google

Strix flammea. Depone da 4 a 6 uova in maggio e giugno.

Syrnium Aluco. La femmina sola cova 5 o 6 uova.

Asio Otus. La femmina sola cova da 4 a 5 uova in marzo ed aprile.

Asio accipitrinus. In maggio depone 4 o 5 uova.

Athene Noctua. Depone da 4 a 6 uova nei mesi di aprile e maggio; durata dell'incubazione 15 giorni.

Buteo vulgaris. Depone da 4 a 5 uova in maggio e giugno.

Scops Giu. Depone 5 uova in maggio e giugno.

Cerchneis Tinnunculus. Depone da 5 a 6 uova in maggio e giugno; fa una sola covata ed il maschio non cova.

Ardetta minuta. Trovai molti nidi con i pulcini appena nati negli ultimi giorni d'agosto dell'anno 1879 nelle valli di Runci presso Rovigo, depone da 5 a 6 uova.

Botaurus stellaris. Sono certo che nidifica da noi, però non ebbi mai il nido.

Anas Boscas. Nidifica positivamente da noi.

Nettion Crecca. Ebbi le uova in maggio.

Fulix Nyroca. Nei primi giorni d'agosto del 1879 nelle valli di Runci, vidi i giovani che ancora non volavano, venne uccisa la madre.

Turtur tenera. Fa una sola covata di 2 uova nei mesi di maggio e giugno; cova anche il maschio.

Starna Perdix. Fa una sola covata ai primi di maggio di 10 a 11 uova; cova la sola femmina per 21 giorni.

Coturnix communis. Fa due covate di 10 a 17 uova; cova solo la femmina per 21 giorni.

Rallus aquaticus. Depone da 6 ad 8 uova; nidifica in maggio.

Gallinula chloropus. Trovai un nido con 10 uova; fa due covate da maggio a luglio.

Fulica atra. Depone in maggio 10 a 12 uova; dura l'incubazione giorni 21.

Hydrochelidon nigra. In giugno trovai diversi nidi con 3 a 4 uova.

Podiceps fluviatilis. Cova da maggio a giugno, fa due covate di 4 a 5 uova.

Digitized by Google

EMILIA.

Bologna, distretto di Vergato (Lorenzini Demetrio[1]):

Questo distretto di osservazione comprende tutto il circondario di Vergato e confina: a NE. con quello di Bologna, a NO. colla provincia di Modena e a SO. con quella di Firenze. Le vallate principali di questa regione appenninica, assai montuosa, sono quelle del Reno, della Limentra, del Sette, del Dardagna, del Sela o Sila, del Vergatello e di tutti i loro rispettivi confluenti. Le sue quote altimetriche sul livello del mare oscillano da un minimo di m. 250 a Marzabotto e un massimo di m. 1939. 19 sul Corno delle Scale.

La vegetazione arborea che ne riveste i monti può distinguersi dall' alto in basso in tre zone o regioni: la zona del Faggio, quella del Castagno e quella della Quercia, limitate da linee quando più quando meno flessuose. La vegetazione erbacea poi ricopre al di sopra della zona del Faggio la sommità del crinale appenninico di un bel tappeto scivolante verde grigiastro dovuto al *Nardus stricta*, e fra i vani di questa gregaria graminacea crescono mirabilmente molte belle specie che caratterizzano la flora alpina e rendono variopinto questo tappeto nella breve calda stagione. Estesi talora e lussureggianti sono i pascoli presso la sommità della cresta appenninica.

Alla suddetta vegetazione erbacea si mescola poi più in basso della cresta quella di piccoli arbusti tra i quali sono notevoli il *Juniperus nana*, il *Rhamnus alpinus*, i baggioli ec., ec. che danno buon pascolo coi loro frutti agli uccelli. Al limite inferiore della regione del Faggio comincia quella del Castagno, la quale si svolge per la mag-

[1] Il signor D. Lorenzini ha dato alcuni cenni generali interessanti riguardanti l' Avifauna del distretto di Vergato nella sua opera: *Guida dei Bagni della Porretta*. Porretta, 1886.

Digitized by Google

giore estensione dell'Appennino bolognese. In questa zona si comprendono più che nelle superiori le coltivazioni dei cereali e per gran parte quella della vite (sino all' altezza dai 500 ai 600 metri). Nella regione della Quercia la coltivazione dei cereali, dei prati artificiali, dei vigneti e altre svariate raggiungono proporzioni ragguardevoli.

Elenco delle specie di uccelli osservate nel distretto di Porretta, Vergato, provincia di Bologna, con nomi volgari locali e notizie di frequenza, nidificazione, ec.

Corvus Corone. Erratica e poco frequente

Corvus Cornix. Nidificante ed erratica.

Corvus frugilegus. Poco comune, invernale.

Garrulus glandarius, *Giandara.* Sedentaria e comunissima.

Sturnus vulgaris. Scarso alle due epoche del passo e anche d' inverno.

Fringilla cœlebs, *Franguel.* Sedentario e comune.

Fringilla Montifringilla. Poco frequente e nidificante.

Petronia stulta, *Passera bastarda.* Poco numerosa, nidifica tra i castagni.

Passer montanus, *Zelega.* Poco comune, invernale.

Passer Italiæ. Sedentaria e abbondante.

Coccothraustes vulgaris, *Frison.* Scarso, nidificante ed erratico nell' inverno.

Ligurinus Chloris. Comune, nidificante, erratico.

Carduelis elegans, *Gardlin.* Comune, erratico, di raro rimane l' inverno.

Serinus hortulanus, *Giallino, Cardarugiolo.* Nidificante ed erratico.

Cannabina Linota. Poco abbondante.

Pyrrhula europæa. Raro, nidifica tra i faggi e castagni, erratico d' inverno.

Digitized by Google

Emberiza Citrinella, *Pajariz.* Nidificante ed erratico.
Emberiza Hortulana. Raro, nidificante, estivo.
Alauda arvensis. Nidificante ed erratica.
Galerita cristata. Poco frequente, ma nidificante.
Anthus trivialis, *Spipola.* Nidificante ed erratica.
Anthus Spipoletta, *Spiplina.* Nidifica in alto ed emigra nell' autunno.
Motacilla alba, *Guardianina.* Sedentaria e comune.
Calobates melanope, *Guardianina gialla.* Scarsa e sedentaria.
Saxicola Oenanthe. Comune ed estivo.
Monticola saxatilis, *Merel sassar.* Poco frequente, ma nidificante.
Monticola Cyanus. Non comune, nidificante ed erratico.
Merula nigra, *Merel.* Frequente e sedentario; nell' autunno vedesi una varietà detta *maremmana*, il cui maschio è di un nero grigiastro con becco scuro.
Merula torquata. Usualmente rara, ma nell' autunno 1866 ve ne fu abbondante passaggio ed a Bologna si vendevano col nome di *Merli della Porretta.*
Turdus pilaris, *Colombella.* Di passo autunnale.
Turdus iliacus, *Susino*, *Susinello.* Frequente sulla fine dell' autunno.
Turdus musicus, *Tord.* Poco frequente di doppio passo; alcune coppie nidificano in alto tra i faggi.
Turdus viscivorus, *Gesso.* Frequente e sedentaria.
Aëdon Luscinia. *Lusignol.* Scarso, nidificante.
Erithacus Rubecula, *Pittiros.* Comune, nidifica sui monti, erratico d' inverno.
Ruticilla Phœnicurus, *Codirossola.* Frequente e nidificante.
Ruticilla titys, *Codirossola di monte.* Poco frequente, nidifica in alto; in autunno scende per qualche tempo nella regione della Quercia, quindi cala al piano.
Pratincola Rubicola, *Saltimpunta.* Poco comune, ma nidificante.
Monachus Atricapillus. Comune e nidificante.
Monachus hortensis. Poco abbondante e nidificante; vedesi specialmente in agosto e settembre.

Digitized by Google

Cettia Cettii. Non frequente, ma nidificante.
Troglodytes parvulus, *Ariattin.* Comune e sedentario.
Cinclus aquaticus, *Merel aquar.* Sedentario, comune.
Accentor modularis, *Passra d' macia.* Poco comune, nidificante ed erratica.
Regulus cristatus, *Uslìn dal fred.* Scarso, invernale.
Regulus ignicapillus, *Uslìn dal fred.* Scarso, invernale.
Acredula rosea, *Pulzon.* Sedentaria e comune.
Parus major, *Paranzino.* Comune e sedentaria.
Parus ater. Sedentaria, ma poco frequente.
Cyanistes cæruleus, *Paranzin piccol.* Sedentaria.
Certhia brachydactyla, *Beccaragni.* Scarso e sedentario.
Tichodroma muraria. Accidentale nell' inverno.
Sitta cæsia, *Brescandalo.* Comune e sedentario
Oriolus Galbula, *Sgalbedèr.* Estivo, nidificante.
Ampelis Garrulus. Un solo colto nel 1867.
Lanius minor, *Bufferla grossa.* Estiva e nidificante.
Lanius Collurio, *Bufferla piccola.* Comune, estiva.
Lanius auriculatus, *Bufferla mezzana.* Estiva, scarsa.
Hirundo rustica, *Rondanina.* Comune, arriva in marzo, fa due covate e parte in settembre.
Chelidon urbica, *Rondic.* Comune, estivo.
Cotile rupestris. Nidifica sugli alti monti, da dove scende sul finire dell' estate in branchi numerosissimi; se allora un temporale li sorprende, si fermano aggruppati insieme come uno sciame di api, sotto le grondaie o sopra un albero e allora facilmente si prendono.
Cypselus Apus. Giunge il 25 apr., nidifica e parte il 25 lug.
Cypselus Melba. Di comparsa accidentale.
Caprimulgus europæus, *Fialapp.* Scarso ed estivo.
Picus major. Non frequente e nidificante.
Picus minor. Raro, ma nidificante.
Gecinus viridis, *Pigh gross.* Sedentario e frequente.
Iÿnx Torquilla, *Gavitorciola.* Estivo.
Cuculus canorus, *Cuch.* Estivo e frequente.
Alcedo Ispida, *Piumbin.* Sedentario.
Upupa Epops, *Puppla.* Estiva, ma non frequente.

Digitized by Google

Strix flammea, *Barbazagn.* Rarissimo.
Syrnium Aluco, *Locch.* Sedentario.
Asio Otus. Accidentale in ottobre 1887.
Athene Noctua, *Zivetta.* Frequente e sedentaria.
Scops Giu, *Ciuu.* Estivo e frequente.
Bubo maximus. Accidentale.
Aquila Chrysaëtus. Accidentale nel 1886.
Buteo vulgaris, *Pujen.* Scarsa e nidificante.
Falco Peregrinus. Scarso, ma nidificante.
Æsalon regulus, *Falchett da Passer.* Comune, forse sedentario; nidificante.
Cerchneis Tinnunculus, *Falchett.* Comune, nidificante.
Cerchneis vespertinus. Di passaggio.
Accipiter Nisus, *Falchett.* Sedentario.
Ardea cinerea. Accidentale nell'estate.
Ardeola ralloïdes. Accidentale.
Botaurus stellaris. Accidentale.
Nycticorax griseus. Rarissimo, uno venne ucciso nell'inverno del 1886.
Anas Boscas. Accidentale nell'inverno.
Columba Palumbus, *Clumb favazz.* Poco comune, di passaggio e anche nidificante.
Columba Oenas. Scarsa di passaggio.
Turtur tenera, *Tortorina.* Estiva.
Starna Perdix. Frequente e sedentaria nella zona della Quercia.
Coturnix communis. Scarsa ed estiva; nel 1886 ve ne fu un passo straordinario per abbondanza.
Gallinula chloropus. Accidentale.
Fulica atra, *Folga.* Accidentale.
Grus communis. Passa a stormi in alto in ott. e novembre.
Charadrius Pluvialis. Raro nell'inverno.
Vanellus Capella, *Gallinella.* Rara.
Scolopax Rusticula, *Pizzacra.* Giunge in numero discreto in ottobre, non sverna e ripassa in primavera.
Gallinago major, *Pizzaccherino.* Accidentale.
Gallinago cælestis, *Pizzaccarin.* Scarso.

Digitized by Google

Gallinago Gallinula. Accidentale.
Larus canus. Accidentale.

Parma, (Del Prato dott. Alberto):

Le osservazioni intorno agli uccelli del Parmense, salvo indicazioni contrarie, non si estendono all'intera provincia. Sono anzi per la maggior parte compiute nel breve tratto del circondario di Parma che inferiormente all'Emilia fino al Po, va dal torrente Enza fino all'altro detto Rovacchia; al quale tratto si deve aggiungere una breve porzione della destra del Po fra lo sbocco dell'Enza e la città di Guastalla. Tutta questa regione è assolutamente piana ed è solcata da tre grossi torrenti, l'Enza, il Parma ed il Taro di un regime molto vario, e da numerosi cavi e canali di acque perenni: essa è completamente coltivata e solo piccole porzioni di boschi si rinvengono qua e là lungo le sponde dei torrenti; la coltivazione vi è uniforme a prati stabili ed irrigui od artificiali non irrigui, a campi di frumento e melica ed a piccoli tratti di fave, canape, orti, vigne, risaie. Attraversata questa regione da fitta rete di strade, è ripartita in poderi piuttosto piccoli cinti da siepi, e le varie coltivazioni a guisa di irregolare scacchiere si intercalano l'una all'altra, onde raramente si trovano identiche condizioni per lunghi tratti. Mancano stagni d'acqua e la limitata coltivazione del riso si ha solo nelle vicinanze del Po.

Nell'estate la regione parmense è visitata da pioggie temporalesche e localizzate, nell'autunno e primavera è piuttosto una regione di pioggia, e di nevi nell'inverno che si rendono spesso stabili per due o tre mesi con forte freddo e gelo.

Finalmente osservasi che vi sono poche e non rispettate riserve di caccia.

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Parma, con nomi volgari locali ed indicazioni sulla frequenza, nidificazione, ec. [1]

Corvus Corax. Accidentale; uno preso il 1 febbraio 1889 vicino a Borgotaro.
Corvus Cornix. Sedentaria.
Corvus frugilegus. Sedentario (?).
Lycos Monedula. Accidentale.
Pica rustica. Sedentaria, nidificante.
Garrulus glandarius. Sedentaria, nido con 2 uova 10 giugno.
Sturnus vulgaris. Sedentario, nidificante.
Pastor roseus. Accidentale, avuto il 12 gennaio 1884.
Fringilla cœlebs. Sedentario e nidificante.
Fringilla Montifringilla.
Petronia stulta.
Passer montanus. Sedentaria e nidificante.
Passer Italiæ. Sedentaria e nidificante.
Coccothraustes vulgaris. Sedentario e nidificante.
Ligurinus Chloris. Sedentario e nidificante.
Chrysomitris Spinus. Scarso.
Carduelis elegans. Sedentario e nidificante.
Serinus hortulanus. Scarso.
Cannabina Linota. Frequente.
Ægiothus Linarius, *Fanèll d'la Regenna.* Accidentale.
Pyrrhula europæa. Nidifica ai monti, erratico d'inverno.
Loxia Curvirostra. Accidentale, veduto nel 1879 e 1887 in agosto.
Miliaria Projer. Sedentario e nidificante.
Emberiza Citrinella. Frequente.
Emberiza Cirlus. Scarso.
Emberiza Hortulana. Estivo, avuto nido 8 luglio con uova.

---

[1] Il dott. Alberto Del Prato ha pubblicato un *Catalogo degli Uccelli fin ora rinvenuti nelle province di Parma e Piacenza.* Parma, 1881.

Digitized by Google

Emberiza Schœniclus. Abbastanza frequente.
Alauda arborea. Sedentaria e nidificante.
Alauda arvensis. Sedentaria e nidificante.
Galerita cristata. Sedentaria e nidificante.
Agrodroma campestris. Non raro.
Anthus pratensis. Frequente.
Anthus trivialis. Frequente.
Anthus Spipoletta. Scarso.
Budytes flavus. Frequente.
Budytes cinereocapillus. Nidificante ed estiva.
Motacilla alba. Sedentaria e nidificante.
Calobates melanope. Sedentaria e nidificante.
Saxicola Oenanthe. Estivo e nidificante.
Monticola saxatilis. Estivo, scarso e nidificante.
Merula nigra. Sedentario in parte; var. *montana* tutte femmine.
Merula torquata. Scarso.
Turdus pilaris. Scarsa.
Turdus iliacus. Non raro.
Turdus musicus. Frequente.
Turdus viscivorus. Sedentaria e nidificante.
Aëdon Luscinia. Estivo e nidificante.
Erithacus Rubecula. Frequente.
Cyanecula Wolfi. Di scarso passaggio marzo, aprile, ottobre.
Ruticilla Phœnicurus. Estivo e nidificante.
Ruticilla titys. Scarso.
Pratincola Rubicola. Frequente.
Pratincola Rubetra. Non raro.
Sylvia nisoria. Estiva, nidificante, scarsa.
Sylvia orphæa. Scarsa.
Sylvia cinerea. Estiva e nidificante.
Monachus Atricapillus. Nidificante.
Monachus hortensis. Scarso.
Pyrophthalma melanocephala. Accidentale.
Phylloscopus Trochilus. Frequente.
Phylloscopus Bonellii. Raro assai.
Phylloscopus rufus. Frequente.

Digitized by Google

Hypolais icterina. Non raro.
Hypolais polyglotta. Non raro.
Acrocephalus palustris. Non rara.
Acrocephalus streperus. Nidificante, avuto nido con uova il 27 maggio e ancora nella prima metà di luglio.
Acrocephalus arundinaceus. Nidificante ed estivo.
Calamodus schœnobænus. Comune nelle risaie.
Calamodus aquaticus. Raro.
Lusciniola melanopogon. Accidentale.
Locustella naevia. Accidentale; uno preso vicino a Parma il 3 ottobre 1889.
Cisticola cursitans. Scarsa.
Troglodytes parvulus. Sedentario e nidificante.
Cinclus aquaticus. Sedentario e nidificante, non varia; erratico d'inverno.
Accentor modularis. Comune.
Regulus cristatus. Comune.
Regulus ignicapillus. Non raro.
Ægithalus pendulinus. Avuto il nido una sola volta.
Acredula rosea. Sedentaria e nidificante.
Parus major. Sedentaria e nidificante; 12 giugno uova in sviluppo.
Parus ater. Per caso straordinario fu comune nell'inverno 1887-88.
Cyanistes cæruleus. Sedentaria e nidificante.
Pœcile palustris. Sedentaria e nidificante.
Sitta cæsia. Sedentario e nidificante.
Certhia brachydactyla. Sedentario e nidificante.
Tichodroma muraria. Erratico.
Oriolus Galbula. Estivo e nidificante; 8 luglio i piccoli.
Lanius Excubitor. Scarsa.
Lanius minor. Estiva e nidificante.
Lanius Collurio. Estiva e nidificante.
Lanius auriculatus. Estiva e nidificante.
Muscicapa collaris. Scarsa, di passo ai primi d'aprile.
Muscicapa Atricapilla. Non comune.
Butalis Grisola. Scarso.

Digitized by Google

Hirundo rustica. Estiva e nidificante.
Chelidon urbica. Estivo e nidificante.
Clivicola riparia. Estivo e nidificante.
Cypselus Apus. Estivo e nidificante.
Cypselus Melba. Due sole catture.
Caprimulgus europæus. Estivo, l'8 agosto ebbi nidiaceo.
Picus major. Sedentario e nidificante.
Picus minor. Sedentario e nidificante.
Gecinus viridis. Sedentario e nidificante.
Iynx Torquilla. Estivo e nidificante.
Cuculus canorus. Non raro.
Alcedo Ispida. Sedentario e nidificante.
Coracias Garrula. Avuta il 28 aprile e nella prima metà del settembre.
Merops Apiaster. Estivo e nidificante; ebbi le uova il 13 giugno.
Upupa Epops. Non rara.
Strix flammea. Sedentario e nidificante.
Syrnium Aluco. Sedentario e nidificante, il 24 maggio giovane già svelto.
Asio Otus. Scarso.
Asio accipitrinus. Non comune.
Athene Noctua. Sedentaria e nidificante.
Scops Giu. Estivo e nidificante.
Bubo maximus. Sedentario, scarso, fors' anche di passo.
Circus æruginosus. Di passaggio scarso, avuto il 6, 8, 17 aprile.
Circus cyaneus. Di passaggio scarso, 7 aprile ed ottobre.
Circus Swainsoni. Rara.
Pandion Haliaëtus. Accidentale, il 26 settembre 1880.
Circaëtus gallicus. Assai raro.
Haliaëtus Albicilla. Di passaggio scarso; presa 3 volte, una il 5 dicembre.
Aquila Chrysaëtus. Sedentaria.
Aquila clanga. Accidentale.
Buteo vulgaris. Sedentaria.
Archibuteo lagopus. Accidentale affatto.

Digitized by Google

Pernis apivorus. Accidentale.
Milvus Ictinus. Accidentale, il 30 novembre 1885.
Falco Peregrinus. Sedentario, ma scarso ed erratico d'inverno.
Hypotriorchis Subbuteo. Scarso.
Æsalon regulus. Non raro.
Cerchneis Tinnunculus. Sedentario e nidificante.
Cerchneis vespertinus. Di passo, avuto dal 23 aprile all'8 maggio.
Astur palumbarius. Accidentale, un maschio giovane il 10 ottobre 1883.
Accipiter Nisus. Sedentario.
Gyps fulvus. Accidentale, un maschio giovane il 21 ottobre 1885.
Pelecanus Onocrotalus. Accidentale.
Phalacrocorax Carbo. Accidentale.
Ardea cinerea. Sedentario e specialmente invernale.
Ardea purpurea. Scarso.
Egretta Garzetta. Avuta il 12 maggio; scarsa, di passaggio.
Ardeola ralloïdes. Avuta il 27 apr.; scarsa, di passo soltanto.
Ardetta minuta. Estivo, frequente.
Botaurus stellaris. Di passo in marzo e novembre.
Nycticorax griseus. Di passo in aprile, rari i giovani.
Ciconia alba. Rare volte si vede nella seconda metà d'agosto.
Ciconia nigra. Di passo in aprile ed agosto.
Platalea Leucorodia. Accidentale.
Plegadis Falcinellus. Veduto il 23 aprile ed il 5 ottobre; scarso, di passo soltanto.
Cygnus musicus. Accidentale nel marzo 1888.
Anser segetum. Scarsa.
Tadorna cornuta. Accidentale.
Anas Boscas. Anche nidificante.
Spatula clypeata. Non raro.
Dafila acuta. Comune.
Mareca Penelope. Comune.
Nettion Crecca. Comune.
Querquedula Circia. Comune.
Fuligula rufina. Accidentale.

Digitized by Google

Fulix ferina. Comune.
Fulix Fuligula. Non rara.
Fulix Nyroca. Non rara.
Bucephala Clangula. Non comune.
Œdemia fusca. Non tanto raro.
Erismatura leucocephala. Accidentale.
Mergus Merganser. Accidentale.
Mergus Serrator. Non comune.
Mergellus Albellus. Scarsa.
Columba Palumbus. Nidificante, ma scarso.
Columba Oenas. Non comune.
Turtur tenera. Estiva e nidificante.
Syrrhaptes paradoxus. Accidentale il 27 maggio 1888.
Perdix rufa. Sedentaria, scarsa.
Perdix saxatilis. Sedentaria ed abbastanza frequente.
Starna Perdix. Sedentaria e nidificante.
Coturnix communis. Estiva e nidificante.
Rallus aquaticus. Abbastanza comune.
Ortygometra Porzana. Abbondante.
Ortygometra Bailloni. Non rara.
Ortygometra parva. Non rara.
Crex pratensis. Estivo, nidificante, ma scarso.
Gallinula chloropus. Sedentaria.
Fulica atra. Sedentaria.
Otis Tarda. Accidentale.
Otis Tetrax. Accidentale.
Œdicnemus scolopax. Estivo e nidificante.
Charadrius Pluvialis. Di passo.
Eudromias Morinellus. Accidentale.
Ægialitis curonica. Abbastanza frequente.
Ægialitis Hiaticula. Non raro.
Vanellus Capella. Comune.
Hæmatopus Ostralegus. Accidentale in aprile.
Recurvirostra Avocetta. Accidentale.
Himantopus candidus. Di passo soltanto.
Actodromas minuta. Di passaggio, 8-10 maggio.
Actodromas Temmincki. Di passaggio, 16 maggio.

Digitized by Google

Machetes Pugnax. Scarsa.
Pelidna alpina. Raro assai.
Tringoïdes Hypoleucus. Abbastanza frequente.
Totanus Ochropus. Non raro.
Totanus Glareola. Scarso.
Totanus stagnatilis. Di passo, 7-23 aprile.
Totanus Calidris. Di passo 21 marzo, 22 aprile, scarsa.
Totanus fuscus. Scarsa.
Totanus nebularius, *Gambinon.* Non comune.
Limosa melanura, *Arsega.* Di passaggio, avuta il 27 aprile.
Scolopax Rusticula. Comune di passo.
Gallinago major. Di passo, 28-31 marzo, scarso.
Gallinago cælestis. Di passo, avuto il 26 dicembre.
Gallinago Gallinula. Non raro.
Numenius Arquata, *Pizzacra d'mar.* Non comune.
Sterna fluviatilis. Comune.
Sternula minuta. Scarso.
Hydrochelidon nigra, *Magnanen.* Comune.
Chroocephalus ridibundus. Non raro.
Larus canus. Di scarso passaggio.
Colymbus glacialis. Accidentale.
Podiceps cristatus. Non raro.
Podiceps cornutus. Accidentale, solo i giovani.
Podiceps nigricollis. Di passaggio scarso.
Podiceps fluviatilis. Sedentario.

Sottoregione Peninsulare o Meridionale.

LIGURIA.

Genova, zona meridionale del circondario di Savona (Piccone cav. Enrico):

Il circondario di Savona ha per confini gli Appennini al N., il Mediterraneo al S., il Capo Noli ad O., e il torrente Levone (tra Cogoleto e Arenzano) ad E. È diviso

Digitized by Google

dagli Appennini in due versanti o zone differenti fra loro. La settentrionale si unisce al Monferrato, ed ha con esso molta analogia nella natura fisica, coltivazione, clima ed eziandio nella Fauna. La meridionale è composta di valli parallele da N. a S. formate dai contrafforti della Catena principale, i quali alti ed aspri al principio, vanno abbassandosi verso mezzogiorno, e ridotti a colline s' immergono a perpendicolo sul mare, a modo di promontorii. Queste valli strette in alto, allargansi poi a modo d'imbuto, dando luogo a pianure più o meno estese; più ampie fra tutte quella tra le due Albissole, e l'altra fra Vado e Savona. La vetta della Catena principale è composta di gerbidi, con qualche bosco di Faggi e Roveri, ed i fianchi di castagneti e boschi cedui con intervalli coltivati. La parte montuosa dei contrafforti è coronata di Pini (*P. sylvestris*) ed ha sui fianchi Castagni, Lecci, Roveri, e in maggiore estensione boschi cedui di Corbezzoli, Mirti, Ginepri, Biancospino, Scope e Ginestre. Sono fra questi molti campi disposti a terrazzo; ma alla marina le colline sono coperte per intero da vigne e uliveti. Le pianure fertilissime sono tutte orti, vigne, giardini.

Pertanto la parte coltivata supera di molto l'incolta e boschiva; e nulle affatto sono le superficie acquatiche e palustri. I torrenti medesimi che solcano le valli, conservano soltanto nell'estate poc'acqua perenne verso la sorgente, ma son sempre asciutti verso la foce. Epperciò gli uccelli aquatici o palustri si vedono solo di passo, e non si arrestano che per riposarsi. La parte piana non corrisponde nemmeno al significato che gli si dà in altri luoghi, sotto il rapporto ornitologico: essa è tutta coperta di ortaglie innaffiate, pergolati, alberi fruttiferi e piena di abitazioni; per cui molti uccelli che altrove si riproducono o soggiornano in pianura, qui s'incontrano di preferenza in collina, salvo nel passaggio, e quando il terreno è bianco di neve.

Sotto l'aspetto ornitologico, importante è la circostanza che alle spalle e vicino a Savona trovasi la maggior depressione degli Appennini, nel colle impropriamente detto

Digitized by Google

di Cadebona invece di Altare, comune situato nel colle medesimo. Il clima è mite come in tutta la Liguria, ma meno della vicina provincia di Porto Maurizio. Due o tre volte all' anno comparisce la neve per poco tempo sulle creste degli Appennini, e qualche volta più in basso sui contrafforti ed anche alla marina stessa, ma per pochi giorni e non tutti gli anni. Al litorale possono vegetare benissimo gli Agavi, il Sughero, il Carubbo, e nei luoghi riparati anche i Palmizii.

Elenco delle specie di uccelli osservate nella zona meridionale del circondario di Savona, provincia di Genova; coi nomi volgari locali e notizie di frequenza, nidificazione, migrazione, ecc. ecc.

Corvus Corax, *Crovo*. Raro.

Corvus Corone, *Goa*. Numerosa, invernale.

Corvus Cornix, *Cornaggia*. Scarsa d'autunno e d'inverno.

Corvus frugilegus, *Goa*. Invernale.

Nucifraga Caryocatactes. Rara. Un solo avuto, preso in collina.

Pica rustica, *Berta*. Piuttosto scarsa, sedentaria ai monti e colline.

Garrulus glandarius, *Gazzanha*. Comune, sedentaria ai monti e colline.

Sturnus vulgaris, *Sturnello*. Numeroso ovunque, non nidifica.

Pastor roseus, *Merlo reusa*. Accidentale, nullo il più degli anni, numeroso in altri.

Fringilla cœlebs, *Fringuello*. Numeroso, sedentario e svernante al piano e più in collina.

Fringilla Montifringilla, *Muntagnín*. Numerosa alle colline e al piano.

Montifringilla nivalis. Raro. Un solo preso in collina vicino al mare.

Digitized by Google

Petronia stulta, *Passuùn.* Numerosa ai monti, colline e piano, invernale ed erratica.

Passer montanus, *Passuetta.* Numerosa alle basse colline e al piano.

Passer Italiæ, *Passua.* Numerosa, sedentaria nell'abitato.

Passer domesticus, *Passua.* Rara. Due furono prese in collina.

Coccothraustes vulgaris, *Frixiùn.* Più o meno numeroso secondo gli anni, invernale ed erratico.

Ligurinus Chloris, *Verdùn.* Comune, invernale ed erratico.

Chloroptila Citrinella, *Lügao côrso.* Raro.

Chrysomitris Spinus, *Lügao.* Comune, certi anni abbondantissimo in collina e pianura.

Carduelis elegans, *Cardainha.* Comune, sedentario, invernale ed erratico.

Serinus hortulanus, *Siaïn.* Comune in collina e piano.

Cannabina Linota, *Fanetto.* Comune, invernale e di transito.

Ægiothus Linarius, *Fanetto côrso.* Raro.

Carpodacus erythrinus. Raro.

Pyrrhula europæa, *Sbruttùn*, *Scigùun.* Comune ma non abbondante, invernale ed erratico, nidifica ai monti.

Loxia Curvirostra, *Beccotorto.* Per anni nullo, in altri numeroso.

Euspiza melanocephala, *Sia d'Africa.* Raro.

Euspiza aureola. Rarissimo.

Miliaria Projer, *Mütan.* È comune ed erratico, ma non abbonda.

Emberiza Citrinella, *Sia giana.* Numeroso, invernale.

Emberiza Cirlus, *Sia nostrâ.* Numeroso, sedentario, invernale e di passo.

Emberiza Hortulana, *Nuttuan.* Estivo, numeroso, nidificante in collina.

Emberiza Cia, *Sia russa.* Numeroso, nidificante, invernale e di passo.

Emberiza leucocephala. Raro.

Emberiza rustica. Raro.

Emberiza pusilla. Raro.

Emberiza Schœniclus, *Sia da canne.* Numeroso, invernale.

Digitized by Google

Emberiza pyrrhuloïdes. Come l'antecedente, colla quale si confonde, ma è meno numerosa.

Calcarius nivalis, *Sia da neive.* Piuttosto raro, invernale.

Melanocorypha Calandra. Rara.

Otocorys alpestris. Rara.

Calandrella brachydactyla, *Rugnetta.* Scarsa a primavera, rara in autunno.

Alauda arborea, *Collaetto.* Numerosa, invernale e di passo.

Alauda arvensis, *Ciattarùn.* Numerosa, invernale e di passo ma più nel piano.

Galerita cristata, *Lodoa.* Sedentaria in collina e al piano.

Agrodroma campestris. Piuttosto scarso, nidifica ai monti.

Anthus pratensis, *Sbì Sbì.* Piuttosto numerosa al passo e nell'inverno sul greto dei fiumi e terreni attigui.

Anthus trivialis, *Spia de Nuttuan.* Poco numeroso, di doppio passo.

Anthus Spipoletta, *Sbì Sbì.* Numeroso, invernale, nidifica ai monti.

Budytes flavus, *Gianetta.* Numeroso a primavera, scarso in autunno.

Budytes cinereocapillus, *Gianetta.* Come la precedente.

Motacilla alba, *Paggiaetta.* Comune e nidificante, frequente d'inverno.

Calobates melanope, *Balainha.* In piano e nidificante lungo i ruscelli nelle valli montuose; più abbondante nell'inverno.

Saxicola Oenanthe, *Martinicca, Marticca.* Numeroso all'arrivo in piano e sul greto dei fiumi, nidifica in montagna.

Saxicola albicollis. Scarsa, ma non rara; nidifica in collina e ai monti.

Saxicola Stapazina. Come la precedente.

Monticola saxatilis, *Cuarussùn, Merlo russo.* Come la precedente.

Monticola Cyanus, *Merlo casuengo, Merlo casengo.* Comune, ma non abbondante; nidifica in collina, al piano e sulle case.

Digitized by Google

Merula nigra, *Merlo.* Numeroso, sedentario ai monti e in collina.

Merula torquata. Poco numeroso, qualche anno scarso, preferisce i monti, ma scende pure alle colline del litorale.

Turdus pilaris, *Grìva côrso.* Numerosa, invernale.

Turdus iliacus, *Turdo côrso.* Come la precedente.

Turdus musicus, *Turdo nostrâ.* Numeroso durante il passo, nidifica ai monti, colline e uliveti.

Turdus viscivorus, *Griva nostrâ.* Come il precedente.

Aëdon Luscinia, *Ruscigneu.* Comune ed estivo.

Erithacus Rubecula, *Peccetto.* Nidifica ai monti e col freddo scende alla marina, assai più abbondante nell'inverno.

Cyanecula Wolfi, *Peccetto da Sorchi*, *Pèto bleu.* Scarso a primavera e più in autunno.

Ruticilla Phœnicurus, *Cua russa.* Comune; di doppio passo.

Ruticilla titys, *Cua russa.* Comune, nidifica ai monti, scende al litorale in collina e al piano col freddo.

Pratincola Rubicola, *Simma custi.* Come l'antecedente.

Pratincola Rubetra, *Simma custi*, *Simmacusti de primaveja.* Comune, di doppio passo.

Sylvia orphaea. Comune, estivo, nidificante ai monti e colline.

Sylvia cinerea, *Ciarlettua.* Comune, estiva ai monti e colline.

Sylvia Curruca. Piuttosto rara, autunnale.

Sylvia conspicillata, *Ciarlettua*, *Giaretta.* Scarsa, forse sedentaria.

Monachus Atricapillus, *Testa neigra.* Numerosa, sedentaria.

Monachus hortensis, *Becafigo*, *Pittafigo.* Estivo, comune, ma non troppo numeroso.

Pyrophthalma melanocephala, *Testa neigra montagninha.* Comune e sedentario.

Melizophilus undatus. Sedentaria, assai scarsa, ai monti nei boschi cedui, erratica nell'inverno.

Phylloscopus sibilator, *Boin de primaveja.* Comune ed estivo, ma non abbondante; nidifica in collina e montagna.

Phylloscopus Trochilus, *Boin.* Come il precedente.

Digitized by Google

Phylloscopus Bonellii, *Boin gianco.* Come il precedente.

Phylloscopus rufus, *Boin.* Numeroso ai monti in estate, al litorale col freddo, allora molti giungono da oltre monte.

Hypolais icterina. Piuttosto scarso in primavera.

Hypolais polyglotta. Come l'antecedente.

Acrocephalus streperus. In numero mediocre, di passo in primavera, più scarsa in autunno.

Acrocephalus arundinaceus, *Rusciqneu cannajeu.* Come l'antecedente.

Calamodus schœnobænus. Come il precedente.

Calamodus aquaticus. Come il precedente.

Lusciniola melanopogon. Raro.

Cisticola cursitans. Raro.

Troglodytes parvulus, *Castagnetta.* Comune é sedentario; ai monti in estate, al litorale ovunque nell'inverno, allora molti sono immigranti.

Cinclus aquaticus, *Merlo pescoù.* Comune, sedentario, ma non abbonda; lungo i ruscelli e sui scogli del mare, col freddo, giungono immigranti.

Accentor collaris, *Sia da coi.* Scarso e solo nell'inverno.

Accentor modularis, *Fournè, Senuella.* Numerosa ai monti in estate, alla marina dappertutto d'inverno; molti giungono da fuori.

Regulus cristatus, *Reatin.* Come il precedente.

Regulus ignicapillus, *Reatin.* Come il precedente.

Ægithalus pendulinus. Raro.

Acredula rosea, *Berbexin de cua lunga.* Comune ai monti in estate, col freddo più numerosa alla marina.

Parus major, *Parisseua.* Comune e sedentaria; d'inverno molte giungono da fuori.

Parus ater, *Muneghetta.* Scarsa o abbondante secondo gli anni, autunnale.

Cyanistes cæruleus, *Barbexin.* Comune ai monti in estate, discende col freddo alle colline marine; in alcuni anni sono meno numerose.

Sitta cæsia, *Picunzetto senein.* Comune e sedentario ai monti, col freddo taluno discende.

Digitized by Google

Certhia brachydactyla, *Pitta formigue.* Comune, sedentario.

Tichodroma muraria, *Rampeghin de muaggia.* Di comparsa irregolare, ma non raro.

Oriolus Galbula, *Garbè.* Abbondante, in piano e collina, ma soltanto ai due passi.

Lanius Excubitor, *Cajorno lumbardo*, *Cajorno terragno.* Scarsa in pianura e collina nell' autunno.

Lanius minor, *Cajorno lumbardo* o *terragno.* Comune, estiva, ma non abbondante.

Lanius Collurio, *Cajorno nostrâ.* Numerosa in collina e monti, estiva.

Lanius auriculatus, *Cajorno da testa russa.* Come la precedente.

Muscicapa Atricapilla. Alquanto scarsa in primavera ed autunno.

Butalis Grisola, *Ciappa mosche.* Più numeroso della precedente, pure di passo, nidifica in collina.

Hirundo rustica, *Rundanínha.* Estiva, comune sulle case.

Chelidon urbica, *Cü gianco.* Come sopra.

Clivicola riparia. Scarsa al passo, non so se soggiorni.

Cypselus Apus, *Dardao.* Estivo, comune sugli edifizii.

Cypselus Melba, *Dardao da pansa gianca.* Scarso, non so se soggiorni.

Caprimulgus europæus, *Carcabaggi*, *Rundun.* Comune ed estivo, nidifica in montagna.

Picus major, *Piunzo o Picunzo.* Comune, sedentario, ma non abbonda; in montagna e in collina.

Picus minor, *Piunzzetto o Picunzetto.* Scarso, sedentario ai monti e colline.

Gecinus viridis, *Picunzo verde*, *Picunzo gallinà.* Comune più degli altri, sedentario in montagna fra i boschi.

Iÿnx Torquilla, *Torsicollo*, *Piunzo torsicollo.* Comune, specialmente in primavera.

Cuculus canorus, *Cücco.* Comune, estivo in montagna e collina.

Alcedo Ispida, *Martin pescoù.* Alquanto scarso, nelle valli e sugli scogli del mare, non so se annidi.

Coracias Garrula, *Serenün.* Scarsa ed irregolare, di passo.

Digitized by Google

Merops Apiaster, *Serenha.* Alquanto scarso, di passaggio.

Upupa Epops, *Galletto de marzo.* Come sopra.

Strix flammea, *Rumfun.* Sedentario, in numero mediocre, sugli edifizii.

Syrnium Aluco. Scarso, forse nidificante ai monti.

Asio Otus. In numero mediocre, invernale.

Asio accipitrinus. Come il precedente.

Athene Noctua, *Sivetta.* Comune e più nell'inverno, sedentaria sugli edifizii.

Scops Giu, *Ciò.* Comune, estivo ai monti.

Bubo maximus, *Dügo o Cravâ.* Alquanto raro, sedentario ai monti.

Circus æruginosus, *Farco.* Lo credo scarso, di passo in primavera.

Circus cyaneus, *Farco.* Come sopra.

Circus cineraceus, *Farco.* Come sopra.

Circaëtus gallicus, *Farco grosso.* Comune, ma non abbondante, di doppio passaggio.

Buteo vulgaris, *Farco.* Invernale, più o meno comune secondo gli anni.

Pernis apivorus, *Farco.* Non è raro, di passo, ma nemmeno comune.

Aquila Chrysaëtus, *Aquila reâ.* Rara.

Hypotriorchis Eleonoræ. Raro assai.

Hypotriorchis Subbuteo, *Farchetto, Crivèla.* Comune, di doppio passo.

Cerchneis Tinnunculus, *Crivela russa.* Comune, sedentario al piano e collina.

Cerchneis Naumanni, *Crivela russa.* Raro, anche immigrante.

Cerchneis vespertinus, *Farchetto.* Più o meno comune di passo secondo gli anni, in primavera soltanto.

Accipiter Nisus, *Crivela grixa.* Comune, di passo.

Ardea cinerea, *Perdigiorni senein.* Di passo, piuttosto raro.

Ardea purpurea, *Perdigiorni russo.* Comune, di doppio passo.

Egretta Garzetta, *Perdigiorni gianco.* Alquanto scarsa, in primavera lungo i torrenti e più sulla spiaggia e scogli del mare.

Digitized by Google

Ardeola ralloïdes, *Perdigiorni*. Più o meno abbondante, secondo gli anni, in primavera.

Ardetta minuta, *Perdigiorni piccin*. Comune, di doppio passo.

Botaurus stellaris, *Perdigiorni*. Alquanto scarso, di passaggio.

Nycticorax griseus, *Perdigiorni*. Comune, di passaggio.

Ciconia alba, *Sigheugna*. Passa alta senza fermarsi.

Plegadis Falcinellus. Accidentale.

Phœnicopterus roseus, *Fenicottero*. Rarissimo.

Anser segetum, *Oca sarvaega*. Passa alta e si ferma raramente.

Anas Boscas, *Collo verde*. Comune, invernale e di passo.

Chaulelasmus streperus. Piuttosto rara, invernale.

Dafila acuta, *Marzaíeù o Annía de due cüe*. Comunissimo, non abbondante, di passo.

Mareca Penelope, *Marzaíeù o Annia*. Comune, di passo ed invernale.

Nettion Crecca, *Garganello*. Come la precedente.

Querquedula Circia, *Garganello*. Come la precedente.

Fulix ferina, *Marzaíeú o Annia du collo russo*. Alquanto scarso, invernale.

Fulix Fuligula, *Marzaíeù*, *Annia*. Come sopra.

Mergus Serrator. Alquanto scarso.

Mergellus Albellus. Ne ho avuto una sola.

Columba Palumbus, *Colasso*, *Cümbo sarvaego*. Numeroso durante il passo, in montagna e collina.

Columba Oenas, *Cümbo sarvaego*. Come la precedente.

Turtur tenera, *Turtua*. Estiva.

Perdix rufa, *Pernixe russa*. Comune e sedentaria nelle valli montuose.

Starna Perdix, *Sterla*. Comune e sedentaria nelle valli anche coltivate.

Coturnix communis, *Quaggia*. Mediocremente numerosa, di passo alle colline e al piano.

Rallus aquaticus, *Gallinetta du becco russo*. Comune, ma non abbondante, invernale.

Ortygometra Porzana, *Gallinetta*. Comune, di doppio passo.

Ortygometra Bailloni, *Gallinetta piccinha*. Scarsa in pianura.

Digitized by Google

Ortygometra parva, *Gallinetta piccinha.* Come sopra.

Crex pratensis, *Requagiò.* Comune alle epoche del passo.

Gallinula chloropus, *Gallinetta*, *Fulega*, *Fuleghetta.* Comune, ma non abbondante, di doppio passaggio.

Fulica atra, *Fulega.* Alquanto scarsa, invernale.

Grus communis, *Grú.* Passa alta, ma si ferma solo casualmente.

Œdicnemus scolopax, *Massucco*, *Curridoù.* Comune, durante i due passi.

Charadrius Pluvialis, *Massuccotto.* Comune, durante il passo.

Squatarola helvetica. Scarsa, di passo.

Ægialitis cantiana, *Bulgarin*, *Ovivâ.* Alquanto scarso.

Ægialitis curonica, *Bulgarin*, *Ovivâ.* Comune, nidifica sul greto dei torrenti.

Ægialitis Hiaticula, *Bulgarin*, *Ovivâ du testùn.* Come la precedente.

Vanellus Capella, *Pavonetto*, *Vì-Vì*, *Boiin.* Comune, ma non abbondante, durante il passo e d'inverno.

Recurvirostra Avocetta. Rara.

Himantopus candidus. Di passo, degli anni nullo o scarso, talvolta a branchi.

Pelidna subarquata, *Bulgarín*, *Rŏsëza.* Comune, durante il passo primaverile.

Pelidna alpina, *Bulgarin*, *Rŏsëza.* Come la precedente. Vedesi anche d'autunno.

Actodromas minuta, *Burgaínetto*, *Strillin.* Come la precedente.

Actodromas Temmincki, *Burgaínetto*, *Strillin.* Piuttosto scarso.

Tringa Canutus, *Bulgarin*, *Rŏsëza.* Raro.

Machetes Pugnax, *Bulgaria de sciumme*, *Lunea.* Di passaggio, comune.

Tringoïdes Hypoleucus, *Bulgaria*, *Lunea.* Comune.

Totanus Ochropus, *Bulgaria*, *Lunea.* Mediocremente comune, forse nidificante.

Totanus Glareola, *Bulgaria*, *Lunea.* Numeroso, di solo passaggio.

Totanus stagnatilis, *Bulgaria*, *Lunea.* Piuttosto scarso, e non tutti gli anni si vede.

Totanus Calidris, *Bulgaria de gambe russe.* Comune.

Digitized by Google

Totanus nebularius, *Bulgaria*. Abbastanza comune alle epoche del passo.

Limosa melanura, *Becassa de mâ*. Piuttosto scarsa.

Scolopax Rusticula, *Beccassa*. Comune.

Gallinago cælestis, *Beccassin*. Piuttosto scarso.

Gallinago Gallinula, *Beccassin*. Come l'antecedente.

Numenius Arquata. Raro.

Numenius Phæopus, *Burgainotto*, *Ròsëza barbaresca*. Alquanto scarso.

Glareola Pratincola, *Pernixe o Pernixotto de mâ*. Alquanto scarsa, di passo in primavera.

Thalasseus cantiacus. Scarso, non raro sul mare.

Sterna fluviatilis, *Ciumbin*. Alquanto scarsa in primavera.

Sternula minuta, *Ciumbin piccin*. Piuttosto rara.

Hydrochelidon hybrida, *Ciumbin*. Uno solo preso sul mare.

Hydrochelidon leucoptera, *Ciumbin*. Comune in primavera e autunno, alla foce dei torrenti e bocca del porto.

Hydrochelidon nigra, *Ciumbin*. Come l'antecedente.

Chroocephalus melanocephalus, *Ochin*, *Ciumbin*. Comune sul mare.

Chroocephalus ridibundus, *Ochin*, *Ciumbin*. Come l'antecedente.

Rissa tridactyla, *Ochin*, *Ciumbina*. Raro, sul mare.

Larus cachinnans, *Oca de mâ*. Alquanto scarso, ma sedentario sul mare.

Puffinus anglorum. Comune e sedentaria, sul mare.

Puffinus Kuhli. Come l'antecedente.

Fratercula arctica. Rara.

Utamania Torda, *Magrun*. Quando più quando meno comune. invernale.

Colymbus glacialis, *Magrun grosso*. Rara, invernale.

Colymbus arcticus, *Magrun*. Rara, ma meno della precedente.

Colymbus septentrionalis, *Magrun*. Scarsa, ma qualcheduna quasi tutti gli anni, sempre d'inverno.

Podiceps cristatus, *Magrun*. Piuttosto raro, invernale.

Podiceps griseigena, *Magrunetto*. Raro, invernale.

Digitized by Google

Podiceps cornutus, *Magrunetto*. Come sopra.
Podiceps nigricollis, *Magrunetto*. Piuttosto raro, invernale.
Podiceps fluviatilis, *Magrunetto*. Come sopra.

Genova, distretto di Arenzano e Cogoleto (Luciani dottore Costante):

La regione osservata è quella che comprende i due comuni di Arenzano e Cogoleto; ha per confini all'O. il torrente Larestro, all'E. il torrente Lupara, al N. l'Appennino Ligure coi suoi contrafforti, le cui più alte vette si elevano 1200 metri circa sul livello del mare; al S. il Mediterraneo. Questa regione non ha pianure di una qualche estensione, è una pendice dell'Appennino Ligure che va al mare. Si può piuttosto distinguere in due zone, la coltivata e l'incolta. Nella zona coltivata cresce spontaneo e forma dei boschi il Pino marittimo. L'Ulivo e la Vite sono coltivati nella parte più bassa e vi crescono bene. La zona incolta è rappresentata da rocce nude e da tratti tappezzati da poche graminacee, dal Mirto, da qualche Erica e dai Cistus. Questa regione è poi intersecata da due torrenti, il Levone e la Cantarena, che discendono dall'Appennino. Vi sono alcuni promontorii sporgenti al mare, uno è il Capo Panaggi, un altro è detto Terrarossa, in quest' ultimo sono rinomate le poste pei Colombacci, per gli Stornelli e per quasi ogni altra specie di passaggio, quando spirano i venti di tramontana sia nell' autunno che in primavera.

Gli uccelli qui sedentarî sono relativamente pochi; prima perchè come in tutta la Liguria, eternamente perseguitati, secondariamente perchè non essendoci nè grandi boschi, nè praterie, nè campi, non trovano i mezzi di sostentamento.

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Genova, distrettò di Arenzano e Cogoleto; coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazione, nidificazione, ecc., ecc.

Corvus Corax, *Crovo imperiale.* Rarissimo.
Corvus Corone, *Goa.* Comune, invernale.
Corvus Cornix, *Crovo senein.* Frequente d'autunno e d'inverno.
Corvus frugilegus, *Goa.* Frequente in autûnno.
Lycos Monedula, *Cornaggetta.* Rara.
Pica rustica, *Berta.* Rara.
Garrulus glandarius, *Gazzanna.* Frequente e sedentaria.
Sturnus vulgaris, *Sturnello.* Frequente, di passaggio in autunno e fine d' inverno.
Pastor roseus, *Merlo-reusa.* Frequente, ma di comparsa irregolare.
Fringilla cœlebs, *Frenguello.* Comunissimo e sedentario.
Fringilla Montifringilla, *Montanin.* Frequente; passa da E. ad O. in autunno, da O. ad E. in marzo ed aprile.
Petronia stulta, *Passuun.* Frequente, come sopra.
Passer montanus, *Passuetta.* Frequente, come sopra.
Passer Italiæ, *Passua.* Frequentissima e sedentaria.
Coccothraustes vulgaris, *Frixiun.* Frequente; passa in autunno da E. ad O., in primavera da O. ad E.
Ligurinus Chloris, *Verdun.* Frequente, sedentario, di passo come sopra.
Chloroptila Citrinella, *Lugau corso.* Raro.
Chrysomitris Spinus, *Lugain.* Comune, di passo.
Carduelis elegans, *Cardeinna.* Frequente, di passo e sedentario.
Serinus hortulanus, *Siain.* Frequente, passa d'autunno da E. ad O., di primavera da O. ad E.
Cannabina Linota, *Fanetto.* Frequente, come sopra.
Ægiothus Linarius, *Fanetto corso.* Raro.

Digitized by Google

Pyrrhula europæa, *Scigoun.* Frequente, nidifica sull'Appennino e scende al basso d'inverno.

Loxia Curvirostra, *Becco torto.* Frequente, ma di comparsa irregolare.

Euspiza melanocephala, *Nottuan de Provenza.* Raro.

Miliaria Projer, *Ciattarun.* Comune e sedentario.

Emberiza Citrinella, *Sia paggea.* Frequente, di passo autunnale ed invernale.

Emberiza Cirlus, *Sia nostrâ.* Frequente, di passo, sedentario ed erratico.

Emberiza Hortulana, *Nottoan.* Frequente, di passo in primavera (15 aprile al 15 maggio), scarso in autunno; nidifica.

Emberiza Cia, *Sia montagnina.* Frequente nell'autunno e nell'inverno.

Emberiza pusilla, *Strapassua.* Raro.

Emberiza Schœniclus, *Sia da canne.* Frequente, di passo nell'autunno e nell'inverno.

Calcarius nivalis, *Sia da neive.* Raro assai e solo nei rigidi inverni.

Melanocorypha Calandra, *Calandra.* Accidentale.

Otocorys alpestris. Accidentale il 31 dicembre 1886.

Calandrella brachydactyla, *Grivein.* Frequente, ma solo di passo in aprile e maggio.

Alauda arborea, *Petronilla.* Frequente, di doppio passo e sedentaria.

Alauda arvensis, *Grivea.* Frequente, di passo in autunno ed inverno.

Galerita cristata, *Lodoa.* Rara.

Agrodroma campestris, *Terreina.* Frequente, di passo in primavera, raro nell'autunno.

Anthus pratensis, *Sì Sì de monte.* Frequente d'autunno e d'inverno, rara in primavera.

Anthus trivialis, *Spia de Nottoan.* Frequente in primavera, raro in autunno.

Anthus Spipoletta, *Sì Sietta.* Frequente, invernale.

Budytes flavus, *Giânetta.* Frequente al basso in primavera, aprile e maggio, raro in autunno.

Digitized by Google

Budytes cinereocapillus, *Giânetta.* Frequente, come sopra.

Motacilla alba, *Biancola.* Frequente, di passo in marzo, scarsa nell'autunno.

Calobates melanope, *Cua lunga.* Frequente e sedentaria, nidifica ai monti e scende al basso d'autunno.

Saxicola Oenanthe, *Cû gianco de bosco.* Comune, di passo in aprile.

Saxicola albicollis, *Scappaxin.* Frequente in aprile, estiva.

Saxicola Stapazina, *Scappaxina.* Frequente, come sopra.

Dromolæa leucura, *Merlou ciappâ da cua gianca.* Rara, ma sedentaria.

Monticola saxatilis, *Cuarusson.* Frequente in aprile, nidifica.

Monticola Cyanus, *Merlou ciappâ.* Frequente e sedentaria.

Merula nigra, *Merlo.* Frequentissimo e sedentario, passa in febbraio e marzo, più scarso in autunno.

Merula torquata, *Merlo gianco.* Raro.

Turdus pilaris, *Tordeja corsesca.* Comune nei rigidi inverni.

Turdus iliacus, *Turdo corsin.* Frequente in autunno.

Turdus musicus, *Turdo.* Frequente, passa in ottobre e ripassa in marzo.

Turdus viscivorus, *Tordeja.* Frequente d'inverno e sedentaria.

Aëdon Luscinia, *Ruscigneu.* Frequente, estivo.

Erithacus Rubecula, *Piccetto.* Frequente, invernale e sedentario.

Cyanecula Wolfi, *Cua rossa da Madonna.* Raro, in aprile.

Cyanecula suecica, *Cua rossa da Madonna.* Raro, come sopra.

Ruticilla Phœnicurus, *Cuarussetta.* Comune in marzo ed aprile, raro d'autunno.

Ruticilla titys, *Ciapusso.* Sedentario e comune.

Pratincola Rubicola, *Sima cousti.* Comune e sedentario.

Pratincola Rubetra, *Sima cousti.* Comune ed estivo.

Sylvia orphæa, *Favâ*, *Giugo.* Comune in aprile e maggio, estiva.

Sylvia cinerea, *Ciarletta.* Comune, come sopra.

Sylvia subalpina, *Mujâ.* Comune, come sopra.

Monachus Atricapillus, *Testa neigra.* Sedentaria e comune al passo autunnale.

Digitized by Google

Monachus hortensis, *Beccafigo*. Estivo e comune, di passo da agosto a settembre ed in aprile e maggio.

Pyrophthalma melanocephala, *Oxelo da sexi*. Comune e sedentario.

Melizophilus undatus, *Mujâ*. Comune e sedentaria.

Phylloscopus sibilator, *Boën*. Comune di passo in primavera.

Phylloscopus Trochilus, *Boën*. Comune, come sopra.

Phylloscopus Bonellii, *Boën gianco*. Comune in agosto, scarso in primavera.

Phylloscopus rufus, *Boënetto*. Comune ed invernale.

Hypolais icterina, *Ciarlettua*. Comune, di passo in aprile e maggio.

Hypolais polyglotta, *Ciarlettua*. Estivo e comune in agosto.

Acrocephalus streperus, *Ruscigneu de canne*. Comune in aprile e maggio e nell'agosto.

Acrocephalus arundinaceus, *Ruscigneu lombardou*. Comune come sopra.

Calamodus sohœnobænus, *Quaggiu*. Comune in aprile e maggio, scarso in autunno.

Calamodus aquaticus, *Fenuggiâ*. Comune, come sopra.

Locustella naevia. Passa in maggio, non comune.

Cettia Cettii, *Ruscigneu d'egua*. Raro.

Cisticola cursitans, *Pitta-muscin*. Raro, in primavera.

Troglodytes parvulus, *Castagnetta*. Sedentario e comune.

Cinclus aquaticus, *Merlou pescou*. Sedentario e comune, nidifica ai monti e scende al basso nell'autunno.

Accentor collaris, *Turdo sarvaego*. Sedentario e comune, abita le aride valli dell'Appennino, scende al mare coi grandi freddi.

Accentor modularis, *Rousenento*. Comune e sedentaria.

Regulus cristatus, *Testin d'ou*. Comune d'inverno.

Regulus ignicapillus, *Reattin*. Comune d'inverno.

Acredula rosea, *Parissuin cua lunga*. Rara.

Parus major, *Parisseua*. Comune e sedentaria.

Parus ater, *Parissuin*. Comune, anzi qualche anno abbondantissima, in ottobre e novembre.

Cyanistes cæruleus, *Berbexin*. Comune in autunno.

Digitized by Google

Poecile palustris, *Parissuetta*. Comune e sedentaria.

Certhia brachydactyla, *Rampeghin*. Sedentario e comune.

Tichodroma muraria, *Pitta muin*. Raro.

Oriolus Galbula, *Garbè*. Comune dalla metà di aprile alla metà di maggio, quando giunge in branchetti di 7 od 8; ripassa alla spicciolata in agosto.

Lanius Excubitor, *Cajurno lombardo*. Rara.

Lanius minor, *Cajurno lombardo*. Rara, in primavera.

Lanius Collurio, *Cajurno nostrà*. Estiva, comune in aprile e maggio, più scarsa in autunno.

Lanius auriculatus, *Cajurno testa roussa*. Comune, come sopra.

Muscicapa Atricapilla, *Sbatti-ae*. Comune in aprile e maggio.

Butalis Grisola, *Bazana*. Comune, come sopra.

Hirundo rustica, *Roundanina*. Comune, estiva.

Hirundo rufula. Vedesi in aprile e maggio, rara.

Chelidon urbica, *Cugianco d'aja*. Comune, estivo.

Clivicola riparia, *Frattin*. Comune al passo in primavera ed in autunno, a tutto novembre.

Cotile rupestris, *Senentun*. Sedentaria e comune; è anche di passo in febbraio e marzo ed in agosto e settembre.

Cypselus Apus, *Sbiro*. Comune, passa dal 15 aprile al giugno, ripassa in agosto e settembre.

Cypselus Melba, *Rondon*. Comune, come sopra.

Caprimulgus europæus, *Carca baggiu*. Estivo, comune, giunge in aprile e maggio.

Gecinus viridis, *Piccounsu*. Raro, sedentario.

Iynx Torquilla, *Lengua lunga*. Estivo, comune in aprile e maggio, scarso d'autunno.

Cuculus canorus, *Cücco*. Estivo, comune in aprile e maggio, scarso in autunno.

Alcedo Ispida, *Martin pescou*. Sedentario e comune.

Coracias Garrula, *Seenna*. Comune.

Merops Apiaster, *Seenna*. Comune dalla fine d'aprile a tutto maggio.

Upupa Epops, *Galetto de marzo*. Comune in marzo ed aprile.

Strix flammea, *Ouco giunco*. Comune e sedentario.

Syrnium Aluco, *Ouco*. Raro.

Digitized by Google

Asio Otus, *Testa gatto*. Comune.
Asio accipitrinus, *Testa gatto*. Comune.
Athene Noctua, *Sivetta*. Sedentaria e comune.
Scops Giu, *Ciô*. Comune.
Bubo maximus, *Dugo*. Raro.
Circus æruginosus, *Farco de padù*. Comune in aprile durante i venti di tramontana.
Circus cyaneus, *Sivetta gianca*. Comune, come sopra.
Circus cineraceus, *Sivetta gianca*. Rara, come sopra.
Circus Swainsoni, *Sivetta gianca*. Comune, come sopra.
Pandion Haliaëtus, *Farco pescou*. Raro, passa in aprile.
Circaëtus gallicus, *Agugia*. Comune, di passaggio in marzo e primi di aprile, abbondantissimo al ripasso in settembre ed ottobre.
Nisaëtus fasciatus, *Agugia foestea*. Rara.
Buteo vulgaris, *Farco gallinâ*. Comune nell'inverno.
Pernis apivorus, *Agugiotto*. Comune, di passo in maggio e fino al 15 giugno; più scarso in autunno.
Milvus Ictinus, *Niggio*. Raro.
Falco Peregrinus, *Sivettua grossa*. Comune e sedentario.
Hypotriorchis Eleonorae, *Farchetto da Regina*. Raro.
Hypotriorchis Subbuteo, *Sivettua neigra*. Comune, di passo in aprile e maggio.
Cerchneis Tinnunculus, *Sivettua roussa*. Sedentario e comune; anche di passo in marzo ed aprile.
Cerchneis Naumanni, *Sivettua*. Raro, passa in aprile e maggio.
Cerchneis vespertinus, *Farchetto dai pê rusci*. Raro, passa in maggio e giugno.
Accipiter Nisus, *Sivettua grixa*. Sedentario e comune, di passo in aprile, meno abbondante d'autunno.
Ardea cinerea, *Perdigiorni senein*. Comune, di passo in aprile e maggio.
Ardea purpurea, *Perdigiorni russo*. Comune, come sopra.
Egretta Garzetta, *Perdigiorni gianco*. Comune, come sopra, anche al giugno.
Ardeola ralloïdes, *Perdigiorni gianco*. Comune, come sopra, maggio e giugno.

Digitized by Google

Ardetta minuta, *Perdigiorni piccin.* Comune, come sopra.
Botaurus stellaris, *Perdigiorni*, *Grixelan.* Comune, come sopra.
Nycticorax griseus, *Perdigiorni.* Comune, come sopra.
Ciconia alba, *Sigheugna.* Rara.
Platalea Leucorodia, *Spatula.* Rara assai coi forti scirocchi.
Plegadis Falcinellus, *Tantalo.* Raro in primavera.
Anser segetum, *Oca paa.* Rara d'inverno.
Anas Boscas, *Collo verde.* Comune, invernale.
Spatula clypeata, *Collo verde piccin.* Comune, invernale.
Dafila acuta, *Cua de Rondanina.* Comune nell'inverno.
Mareca Penelope, *Ania matta.* Comune, invernale.
Nettion Crecca, *Garganello.* Comune, invernale.
Querquedula Circia, *Garganello.* Comune, specialmente nel marzo.
Fuligula rufina. Rarissimo.
Fulix ferina, *Moetton.* Comune e invernale.
Fulix Fuligula, *Ania neigra.* Invernale e comune.
Fulix Nyroca, *Moetta.* Invernale e comune.
Somateria mollissima. Invernale, rarissima.
Mergus Serrator, *Seretta.* Comune, di passo in novembre.
Mergellus Albellus, *Smergo.* Rara, invernale.
Columba Palumbus, *Gulasso.* Comune, passa da E. ad O. in ottobre e novembre, e da O. ad E. in marzo.
Columba Oenas, *Cumbo sarvaego.* Comune, come sopra.
Columba livia, *Cumbo turraieu.* Raro.
Turtur tenera, *Turduinna.* Comune in aprile e maggio, rara in autunno.
Perdix rufa, *Pernixe roussa.* Comune e sedentaria.
Starna Perdix, *Sterna.* Rara.
Coturnix communis, *Quagia.* Comune da aprile a giugno, non si vede nell'autunno; qualche coppia delle più tardive nidifica nel distretto.
Rallus aquaticus, *Gallinetta.* Comune, di passo in ottobre e novembre, rara in primavera.
Ortygometra Porzana, *Gallinetta.* Comune in marzo ed aprile, non si rivede in autunno.
Ortygometra Bailloni, *Gallinetta piccina.* Comune, come sopra.

Digitized by Google

Ortygometra parva, *Gallinetta piccina.* Comune, come sopra.
Crex pratensis, *Requaggio.* Comune in aprile, raro in autunno.
Gallinula chloropus, *Gallinetta grossa.* Comune in marzo ed aprile.
Fulica atra, *Folaga.* Comune d'inverno.
Grus communis, *Grua.* Comune di passo; d'autunno va ad O. di primavera ad E.
Œdicnemus scolopax, *Grixeloun.* Comune in marzo ed aprile, raro d'autunno.
Charadrius Pluvialis, *Testonotto.* Raro, di doppio passo.
Eudromias Morinellus. Raro in primavera.
Ægialitis cantiana, *Giaēu.* Raro in primavera.
Ægialitis curonica, *Giaēu.* Comune, di doppio passo, abbonda in primavera.
Strepsilas Interpres, *Voltaprie.* Raro in primavera.
Vanellus Capella, *Marzeu.* Di doppio passo, comune.
Hæmatopus Ostralegus, *Ostregante.* Raro.
Himantopus candidus, *Passegua.* Raro in primavera.
Pelidna subarquata, *Pettiruscio.* Non raro in marzo e giugno.
Pelidna alpina, *Spilorso.* Non raro in primavera.
Actodromas minuta, *Gilardinotta.* Comune in primavera.
Machetes Pugnax, *Lippun.* Comune in primavera.
Tringoïdes Hypoleucus, *Viduetta.* Comune in primavera, nidifica.
Totanus Ochropus, *Spilorso.* Comune in primavera, più scarso d'autunno.
Totanus Glareola, *Gilardinna.* Comune in primavera.
Totanus Calidris, *Cieuvì.* Comune in primavera.
Totanus fuscus, *Cieuvì grosso.* Comune in primavera.
Totanus nebularius, *Spilorso.* Rara in primavera.
Limosa melanura, *Beccassa de mâ.* Rara in marzo.
Scolopax Rusticula, *Becassa.* Comune, invernale.
Gallinago cælestis, *Beccassin.* Comune, invernale.
Gallinago Gallinula, *Beccassin surdo.* Comune, invernale.
Numenius Arquata, *Rounseza.* Comune, di doppio passaggio.
Glareola Pratincola, *Pernixe de mâ.* Rara in primavera, maggio.

Digitized by Google

Thalasseus cantiacus, *Rondanina de mâ.* Non raro, si vede d'inverno ed in aprile; nel 1882 il passo primaverile fu copioso.

Sterna fluviatilis, *Rondanina de mâ.* Comune, di passo regolare in aprile ed in agosto e settembre.

Hydrochelidon leucoptera, *Moetto.* Non raro alle due epoche del passo: 15 aprile-10 maggio, fine agosto e settembre.

Hydrochelidon nigra, *Moetto.* Comune alle due epoche del passo, come sopra.

Chroocephalus minutus, *Ochin.* Raro in primavera.

Chroocephalus melanocephalus, *Ochin.* Comune, di passo in aprile ed in agosto, e durante l'inverno.

Chroocephalus ridibundus, *Ochin.* Raro.

Rissa tridactyla, *Ochetta.* Raro in primavera.

Larus canus, *Oca mezana.* Comune dall'agosto all'aprile.

Larus cachinnans, *Oca de mâ.* Comune, forse sedentario.

Puffinus anglorum, *Bertacco piccin.* Comune, specialmente nell'inverno, forse sedentaria.

Puffinus Kuhli, *Bertacco.* Comune più nell'estate, ma si vede pure d'inverno.

Procellaria pelagica, *Frenguello de mâ.* In alto mare, sempre.

Utamania Torda, *Magrun.* Comune dal novembre al marzo quasi ogni anno; fu assai abbondante nel 1886.

Colymbus arcticus, *Folaga.* Rara, invernale.

Colymbus septentrionalis, *Folaga.* Rara, invernale.

Podiceps cristatus, *Magrun.* Non raro da novembre a marzo, talvolta anco in settembre i giovani.

Podiceps nigricollis, *Magrun piccin.* Non raro, come sopra.

Podiceps fluviatilis, *Magrun piccin.* Non raro, come sopra.

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli le quali nidificano nel distretto di Arenzano e Cogoleto, provincia di Genova, con alcune notizie in proposito.

Garrulus glandarius. Fa due covate, la prima di 5, la seconda di 4 o 3 uova; covano mas. e fem.

Fringilla cœlebs. Fa due e tre covate l'anno, in marzo son già nati i piccoli della prima covata; il numero delle uova è di 5 per la prima, 4 la seconda e 3 la terza; covano mas. e fem.

Passer Italiæ. Fa tre covate, alla fine di marzo son già nati i primi pulcini; le uova sono 5 la prima, 4 la seconda e 3 la terza; covano mas. e fem.

Ligurinus Chloris. Fa due covate e raramente tre; la prima in aprile; le uova son 5 la prima e 4 o 3 le altre.

Carduelis elegans. Fa tre covate rispettivamente di 5, 4, 3 uova; covano mas. e fem.; in aprile depone la prima volta.

Pyrrhula europæa. So che nidifica da noi; ma non so altro.

Miliaria Projer. Cova due volte da aprile a giugno; la prima covata è di 4, la seconda di 3; cova anche il maschio.

Emberiza Cirlus. Fa tre covate da aprile ad agosto, la prima di 5 l'altra di 4 e l'ultima di 2 o 3 uova; covano mas. e fem.

Emberiza Hortulana. Qualche coppia annida in aprile e fa due covate, la prima di 4 o 5, la seconda di 3 uova; covano mas. e fem.

Alauda arborea. Cova due e qualche volta tre volte, depone 4 uova ed anche 5, le altre covate diminuiscono di numero; covano mas. e fem.; ho trovato il nido ai primi di aprile.

Agrodroma campestris. Giunge in aprile e qualche coppia

Digitized by Google

nidifica ponendo due covate di 4 e 3 uova; covano mas. e fem.

Calobates melanope. Si ritira in marzo alle sorgenti dei torrentelli e fa due covate di 5 e 4 uova; covano mas. e fem.

Saxicola albicollis. Giunge in aprile e pone subito nido, fa due covate di 5 e 4 uova; covano mas. e fem.

Saxicola Stapazina. Giunge alla stessa epoca e cova allo stesso modo.

Dromolæa leucura. È specie rarissima e non vidi mai il nido, sebbene sia da noi sedentaria.

Monticola saxatilis. Giunge in aprile, fa una prima covata di 5 o 4 uova ed una seconda di 3; covano mas. e fem.

Monticola Cyanus. In marzo ha già il nido di 4 uova e ne fa un secondo di 3 e qualche volta una terza di 2; covano mas. e fem.

Merula nigra. In marzo ha già il primo nido di 5 uova, poi ne fa un secondo di 4, ed un terzo di 2 o 3 uova; covano mas. e fem.

Turdus viscivorus. È dei primi a deporre, ho visto i piccoli ai 5 di marzo già colle cannuccie; fa tre covate di 5, 4, 3 uova; covano mas. e fem.

Aëdon Luscinia. Giunge in aprile fa due e qualche volta tre covate, la prima di 5 uova l'altra di 3 o 4; covano mas. e fem.

Ruticilla titys. Fa due covate di 5 e 4 o 3 uova, in aprile ha già il nido; covano mas. e fem.

Erithacus Rubecula. Fa due nidi da aprile a giugno di 5 il primo, di 3 o 4 il secondo.

Pratincola Rubicola. In marzo ha già la prima covata di 4 ed anche di 5 uova, ne fa poi un'altra di 3 e qualche volta una terza; covano mas. e fem.

Sylvia orphæa. Viene in aprile, fa due covate qualche volta tre; la prima covata è di 5 e l'altra di 3 o 4 uova.

Sylvia cinerea. Viene all'epoca della precedente, fa le stesse covate.

Monachus Atricapillus. Fa il primo nido in fin di marzo di

Digitized by Google

5 uova, ne fa poi un altro e qualche volta un terzo; covano mas. e fem.

Monachus hortensis. Fa come il precedente, ma annida più tardi.

Pyrophthalma melanocephala. Pone nido ai primi di marzo e fa due ed anche tre covate, la prima di 4, l'altra di 3 uova; covano mas. e fem.

Melizophilus undatus. Fa come la specie precedente.

Hypolais polyglotta. Giunge ed annida in aprile, fa due covate di 5 e 4 o 3 uova; covano mas. e fem.

Troglodytes parvulus. Si ritira in marzo nei folti e freschi macchioni di monte e fa due covate, la prima ha 6 o 7 uova, l'altra 4 o 5.

Cinclus aquaticus. Si ritira alle sorgenti dei torrentelli a nidificare in marzo e fa una o due covate di 5 e 4 uova.

Accentor collaris. So che annida sulla vetta dell'Appennino nostro, ma non so altro.

Accentor modularis. Fa due covate, la prima in marzo e depone 5 uova, l'altra è di 3 o 4; covano mas. e fem.

Parus major. Cova in marzo e depone in buca d'albero 10 e più uova, ne trovai nidi anche di 12; fa qualche volta un'altra covata di 5 o 6 uova.

Pœcile palustris. So che annida da noi, ma non vidi mai il nido.

Certhia brachydactyla. Annida per tempo e fa 8 e più uova nella prima covata, ne fa ancora un'altra di minor numero.

Lanius auriculatus. Annida in apr. e fa una prima covata di 5 uova, ne fa anche un'altra di 3 o 4; covano mas. e fem.

Lanius Collurio. Giunge ed annida in fine d'aprile, fa due e qualche volta tre covate di 5, 4 e 3 uova; covano mas. e fem.

Hirundo rustica. Fa due covate, la prima in aprile ed è di 5 uova, la seconda di 4 o 2; qualche volta ne fa una terza di 2 o 3 uova.

Chelidon urbica. Fa due covate da aprile ad agosto, qualche volta tre; la prima è di 5 uova; covano mas. e fem.

Digitized by Google

Cotile rupestris. So che ci cova ma non potei mai vedere il nido perchè in rocce scoscese.

Cypselus Apus. Viene in maggio e fa due covate di 5 e 3 uova; covano mas. e fem.

Caprimulgus europæus. Ho già trovato due delle sue uova in una buca del terreno, ma non so quante ne depongae quante volte.

Iynx Torquilla. Depone in aprile una prima covata di 7 od 8 uova, e ne fa una seconda di 4 o 5.

Cuculus canorus. Non saprei quante volte deponga perchè depone le uova negli altrui nidi. Ho visto dei Cuculi nel nido di *Monticola saxatilis*, di *Miliaria Projer* ed anche dell'*Accentor modularis.*

Alcedo Ispida. Annida lungo i torrenti, non so niente del suo nido.

Strix flammea. Annida in marzo e fa una covata di 5 o 4 uova.

Athene Noctua. Fa una o due covate cominciando da marzo e depone 3 o 4 uova.

Cerchneis Tinnunculus. Fa due covate cominciando da aprile di 5 uova la prima, l'altra di 4 o 3.

Perdix rufa. Depone 10 o 12 uova in marzo e covano mas. e fem.

Coturnix communis. Qualche coppia delle più tardive annida sulle vette dell'Appennino, dove trovansi dei prati piani, depone 8 o 9 uova.

Tringoïdes Hypoleucus. Cova in aprile e depone 4 uova; covano il mas. e la fem. [1]

---

[1] Come si vede gli uccelli che nidificano sul versante meridionale dell'Appennino sono pochi. Per dare poi le notizie dovute sulla durata delle covate ec. come è richiesto, abbisogna l'osservazione di parecchi anni, e perciò io non so per ora risponder altro (*Luciani*).

Digitized by Google

Genova, distretto di Spezia (Carazzi, dott. professore Davide):[1]

Confini ben limitati per tre lati: O., S., S.E. il mare; E. e E.E.N. il fiume Magra. Al N. e N.N.O. i confini del distretto preso in osservazione sono poco ben limitati; si possono determinare abbastanza approssimativamente con una linea retta che decorre obliquamente da O. a Riomaggiore sul mare (44° 6′), a N.E., al confluente della Durasca nella Magra, presso Follo (44° 10′).

La regione è principalmente montuosa, fatta eccezione della piccola pianura paludosa presso il mare a 3 chilom. all'E. di Spezia (stagni e stagnoni) e la riva destra della Magra. Le colline del distretto non sorpassano l'altezza di 600 m. circa; sono quasi tutte di calcari liasici e cretacei; pochi calcari e quarziti del Trias. La pianura tanto vicino alla Spezia che va lungo la Magra è alluvionale. In generale le colline a O. e N.O. non sono coltivate eccetto che in basso; vi crescono abbondanti le eriche e le felci più comuni, parecchie conifere e piccoli roveri; a coltura si trovano i terreni delle colline a N. e N.E., vigneti e uliveti. Quasi tutte coltivate le colline comprese fra il Golfo e la Magra. Gli stagnoni sono in gran parte paludosi, vi abbonda quindi l'acqua e vi sono le solite piante di queste regioni. Una parte di essi è coltivata. Le rive della Magra sono tutte coltivate.

---

[1] L'egregio prof. Carazzi si è occupato con lodevole zelo nel raccogliere dati illustranti l'avifauna della Liguria orientale e materiali per la inchiesta ornitologica; non solo egli ha pubblicato due importanti lavori intorno alla Ornitologia di quella regione (*Materiali per una Avifauna del Golfo della Spezia e della Val di Magra* con una *Appendice*. Spezia, 1887. *Appunti ornitologici* Napoli, 1887), ma nella sua qualità di direttore del Museo Civico di Spezia e di collaboratore nella inchiesta ornitologica, egli fece su quest'ultimo soggetto una pubblica conferenza il 2 maggio 1886 nelle sale di quel Museo Civico e diramò, principalmente ai cacciatori del distretto, una speciale circolare a stampa. Nell'interesse della inchiesta io lo ringrazio caldamente e mi auguro che il suo esempio sia seguìto.

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Genova, distretto della Spezia; coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazione, nidificazione, ec., ec.[1]

Corvus Corax, *Corvo*, *Crovo*. Raro; sulle Alpi Apuane sedentario.

Corvus Corone, *Corvo*, *Crovo*. Molto scarsa sui monti d'autunno e d'inverno.

Corvus Cornix, *Corvo*, *Crovo*. Scarsa, al monte e al piano, sedentaria.

Corvus frugilegus, *Corvo*, *Crovo*. Scarso, invernale.

Lycos Monedula. Molto scarsa, sembra che arrivi irregolarmente.

Nucifraga Caryocatactes. Rara, solo nei rigidi inverni.

Pica rustica, *Gaza*. Scarsa, sedentaria, sembra più frequente alle bocche di Magra che altrove.

Garrulus glandarius, *Gaza*. Frequente, sedentaria sulle colline.

Pyrrhocorax alpinus. Scarsissimo; abbondante sulle Alpi Apuane.

Pyrrhocorax Graculus. Raro.

Sturnus vulgaris, *Sturnèo*. Abbondante, di doppio passo ed invernale; non è stabilito che nidifichi.

Sturnus unicolor. Accidentale, qualche volta capita insieme al precedente.

Pastor roseus, *Merlo maìn*. Scarso, arriva irregolarmente; fu trovato nidificante nel mese di luglio ad Ameglia presso la Magra.

---

[1] I dati raccolti e notati si riferiscono ad uccelli esistenti tutti preparati nella Collezione regionale del Museo Civico di Spezia, che possiede 141 specie con 300 esemplari circa; oppure ad uccelli che il sottoscritto ha potuto esaminare perchè mandati al preparatore del Museo per esser imbalsamati. (*Carazzi*).

Digitized by Google

Fringilla cœlebs, *Franguèo*. Sedentario e molto abbondante, può darsi che i maschi viaggino separati dalle femmine.

Fringilla Montifringilla, *Franguèo de montagna*. Poco frequente ed invernale.

Montifringilla nivalis. Rarissimo.

Petronia stulta. Scarsa nella Val di Magra, molto scarsa nel Golfo. È certo che questa specie, la quale ora non ha nemmeno nome nel distretto ed è sconosciuta a molti cacciatori, era nel passato molto abbondante specialmente in Val di Magra.

Passer montanus, *Pássua terracina*, *Ciaciarello* (Sarzana). Frequente e stazionaria.

Passer Italiæ, *Pássua muinàa*. Frequente, sedentaria.

Passer domesticus. Accidentale.

Coccothraustes vulgaris, *Scosson*, *Scossa nuci*. È dubbio se può dirsi sedentario, frequente.

Ligurinus Chloris, *Verdùn*. Frequente e stazionario.

Chloroptila Citrinella. Rarissimo al piano, molto scarso sui monti.

Chrysomitris Spinus, *Lügain*. Molto abbondante alcuni anni, scarso in altri.

Carduelis elegans, *Cardaìn*. Abbondante; nidifica.

Serinus hortulanus, *Rapalin*. Abbondante; talvolta nidifica sui monti.

Cannabina Linota, *Fanetto*. Compare piuttosto scarso a piccoli branchi nell' epoca del passo.

Cannabina flavirostris. Rarissimo.

Ægiothus Linarius. Rarissimo; due esemplari furono presi a Chiavari molti anni fa, trovansi ora nella collezione Magni-Griffi.

Ægiothus rufescens. Rarissimo; una sola cattura, pure a Chiavari.

Carpodacus erythrinus. Rarissimo; uno fu preso a Castelnuovo Magra nel maggio 1861, è ora nella collezione Magni-Griffi.

Pyrrhula europæa, *Frangueó maìn*. Scarso, nidifica sui monti

Digitized by Google

Loxia Pityopsittacus. Rarissimo; due esemplari vennero colti nella pineta di Chiavari nell'inverno 1851.

Loxia Curvirostra, *Bèco storto.* Molto scarso, di passo irregolare, più facile nell'estate.

Euspiza melanocephala. Raro.

Euspiza aureola. Rarissimo.

Miliaria Projer, *Silùn de montagna, Ciatarùn.* Piuttosto scarso.

Emberiza Citrinella, *Silo.* Frequente, di doppio passo regolare, molti svernano.

Emberiza Cirlus, *Silo.* Meno frequente del precedente, più facile a trovarsi d'inverno.

Emberiza Hortulana, *Ortulàn.* Frequente, di doppio passo in maggio ed agosto; nidifica.

Emberiza caesia. Rarissimo.

Emberiza Cia, *Silo d'inverno.* Scende numeroso nell'inverno dalle colline dove nidifica.

Emberiza leucocephala. Raro; un individuo preso a Sarzana nel dicembre 1861 trovasi ora nella collezione del professor Magni-Griffi.

Emberiza pusilla. Rarissimo.

Emberiza Schœniclus. Poco frequente nella regione, credo sia specie solo invernale, sebbene il Magni-Griffi mi abbia detto che nidifica.

Emberiza pyrrhuloïdes. Scarsò, invernale; dopo aprile non si trova più.

Calcarius lapponicus. Rarissimo; un esemplare preso a Sarzana nell'aprile 1861, non nel dicembre, come per errore il Magni-Griffi scrisse al prof. Giglioli, e questi stampò nella sua *Avifauna* (pag. 56).

Calcarius nivalis. Raro, qualcheduno capita negli inverni rigidi.

Melanocorypha Calandra. Rara.

Calandrella pispoletta. Rarissima, un esemplare che il Magni-Griffi riferisce a questa specie fu preso a Sarzana nel maggio 1862.

Calandrella brachydactyla. Scarsissima, qualcuna in maggio.

Alauda arborea, *Lodòn.* Sedent., numerosa, nidif. sui monti.

Digitized by Google

Alauda arvensis, *Mignarda.* Abbondante, stazionaria nelle colline.

Galerita cristata, *Lòdoa.* Frequente e sedentaria.

Agrodroma campestris, *Spia di Ortulàn.* Arriva nella metà di aprile, nel ritorno è più scarso.

Anthus pratensis, *Fifina, Spia dee Quagie.* Non molto frequente, arriva d'ottobre, qualcheduna sverna.

Anthus cervinus. Scarsissima.

Anthus trivialis, *Pagiaissa.* Frequente d'autunno, meno d'inverno.

Anthus Spipoletta, *Panîgaèo.* Frequente d'inverno.

Budytes flavus, *Boarina.* Numerosi a primavera, passano ai primi d'aprile a piccoli branchi; più scarso d'autunno.

Budytes cinereocapillus, *Boarina.* Più scarsa della precedente.

Budytes melanocephalus. Scarsissimo, e forse di passo irregolare.

Budytes campestris. Raro.

Motacilla alba, *Balaina gianca.* Frequente nell'inverno, sedentaria.

Motacilla lugubris. Accidentale; il giorno 21 febbraio 1888 un cacciatore prese insieme ad altre Ballerine bianche un esemplare di questa specie accidentale per tutta Italia. Col mezzo del prof. Caldi potei averlo ancora in carne; era stato preso alle Case Rosse, località posta lungo la spiaggia del mare due chilom. ad Est di Spezia. Fu da me donato alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani in Firenze.

Calobates melanope, *Balaina zala.* Non molto abbondante, sedentaria; passa l'estate sui monti, di agosto e di settembre scende al piano.

Saxicola Oenanthe, *Cüo gianco de monte.* Frequente ai due passi, di più al primaverile; i primi arrivano sul finire di marzo.

Saxicola albicollis. Scarsissima.

Saxicola Stapazina. Poco frequente.

Dromolæa leucura. Rara, si trova sui monti fra Portovenere e le Cinque Terre, lungo il mare.

Digitized by Google

Monticola saxatilis, *Tordo cua russa.* Molto scarso, nidifica sulle colline dietro Sarzana; di passo regolare.

Monticola Cyanus, *Merlo rocaè.* Frequente e sedentaria.

Merula nigra, *Merlo.* Frequente e sedentario.

Merula torquata. Raro.

Turdus pilaris, *Sturlenga.* Poco abbondante, forse di passo irregolare; così ne vidi parecchi nel decorso inverno (1887-88), nessuno nei due precedenti (85-86 e 86-87).

Turdus iliacus, *Arpezin.* Frequente, invernale.

Turdus musicus, *Tordo.* Abbondante, non ho prove che nidifichi; i casi d'isabellismo non sono rari.

Turdus Swainsoni. Il prof. Magni-Griffi ha nella sua raccolta un piccolo Tordo preso a Sarzana, ch'egli riferisce a questa specie rarissima.

Turdus viscivorus, *Tordèna.* Frequente; talvolta nidificante; in questo gennaio (1888) vi fu un passo molto più abbondante del solito.

Aëdon Luscinia, *Rossignèo.* Comune dai primi d'aprile ai primi d'ottobre.

Aëdon Philomela. Accidentale.

Erithacus Rubecula, *Picèto.* Abbondante, nidifica sui monti.

Cyanecula Wolfi, *Cua russa de palüde.* Primaverile e poco frequente.

Cyanecula suecica. Molto scarso.

Ruticilla Phœnicurus, *Cua russa.* Frequente, i primi arrivano alla fine di marzo.

Ruticilla titys. Poco frequente. In un maschio coll'abito da femmina avuto il 21 marzo 1887 i testicoli erano completamente sviluppati.

Pratincola Rubicola, *Fricialase.* Frequente, qualcheduno sverna, è uno dei primi uccelli a fare il nido; nidifica al piano e al monte.

Pratincola Rubetra, *Fricialase.* Frequente.

Sylvia nisoria. Molto rara, una sola cattura ho potuto constatare nella regione.

Sylvia orphæa. Non molto frequente da maggio a settembre.

Digitized by Google

Sylvia cinerea, *Pissa mue* (becca more). Frequente da aprile ad ottobre.

Sylvia Curruca. Scarsa da maggio a settembre.

Sylvia subalpina. Come la precedente.

Sylvia conspicillata. Scarsissima, primaverile.

Monachus Atricapillus, *Testa negra* (il maschio). Frequente, abbonda nel marzo.

Monachus hortensis, *Becafigo.* Arriva al finir d'aprile; più frequente in autunno. È dubbio che nidifichi.

Pyrophthalma melanocephala. Scarso, di passo regolare, nidifica; qualcheduno resta all'inverno.

Melizophilus undatus, *Carcassüco.* Scarsa e sedentaria.

Melizophilus sardus. Molto rara, un esemplare preso alle bocche di Magra il maggio 1860 è ora nella collezione del prof. Magni-Griffi.

Agrobates galactodes. Rarissimo, una sola cattura nota.

Agrobates familiaris. Rarissimo, una sola cattura nota.

Phylloscopus sibilator, *Luì*, *Boain.* Frequente, estivo.

Phylloscopus Trochilus, *Luì*, *Boain.* Frequente e sedentario.

Phylloscopus Bonellii. Scarsissimo, estivo e nidificante.

Phylloscopus rufus, *Luì*, *Boain.* Frequente e sedentario.

Hypolais icterina. Poco frequente, estivo.

Hypolais polyglotta. Scarso, estivo.

Hypolais olivetorum. Un Canapino preso a Sarzana nel 1882 ora nella collezione del prof. Magni-Griffi, viene da questi riferito a questa specie rarissima.

Hypolais pallida. Accidentale.

Acrocephalus palustris. Rara, primaverile.

Acrocephalus streperus. Scarsissima, estiva.

Acrocephalus arundinaceus. Meno scarso della precedente.

Calamodus schœnobænus, *Boain.* Poco frequente, estivo.

Calamodus aquaticus. Più scarso del precedente.

Lusciniola melanopogon. Quasi raro, primaverile.

Locustella naevia. Raro. Il prof. Magni-Griffi sostiene doversi riferire alla *L. lanceolata* un Forapaglie preso a Sarzana nel maggio 1861; noto che l'esemplare esaminato dal prof. Giglioli, venne riferito alla *L. naevia.*

Digitized by Google

Potamodus luscinioïdes. Scarsissima e primaverile.

Cettia Cettii. Scarso, estivo.

Cisticola cursitans, *Sizìn.* Scarso ma sedentario.

Troglodytes parvulus, *Cra-cra*, *Reatin.* Frequente al piano da ottobre ad aprile, allora sale ai monti.

Cinclus aquaticus, *Merlo d'aïgua.* Poco frequente nei rivi delle colline, raro al piano.

Accentor collaris. Scarso, scende nel cuor dell'inverno fin presso la pianura.

Accentor modularis, *Ferao*, *Feraìn.* Frequente d'inverno.

Regulus cristatus, *Fri-fri*, *Testin d'oo* (d'oro). In pianura si vede dall'ottobre fino a primavera.

Regulus ignicapillus. Come il precedente, dal quale non viene distinto di solito.

Ægithalus pendulinus. Specie scarsa che resta anche d'inverno.

Acredula Irbyi, *Carcassüco.* Comune e sedentario.

Acredula rosea. Scarsa.

Panurus biarmicus. Rarissimo.

Parus major, *Perissèa.* Comune e sedentaria.

Parus ater, *Perissèa.* Poco frequente, scende al piano alla fine di settembre,

Cyanistes cæruleus, *Perissuin*, *Perisseta.* Poco frequente e nidificante, più numerosa d'inverno.

Pœcile palustris. Poco frequente, invernale.

Pœcile borealis. Rara, soltanto negli inverni molto rigidi.

Lophophanes cristatus. Accidentale; un esemplare fu catturato presso Sarzana molti anni sono.

Sitta cæsia, *Picazo* (Sarz.). Scarso, invernale.

Certhia familiaris. Rarissimo; un esemplare esistente nella collezione del Museo fu catturato agli Stagnoni presso al mare (2 chilom. da Spezia) il 29 novembre 1881.

Certhia brachydactyla, *Rampeghin.* Comune d'inverno.

Tichodroma muraria, *Paparagno.* Scarso, ma sedentario.

Oriolus Galbula, *Garbeo*, *Sgarbèo.* Arriva alla fine di marzo, ma è abbondante solo in maggio, nidifica, e riparte in autunno.

Digitized by Google

Ampelis Garrulus. Raro, qualcheduno nell'inverno.

Lanius Excubitor, *Gazuèla.* Primaverile, scarsa.

Lanius meridionalis. Accidentale; un esemplare preso nel maggio 1875 (e non nell'aprile 1879 come dice il professore Giglioli, *Avif. Ital.*, pag. 173) a Sarzana è posseduto dal Magni-Griffi.

Lanius Collurio, *Gazuèla.* È la specie più comune di passo doppio regolare.

Lanius minor. Scarsa, primaverile.

Lanius auriculatus, *Gazuèla.* Piuttosto scarsa, ma di passo regolare.

Muscicapa collaris. Molto scarsa, di passo regolare.

Muscicapa Atricapilla. Frequente abbastanza e di passo regolare.

Butalis Grisola. Scarso, di passo regolare.

Hirundo rustica, *Rondanina.* Frequente dalla ultima diecina di marzo alla prima metà di ottobre. Nel dicembre 1886 ebbi una Rondine viva.[1]

Hirundo rufula. Rarissima, una sola cattura constatata.

Chelidon urbica, *Cüo gianco.* Frequente, cominciano ad arrivare subito dopo la metà di marzo, ma la massa giunge un mese dopo; notai un caso di svernamento qui in Spezia nel 1886, il primo constatato con certezza in Italia.[2]

Clivicola riparia. Molto scarso nei dintorni del Golfo, più frequente in Val di Magra.

Cotile rupestris. Scarsa lungo la Magra.

Cypselus Apus, *Rondòn.* Arriva alla seconda metà di aprile, scompare in luglio, ma qualcheduno si trova nell'agosto ed anche ai primi di settembre, non oltre.

Cypselus Melba. Come ai tempi dello Spallanzani, qualche Rondone alpino nidifica sulle rupi calcaree dell'isola Palmaria all'estremo S.O. del Golfo; non posso asserire che si trovi in altre località della regione presa in osservazione.

---

[1] Vedi: D. Carazzi, *Appunti ornitologici, Napoli* 1887.

[2] Vedi: D. Carazzi, *op. cit.*

Digitized by Google

Caprimulgus europæus, *Tetavache.* Estivo, di primavera si trova più facilmente in collina, d'agosto alla pianura.

Picus major, *Picùn, Picazo.* Sedentario e comune.

Picus minor, *Piza formighe* (Sarz.). Scarsissimo.

Gecinus viridis, *Picùn.* Sedentario e frequente.

Gecinus canus. Rarissimo, un solo esemplare, ch'io sappia, fu catturato a Sarzana nel dicembre 1860; è nella collezione del Magni-Griffi a Siena.

Iynx Torquilla, *Formiguin, Colostorto, Capitorza* (Sarz.). Frequente ed anche sedentario, perchè n'ebbi due volte in dicembre, una in gennaio e una in febbraio.

Cuculus canorus, *Cucii, Cücu.* Estivo e frequente.

Coccystes glandarius. Rarissimo; due esemplari furono presi a Sarzana dal prof. Magni-Griffi.

Alcedo Ispida, *Useo santa Maia, Useo smenièo, Martinèo.* Frequente e sedentario.

Coracias Garrula, *Gaza maìna.* Scarsa, forse nidifica.

Merops Apiaster, *Tordo maìn.* Di passo doppio regolare, più scarso d'autunno; qualcuno nidifica.

Merops persicus. Accidentale; n'ebbe uno il Magni-Griffi nel maggio 1858, ora è nella sua collezione.

Upupa Epops, *Galeto de marso.* Frequente, nidifica.

Strix flammea, *Aüco.* Comune e sedentario.

Syrnium Aluco, *Aüco.* Comune e sedentario.

Athene Noctua, *Sivetua.* Comune e sedentaria.

Scops Giu, *Ciodo.* Arriva in marzo aprile, nidifica e riparte in settembre, non credo che sverni.

Asio Otus, *Güfo.* Comune, ma scarso in confronto del seguente.

Asio accipitrinus. Anche questo comune e sedentario.

Bubo maximus. Scarso, sedentario.

Circus aeruginosus, *Farco.* Frequente e di passo, ma qualcuno resta d'inverno.

Circus cyaneus, *Farco gianco, Farco de padù.* Sedentaria. più numerosa al tempo del passo.

Circus cineraceus. Di passo regolare, molto scarsa.

Pandion Haliaëtus. Molto scarso.

Digitized by Google

Circaëtus gallicus, *Farco büson*, *Farco marsaiolo*. Passa di primavera, qualcuno nidifica sui monti.

Haliaëtus Albicilla, *Aquila*. Rara.

Nisaëtus fasciatus. Il prof. Magni-Griffi mi disse di avere avuto dei giovani di questa specie presi in val di Magra.

Archibuteo lagopus. Accidentale.

Buteo vulgaris. *Büsun*. Sedentaria e frequente.

Pernis apivorus, *Farco*. Scarso e primaverile.

Milvus Ictinus. Molto scarso.

Milvus migrans. Raro.

Falco Peregrinus, *Farco reale*. Sedentario, scarso.

Hypotriorchis Eleonorae. Accidentale, due esemplari, maschio e femmina, furono presi assieme nel 1878 lungo la Durasca, piccolo affluente della Magra.

Hypotriorchis Subbuteo, *Farchèto*. Di passo regolare, ma molto scarso.

Æsalon regulus. Molto scarso e probabilmente di passaggio irregolare.

Cerchneis Tinnunculus, *Farcheto*. Frequente e sedentario.

Cerchneis Naumanni. Scarsissimo.

Cerchneis vespertinus, *Farchèto american*. Una volta di passaggio regolare e abbondante, così nel maggio si vedeva a piccoli branchi; ora è molto scarso forse di passo irregolare.

Astur palumbarius. Molto scarso.

Accipiter Nisus, *Farchéto*. Frequente e sedentario.

Phalacrocorax Carbo. Specie scarsa, della quale si trova qualche giovane nell'inverno.

Ardea cinerea, *Perticòla*. Frequente in primavera, a datare dai primi di marzo, scarso in autunno.

Ardea purpurea, *Perticòla*. Come la precedente.

Egretta alba. Molto scarsa, primaverile.

Egretta Garzetta, *Perticòla gianca*. Di passo regolare, più frequente in primavera.

Ardeola ralloïdes, *Perticolin*. Di passo irregolare e abbastanza frequente, qualcheduna si ferma fino a ottobre, così che probabilmente nidifica.

Digitized by Google

Ardetta minuta, *Perticolin*. Più frequente della precedente.

Botaurus stellaris, *Capon de padù*. Frequente in primavera, scarso d'autunno.

Nycticorax griseus, *Airòn*. Frequente in primavera; non l'ho ancora visto d'autunno.

Ciconia alba, *Sigugna*. Scarsissima.

Platalea Leucorodia, *Cüciao*. Accidentale.

Plegadis Falcinellus. In primavera e molto scarso.

Phœnicopterus roseus. Accidentale; una sola cattura constatata, l'ebbe nel marzo 1857 il Magni-Griffi dalle Bocche di Magra.

Anser segetum, *Oca da gran*. Poco frequente.

Tadorna cornuta. Accidentale.

Anas Boscas, *Capo verde*. Di doppio passo, si ferma nell'inverno, alcuni anni però in numero scarso; fui assicurato che fu trovato nidificante agli Stagni presso Spezia; il 28 agosto 1888 ne fu preso uno lungo la Magra.

Chaulelasmus streperus. Scarsissima, invernale.

Spatula clypeata. Anche questo molto scarso ed invernale.

Dafila acuta, *Anitrin*. Invernale e abbastanza comune.

Mareca Penelope. Specie invernale e scarsa.

Nettion Crecca, *Gavarèlo*, *Anitrin*. Frequente specialmente al ripasso in marzo.

Querquedula Circia, *Gavarèlo*, *Anitrin*. Invernale e frequente.

Fuligula rufina. Raro.

Fulix ferina, *Testa rossa*. Piuttosto scarso.

Fulix Marila. Scarsissima.

Fulix Fuligula. Comune al passo, le prime le vidi sull'ultima diecina di ottobre.

Fulix Nyroca. Di passo doppio ma molto scarsa.

Bucephala Clangula. Specie scarsa, un maschio adulto preso agli Stagnoni di Spezia è nella collezione del Museo Civico.

Harelda glacialis. Rarissima.

Œdemia fusca. Raro, un esemplare fu preso in dicembre lungo la Magra a Santo Stefano.

Digitized by Google

Erismatura leucocephala. Una sola cattura, nel dicembre 1856 sulla Magra, l'esemplare è al R. Liceo di Pistoia.

Mergus Merganser, *Margùn*, *Segheta*. Specie invernale molto scarsa.

Mergus Serrator, *Margùn*, *Segheta*. Piuttosto scarso.

Mergellus Albellus. Specie invernale e molto scarsa.

Columba Palumbus, *Coombo*. Passano alla fine d'ottobre e ripassano in febbraio e marzo, ma sempre scarsi; alcuni nidificano, ma non mi consta che svèrnino.

Columba Oenas, *Coombo*, *Favazo* (Sarz.). Passa a branchi dalla fine di settembre in poi; qualcuno sverna.

Columba livia. Molto scarsa.

Turtur tenera, *Tortoèla*. Arriva di maggio, nidifica e riparte alla fine di settembre.

Perdix rufa, *Pernise*. Sedentaria e frequente.

Perdix saxatilis, *Cotórnesa*. Rarissima, forse oggimai scomparsa dalla regione.

Starna Perdix, *Starna*. Frequente e sedentaria.

Coturnix communis, *Quagia*. Da maggio a settembre passano, ma non molto numerose; nel 1887 ai 16 di marzo ne uccisero una a Sarzana, era un precursore od una che che aveva svernato?

Rallus aquaticus, *Polastra d'inverno*, *Folenga*. Frequente e invernale, più frequente all'epoca dei passi.

Ortygometra Porzana, *Polastrela*, *Folenga de marso*. Frequente specialmente a marzo e aprile.

Ortygometra Bailloni, *Folengheta*, *Girardina*. Scarsa.

Ortygometra parva, *Girardina*. Scarsa.

Crex pratensis, *Re dee quagie*. Da dopo la metà d'aprile a ottobre, abbastanza frequente.

Gallinula chloropus, *Folengòn*. Abbastanza frequente in aprile ed ottobre.

Porphyrio cæruleus. Accidentale.

Fulica atra, *Goba*. Comune, durante l'inverno.

Grus communis, *Grü*. Rara.

Otis Tarda. Rara.

Otis Tetrax. Rarissima.

Digitized by Google

Œdicnemus scolopax, *Rostabò*. Frequente nel passo primaverile, molto scarso in quello autunnale.

Cursorius gallicus. Raro, una sola cattura nel maggio 1865.

Charadrius Pluvialis, *Piviè̀o*. Frequente d'inverno, nel decorso 1887 uno fu preso lungo la Magra ai 16 settembre.

Squatarola helvetica. Scarsissima.

Eudromias Morinellus. Di passaggio doppio, qualcheduno sverna, è sempre molto scarso.

Ægialitis cantiana, *Marioli boaroi*. Scarso, arriva alla fine di marzo.

Ægialitis curonica, *Marioli boaroi*. Frequente dopo marzo.

Ægialitis Hiaticula, *Marioli boaroi*. Di passo doppio, ma più scarso della specie precedente.

Vanellus Capella, *Pia*. Le prime arrivano sulla seconda metà di settembre, ma sono abbondanti solo più tardi fino a tutto marzo.

Strepsilas Interpres. Raro.

Hæmatopus Ostralegus, *Beccassa de mae*. Specie molto scarsa in primavera, rara del tutto in autunno.

Recurvirostra Avocetta. Rara e primaverile.

Himantopus candidus. Specie scarsa e primaverile.

Limicola platyrhyncha. Accidentale; una sola cattura constatata (maggio 1860) l'esemplare è nel R. Liceo di Pistoia, dov'io lo vidi anche quest'anno.

Pelidna subarquata, *Fisc-cion róssai*. Frequente.

Pelidna alpina. Meno frequente del precedente.

Actodromas minuta, *Fisc-cion*. Frequente, ma non molto in primavera, scarso d'autunno.

Actodromas Temmincki. Molto scarso.

Tringa canutus. Raro.

Calidris Arenaria. Molto scarsa.

Machetes Pugnax, *Fisc-cion*, *Gambeta*. Frequente nel passo primaverile, qualcuno sverna e talvolta resta nell'estate; nella collezione del Museo Civico ho una femmina adulta del 4 giugno.

Tringoides Hypoleucus. Poco frequente in primavera, scarso d'autunno.

Digitized by Google

Totanus Ochropus, *Fisc-cion.* Scarso, specialmente d'autunno.

Totanus Glareola, *Tortoin.* Frequente a primavera.

Totanus stagnatilis, *Fisc-cion, Tortoin.* Scarso, arriva dopo il marzo aprile.

Totanus Calidris, *Fisc-cion.* È la specie più frequente da marzo a giugno; ritengo che nidifica perchè in giugno ho avuto maschi e femmine.

Totanus fuscus. Scarsissima in primavera, rara d'autunno.

Totanus nebularius, *Fisc-cion.* In prim. e autunno, ma scarsa.

Limosa melanura, *Russa.* Poco frequente.

Limosa rufa, *Russa.* Rara.

Scolopax Rusticula, *Becassa.* Frequente da ottobre a marzo.

Gallinago major, *Sgnepa.* Frequente, più in primavera.

Gallinago cælestis, *Beccassin.* Frequente dall'agosto fino a mezzo marzo.

Gallinago Gallinula, *Foti-borse.* Di doppio passo, ma poco abbondante.

Numenius Arquata, *Boàri, Centossi* (Sarz.). Scarso, ma di passo regolare.

Numenius tenuirostris. Raro, al passo di primavera.

Numenius Phæopus, *Boàri picenin.* Poco numeroso.

Glareola Pratincola, *Pernise de mae.* Molto scarsa in maggio ed ottobre.

Sylochelidon caspia. Rarissimo.

Thalasseus cantiacus. Scarso d'inverno, un po'meno a primavera; forse di passo irregolare.

Gelochelidon anglica. Raro, una sola cattura constatata.

Sterna fluviatilis. Di passo regolare ma scarsa.

Sternula minuta. Come la precedente.

Hydrochelidon hybrida, *Anima de sbiro.* Primaverile e piuttosto scarso.

Hydrochelidon leucoptera, *Anima de sbiro.* Scarso, ma di passo regolare.

Hydrochelidon nigra, *Anima de sbiro.* Frequente.

Chroocephalus minutus, *Ochetta de mae.* Scarso e primaverile.

Chroocephalus melanocephalus, *Ochetta de mae.* Invernale e di passo; qualcheduno resta d'estate.

Digitized by Google

Chroocephalus ridibundus, *Oca de mae.* Frequente d'inverno, raro d' estate.

Rissa tridactyla. Solamente primaverile e scarso, forse di passo irregolare.

Larus canus. Molto scarsa.

Larus cachinnans, *Oca de mae, Gabian.* Sedentario, ma poco frequente.

Stercorarius pomatorhinus. Raro; dieci anni fa tre esemplari di questa specie furono uccisi mentre assalivano delle anitre lungo la Magra; uno si conserva ancora imbalsamato dal signor Neri a Sarzana.

Stercorarius crepidatus. Raro; un giovane preso agli Stagnoni di Spezia parecchi anni fa, l'ebbi in cambio dal marchese Castagnola.

Puffinus Kuhli, *Margùn.* Comune e sedentaria.

Procellaria pelagica. Scarso.

Utamania torda. Fino al 1885 era specie sconosciuta nel circondario, sebbene nel R. Museo di Firenze vi sia un bellissimo maschio in abito nuziale preso nel 1879 a Spezia. Nel 1886 e nel successivo inverno 1886–87 le Gazze marine capitarono numerose, tanto giovani che adulte; al 23 maggio 1887 ebbi un maschio in abito nuziale quasi completo preso nella Darsena del R. Arsenale.

Fratercula arctica. Molto scarsa, arriva irregolarmente.

Colymbus glacialis. Rara.

Colymbus septentrionalis, *Margùn.* I giovani sono frequenti.

Podiceps cristatus. Raro.

Podiceps griseigena. Raro.

Podiceps nigricollis, *Tufin.* I giovani sono frequenti.

Podiceps fluviatilis, *Tufin.* Scarso, ma non raro lungo la Magra.

Digitized by Google

TOSCANA.

Lucca, (Martorelli prof. Giacinto, Fontebuoni cav. Angiolo e Gragnani Raimondo):

Divido la provincia di Lucca sulla quale si estesero le mie ricerche in due parti ben distinte: l'una tra il Monte Pisano, il Monte di Quiesa ed il mare alla quale non potrei assegnare caratteri propri, poichè essendo situata tra la pianura pisana e quella carrarese, non è che una continuazione di esse; la seconda che si estende a tutto il corso del Serchio e raggiunge i culmini dell'Appennino compresi tra la Garfagnana e l'estremo della valle di Lima, mi sembra di non poca importanza ornitologica, essendo una delle vie prescelte da parecchie specie di uccelli per raggiungere i valichi dell'Appennino nelle loro migrazioni.

Nella sunnominata porzione marittima della provincia è il lago di Massaciuccoli, circondato da paludi, ove in grandissima copia affluiscono durante il passo le varie specie palustri. Tra il padule ed il mare si alternano i campi e le basse macchie colle foreste, sopratutto di Pini. Nella parte invece che resta di qua dei monti, scorre il Serchio, o tra grande ricchezza di campi, o tra monti coperti di uliveti o da boschi di Castagni, e che solo qua e là brulli e sassosi lo sorpiombano, chiudendolo in anguste forre. In un angolo della pianura lucchese sulla sinistra del fiume rimane ancora, come avanzo del prosciugato lago di Bientina, un vasto padule, ed ancora pochi anni or sono ivi affluivano durante le migrazioni in autunno o in primavera, in grandissimo numero gli uccelli acquatici e di ripa, ma ora, prosciugato il lago, pochissimi prendono quella direzione (*Martorelli*).

Digitized by Google

A mezzogiorno il Monte Pisano divide la provincia di Lucca da quella di Pisa; a levante è confinata dal piano paludoso del già lago di Bientina; a tramontana l'Appennino modenese, e verso ponente le Alpi Apuane ed i monti della Versilia. La provincia di Lucca è costituita in gran parte da una estesa e fertilissima pianura, in parte paludosa e irrigata da frequenti fossi e canali, oltre poi al fiume Serchio. È poi circondata da amene colline che sono dominate da altissime montagne, tra le quali sono notevoli le Alpi di Pescaglia. Alle epoche del passo molte sono le specie di uccelli che si trovano in questi monti e non poche quelle che vi passano l'estate (*Fontebuoni*).

Il distretto di cui intendo più specialmente parlare comprende il lago e le paludi di Massaciuccoli, il piano vicino, ed i monti di Chiatri e Compignano. La prossimità del mare mi permette di fare anche qualche osservazione sulle spiaggie del litorale. Il circondario suddetto comprende i distretti di Viareggio e di Massarosa, specialmente la sezione di Quiesa. I paduli di Massaciuccoli sono quasi tutti a falasco e canneti, oppure coltivati a risaie; il piano è coltivato a seminativi, i monti ad uliveti, con tratti di vigneti e macchia (*Gragnani*).

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Lucca, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione, ecc. ecc.[1]

Corvus Corax. Sedentario, veduto una sol volta a Prato Fiorito sopra i Bagni di Lucca (*M.*).

[1] Questo elenco è compilato sulle liste e sulle notizie fornite dai signori G. Martorelli, A. Fontebuoni ed R. Gragnani, questi specialmente pei distretti di Viareggio e Massarosa. Ho indicato con iniziali la parte che spetta a ciascuno.

Digitized by Google

Corvus Corone. Sedentaria, la vidi presso Gallicano da luglio a settembre ed a Prato Fiorito in settembre (*M.*).

Corvus Cornix, *Cornacchia.* Comune e sedentaria al piano nel distretto di Massarosa (*G.*); non comune (*F.*).

Corvus frugilegus, *Corvo, Graccio.* Di passo in autunno, divenuto scarso (*M. F.*); comune, veduto anche in settembre (*G.*).

Lycos Monedula, *Taccola.* Rara al piano in quello di Massarosa, ne ebbi una nell'agosto 1883 (*G.*).

Pica rustica, *Gazza, Cecca.* Sedentaria, ma scarsa, più frequente verso il mare (*M. F.*); comune (*G.*).

Garrulus glandarius, *Ghiandaia.* Sedentaria, piuttosto scarsa, il numero aumenta in autunno (*M. F. G.*).

Pyrrhocorax alpinus, *Gracchio.* Comune e sedentario sulle Alpi Apuane, scende talvolta nei rigori invernali (*F.*).

Sturnus vulgaris, *Storno.* Comunissimo di passo, non nidifica (*M. F.*); nel distretto di Massarosa ha nidificato (*G.*).

Pastor roseus, *Storno marino.* Ne vidi uno a Coreglia, preso sull'Appennino lucchese nell'estate 1883 (*M.*); accidentale, ne ebbi due adulti nel 1882 e 1885, un giovane in agosto 1883 (*G.*).

Fringilla cœlebs, *Fringuello, Filunguello.* Sedentario e comune, ne cresce assai il numero nella seconda metà di ottobre (*M.*); e nell'inverno (*F. G.*).

Fringilla Montifringilla, *Tramontano.* Comune di passo in autunno ed inverno (*M. F.*); passa in ottobre (*G.*).

Petronia stulta, *Passera ragia.* Scarsa (*M.*); di passo in settembre (*G.*).

Passer montanus, *Migliarina.* Comune e sedentaria (*M. G.*).

Passer Italiæ, *Passero.* Comune e sedentaria.(*M. F. G.*).

Coccothraustes vulgaris, *Fregione.* Comune, passa in abbondanza ogni due anni (*M.*); passa in ottobre (*G.*)

Ligurinus Chloris, *Verdone.* Comune e sedentario (*M. G.*); abbondante assai nell'inverno (*F.*).

Chrysomitris Spinus, *Lucarino.* Comune di doppio passo (*M. F.*); vedesi in settembre (*G.*).

Digitized by Google

Carduelis elegans, *Cardellino*. Comune, sedentario e di passo (*M. F. G.*).

Serinus hortulanus, *Raperino*. Solo di passo autunnale (*M.*): comune assai e anche sedentario (*F. G.*).

Cannabina Linota, *Montanello*. Solo di passo autunnale (*M.*); comune (*F.*); in settembre (*G.*).

Pyrrhula europæa, *Fringuel marino*. Invernale, qualche anno abbondante (*M.*); di passo in novembre (*G.*).

Loxia Curvirostra, *Crociere*. Avventizio in quello di Massarosa, ne ebbi uno nell'aprile 1880 (*G.*).

Miliaria Projer, *Stiaccione*. Poco frequente, sedentario (*M. G.*).

Emberiza Citrinella, *Zirla gialla*. Non abbondante, ma nidificante sui monti a circa 1000 m. nei boschi di Faggio (*M. F.*); passa in ottobre (*G.*).

Emberiza Cirlus, *Zirla*, *Zirla nera*. Non comune (*M. F. G.*).

Emberiza Hortulana, *Ortolano*. Non comune, ma estivo (*M. F.*); giunge in maggio (*G.*).

Emberiza Cia, *Zirla*, *Zirla mucciatta*. Comune e sedentario (*M. F.*); passa in ottobre (*G.*).

Emberiza Schœniclus, *Migliarino*. Invernale, comune (*M. F.*); passa in ottobre (*G.*).

Emberiza pusilla. Accidentale in settembre in quello di Massarosa (*G.*).

Emberiza pyrrhuloïdes, *Zigolo*. Comune in quello di Massarosa, di passo in settembre (*G.*).

Melanocorypha Calandra, *Calandra*. Sedentaria, ma scarsa (*G.*).

Calandrella brachydactyla, *Calandrino*. Comune in aprile al piano in quello di Massarosa (*G.*).

Alauda arborea, *Piturlino*. Pochi sedentari ai monti, abbondante di passo nella seconda metà di ottobre (*M. G.*).

Alauda arvensis, *Lodracchio*. Comune e sedentaria, abbonda nel passo autunnale (*M.*); ed in primavera (*F.*); passa in ottobre (*G.*).

Galerita cristata, *Cappellaccio*. Comune e sedentaria (*M. F. G.*).

Agrodroma campestris. Non comune (*G.*).

Anthus pratensis, *Prispola*. Di doppio passo abbondante ed invernale (*M. F.*); passa in ottobre (*G.*).

Digitized by Google

Anthus trivialis, *Aguina*. Di solo passo autunnale (*M. F.*); passa anche in aprile in quello di Massarosa (*G.*).

Anthus Spipoletta, *Prispola*. Non comune, di doppio passo (*M.*); passa in ottobre (*G.*).

Budytes flavus, *Ballerina gialla*. Scarso, di doppio passo (*M.*); forse nidificante nel padule di Massaciuccoli ove giunge in aprile (*G.*).

Budytes cinereocapillus, *Strisciajola*. Scarsa, di doppio passo (*M.*); comune (*F.*); e nidificante (*G.*).

Motacilla alba, *Ballerina*. Sedentaria, comune e di doppio passo (*M. F. G.*).

Calobates melanope. Non abbondante, sedentaria (*G. F.*).

Saxicola Oenanthe, *Culbianco*. Comunissimo da aprile ad ottobre, ai primi di settembre scende dai monti ove ha nidificato e si trattiene sui prati sino alla partenza (*M. F. G.*).

Saxicola albicollis, *Monachella*. Rara in aprile in quello di Massarosa (*G.*).

Saxicola Stapazina, *Monachella golanera*. Avuta una volta da Massaciuccoli (*M.*); ne ebbi un adulto in maggio 1881 (*G.*).

Monticola saxatilis, *Culrossolone*. Comune ai monti da maggio a settembre (*M. F.*); scarso in quel di Massarosa (*G.*).

Monticola Cyanus, *Passera solitaria*. Comune e sedentaria, scende al piano l'inverno (*M. F.*); di passo in settembre (*G.*).

Merula nigra, *Merlo*. Comune e sedentario, ma scemato in numero; molti giungono in ottobre ed i cacciatori li distinguono dal becco scuro e li chiamano « maremmani » (*M. F. G.*).

Merula torquata, *Merlo col petto bianco*. Raro, l'ebbi una sola volta (*M.*); veduti in maggio ed ottobre, tre esemplari vennero poi uccisi presso il lago di Massaciuccoli il 7 aprile 1888 (*G.*).

Turdus pilaris, *Stordeola*. Scarsa e poco nota, autunnale (*M. G.*).

Turdus iliacus, *Sassello*. Autunnale e comune (*M. F.*); passa in ottobre (*G.*).

Digitized by Google

Turdus musicus, *Tordo.* Abbondante di passo nella prima metà di ottobre, pochi svernano, il ripasso ha luogo dal principio di febbraio a tutto marzo (*M. F.*); forse nidificante ai monti (*F.*); passa anco in settembre (*G.*).

Turdus viscivorus, *Stordeola.* Sedentaria, ma non abbondante, nidifica ai monti (*M. F. G.*).

Aëdon Luscinia, *Rosignolo.* Abbondante ai due passi, aprile-maggio e settembre, non molti rimangono l' estate (*M. F. G.*).

Erithacus Rubecula, *Pettiere.* Sedentario, nidificante ai monti, e di copioso passo in ottobre ed aprile (*M. F. G.*).

Cyanecula Wolfi, *Pettazzurro.* Frequente di passo nella seconda metà di marzo ed in aprile, ripassa in settembre (*M. G.*).

Cyanecula suecica. Vidi anche questa forma, alle epoche medesime della precedente (*M.*).

Ruticilla Phœnicurus, *Currosso.* Comune di doppio passo (*M. F.*); forse nidificante ai monti (*F.*); giunge in marzo (*G.*).

Ruticilla titys, *Currosso.* Avuto in autunno (*M.*); sedentario (*G.*).

Pratincola Rubicola, *Saltampalo.* Comune e sedentario (*M. F.*); uno dei primi uccelli a covare (*F. G.*).

Pratincola Rubetra, *Stiaccino.* Specialmente di passo in aprile e settembre (*M. G.*).

Sylvia orphæa, *Bigione.* Estiva e assai comune, giunge in aprile, cova anche nel giugno (*M. G.*).

Sylvia cinerea, *Sterpazzola.* Comunissima tra aprile ed ottobre, nidifica specialmente sui monti (*M. F. G.*).

Sylvia Curruca. Scarsa, di doppio passo, non nidificante (*M.*); fors'anche nidificante (*G.*).

Sylvia subalpina, *Sterpazzolina.* Osservata di solo passo in settembre (*M.*); sedentaria e comune (*G.*).

Monachus Atricapillus, *Capinera.* Comunissima e sedentaria, abbonda più in collina (*M. F. G.*).

Monachus hortensis, *Beccafico.* Abbondante di passo alla fine d'agosto ed in settembre, mai veduto in primavera (*M. F. G.*).

Digitized by Google

Pyrophthalma melanocephala, *Ceciora*. Comune e nidificante, ma scarso dopo il settembre (*M. G.*).

Melizophilus undatus, *Sterpazzola*. Assai frequente nella buona stagione (*M. F.*); sedentaria (*G.*).

Phylloscopus sibilator, *Chiuino verde*. Specialmente abbondante in agosto e settembre (*M. F.*); giunge in aprile e sarebbe nidificante ai monti (*G.*).

Phylloscopus Trochilus, *Chiuino giallo*. Comune in ogni stagione[1] in cert'anni (*M. F.*); giunge in aprile e nidifica (*G.*).

Phylloscopus rufus, *Chiuino*. Comune e sedentario ai monti (*G.*).

Phylloscopus Bonellii, *Chiuino bianco*. Scarso in agosto e settembre (*M. F.*).

Hypolais icterina, *Canepino maggiore*, *Beccafico selvatico o cannajolo*. Comune dall'aprile alla fine di settembre (*M. F. G.*).

Hypolais polyglotta, *Canepino*, *Beccafico selvatico o cannajolo*. Più abbondante della precedente dall'aprile a tutto settembre (*M. F. G.*).

Acrocephalus streperus, *Cannajolino*. Giunge in aprile, comune nell'estate e principio d'autunno, quando frequenta le saggine (*M. F. G.*).

Acrocephalus arundinaceus, *Cannajola*. Comune dai primi di aprile ai primi di ottobre, durante i passi accade trovarlo anche lungi dai luoghi palustri (*M. F. G.*).

Calamodus schœnobænus, *Calcapaglione*. Comune dall'aprile a tutto settembre (*M. F. G.*).

Calamodus aquaticus, *Calcapaglione*. Estivo e comune (*M. F. G.*).

Lusciniola melanopogon, *Calcapaglione*. Comune e sedentario al piano in quello di Massarosa (*G.*).

Potamodus luscinioïdes, *Rosignolo di padule*. Comune e sedentaria al piano in quello di Massarosa (*G.*).

Locustella naevia, Osservato talora nel padule di Monsummano e in quello di Massaciuccoli, ove ne uccisi uno;

---

[1] Non dubito sia qui confuso anche il *P. rufus*.

Digitized by Google

un altro lo trovai in settembre sul mercato di Lucca (*M.*).

Cettia Cettii, *Rosignolo di padule.* Comune nel padule di Massaciuccoli (*G. F.*), ove nidifica; vi giunge in marzo (*G.*).

Cisticola cursitans, *Martellino.* Non raro anche d'inverno negli stipeti in collina (*M.*); sedentario (*G.*).

Troglodytes parvulus, *Recacco.* Sedentario e comune, nidifica ai monti e scende al piano l'inverno (*M. F. G.*).

Cinclus aquaticus, *Merlacquaccio.* Comune e sedentario, nidifica ai monti e col freddo scende al piano (*M.*); non comune in quello di Massarosa (*G.*).

Accentor collaris, *Mattacchiano.* Coi massimi freddi si vede lungo il Serchio (*M.*); di passo in novembre (*G.*).

Accentor modularis, *Stipajola.* Specialmente invernale e di doppio passo, ne ebbi in settembre (*M.*); sedentaria (*G.*).

Regulus cristatus, *Fiorino.* Sedentario, comune specialmente d'inverno nelle pinete (*M. G.*).

Regulus ignicapillus, *Fiorino.* Sedentario, comune d'inverno nelle pinete (*M. G.*).

Ægithalus pendulinus, *Fiaschetta, Fiaschettone.* Scarso, ma sembra sedentario giacchè ne ebbi uno in febbraio (*M.*); giungono numerosi al piano in marzo, nidificano e scompaiono prima della fine dell'estate (*F.*); sedentario (*G.*).

Acredula rosea, *Codazzola.* Scarsa e sedentaria sui monti, ne ebbi parecchi (*M. G.*).

Acredula Irbyi, *Codazzola.* Comune ovunque e sedentario (*M. G.*); abbonda specialmente in ottobre e aprile (*F.*).

Panurus biarmicus. Vidi in Lucca diversi esemplari presi nei paduli vicini (*M.*).

Parus major, *Cincina.* Abbondante e sedentaria (*M. F. G.*).

Parus ater, *Cincina.* Piuttosto scarsa (*M.*).

Cyanistes cæruleus, *Cincinina.* Abbondante e sedentaria, più scarsa d'inverno (*M. F. G.*).

Poecile palustris, *Cincina.* Sedentaria, piuttosto scarsa (*G.*).

Sitta cæsia, *Picchio muratore.* Sedentario, ma non abbondante (*M.*); raro assai (*G.*).

Digitized by Google

Certhia brachydactyla, *Montarino.* Comune e sedentario (*M. F.*); nidifica assai presto (*F. G.*).

Tichodroma muraria, *Picchio murajolo.* Sedentario, ma scarso; nidifica sugli alti monti (*M.*); ne ebbi uno nel gennaio 1886; veduti anche in ottobre al passo (*G.*).

Oriolus Galbula, *Gobulo.* Arriva alla seconda metà d'aprile ed ai primi di maggio, poche coppie rimangono a nidificare; parte o ripassa nella prima metà di settembre (*M. F. G.*).

Lanius Excubitor, *Averla grossa.* Scarsa in autunno (*M.*); piuttosto comune (*G.*).

Lanius minor, *Averla cenerina.* Numerosa al piano verso il litorale dalla metà di aprile alla metà di settembre (*M. F. G.*).

Lanius Collurio, *Averla piccola.* Abbondante dall'aprile alla metà di ottobre (*M. F. G.*).

Lanius auriculatus, *Capirosso, Averla capirossa.* Piuttosto scarsa dalla metà di aprile alla metà di settembre, pochi nidificanti (*M. F. G.*).

Muscicapa collaris, *Balia, Aliuzza.* La ebbi una sola volta in aprile (*M.*); di scarso passaggio in aprile (*G.*).

Muscicapa Atricapilla, *Balia, Aliuzza.* Assai comune in aprile e settembre, ma in autunno non vidi che giovani (*M.*); scarsa ai primi di maggio (*F. G.*).

Butalis Grisola, *Siccio.* Estivo e comunissimo, giunge in aprile parte alla metà di settembre (*M. G.*).

Hirundo rustica, *Rondine.* Comune, estiva; giunge verso il 20 marzo ed è raro vederne ancora ai primi d'ottobre (*M. F.*); se ne vedono già in febbraio (*G.*).

Chelidon urbica, *Balestruccio.* Comune, estivo; giunge ai primi di marzo in scarso numero, la massa nella seconda metà di quel mese; con altre Rondini si trattiene sui paduli qualche giorno; parte entro la prima metà di ottobre, eccezionalmente se ne son veduti a novembre inoltrato (*M. F.*); se ne vedono già in febbraio (*G.*).

Clivicola riparia, *Balestruccio.* Giunge abbondante alla metà

Digitized by Google

di marzo, parte o ripassa nella prima quindicina di ottobre, non lo trovai nidificante (*M.*); vedonsene già in febbraio (*G.*).

Cotile rupestris, *Rondine.* Non comune d'inverno al piano in quello di Massarosa; vedesi di passo in ottobre (*G.*).

Cypselus Apus, *Rondone.* Comune, estivo; i primi vedonsi al principio di aprile, dalla città di Lucca scompaiono ai' primi d'agosto, ma sui monti elevati si trovano ancora ai primi di settembre (*M. G.*).

Cypselus Melba, *Rondone bianco.* Ne vidi due isolati durante un temporale in settembre ed un fortissimo branco sul Monte Penna (Monte Pisano) alla metà di ottobre (*M.*); passa abbondante in aprile (*G.*).

Caprimulgus europæus, *Calca bodda.* Comune dalla metà di aprile alla metà di ottobre (*M. F. G.*).

Picus major, *Picchio rosso.* Scarso, ma sedentario (*M.*); comune (*F.*).

Picus minor, *Picchio rosso piccolo.* Scarso assai, ma sedentario (*M. G.*).

Gecinus viridis, *Picchio gallinaccio.* Piuttosto scarso, ma sedentario (*M. F.*); abbastanza comune (*G.*).

Iynx Torquilla, *Capitorsolo.* Comunissimo, alcuni rimangono assai tardi (*M. F.*); sedentario (*G.*).

Cuculus canorus, *Cuccù.* Estivo, giunge ai primi d'aprile, parte o ripassa verso la metà di settembre; non molti si fermano l'estate, nel maggio frequentano le pinete in cerca di bruchi (*M. F.*); giunge già in marzo (*G.*).

Coccystes glandarius. Ne ebbi uno nell'aprile 1887, ed un secondo ai primi di maggio 1888; fui assicurato che altri tre erano stati veduti presso il mare (*G.*).

Alcedo Ispida, *Uccel Santa Maria*, *Uccel bel verde.* Comune e sedentario (*M. F. G.*).

Coracias Garrula, *Ghiandaja marina.* Di passo irregolare in primavera ed autunno, ne ebbi un giovane nel settembre in Valle di Freddana (*M.*); giunge di passo nel maggio (*G.*).

Merops Apiaster, *Tordo marino.* Passa regolarmente in pri-

Digitized by Google

mavera (maggio), ma per lo più vien soltanto udito o visto per aria, giacchè di rado si abbassa durante il suo viaggio diurno; spesso si odono senza poterli scorgere tanto sono alti (*M. F.*); molti nidificano nella tenuta del Duca Salviati a Migliarino (*G.*).

Upupa Epops, *Galletto marzolo.* Giunge ai primi d'aprile, parte in settembre, pochi rimangono a nidificare (*M. F.*); vedesi già in marzo (*G.*).

Strix flammea, *Barbagianni.* Comune e sedentario (*M.*); di passo in marzo (*F.*).

Syrnium Aluco, *Gufo selvatico.* Sedentario, ma scarso ai monti (*M. G.*).

Asio Otus, *Allocco.* Veduto soltanto in ottobre (*M.*); comune (*F.*); sedentario (*G.*).

Asio accipitrinus, *Allocco.* Di passo in primavera (*M.*); sedentario (*G.*).

Athene Noctua, *Civetta*, *Cuccumeggia.* Comune e sedentaria (*M. F. G.*).

Scops Giu, *Chiucco*, *Chiurlo-in-Chiò* (Valli di Sopa). Estivo e frequente (*M. F.*); giunge in marzo (*G.*).

Bubo maximus, *Gufo reale.* Abbastanza frequente; è sedentario e comune nei monti della vicina Garfagnana, ove sono dirupi inaccessibili di roccia calcarea con abbondanti cavità in cui nidifica (*M.*); veduto una sola volta (*G.*).

Circus æruginosus, *Pogliana.* Comune e sedentario al piano (*M. F. G.*).

Circus cyaneus, *Albanella reale.* Non rara (*M.*); di passo in febbraio (*G.*).

Circus Swainsoni, *Albanella.* Scarsa, forse è più facile trovarne ai monti che al piano (*M.*); non rara di passo in febbraío (*G.*).

Pandion Haliaëtus, *Aquilotto.* Divenuto scarso dopo il prosciugamento del lago di Bientina, l'ebbi in aprile da Massaciuccoli (*M.*); di passo in agosto (*G.*).

Circaëtus gallicus, *Marzolo.* Non raro e forse sedentario, lo ebbi in maggio ed in settembre, lo vidi anche d'in-

Digitized by Google

verno; predilige le pinete (*M.*); di passo regolare nel marzo (*G.*).

Haliaëtus Albicilla, *Aquila di mare.* Di comparsa accidentale (*M.*); veduta nel gennaio 1884 (*G.*).

Aquila Chrysaëtus. Ne vidi una sola presa sull'Appennino e conservata a Coreglia (*M.*).

Aquila clanga. Rara (*M.*).

Archibuteo lagopus. Accidentale (*M.*).

Buteo vulgaris, *Pojana.* Comune e sedentaria (*M. F.*); di passo in settembre (*G.*).

Pernis apivorus, *Pojana.* Frequente di doppio passaggio (*M.*); passa in settembre (*G.*).

Milvus Ictinus. Raro (*M.*); sedentario (*F.*).

Falco Peregrinus. Accidentale, ne vidi uno a Massaciuccoli nel novembre 1886 (*G.*).

Hypotriorchis Subbuteo, *Falchetto.* Si prende specialmente in settembre ed ottobre (*M. F. G.*).

Æsalon regulus. Di passo in autunno e primavera (*M.*).

Cerchneis Tinnunculus, *Falchetto.* Assai comune e sedentario (*M. F.*); anche di passo in settembre (*G.*).

Cerchneis Naumanni. Ebbi una sola femmina, uccisa il 21 agosto 1886 sul Monte Valimona presso Lucca (*M.*); passa anche in settembre e non è raro (*G.*).

Cerchneis vespertinus, *Falco cucculo.* Molti passano in aprile e maggio in Val di Serchio; alcuni anni or sono ne ebbi un maschio adulto ai primi di novembre (*M.*); non regolare nelle sue comparse, nella primavera del 1878 innondarono il padule di Massaciuccoli poi non ne vidi più sino al maggio 1888, quando una coppia soltanto venne osservata (*G.*).

Astur palumbarius, *Astore.* Non raro (*F.*).

Accipiter Nisus, *Sparviere.* Comune alle due epoche del passo, ma anche sedentario (*M.*); di passo in settembre (*G.*).

Pelecanus Onocrotalus, *Pellicano.* Raro, ne ebbi uno giovane nell'agosto 1883; in più anni ne ho veduti tre volte sul lago di Massaciuccoli, sempre in branchi, e una volta, nel maggio, un individuo isolato (*G.*).

Digitized by Google

Phalacrocorax Carbo, *Mergollo.* Comune sul lago di Massaciuccoli; anche di passo nel settembre (*G.*).

Ardea cinerea, *Bertola.* Scarso in quel di Massarosa, vedesi anche in luglio di passo (*G.*).

Ardea purpurea, *Fiascaccio.* Avuto dai paduli (*M.*); comune in primavera (*F.*); giunge di passo in marzo (*G.*).

Egretta alba, *Garza.* Rara a Massaciuccoli, ne uccisi tre giovani nell'agosto 1882 (*G.*).

Egretta Garzetta, *Bertolotto.* Avuta due volte da Massaciuccoli (*M.*); vi passa regolarmente in aprile; nel 1887 tre coppie vi rimasero sino alla metà di luglio, onde vi è forse nidificante (*G.*).

Ardeola ralloïdes, *Spennacchino.* Avuta da Massaciuccoli (*M.*); ove passa in copia in aprile; forse vi nidifica giacchè nel 1887 una coppia vi rimase certo sino alla metà di luglio (*G.*).

Ardetta minuta, *Trabucchella.* Estivo e comune (*M. F.*); giunge in aprile (*G.*).

Botaurus stellaris, *Trabucco.* Comune da primavera ad autunno (*M. F.*); sedentario (*G.*).

Nycticorax griseus, *Arione.* Comune da primavera ad autunno (*M. F.*); giunge in aprile (*G.*).

Platalea Leucorodia, *Spatola.* Rara, ne ebbi una nell'aprile 1882, da un branco di quattro che si fermò nel padule di Massaciuccoli (*G.*).

Plegadis Falcinellus, *Ciurletto nero.* Ne vidi 8, presi insieme a Massaciuccoli (*M.*); vi passa in aprile regolarmente (*G.*).

Ciconia alba. Rara assai (*G.*).

Ciconia nigra. Accidentale (*G.*).

Phœnicopterus roseus. Accidentale, ne ebbi un giovane a Massaciuccoli nell'agosto 1880 (*G.*).

Cygnus Olor. Ne vidi due volte sul lago di Massaciuccoli, d'inverno, prima del 1880 (*G.*).

Cygnus musicus. Accidentale d'inverno a Massaciuccoli (*G.*).

Cygnus Bewicki. Due individui furono uccisi sul lago di Massaciuccoli nel gennaio 1874 (*G.*).

Anser cinereus, *Oca.* Non rara di passo in novembre (*G.*).

Digitized by Google

Anser segetum, *Oca.* Comune di passo in novembre (*G.*); specialmente nel marzo sul Serchio (*F.*).

Tadorna cornuta, *Volpoca.* Rara, ne vidi tre sul lago di Massaciuccoli (*G.*).

Anas Boscas, *Germano.* Abbondante di passo da ottobre a marzo, ma anche sedentario (*M. F. G.*); durante la incubazione il maschio assume l'abito femminile (*G.*).

Chaulelasmus streperus, *Canapiglia.* Invernale e scarsa (*M.*); era una volta assai più frequente, veduta di passo in luglio (*G.*).

Spatula clypeata, *Mestolone.* Assai frequente nell'inverno (*M. F.*); veduta di passo in luglio (*G.*).

Dafila acuta, *Codone.* Frequente nell'inverno (*M.*); durante l'epoca dell'incubazione il maschio assume l'abito femminile; l'ho veduto di passo in luglio (*G.*).

Mareca Penelope, *Fratino.* Assai abbondante d'inverno (*M.*); anche sedentario; durante l'epoca dell'incubazione il maschio assume in parte l'abito della femmina (*G.*).

Nettion Crecca, *Arzavola.* Comunissima nell'inverno (*M.*); sedentaria anche; durante la incubazione il maschio assume l'abito femminile (*G.*).

Querquedula Circia, *Rochetto.* Abbonda soltanto alla fine di febbraio ed ai primi di marzo (*M. F.*); durante la incubazione il maschio prende un abito somigliante alla femmina; veduta anche in luglio (*G.*).

Fuligula rufina, *Fischione turco.* Raro, ma si vede quasi ogni anno a Massaciuccoli, vi uccisi una femmina nell'agosto 1886 (*G.*).

Fulix ferina, *Moriglione.* Comune nell'inverno (*M.*); se ne vedono alcuni tutto l'anno (*G.*).

Fulix Marila, *Morettone.* Raro a Massaciuccoli d'inverno, novembre (*G.*).

Fulix Fuligula, *Moretta, Morettone.* Comune d'inverno (*M. F.*); se ne vedono tutto l'anno e nidificano certamente a Massaciuccoli (*G.*).

Fulix Nyroca, *Rossina.* Comune d'inverno (*M.*); se ne vedono tutto l'anno, la credo nidificante (*G.*).

Digitized by Google

Bucephala Clangula, *Cagnaccio.* Scarso a Massaciuccoli d'inverno (*M.*); passa in novembre (*G.*).

Œdemia fusca, *Anatra di mare.* Scarso d'inverno, ma ogni anno se ne vedono in novembre a Massaciuccoli (*G.*).

Erismatura leucocephala. Raro, ne uccisi due a Massaciuccoli nell'inverno 1888 (*G.*).

Mergus Merganser, *Seghettone.* Accidentale a Massaciuccoli d'inverno (*G.*).

Mergus Serrator, *Seghettone.* Assai frequente nell'inverno (*M.*); passa in novembre (*G.*).

Mergellus Albellus, *Pescina.* Frequenti i giovani e le femmine d'inverno, rari i maschi adulti (*M.*); divenuta rara (*G.*).

Columba Palumbus, *Favaccio.* Comune durante il passo tra fine settembre e novembre; fors'anche nidificante (*M. G.*); frequente pure al ripasso (*F.*).

Columba Oenas, *Colombella.* Più comune durante il passo verso il litorale (*M.*); e anche al ripasso (*F.*); passa in ottobre (*G.*).

Turtur tenera, *Tortora.* Passa alla fine d'aprile, in maggio ed in settembre; pochi rimangono a nidificare (*M. F. G.*).

Perdix rufa, *Pernice*, *Coturnice.* Quasi scomparsa dalla provincia, ove in certe località ai monti era comune e sedentaria (*M.*); nel marzo 1883, presso Monte San Quirico ne incontrai una brigata che doveva essere di passo (*F.*).

Starna Perdix, *Starna.* Poco comune e sedentaria (*M. F. G.*).

Coturnix communis, *Quaglía.* Giunge agli ultimi d'aprile e ai primi di maggio; al ripasso predilige le risaie (*M.*); è abbondante (*F. G.*).

Rallus aquaticus, *Gallinella.* Comune d'inverno, ebbi però un maschio giovane alla metà d'agosto (*M.*); sedentaria (*G.*).

Ortygometra Porzana, *Pappardella.* Comune in marzo ed aprile ed in settembre ed ottobre (*M. F.*); vedesi già in febbraio (*G.*).

Ortygometra Bailloni, *Pappardellino.* Comune in marzo ed aprile ed in settembre ed ottobre (*M. F. G.*).

Digitized by Google

Ortygometra parva, *Puttanella*, *Gambino*. Comune in marzo ed aprile ed in settembre ed ottobre (*M. F. G.*).

Crex pratensis, *Requaglio*. Assai comune in primavera ed autunno; qualcuno vedesi anche d'inverno (*M. F.*); era assai più frequente in passato, veduto anche in agosto (*G.*).

Gallinula chloropus, *Scepita*. Non molto abbondante (*M. F.*); sedentaria (*G.*).

Hydrornia Alleni. Accidentale, ne sono stati presi tre o quattro a Massaciuccoli in tempo addietro (*G.*).

Porphyrio cæruleus. Accidentale (*G. F.*).

Fulica atra, *Folaga*. Comune assai, in parte sedentaria, in parte migratoria (*M. F. G.*).

Grus communis, *Gruga*. Comune di passo, ma assai di rado si ferma (*M. G.*).

Otis Tarda. Accidentale (*G.*).

Otis Tetrax. So di quattro individui presi (*M.*); di scarso passo nel maggio (*G.*).

Œdicnemus scolopax, *Occhione*. Comune, specialmente tra i colli ed il mare (*M.*); di passo in marzo, ma è divenuto scarso (*G.*).

Cursorius gallicus. Vidi un solo esemplare, preso presso Viareggio (*M.*).

Charadrius Pluvialis, *Piviere*. Comune dall'autunno alla primavera inoltrata (*M. F.*); vedesi anche in gennaio (*G.*).

Squatarola helvetica, *Piviere di scoglio*. Non rara (*M.*); passa in maggio (*G.*).

Eudromias Morinellus. Una volta si vedeva, ora pare essere affatto scomparso (*G.*).

Ægialitis cantiana, *Pretino*, *Prillo*. Comune (*G. F.*); passa in maggio (*G.*).

Ægialitis curonica, *Pretino*, *Prillo*. Comune in marzo ed ottobre sulle ghiaie del Serchio (*M. F.*); passa specialmente in maggio (*G.*).

Ægialitis Hiaticula, *Pretino*, *Prillo*. Comune nell'aprile e maggio (*M. F. G.*).

Vanellus Capella, *Fifa*. Giunge in copia nel novembre per

Digitized by Google

svernare, ma un anno ne trovai sul Serchio nella seconda metà di settembre (*M.*); passa già in ottobre (*F. G.*).

Strepsilas Interpres, *Voltapietre.* Specie rara, ma quasi ogni anno, nel maggio, se ne prendono alle reti nel padule di Massaciuccoli, ove molti uccelli aquatici e di ripa si prendono a quel modo; una sola volta l'ebbi presa in settembre (*G.*).

Hæmatopus Ostralegus, *Beccaccia di mare.* Scarso in aprile e maggio sul litorale (*M.*); dicesi abbia nidificato alla foce del Serchio (*G.*).

Recurvirostra Avocetta, *Becca' lesina.* Scarsa in aprile e maggio (*M. G.*).

Himantopus candidus, *Taliano.* Di passo in aprile e maggio (*M.*); ha nidificato per molti anni a Massaciuccoli (*G.*).

Limicola platyrhyncha, *Frullino.* Ne ebbi cinque presi a Massaciuccoli (*M.*); veduti in maggio, agosto e settembre (*G.*).

Pelidna subarquàta, *Piovanello*, *Prillo.* Molto abbondante in maggio (*M. F.*); vedesi di passo anche in agosto (*G.*).

Pelidna alpina, *Piovanello*, *Prillo.* Scarso in primavera (*G.*).

Actodromas minuta, *Piovanellino.* Comune in maggio (*M. F.*); veduto di passo anche in luglio (*G.*).

Actodromas Temmincki, *Piovanellino.* Scarso nel maggio; veduto di passo anche in luglio (*G.*).

Tringa Canutus, *Piovanello.* Ne ebbi uno nel maggio 1881 (*G.*).

Calidris Arenaria, *Piovanello.* Non comune in maggio a Massaciuccoli (*G.*).

Machetes Pugnax, *Gambetta muta.* Comune da marzo a maggio, scarsa in autunno (*M. F.*); di passo anche in agosto ed in febbraio (*G.*).

Tringoïdes Hypoleucus, *Piro-piro*, *Prillo.* Comune da marzo ad ottobre e nidificante (*M. F.*); sedentario (*G.*).

Totanus Ochropus, *Piro-piro*, *Prillo.* Comune di passo e anche sedentario (*M. F.*); vedesi anco nel luglio (*G.*).

Totanus Glareola, *Piro-piro*, *Prillo.* Comune di doppio passo; l'ho veduto di passo in aprile ed in giugno, non è

Digitized by Google

improbabile che sia nidificante avendone veduto anche in luglio (*G.*).

Totanus stagnatilis, *Piro-piro*, *Prillo*. Non comune di passo in marzo; ne uccisi anche nella prima metà di agosto 1887 (*G.*).

Totanus Calidris, *Chio-chio*. Comune di doppio passo (*M.*); forse nidificante a Massaciuccoli ove giunge in aprile (*G.*).

Totanus fuscus, *Fischioncello*. Comune di passo in aprile (*G.*).

Totanus nebularius, *Fischione*. Comune in aprile; di passo ancora in luglio ed agosto (*G.*).

Terekia cinerea. Ne ebbi una nel maggio 1883 (*G.*).

Limosa melanura, *Pittima*. Comune, specialmente in marzo (*M. F.*); di passo anche in agosto (*G.*).

Limosa rufa. Ho avuto una in abito nuziale il 16 maggio 1888, era femmina; un'altra l'ebbi nel settembre 1887 (*G.*).

Scolopax Rusticula, *Beccaccia*. Giunge per lo più dopo il 20 ottobre, ma se ne vedono spesso alla fine di settembre; poche svernano ed il passo primaverile è sempre meno copioso; dopo aprile è affatto casuale vederne, dicesi di casi di nidificazione di questa specie nella provincia (*M. F. G.*).

Gallinago major, *Pasqualino*. Comune al passo in marzo ed aprile (*M.*); ed anche maggio (*F.*); ne uccisi uno il 24 novembre 1874 a Massaciuccoli (*G.*).

Gallinago cælestis, *Beccaccino*, *Seneppia*. Giunge la massa ai primi di novembre, ma sin dall'agosto se ne vedono (*M. F.*); veduto anche in luglio (*G.*).

Gallinago Gallinula, *Seneppio*, *Seneppino*, *Vuota borse*. Di doppio passo e comune (*M. F.*); di passo anche in settembre (*G.*).

Numenius Arquata, *Ciurlotto*. Comune da novembre ad aprile (*M.*); di passo anche in settembre (*G.*).

Numenius tenuirostris, *Ciurlo a picche*. Non comune in aprile e maggio (*M. G.*).

Numenius Phæopus, *Ciurlottino*. Comune in aprile e maggio (*M.*); di passo anche in settembre (*G.*).

Digitized by Google

Glareola Pratincola, *Incarcabodda.* Si prende in buon numero alle reti nel maggio a Massaciuccoli (*M. G.*),

Sylochelidon caspia, *Forbicione maggiore.* Raro, ne vidi due nel maggio 1885 a Massaciuccoli (*G.*).

Thalasseus cantiacus. L'ebbi più volte dai paduli del litorale in aprile e maggio (*M.*).

Gelochelidon anglica, *Paolinaccione.* Non comune in maggio a Massaciuccoli; ma nel 1888 se ne videro moltissimi e anche il 28 giugno ne vidi un branco (*G.*).

Sterna fluviatilis, *Forbicione.* Comune in aprile, maggio e settembre (*M. F. G.*); veduta anche il 26 agosto 1887 (*G.*).

Sternula minuta, *Monachino.* Comune di passo in aprile-maggio ed in settembre, non nidifica (*M. F.*); vedesi anche in agosto (*G.*).

Hydrochelidon hybrida, *Beccapesce.* Abbastanza comune, si prende vivo colle reti in maggio, mai in autunno (*M. F.*); non di regolare comparsa a Massaciuccoli, ove l'ho veduto il 9 luglio 1887 e per la prima volta in autunno il 23 settembre 1887 (*G.*).

Hydrochelidon leucoptera, *Paolinaccio toppato*, *Paolinaccio moro.* Comune di passo, ma soltanto nel maggio, quando colle congeneri si piglia alle reti (*M. F. G.*).

Hydrochelidon nigra, *Paolinaccio.* Comunissimo dalla fine di aprile al settembre (*M. F. G.*).

Chroocephalus minutus, *Gabbianello*, *Piccioncino.* Abbastanza frequente in primavera (*M.*); di passo in settembre, e nel palude di Massaciuccoli ne vidi in luglio e anche in dicembre (*G.*).

Chroocephalus melanocephalus, *Ghella.* Comune, veduto anche in luglio (*G.*).

Chroocephalus ridibundus, *Ghella.* Comunissimo sul litorale e sulle paludi (*M.*); vedesi anche in luglio (*G.*).

Larus canus, *Ghella.* Non rara sul litorale (*M.*); si vede in novembre (*G.*).

Larus fuscus, *Martinaccio.* Sedentario, comune (*G.*).

Larus cachinnans, *Martinaccio*, *Mugnajaccio.* Poco comune, ma sedentario sul litorale (*M.*); comune (*G.*).

Digitized by Google

Puffinus Kuhli, *Pallante*, *Berta*. Comune, di passo in maggio (*G.*); mi fu detto che si vedono anche lungo il Serchio (*F.*).

Utamania Torda. Non comune d'inverno (*G.*).

Fratercula arctica. Rara al litorale d'inverno (*G.*).

Colymbus glacialis, *Marangone*. Non comune d'inverno; ne ebbi una il 20 dicembre 1886 che pesava 5 chilogrammi (*G.*).

Colymbus arcticus, *Strolaga*. Comune d'inverno dal 1° novembre (*G.*).

Colymbus septentrionalis, *Strolaga*. Non comune d'inverno e non di regolare comparsa (*G.*).

Podiceps cristatus, *Ciuffina*. Invernale, scarso (*M. F.*); passa anche in settembre (*G.*).

Podiceps griseigena, *Strolaghina*. Non comune, ma se ne videro diversi nel 1887; il 16 maggio 1888 furono uccise a Massaciuccoli due femmine in perfetto abito nuziale; passa anche in settembre (*G.*).

Podiceps cornutus, *Occhialone*. Non comune d'inverno, ma quasi ogni anno capita a cominciare dall'ottobre (*G.*).

Podiceps nigricollis, *Occhialone*. Non comune, ma più assai della precedente, vedesi di passo anche in agosto (*G.*).

Podiceps fluviatilis, *Tuffetto*. Comune e sedentario (*M. F. G.*).

Elenco delle specie di uccelli osservate di passaggio regolare nella provincia di Lucca, distretti di Massarosa (Massaciuccoli), e Viareggio.[1]

LUGLIO

Ardea cinerea.
Chaulelasmus streperus.
Spatula clypeata.
Dafila acuta.
Querquedula Circia.
Actodromas minuta.

[1] Questo elenco è compilato dal signor Raimondo Gragnani.

Digitized by Google

Actodromas Temmincki.
Gallinago cælestis.
Chroocephalus melanocephalus.
Chroocephalus ridibundus.

AGOSTO

Monachus hortensis.
Pelidna subarquata.
Limicola platyrhyncha.
Machetes Pugnax.
Totanus nebularius.
Limosa melanura.
Sternula minuta.
Hydrochelidon nigra.
Podiceps nigricollis.

SETTEMBRE

Corvus frugilegus.
Petronia stulta.
Chrysomitris Spinus.
Cannabina Linota.
Emberiza pyrrhuloïdes.
Emberiza pusilla. Accidentale.
Monticola Cyanus.
Turdus musicus.
Cyanecula Wolfi.
Pernis apivorus.
Buteo vulgaris.
Hypotriorchis Subbuteo.
Cerchneis Tinnunculus.
Cerchneis Naumanni.
Accipiter Nisus.
Phalacrocorax Carbo.
Gallinago Gallinula.
Numenius Arquata.
Numenius Phæopus.
Chroocephalus minutus.
Podiceps cristatus.
Podiceps griseigena.

OTTOBRE

Fringilla Montifringilla.
Coccothraustes vulgaris.
Emberiza Citrinella.
Emberiza Cia.
Emberiza Schœniclus.
Alauda arvensis.
Anthus pratensis.
Anthus Spipoletta.
Turdus iliacus.
Cotile rupestris.
Columba Palumbus.
Columba Oenas.
Vanellus Capella.
Scolopax Rusticula.
Podiceps cornutus.

NOVEMBRE

Pyrrhula europæa.
Accentor collaris.
Anser cinereus.
Anser segetum.
Fulix Marila.
Bucephala Clangula.
Œdemia fusca.
Mergus Serrator.
Mergellus Albellus.
Gallinago major.
Larus canus.
Colymbus arcticus.

DICEMBRE

Nessuna.

Digitized by Google

GENNAIO

Charadrius Pluvialis.
Vanellus Capella.

FEBBRAIO

Hirundo rustica.
Chelidon urbica.
Clivicola riparia.
Circus cyaneus.
Circus Swainsoni.
Ortygometra Porzana.
Machetes Pugnax.

MARZO

Ruticilla Phœnicurus.
Cettia Cettii.
Cuculus canorus.
Upupa Epops.
Scops Giu.
Circaëtus gallicus.
Ardea purpurea.
Ortygometra Bailloni.
Ortygometra parva.
Œdicnemus scolopax.
Totanus stagnatilis.
Limosa melanura.

APRILE

Calandrella brachydactyla.
Anthus trivialis.
Budytes flavus.
Saxicola Oenanthe.
Aëdon Luscinia.
Cyanecula Wolfi.
Pratincola Rubetra.
Sylvia orphæa.
Sylvia cinerea.
Phylloscopus sibilator.
Phylloscopus Trochilus.
Hypolais icterina.
Hypolais polyglotta.
Acrocephalus streperus.
Acrocephalus arundinaceus.
Calamodus schœnobænus.
Calamodus aquaticus.
Lanius minor.
Lanius Collurio.
Lanius auriculatus.
Muscicapa collaris.
Muscicapa Atricapilla.
Butalis Grisola.
Cypselus Apus.
Cypselus Melba.
Egretta Garzetta.
Ardeola ralloïdes.
Ardetta minuta.
Nycticorax griseus.
Plegadis Falcinellus.
Turtur tenera.
Hæmatopus Ostralegus.
Recurvirostra Avocetta.
Totanus Calidris.
Totanus fuscus.
Totanus nebularius.
Sterna fluviatilis.
Hydrochelidon nigra.

MAGGIO

Emberiza Hortulana.
Oriolus Galbula.
Caprimulgus europæus.
Coracias Garrula.
Merops Apiaster.

Digitized by Google

Coturnix communis.
Otis Tetrax.
Squatarola helvetica.
Ægialitis cantiana.
Ægialitis curonica.
Ægialitis Hiaticula.
Strepsilas Interpres.
Himantopus candidus.
Limicola platyrhyncha.
Pelidna subarquata.
Actodromas minuta.
Actodromas Temmincki.
Glareola Pratincola.
Sternula minuta.
Hydrochelidon hybrida.
Hydrochelidon leucoptera.
Puffinus Kuhli.

GIUGNO

Totanus Glareola.

Pisa (Ott Enrico, Fauglia e circondario; Papasogli Giovanni, Lavajano, Lari; Venerosi-Pesciolini conte Giuseppe, Ghizzano in Val d'Era; Degli Alessandri conte Cosimo, Cedri in Val d'Era):

Il distretto è nella provincia di Pisa ed include: il comune di Fauglia (per intero); il comune di Collesalvetti (in parte); il comune di Lari (in parte); e quelli di Cascina e di Lorenzana (in parte). La natura del suolo è tufoso, arenario, argilloso e galestrino. I torrenti e fossi principali sono: Rio del Tramoscio, fiume Isola, fiume Orcina, fiume Zannone ed il fosso emissario del padule di Bientina, detto Fosso della Botte.

Il distretto è piccolo, ma essendo il mio consueto luogo di caccia da ben 15 anni, è da me ben conosciuto; abitando di consueto nella mia tenuta di Tripalle, che forma quasi il centro del territorio di osservazione. Il piano è limitato dall'emissario del padule di Bientina da una parte; dall'altre dal fiume Zannone (parte di Levante) e dal fiume Isola (parte di Ponente). Dal lato di Mezzogiorno sono le colline di Fauglia, Tripalle, Crespina e Lari. Il poggio si estende per tutte le sopra dette colline fino alle Biancane di Lari e di Lorenzana, dalla parte di Mezzogiorno.

Il piano è coltivato in parte a viti, e in parte lavora-

Digitized by Google

tivo spogliato, in parte a prato (specialmente al di là dello Zannone). Nella coltivazione a prato trovansi frequentemente dei bassi ove dall'ottobre al maggio rimane l'acquatrino. Il piano, dal fosso Zannone alle falde delle colline, è frastagliato da collinette, o meglio ondulazioni di terreno, molte coperte di scopicci, altre lavorate e vitiate, altre ricoperte di pinete e da macchie di Cerro, Farnie, Quercia e Stipe (tenuta Cenosa, prop. contessa Valery). Macchie che contengono piccoli vallini paludosi, e un proprio e vero padulino che fino a 10 anni or sono ha servito di risaia.

La collina in parte è lavorata e piantata a vigna ed ulivi, in parte a macchia di Cerro, di Quercia, Stipa e poco Leccio. Macchie (si dica lo stesso per quelle di piano) quasi tutte tagliate al piede dell'età di anni 10, e in basso (sterzo sterzatura) ogni 5 anni. Prima vi si trovavano molti Pini insieme ai Cerri ora quasi tutti tagliati o lasciati solo nei luoghi detti Pinete. Le colline abbondano di acque nelle vallate, non vedendosi i torrenti mai del tutto prosciugati nell'estate.

Le Biancane poi, composte quasi totalmente di mattaione, sono spoglie di viti e solo ricoperte da pochi anni di Lupinella e Solla; nell'estate sono aridissime.

Sono sentiti assai forti i venti di mare sia d'estate che d'inverno. Nell'inverno più il Greco-Levante che il Tramontano. Nell'estate abbiamo quasi costantemente la mattina il Tramontano o Greco-Levante, e la sera Maestrale specialmente nei giorni di bellissimo tempo (*Ott*).

Lavajano piccolo villaggio del comune di Lari, nella provincia di Pisa, giace a mezzogiorno ed a pochi chilometri dai Monti Pisani, al nord-nord-ovest delle colline di Lari dalle quali scende il torrente Zannone, che ne divide il territorio in due zone, e che scarica le sue acque nel Tirreno per la foce del Calambrone, presso Livorno, dopo averle convogliate con quelle di altri torrenti nel Fosso Reale. La sua altezza sul livello del mare, lontano 22 chilometri dal lato di occidente, è di pochi metri.

Digitized by Google

Delle due zone accennate, quella di sinistra può dirsi costituita da suolo formato in posto; la sua superficie, alta sul mare in media 12 metri, è ondulata, accidentata assai e denunzia la vicinanza collinare. Non ha molto, nelle vallecole di questa zona l'acqua impaludava, e sui colletti vegetavano a stento sterpi, ginestre e rachitiche scope. Ora invece inframmezzati da piccole plaghe boscose, si trovano campi coltivati e rigogliosi vigneti. La zona a destra, pianeggiante, più bassa e più estesa, ha il suolo di riporto, e vi predominano i terreni argillosi. Anche qui prospera la vite, ma la porzione maggiore è tenuta a prateria ed a lavorativo spogliato.

Insomma nel territorio di Lavajano e nelle immediate vicinanze, hannosi basse colline asciutte e soleggiate, coperte da Quercia, Pini ed altre essenze; da campi e vigneti, e da cedui di quercioli, ginestre e grandi eriche. Si hanno larghi piani coltivati a cereali o tenuti a pascolo; terreni sommergibili e risaie; raccolte d'acqua e corsi perenni ed intermittenti, e per orti e giardini. (*Papasogli*).

Ghizzano è un piccolo paese situato nella Valle dell'Era e precisamente in uno degli ultimi punti della comunità di Peccioli, dalla parte in cui la provincia pisana giunge a confinare colla fiorentina. Non intendendo qui di fare una descrizione esatta e minuziosissima di questo luogo, chè non sentiamo la capacità di fare con quella bellezza e di forma e di stile che potrebbesi desiderare, ci limitiamo a dirne i confini fra cui è racchiuso il territorio che da ogni parte circonda detto paese, e che forma il distretto di osservazione, e così ci esprimiamo: Ghizzano adunque, o meglio il territorio che lo circonda, è racchiuso in gran parte a destra dal fiume o torrente Melogio, a sinistra dal Roglio; il primo si scarica nel secondo, e questo alla sua volta va a immedesimarsi nell'Era. È racchiuso da questi due fiumi o torrenti, dicevasi, al di là dei quali trovansi i possessi di proprietarii limitrofi, che sono sulla *destra* la tenuta di Pratello e quelle di Monti dei conti Ma-

Digitized by Google

stiani Brunacci di Pisa, a *sinistra* la tenuta di Cedri degli Alessandri, quindi quella di Montelopio dei Nerli e poi quella di Peccioli dei marchesi Dufour Berte: le quali due ultime tenute, non tanto fiancheggiano a sinistra il territorio di Ghizzano, ma piuttosto, lo diciamo correggendoci, stanno di fronte al di là del Roglio, che prendendo dalla sinistra viene a passare davanti al predetto territorio medesimo ed è agli ultimi punti di quella che riceve le acque del Melogio, che proviene dalla parte destra. A tergo questo paese, senza essere diviso da fiumi, è confinato dalla fattoria Biondi di Castelfalfi, che risiede in provincia fiorentina.

Il paese di Ghizzano si eleva 190 metri sul livello del mare, tanto che si scorgono benissimo e le vette di Monte Morello e il Golfo di Spezia e la etrusca Volterra che non dista che sole quattordici miglia toscane. Questo territorio è tutto in collina, collina non molto ripida, ma nemmeno molto placida; v'è del piano, ma questo è tutto attorno al letto dei due torrenti e non si estende a più di un campo di larghezza. In questo territorio si trova in alcuni punti il tufo in altri il mattaione, in altri il nicchio. Questo luogo costituisce nel suo insieme uno dei più bei punti delle colline, pisane che certo gareggiano colle migliori della Toscana. (*Venerosi-Pesciolini*).

Il distretto di osservazione è la tenuta di Cedri o Ceddri (Villa Cedrae) in Val d'Era, posta sulle colline fra Peccioli e Volterra. Terreno argilloso di deposito terziario, appartenente alle marne blù subappenniniche dette mattaioni del Volterrano, analogo alle crete senesi (*Degli Alessandri*).

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Pisa, distretti di Fauglia, Lari, Collesalvetti, Lorenzana, Cascina e Peccioli in Val d'Era, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione, ec., ec.[1]

Corvus Cornix, *Cornacchia.* Di passo (*O.*); sedentaria e scarsa (*P. V.*).

Corvus frugilegus, *Corvo, Corbo.* Di passo in autunno ed inverno, soggiorna poco (*O.*); scarso in novembre (*P.*).

Lycos Monedula, *Corvetto.* Ne uccisi e ne vidi un solo (*P.*); nidificante in Val d'Era (*D.*).

Pica rustica, *Gazza, Gazzera, Cecca.* Comunissima e sedentaria (*O. P. D.*).

Garrulus glandarius, *Ghiandaia.* Sedentaria e comune, più in collina (*O.*); piuttosto scarsa (*P. D.*).

Sturnus vulgaris, *Storno.* Numeroso al passo, si ferma al piano (*O.*); giunge in settembre ed ottobre di passaggio (*P. D.*).

Fringilla cœlebs, *Fringuello, Filunguello, Filinguello.* Sedentario e comunissimo ovunque, più abbondante assai alle epoche del passo, cioè in ottobre e novembre e febbraio (*O. P. V. D.*).

Fringilla Montifringilla, *Peppola, Fringuello marino.* Frequente di passo, abbondarono nell'inverno 1886 (*O.*); scarsa in ottobre (*P. D.*).

Petronia stulta, *Passera lagia, Passera forestiera.* Invernale,

---

[1] Questo elenco è compilato su quelli e sulle indicazioni fornite dai signori: Ott Enrico di Fauglia; Papasogli Giovanni di Lavajano, Lari; Venerosi-Pesciolini conte Giuseppe e dal compianto Degli Alessandri conte Cosimo di Ghizzano e Cedri in Val d'Era. Ho indicato colle iniziali *O. P. V.* e *D.* il contributo che spetta a ciascuno.

Digitized by Google

assai numerosa al passo alcuni anni (*O.*); scarsa in ottobre (*P. V.*); nidificante (*D.*).

Passer montanus, *Mattugia*, *Mattugino*, *Passera mattugia*. Comune e sedentaria (*O. P. V.*).

Passer Italiæ, *Passera*, *Passera grossa*, *Passera grossaia*. Comune e sedentaria (*O. P. V. D.*).

Coccothraustes vulgaris, *Frosone*, *Frusone*. Abbondante certi anni al passo autunnale (ottobre), meno numeroso al ripasso in marzo; forse sedentario, avendo avuto i giovani in luglio (*O.*); di passo (*P. V. D.*).

Ligurinus Chloris, *Verdone*, *Carenzuolo*, *Carenzolo*, *Calenzuolo*. Comune e sedentario, più abbondante nel passo d'ottobre che in quello di marzo ed aprile (*O. P. V. D.*).

Chrysomitris Spinus, *Lucherino*. Numeroso ai due passi, cioè in ottobre ed in marzo ed aprile, ma non tutti gli anni (*O. V.*); scarso, si dice che il passo abbondante, in ottobre, avviene ogni tre anni (*P. D.*).

Carduelis elegans, *Cardellino*, *Carderino*. Sedentario e di abbondante doppio passo (*O. P. V. D.*).

Serinus hortulanus, *Raperino*. Di regolare e doppio passo (*O.*); non frequente in ottobre (*P. V. D.*).

Cannabina Linota, *Montanello*. Sedentario e di passo copioso in ottobre e primavera (*O. P. D.*); i grossi branchi immigranti svernano da noi (*P. V.*).

Miliaria Projer, *Strillozzo*, *Stiattaione*. Comune e sedentario, di doppio passo copioso al piano (*O. P.*); specialmente in ottobre (*P. V.*).

Emberiza Citrinella. Piuttosto raro di passaggio in ottobre (*O. P. D.*).

Emberiza Cirlus, *Zigolo*, *Zigolino*. Comune e sedentario, ma più abbondante alle due epoche del passo (*O. V. D.*).

Emberiza Hortulana, *Ortolano*. Estivo e comune assai (*O.*); scarso in agosto (*P. V.*).

Emberiza Cia, *Zigolo muciatto*, *Mugiatto*. Comune d'inverno ed alle epoche del passo (*O.*); scarso in ottobre (*P.*).

Emberiza Schœniclus, *Migliarino*. Scarso in collina, abbondante al piano da ottobre a marzo (*O.*).

Digitized by Google

Melanocorypha Calandra, *Calandra.* Sedentaria ma non comune (*O.*); frequente al piano, ove da pochi anni è sedentaria; qualcuna passa in ottobre (*P.*).

Alauda arborea, *Bonicola.* Comune e sedentaria, più abbondante alle epoche del passo, nidifica in collina (*O. V.*); scarsa, giunge in ottobre per svernare (*P. D.*).

Alauda arvensis, *Panterana, Lodola di passo, Lodola reale* (in collina); *Lodola buona panterana* (al piano). Comune, sedentaria e di passo copioso in ottobre, novembre e marzo; nidifica al piano (*O. P. V. D.*).

Galerita cristata, *Lodola cappellaccia, Cappellaccia, Lodola nostrale.* Abbondante e sedentaria ovunque (*O. P. V. D.*).

Agrodroma campestris, *Corrisodo.* Scarso, più abbondante al passo alcuni anni (*O.*); estivo e nidificante (*D.*).

Anthus pratensis, *Prispola, Pispola, Prispolino, Mangia botte.* Comune alle due epoche del passo, specialmente in quella autunnale, settembre (fine) ed ottobre (*O. P. V. D.*).

Anthus trivialis, *Prispolone, Tordino.* Comune specialmente all'epoca del passo autunnale, cioè in agosto ed in settembre (*O. P. V.*); una volta ne ebbi due alla fine di novembre (21 novembre 1882) (*O.*).

Anthus Spipoletta, *Fossaccio.* Scarso nella prima metà di ottobre (*P.*).

Budytes flavus, *Cutti, Strisciaiuola.* Comune al passo, in piano (*O.*).

Budytes cinereocapillus, *Cutti, Strisciaiuola.* Comune al passo specialmente in primavera (*D.*).

Motacilla alba, *Ballerina, Batticoda, Cutrettola.* Abbondante e sedentaria (*O.P.*); passa nella prima metà d'ottobre (*P. V. D.*).

Calobates melanope, *Ballerina gialla.* Non abbondante, ma sedentaria (*O. P. V.*).

Saxicola Oenanthe, *Codibianco, Culobianco, Codino.* Comune alle due epoche del passo, specialmente al piano (*O. P.*) vedonsi specialmente nel passo autunnale da agosto a tutto settembre (*P. V.*); estivo e nidificante (*D.*).

Digitized by Google

Monticola saxatilis, *Codirossone, Codirosso grosso.* Scarso (*O.*).

Monticola Cyanus, *Passera solitaria, Merla tettaiuola.* Frequente e sedentaria, nidifica ai colli e scende al piano l'inverno (*O.*); scarsa, ma nidificante in Val d'Era (*V.*).

Merula nigra, *Merlo.* Comune e sedentario, abbondante alle due epoche del passo, ottobre e novembre, febbraio e marzo (*O. P. V. D.*).

Merula torquata, *Merlo forestiero.* Raro assai in collina (*O.*).

Turdus pilaris, *Cesena, Sassellara, Tordela forestiera.* Comune all'epoca del passo (*O.*).

Turdus iliacus, *Sassello.* Invernale e abbondante alle due epoche del passo (*O. P.*); giunge alla fine d'ottobre od in novembre (*P.*).

Turdus musicus, *Tordo reale, Tordo, Tordo bottaccio.* Comune alle due epoche del passo (*O.*); specialmente in ottobre (*P. V. D.*).

Turdus viscivorus, *Tordela, Tordiera.* Sedentaria e comune (*O. D.*); scarsa (*P.*).

Aëdon Luscinia, *Usignolo, Rosignolo, Rusignolo.* Estivo e comune, abbonda durante il passo in aprile (*O. P. D.*); nel gennaio del 1878 o 79 ne fu ucciso uno assai magro (*O.*); usualmente sono partiti alla fine di settembre (*P.*).

Erithacus Rubecula, *Pettirosso, Pittirosso, Pettiere.* Invernale e abbondante alle due epoche del passo (*O. P.*); specialmente dalla metà di settembre a tutto ottobre (*P. V.*); nidifica in Val d'Era (*D.*).

Ruticilla Phœnicurus, *Codirosso, Codirossa.* Comune alle due epoche del passo; nel gennaio 1880 dopo una nevicata uccisi un Codirosso[1] (*O.*); scarsa in collina nel passo autunnale (*P. V.*).

Pratincola Rubicola, *Saltimpalo, Scrocchetto, Frust'asino, Saltasecce, Spunta calocchie.* Sedentario e comunissimo (*O. P. V. D.*).

Pratincola Rubetra, *Stiaccino.* Assai più comune all'epoca

---

[1] Questo era probabilmente la *R. titys.*

Digitized by Google

del passo, in agosto e settembre, al piano che in collina (*O. P.*).

Sylvia cinerea, *Sterpazzola*, *Sterpagnola*, *Beccafichino*. Estiva e comune (*O. D.*).

Monachus Atricapillus, *Capinera* (il mas.), *Capibigia* (la fem.). Sedentaria e comune ovunque (*O. P.*).

Monachus hortensis, *Beccafico reale*, *Beccaficone*. Comunissimo in agosto e settembre (*O. P. V.*).

Pyrophthalma melanocephala, *Occhio rosso*, *Cecca*, *Bigina*. Sedentario e ovunque comune (*O.*).

Phylloscopus sibilator, *Luì verde*, *Luì*. Numeroso assai durante il passo primaverile soltanto, da marzo a metà aprile (*O.*).

Phylloscopus Trochilus, *Luì*, *Luicchio*, *Lucherino*. Comune ovunque dalla metà di settembre al marzo (*O.*).[1]

Phylloscopus rufus, *Luì*. Scarso in ottobre e novembre (*P.*).

Hypolais polyglotta, *Beccafico*, *Giallino*. Comune dalla metà di marzo alla metà di ottobre (*O. P.*).

Acrocephalus streperus, *Cannaiuola*, *Beccafico di padule*. Rara in collina, frequente al piano al passo di marzo ed aprile (*O.*).

Acrocephalus arundinaceus, *Caneroncione*. Assai comune al passo in aprile al piano (*O.*).

Calamodus schœnobænus, *Forapaglia*. Comune al piano, scarso in collina (*O.*).

Calamodus aquaticus, *Paglierino*. Comunissimo al piano (*O.*).

Cettia Cettii, *Rosignolo di padule*. Comune al piano (*O.*).

Cisticola cursitans, *Becca mosche*. Sedentario, ma meno frequente d'inverno (*O.*).

Troglodytes parvulus, *Re di macchia*, *Re*, *Re cacchino*, *Re cacco*. Comune e sedentario ovunque (*O. P.*); specialmente invernale (*P.*).

Accentor modularis, *Stipaiuola*, *Passerina*, *Passera di macchia*, *Passera stipaiola*. Comune ovunque (*O.*); scarsa (*P. V.*); dalla metà di ottobre in poi fanno un passo abbon-

[1] Ciò si riferisce fors' anche al *Ph. rufus*.

Digitized by Google

dante assai, onde si può dire che insieme ai Fringuelli costituiscono il maggior numero degli uccelli catturati ai paretai ed alle brescianelle (*D.*).

Regulus cristatus, *Arancino*, *Fiorancino*, *Capidoro*, *Capigiallo*. Comune (*O.*).

Regulus ignicapillus, *Arancino*, *Fiorancíno*, *Capidoro*, *Capigiallo*. Più comune della precedente (*O.*); frequente di di passo in autunno (*P. V.*).

Acredula Irbyi, *Penninculo*. Comune, specialmente in collina, e sedentario (*O. P. V. D.*).

Parus major, *Capinegra*, *Puticchia grossa*, *Cincia*. Comune ovunque e sedentaria (*O. P. D.*).

Cyanistes cæruleus, *Puticchia*, *Cincia*, *Cincino*. Comune e sedentaria (*O. D.*).

Sitta cæsia, *Picchio muraiolo*. Molto frequente al piano, meno ai colli, sedentario (*O. D.*).

Certhia brachydactyla, *Rampichino*. Comune ovunque e sedentario (*O.*); scarso (*P. V. D.*).

Oriolus Galbula, *Rigogolo*, *Ribobolo*. Estivo, più frequente in collina che al piano (*O.*); scarso da maggio ad ottobre (*P. V.*).

Lanius minor, *Averla grossa*, *Averla bigia*, *Averla gazzina*, *Averla gazzerina*. Estiva e comune ovunque. Il 20 dicembre 1883, trovandomi a Castiglion della Pescaia fui maravigliato di vedere in vendita un *L. minor*,[1] preso il giorno avanti (*O.*); frequente, giunge alla metà di maggio, parte in settembre (*P.*).

Lanius Collurio, *Averla*, *Averla piccola*. Estiva e ovunque comune (*O.*).

Lanius auriculatus, *Averla capirossa*. Comune ovunque, estiva (*O.*); giunge ai primi di maggio e parte in settembre (*P.*).

Butalis Grisola, *Piglia mosche*. Estivo e scarso (*P.*).

Hirundo rustica, *Rondine*, *Rondine reale*. Estiva e comune.

[1] Con ogni probabilità era invece un esemplare del raro *L. meridionalis*.

Digitized by Google

ne uccisi una agli ultimi del novembre 1880 (*O.*); i primi nella seconda metà di marzo, ultime partenze fine ottobre (*P.*).

Chelidon urbica, *Balestruccio*, *Rondinino*. Estivo e comune (*O.*); arriva ai primi di marzo, la massa in aprile, parte in settembre ed ottobre (*P.*).

Clivicola riparia, *Topino*, *Balestruccio bigio*. Assai comune al piano all'epoca del passo in aprile (*O.*).

Cypselus Apus, *Rondone*, *Rondinaccio*. Estivo e comune (*O. P.*); giunge in aprile e parte alla fin di luglio (*P.*).

Caprimulgus europæus, *Nottola*, *Nottolone*. Estivo, più frequente in collina; agli ultimi di novembre 1880, essendo a caccia di Beccaccie, mio fratello ne uccise uno (*O.*); scarso (*P.*).

Picus major, *Picchio rosso*, *Picchio rosso maggiore*. Comune (*O.*).

Picus minor, *Picchio rosso piccolo*. Scarso, ma sedentario (*P.*).

Gecinus viridis, *Picchio verde*, *Picchio gallinaccio*, *Picchio pollastro*. Sedentario, più comune in collina (*O.*); scarso (*P. D.*).

Iynx Torquilla, *Storgicollo*, *Torgicollo*, *Girasole*. Sedentario e comune (*O. P. V.*).

Cuculus canorus, *Cuculo*, *Cucco*. Estivo, più frequente in collina (*O. P.*); rimane dall'aprile al settembre (*P.*).

Alcedo Ispida, *Uccel Santa Maria*, *Santa Maria*. Comune ovunque e sedentario (*O.*); scarso (*P.*).

Merops Apiaster, *Tordo marino*, *Cione*, *Ciane*, *Cruccione*. Estivo e abbondante, nidifica a colonie in collina (*O. D.*); scarso (*P.*).

Upupa Epops, *Galletto marzuolo*. Estivo, comune (*O.*); da marzo a settembre (*P. D.*).

Strix flammea, *Barbagianni*. Comune e sedentario (*O.*); scarso anche di passo in ottobre (*P. V.*).

Syrnium Aluco, *Allocco*, *Barbagianni*. Non raro nei boschi al piano, sedentario (*O.*); scarso, di passo in ottobre (*P.*).

Asio Otus, *Gufo*, *Bufo*. Assai comune ovunque (*O.*).

Athene Noctua, *Civetta*. Comune e sedentaria (*O. P. V.*).

Scops Giu, *Assiolo*, *Chiurlo*, *Chirliucchiò*, *Chiù*. Estivo e fre-

Digitized by Google

quente, fors'anche sedentario (*O. V.*); frequente, giunge in aprile parte in agosto e settembre (*P.*).

Buteo vulgaris, *Poiana*, *Falco cappone*, *Capponaccio*. Invernale e ovunque frequente (*O.*); scarsa (*P.*).

Milvus Ictinus, *Falco*. Comune ovunque, specialmente nell'ottobre (*O.*).

Æsalon regulus, *Falchetto nero*. Piuttosto comune (*O.*).

Cerchneis Tinnunculus, *Gheppio*. Comunissimo e sedentario (*O.*).

Cerchneis Naumanni. Scarso al piano nel maggio (*O.*).

Cerchneis vespertinus, *Arcistrello*, *Falco cuculo*. Comune qualche anno in aprile e maggio (*O. P.*); si vedono a branchi nelle praterie (*P.*).

Astur palumbarius, *Astore*. Scarso (*P.*).

Accipiter Nisus, *Falchetto*. Frequente, specialmente in ottobre (*P.*).

Ardea cinerea, *Nonna*. Di passo ed invernale (*O.*); scarso (*P.*).

Ardea purpurea, *Ranocchiaia*. Di passaggio al piano (*O.*); scarso in aprile e maggio (*P.*).

Egretta alba. Di passo scarso al piano (*O.*).

Egretta Garzetta. Di passaggio in primavera al piano (*O.*).

Ardeola ralloïdes. Di passaggio al piano (*O.*).

Ardetta minuta, *Tarabusino*. Di passaggio al piano, ne ebbi uno in collina nel marzo 1875 (*O.*); scarso in aprile e maggio (*P.*).

Botaurus stellaris, *Tarabuso*. Di passaggio al piano (*O.*); scarso in marzo ed aprile (*P.*).

Nycticorax griseus. Di passaggio al piano; due si trattennero lungo il torrente Isola dalla metà di aprile alla metà di maggio 1885 (*O.*).

Anser segetum. Di passo in autunno ed inverno, si fermano al piano mai in collina (*O.*).

Anas Boscas, *Germano*, *Germano reale* (il mas.); *Anatra* (la fem.). Comune al piano alle epoche del passo e d'inverno (*O.*); non comune, scompaiono in febbraio (*P.*).

Chaulelasmus streperus, *Canapiglia*. Autunnale e di passo al piano (*O.*); ove è scarsa (*P.*).

Digitized by Google

Spatula clypeata. Invernale e di passo al piano (*O.*).

Dafila acuta, *Codone.* Invernale e di passo al piano (*O.*); ove è scarso (*P.*).

Mareca Penelope, *Bibbio.* Invernale e di passo al piano (*O.*); ove è scarso (*P.*).

Nettion Crecca, *Alsavola*, *Arzagola*, *Germanello*, *Germano piccolo.* Invernale e di passo al piano (*O.*).

Querquedula Circia, *Germanello*, *Marzaiuola.* Di passaggio al piano alla fine dell'inverno (*O.*); scarsa in febbraio e marzo (*P.*).

Columba Palumbus, *Colombaccio.* Comune di passo e nell'inverno (*O.*); scarso in primavera, più abbondante in ottobre, specialmente nella seconda quindicina (*P.*); nidifica in Val d'Era (*D.*).

Columba Oenas, *Colombella.* Comune di passo e nell'inverno (*O. D.*); scarsa, anticipa sui Colombacci e ripassa in marzo (*P.*).

Turtur tenera, *Tortola*, *Tortora.* Estiva e frequente ovunque (*O.*); giunge di maggio parte in settembre (*P. D.*).

Starna Perdix, *Starna.* Comune e sedentaria in collina (*O. V.*); scarsa (*P.*); questa specie vive e si riproduce in gran numero a Cedri attesa la cura che si ha di distruggère le Volpi, le Gazzere ed altri nemici diretti, col procurare che nell'estate trovino acqua sulle colline ove vivono. Nell'ottobre forti brigate di 30 o 40 individui si mostrano erratiche o compiono una migrazione parziale (*D.*).

Coturnix communis, *Quaglia*, *Quagliera.* Comunissima, più al piano, e anche sedentaria (*O. P.*); i primi giungono alla fine di aprile, la massa nella prima metà di maggio, riparte in settembre; il passo primaverile è abbondante, quello d'autunno quasi nullo in confronto a quello del prossimo litorale livornese ove nei giorni di vento S. E. trovansi in quantità nel settembre (*P.*).

Rallus aquaticus, *Gallinella*, *Gambetta.* Comune al piano (*O.*); scarsa, passa in ottobre e novembre, ripassa in marzo (*P.*).

Digitized by Google

Ortygometra Porzana, *Voltolino*. Comune al piano (*O.*); scarso assai in ottobre, frequente in marzo ed aprile (*P.*).

Ortygometra Bailloni, *Occhio rosso*, *Voltolino piccolo*, *Gambettino*. Scarsa al piano in marzo ed aprile (*O. P.*).

Ortygometra parva, *Occhio rosso*, *Voltolino piccolo*, *Gambettino*. Scarsa al piano in marzo ed aprile (*O. P.*).

Crex pratensis, *Re quaglio*. Comune al piano (*O.*); scarso in ottobre, più frequente in aprile e maggio (*P.*).

Gallinula chloropus, *Sciabica*. Comune al piano (*O.*); scarsa alla fine dell'aprile (*P.*).

Fulica atra, *Folaga*, *Germano nero*. Comune al piano (*O.*).

Otis Tarda. Nel 1884 venne ucciso e mangiato da alcuni contadini un individuo di questa specie (*P.*).

Otis Tetrax, *Gallina prataiola*. In due occasioni vidi questa specie sempre in ottobre (*P.*).

Œdicnemus scolopax, *Occhione*, *Tallurino*. Assai frequente ovunque (*O.*); scarso in ottobre ed aprile (*P.*); nidifica nel distretto di Cedri ed in grossi branchi si trova sulle colline aride anche in dicembre (*D.*).

Charadrius Pluvialis, *Priviere*, *Piviere*. Comune, ma di solo passo in ottobre e marzo e specialmente al piano (*O. P.*).

Eudromias Morinellus, *Piviere tortolino*. Scarso di passo al piano in settembre ed ottobre ed in marzo ed aprile (*P.*).

Vanellus Capella, *Fifa*, *Nugola*. Invernale e di passo al piano (*O.*); frequente in ottobre ed in marzo (*P.*).

Recurvirostra Avocetta. Rara, veduta una sola volta (*P.*).

Pelidna subarquata. Di copioso passo al piano, specialmente in primavera (*O.*).

Pelidna alpina. Di passo al piano (*O.*).

Machetes Pugnax, *Gambetta*, *Gambettone*. Di passo al piano, comune (*O.*); abbondante in marzo ed aprile (*P.*).

Tringoïdes Hypoleucus, *Piro-piro*. Di passo al piano (*O.*).

Totanus Ochropus, *Pescina*, *Monachina*. Di passo al piano (*O.*).

Totanus Glareola. Di passo al piano (*O.*).

Totanus Calidris. Di passo al piano (*O.*).

Totanus fuscus. Di passo al piano (*O.*).

Digitized by Google

Limosa melanura. Di passo al piano (*O.*).

Scolopax Rusticula, *Beccaccia*, *Beccaccia reale.* Comune d'autunno e d'inverno, più in collina che al piano (*O.*); scarsa, giungono le prime nella seconda metà di ottobre, la massa in novembre, in dicembre il passo è finito e solo nei rigidi inverni se ne vedono ancora; qui il ripasso in marzo è sempre scarso (*P.*).

Gallinago major, *Croccolone*, *Coccolone.* Di passo, più comune al piano (*O.*); scarso in aprile e maggio, raro in autunno (*P.*).

Gallinago cælestis, *Beccaccino*, *Beccaccino reale.* Invernale, più comune al piano (*O.*); scarso (*P.*).

Gallinago Gallinula, *Frullino*, *Beccaccino piccolo*, *Pincino*, *Pinzacchio*, *Prinzacchino.* Comune di passo, specialmente al piano (*O.*); scarso, passano in ottobre e novembre, ripassano in febbraio e marzo; tanto nel passo come nel ripasso, questa specie fa due mosse abbondanti, una anticipando di qualche giorno il *G. caelestis*, e una posticipando (*P.*).

Numenius Arquata, *Chiurlo.* Di passo al piano (*O.*).

Numenius tenuirostris. Di scarso passaggio al piano (*O.*).

Numenius Phæopus. Di passo al piano (*O.*).

Sterna fluviatilis, *Beccapesci.* Comune di passo, specialmente al piano (*O.*).

Sternula minuta. Comune nel maggio al piano (*O.*).

Hydrochelidon nigra, *Fottivento.* Comune nell'aprile e maggio al piano (*O.*); di comparsa irregolare (*P.*).

Podiceps fluviatilis. Nella prima metà del settembre 1878 ne ebbi uno ucciso nella gora di un mulino (*O.*).

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli che nidificano nella provincia di Pisa, distretti di Fauglia e Lavajano, Lari; con notizie in proposito.[1]

Pica rustica. Una covata in aprile e maggio, uova da 3 a 7, durata dell'incubazione da 15 a 20 giorni. Trovai un nido il 30 maggio 1886, molto visibile su di un Cerro a circa 9 metri dal suolo, conteneva sei pulcini di cui uno morto. Un secondo nido scoperto il 6 giugno 1886 sopra un Pino a 7 metri, conteneva 6 uova che i genitori non difesero, come fecero i primi pei loro pulcini (*Papasogli*).

Garrulus glandarius. Covate due in aprile, maggio e giugno, uova da 3 a 7, durata dell'incubazione da 15 a 20 giorni. Sarei quasi per affermare che covi molto più tardi avendone uccisi e presi dei giovanissimi (presi con le mani) ai 15 di agosto.

Fringilla cœlebs. Covate due, maggio, giugno e luglio, uova da 3 a 5, durata dell'incubazione da 15 a 20 giorni. Il maschio non l'ho mai visto covare le uova, solo portare il cibo alla femmina durante l'incubazione e l'allevamento dei piccoli appena nati.

Passer montanus. Covate tre in maggio, giugno, luglio e agosto, uova da 3 a 12, durata dell'incubazione da 15 a 20 giorni. Il maschio non l'ho mai visto covare. Il numero delle uova ho messo fino a 12 avendone in quest'anno (25 giugno 1886) trovato due nidi con 11 piccini e un uovo andato a male; tra i pulcini ve ne erano di quelli affatto nudi, ciò mi porta a credere fossero in quel nido uova di più di una femmina. I nidi

[1] Questo elenco è compilato colle notizie raccolte dai signori E. Ott e G. Papasogli, e specialmente dal primo; le notizie date dal secondo sono distinte col suo nome.

Digitized by Google

erano uno di *P. montanus* e uno di *P. Italiae* sul tetto della mia villa.

Passer Italiæ. Come sopra. Dicesi che in campagna il *P. Italiae* faccia un nido chiuso, simile a quello dell'*A. Irbyi*, ma più rozzo (*Papasogli*).

Ligurinus Chloris. Covate due in aprile, maggio e giugno, uova da 3 a 5, durata dell'incubazione da 15 a 20 giorni. Trovai il nido con 6 uova (*Papasogli*).

Carduelis elegans. Covate due in aprile, maggio e giugno, uova da 3 a 5, durata dell'incubazione da 15 a 20 giorni. Dal 10 giugno al 14 luglio osservai 4 nidi tutti con 5 uova, cova anche il maschio (*Papasogli*).

Miliaria Projer. Covate due in aprile, maggio e giugno, uova da 3 a 5, durata dell'incubazione da 15 a 20 giorni. Nidifica in quantità sugli argini di fossi e di torrenti (*Papasogli*).

Emberiza Cirlus. Covate tre in maggio, giugno, luglio e agosto, uova da 3 a 5, durata dell'incubazione da 15 a 20 giorni. Ho detto essere tre le covate, perchè nel 1884 trovai il 15 di settembre un nido di *E. Cirlus* coi pulcini.

Emberiza Hortulana. Covata una in maggio e giugno, uova da 3 a 5, durata dell'incubazione da 15 a 20 giorni.

Melanocorypha Calandra. Trovato il nido il 30 maggio 1886, in pianura aperta e nuda in una buchetta rotonda e scavata profondamente, rivestita di erbe secche; conteneva 2 giovani già impennati ed un uovo; notai che il colore dell'uovo e dei giovani è protettivo riguardo l'ambiente (*Papasogli*).

Alauda arborea. Covate due in marzo, aprile e maggio, uova da 3 a 5, durata dell'incubazione da 15 a 20 giorni.

Alauda arvensis. Covate due in aprile, maggio e giugno, uova da 3 a 5, durata dell'incubazione da 15 a 20 giorni. Nido con uova, 29 giugno 1886 (*Papasogli*).

Galerita cristata. Covate due in aprile, maggio e giugno, uova da 3 a 5.

Digitized by Google

Motacilla alba. Covate due in marzo, aprile e maggio, uova da 4 a 6.

Merula nigra. Covate tre in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, uova da 3 a 5, durata dell'incubazione da 15 a 20 giorni. Non ho mai visto il maschio covare, solo portare il cibo alla femmina, cosa del resto che ho osservato ancora ad un coppia di Merli, che covavano in schiavitù.

Turdus viscivorus. Covate tre in marzo, aprile, maggio e giugno, uova da 3 a 7. Trovato un nido il 3 giugno 1886, sopra un'alta Querce (*Papasogli*).

Aëdon Luscinia. Covate due in maggio e giugno, uova da 3 a 5. Abbondante (*Papasogli*).

Pratincola Rubicola. Covate tre in marzo, aprile maggio, giugno, luglio e agosto, uova da 3 a 6.

Pratincola Rubetra. Pare che anche questa specie nidifichi nel distretto (*Papasogli*).

Sylvia cinerea. Covate due in aprile, maggio e giugno, uova da 3 a 5.

Monachus Atricapillus. Covata una in aprile e maggio, uova da 3 a 6.

Pyrophthalma melanocephala. Covate 3 in aprile, maggio, giugno, luglio e agosto, uova da 3 a 5. Nel 1884 dopo il 15 di settembre nella mia tesa ai Tarni eravi un nido coi pulcini.

Acredula Irbyi. Covate due in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, uova da 5 a 18, durata dell'incubazione da 15 a 20 giorni. Fui assicurato che alla costruzione di un nido concorrono 8 o 10 individui e vi depongono le uova (talvolta 16 a 18) 4 o 5 femmine (*Papasogli*).

Parus major. Covate tre in aprile, maggio, giugno e luglio, uova da 5 a 10. Ho trovato nidi con 8 e 10 pulcini (*Papasogli*).

Cyanistes cæruleus. Covate tre in aprile, maggio, giugno e luglio, uova da 5 a 9.

Certhia brachydactyla. Covate due in marzo, maggio, giugno e luglio, uova da 3 a 9.

Digitized by Google

Oriolus Galbula. Covata una in aprile, maggio, giugno e luglio, uova da 3 a 5.

Lanius minor. Covata una in maggio e giugno, uova da 3 a 6, durata dell'incubazione circa 15 giorni. Fa i nidi su alte Querce isolate a 10 metri da terra (*Papasogli*).

Lanius Collurio. Covate due in maggio, giugno e luglio, uova da 3 a 6.

Lanius auriculatus. Covate due in maggio, giugno e luglio, uova da 3 a 6. Nidifica specialmente sugli Aceri che sostengono le viti nei campi (*Papasogli*).

Butalis Grisola. Trovato il nido sur un gelso il 20 giugno 1886, con giovani impennati con testa e margini alari tinti di verde chiaro (*Papasogli*).

Hirundo rustica. Covate due in maggio, giugno e luglio, uova da 3 a 6.

Chelidon urbica. Covate due in maggio, giugno e luglio, uova da 3 a 6.

Cypselus Apus. Covate due in maggio e giugno, uova da 2 a 4.

Caprimulgus europæus. Covate due in giugno, uova da 2 a 4.

Gecinus viridis. Covate due in aprile e maggio, uova da 3 a 4.

Iynx Torquilla. Covate due in maggio e giugno, uova da 4 a 12.

Cuculus canorus. Non nidifica, depone le uova in aprile.

Alcedo Ispida. Certamente nidificante (*Papasogli*).

Merops Apiaster. Covata una in maggio e giugno, uova da 5 a 9.

Upupa Epops. Covate due in aprile e maggio, uova da 3 a 6.

Strix flammea. Il 19 gennaio 1885 mi fu portato vivo un Barbagianni ancora di nido che era stato preso con le mani, era coperto sulle ali e in parte sulla groppa ancora di lanuggine e volava pochissimo. Il detto individuo lo posseggo preparato in buonissimo stato.

Athene Noctua. Covata una in maggio, uova da 2 a 7. Nidifica sugli edifizi e nel cavo degli alberi (*Papasogli*).

Scops Giu. Covata una in maggio e giugno, uova da 3 a 7. Non fa nido e sceglie una buca in un albero o in un

Digitized by Google

fabbricato; il 13 giugno 1886 trovai il nido con 3 uova, il 24 giugno erano nati i pulcini (*Papasogli*).

Turtur tenera. Covata una in maggio e giugno, uova 2.

Starna Perdix. Covate due in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, uova da 12 a 18. Ho messo due covate perchè più d'una volta all'apertura di caccia abbiamo trovato, ove era una coppia sola di vecchie, la brigata doppia composta di 14 o 15 individui grossi e di 10 o 12 piccolini come Quaglie.

Coturnix communis. Covate tre, uova da 10 a 15. Trovai tre nidi il 6 giugno 1886 in campi a fieno distanti circa 100 a 150 metri uno dall'altro, due contenevano 12 uova, uno 8 (*Papasogli*).

Nota. — Dalle poche osservazioni da me fatte, rilevo che per le prime covate il numero dei giorni d'incubazione è sempre, o quasi, di 20 giorni e i piccoli stanno più a impennarsi, per le seconde e le terze è minore e i piccini molto più presto si sviluppano in modo che dopo 15 o 16 giorni che sono nati fuggono dal nido (*Ott*).

Firenze, Lenzi dott. Adolfo e Turchetti-Centofanti dott. Italo (*Fucecchio*); Fucini dott. Davide (*Vinci, Empoli*); Gargiolli Ugolino Desiderio (*Fiesole*); Ginori-Lisci march. Carlo (*Doccia, Sesto*); Paolucci marchesa Marianna (*Reggello* e *Novoli,* Firenze); Fontebuoni cavalier Angiolo (*Lastra a Signa* e *Sesto*, Firenze).

Il distretto nel quale ho avuto luogo di fare quelle poche osservazioni che più avanti riporterò, ha dei confini abbastanza delimitati, essendo circondato per la massima parte da monti che lo chiudono e gli fanno corona. Essi sono: A tramontana i contrafforti dell'Appennino pistoiese che si estendono da Monsummano fino a Pescia. A po-

Digitized by Google

nente il monte Pisano. A mezzogiorno i colli che cominciando da San Romano, ove è la stazione ferroviaria sulla linea Firenze-Pisa, si prolungano poi con assai uniforme altezza verso Montopoli, San Miniato, fino ad Empoli ove a poca distanza da questo paese si riuniscono al monte Albano colla interposizione del letto dell'Arno. Il monte Albano chiude questo cerchio dalla parte di levante.

Questa specie di gran catino è solcato dal fiume Arno che lo traversa da una parte all'altra nel suo lato di mezzogiorno e che lo divide in due parti diseguali estendendosi la sezione maggiore verso tramontana e ponente. Oltre questo fiume è irrigato da piccoli torrenti come la Pescia, la Nievole ed altri di minore importanza; racchiude due grandi paduli, quello di Bientina e quello di Fucecchio. Un lungo canale navigabile serve di scolo a quest'ultimo padule dal quale partendosi giunge in Arno presso Pontedera. Questo canale è degno di nota, servendo di guida a molti uccelli, che per esso, arrivano al padule. Il padule di Fucecchio non è coltivabile, facilmente è inondato dalle acque che in parte lo colmano e lo bonificano, vi si raccolgono foraggi buoni, letti per le bestie vaccine, cannelle e giunchi. La pesca e la caccia sono assai abbondanti. Quello di Bientina è oggi per la massima parte ridotto a coltivazione dopo l'essiccazione artificiale, va però soggetto, forse troppo facilmente, da qualche anno ad inondazioni. La pesca è scarsa, abbondante la caccia. Il terreno di tutto il distretto è per la massima parte coltivato a viti, gelsi e grano; però verso ponente si trovano ancora boschi di estensione ragguardevole ove abbonda il Pino, il Castagno e la Querce. Il suolo presenta delle piccole irregolarità, è ovunque praticabilissimo.

D'intorno al padule di Fucecchio sono estese praterie. La costituzione del terreno è per la massima parte argillosa (*Lenzi*).

Il comune di Fucecchio confina con i territorî di otto comuni, cioè: a settentrione coi comuni di Uzzano e Bug-

Digitized by Google

giano; a levante con Lamporecchio, Cerreto Guidi e San Miniato; a mezzogiorno con Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di sotto; a ponente con Montecarlo.

Fucecchio, terra popolata tanto nel piano come nel colle, ha vaste pianure destinate alla coltura della vite e delle graminacee, vasti e dolci pendici di boschi di Cerro, Castagno e pinete. Praterie naturali che forniscono moltissimo prodotto annuo di buon fieno, e sono atte alla caccia delle Lodole, Pispole, Storni, Quaglie ec. ed un esteso padule per la pesca e la caccia dei Germani e di molte altre specie di animali acquatici. La pianura tra Fucecchio oltr'Arno e il canale di Usciana, può dirsi il risultato di terre di alluvione trascinate e depositate ivi dalle acque correnti dell'Arno e dell'Usciana, emissario maggiore del padule di Fucecchio.

La superficie del comune di Fucecchio misura ettari 60,610 ed ari 90, con una popolazione di 11,105 abitanti. Ha buoni mezzi di comunicazione e di trasporto con ottime strade comunali e provinciali. Rispetto alla produzione agraria di questa contrada si ha vino, frutti, tutte le graminacee, canapa, lino e buon olio nelle alture. La campagna Fucecchiese oltre che dall'Arno e dall'Usciana, è attraversata anche da diversi piccoli corsi di acqua, affluenti dell'Arno e del padule (*Turchetti-Centofanti*).

Il distretto di Vinci, Empoli, è parte in pianura, parte in collina e ha circa sei chilometri di giro; il paese è esposto a siccità (*Fucini*).

I confini del distretto delle osservazioni, nel comune di Fiesole, sono: a N. la catena di monte Morello e monte Senario; a N. E. poggi; ad E. i primi monti del Val d'Arno Superiore che partendosi dall'alveo di quel fiume si congiungono alle vallate del Mugello; a S. le colline Fiesolane; a S. O. le colline di Sesto fiorentino e così ad O. Si trova ad un'altezza massima di 500 metri sul mare; il terreno è molto ondulato, coltivazioni e boschi si alternano,

Digitized by Google

ma le sommità dei monti sono in generale nude e a pastura. Nella primavera e nella estate i venti dominanti sono da S. O., nell'autunno e nell'inverno da N. E. La temperatura è mite d'estate e rigida d'inverno a causa dei venti (*Gargiolli*).

Il distretto di Doccia è situato nelle comunità di Sesto fiorentino, Campi e Calenzano; è parte in pianura, parte in collina (*Ginori-Lisci*).

I confini del distretto di Firenze, essendo ben noti, ritengo inutile qualunque descrizione; solamente annoterò le località volta per volta che avrò occasione di descrivere qualche osservazione da me fatta. I luoghi maggiormente da me praticati nelle mie escursioni, sono le colline di Signa e Lastra a Signa, e le pianure dell'Arno e specialmente quella di Sesto fiorentino. I monti di Signa sono per la maggior parte coltivati ed in parte anche boschivi. Le pianure dell'Arno sono formate da alberete ec. Le pianure di Sesto sono coltivate ed in parte irrigate da gore, canali, torrenti, in parte da fossi stagnanti, praterie e laghi artificiali (*Fontebuoni*).

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Firenze, e più specialmente nei distretti di Fucecchio, Vinci-Empoli, Fiesole, Doccia-Sesto, Reggello, Novoli-Firenze, Signa e Firenze; coi nomi volgari locali e notizie di frequenza, sulle migrazioni, nidificazione, ec., ec.[1]

Corvus Corone, *Cornacchia nera.* Un maschio ucciso a Calcinaia, Signa nell'ottobre 1874.

[1] Questo elenco è compilato sulle osservazioni raccolte e le liste date dai signori: Lenzi dottor Adolfo (*L.*) e Turchetti-Centofanti dottor

Digitized by Google

Corvus Cornix, *Cornacchia.* Frequente in marzo e in ottobre-novembre di passo (*G. Fo.*).

Corvus frugilegus, *Corvo.* Scarso in ottobre (*T.*); divenuto raro (*F.*); frequente in marzo e ottobre-novembre (*G. Fo.*).

Pica rustica, *Gazza*, *Cecca* (Fiesole). Scarsa, sedentaria in collina (*T.*); scomparsa affatto da 25 a 30 anni (*F.*); scarsa in aprile ed ottobre (*G.*); nidificante, ma scarsa (*Gi. Fo.*).

Garrulus glandarius, *Ghiandaia.* Assai frequente e sedentaria, predilige i poggi (*L. T.*); molto diminuita (*F.*); comune (*G. Gi.*); specialmente in ottobre (*Fo.*).

Sturnus vulgaris, *Storno.* Abbondante al piano di passo in ottobre e marzo (*L. T. Gi.*); negli inverni 1884-85 e 1885-86, dalla metà di novembre ai primi di febbraio, innumerevoli branchi di Storni popolarono il mio parco a Novoli, venendovi regolarmente a passare la notte (*P.*); comune al piano specialmente in marzo (*Fo.*).

Pastor roseus. Accidentale (*L.*); nella Collezione Italiana conservo quattro individui uccisi in provincia.

Fringilla cœlebs, *Fringuello*, *Filunguello.* Abbondantissimo, sedentario e di passo dal 15 ottobre al 15 novembre ed in marzo in grossi branchi (*L. T. F. G. Gi. Fo.*).

Fringilla Montifringilla, *Peppola.* Frequente di passo dal 25 ottobre al 10 novembre ed in marzo (*L. T.*); a branchi od isolate in novembre e dicembre, nel dicembre 1886 vi fu un passo straordinariamente abbondante (*F.*); frequente (*G. Fo.*).

Italo (con varî collaboratori, *T.*), nel distretto di *Fucecchio;* Fucini dottor Davide (*F.*), nel distretto di *Vinci*, Empoli; Gargiolli Ugolino Desiderio (*G.*), in quello di *Fiesole;* Ginori-Lisci marchese Carlo (*Gi.*), in quello di *Doccia*, Sesto; Paolucci marchesa Marianna (*P.*), in quelli di *Reggello* e di *Novoli;* Fontebuoni cav. Angiolo (*Fo.*), in quelli di *Signa* e *Sesto.* Ho indicato qui con iniziali od abbreviature la parte che spetta a ciascuno, e per completare l'elenco ho aggiunto alcune specie non annotate dagli osservatori suddetti e che mi constano esser state prese in provincia; questo mio contributo non è segnato con iniziali.

Digitized by Google

Montifringilla nivalis. Conservo un maschio ucciso a Marradi nel febbraio 1874.

Petronia stulta, *Passera lagia.* Ora più ora meno frequente, passa alla fine di settembre e primi d'ottobre ed in febbraio e marzo (*L. T.*); scarsa vedesi anche in novembre e dicembre (*F.*); frequente e anche sedentaria (*G. Fo.*); vedesi specialmente in ottobre (*Fo.*).

Passer montanus, *Passera strega* (Fucecchio) *Passera minuta*, *Passera mattugia* (Empoli). Frequentissima, sedentaria e di passo specialmente in settembre (*L. T. F. G. Gi. Fo.*).

Passer Italiæ, *Passera grossaia* (Fucecchio, Empoli) *Passera di tetto o reale* (Fiesole). Abbondante e sedentaria, anco di passo in settembre (*L. T. F. G. Gi. Fo.*).

Coccothraustes vulgaris, *Frusone.* Frequente di passo in settembre, ottobre e marzo, qualcuno nidifica (*L. T.*); in autunno gli ultimi passano in novembre, viaggia a branchi (*F.*); comune, qualche volta ne ho presi in estate ed ha nidificato nel distretto (*G.*); frequente di passo (*Gi. Fo.*).

Ligurinus Chloris, *Carenzolo*, *Verdone*, *Calenzuolo* (Fiesole). Frequentissimo, sedentario e di passo in settembre ed ottobre, in marzo ed aprile (*L. T. F. G. Gi. Fo.*).

Chloroptila Citrinella. Un individuo di questa specie, creduto un ibrido, venne preso il 15 ottobre 1886 colla *prodina*, è perfettamente descritto dal dott. Lenzi.

Chrysomitris Spinus, *Lucherino.* Di scarso passaggio nella seconda metà di marzo ed in ottobre, era nel passato assai più frequente (*L. T. F.*); frequente, ma non ogni anno, una volta ne presi due in estate (*G.*); frequente di passo (*Gi.*); scarso (*Fo.*).

Carduelis elegans, *Cardellino*, *Calderino*, *Caporosso* (Fiesole). Sedentario e frequente, di passo in ottobre ed in marzo-aprile (*L. T. F. G.*); si distingue una razza più grossa detta « lombarda » (*G.*); nidificante e frequente di passo (*Gi. Fo.*).

Serinus hortulanus, *Sverzellino*, *Raperino.* Scarso, passa in agosto e settembre (*L. T. F.*); nidificante da circa 50

Digitized by Google

anni (*F.*); frequente e sedentario (*G.*); scarso, nidificante e di passo (*Gi.*); passa anco in ottobre e marzo (*Fo.*).

Serinus Canarius. Un maschio preso al Galluzzo il 15 ottobre 1883.

Cannabina Linota, *Montanello.* Frequente al poggio, di passo in settembre-ottobre e marzo-aprile (*L. T.*); vedonsi branchi anche in novembre e dicembre (*F.*); comune e sedentario (*G.*); scarso di passo (*Gi. Fo.*).

Ægiothus rufescens, *Organetto.* Accidentale (*G.*); ne conservo due, entrambi colti in ottobre.

Carpodacus erythrinus, *Verdone bastardo.* Non tanto raro nell'autunno, ne conservo quattro: Firenze, agosto 1840; Mugello, 25 settembre 1882; Empoli, settembre 1884 e Campi-Bisenzio, ottobre 1885.

Pyrrhula europæa, *Fringuello marino, Zufolotto* (Fiesole), *Becotto* (Signa). Scarso di passo irregolare in ottobre-novembre (*L. T. G. Fo.*).

Loxia Curvirostra, *Crociere.* Di comparsa irregolare in estate ed autunno (*T.*); accidentale, avrebbe anche nidificato nel distretto (*G.*); scarso in ottobre-novembre (*Fo.*).

Miliaria Projer, *Schiattaione* (Fucecchio), *Braviere* (Empoli, Fiesole), *Sbraviere* (Sesto). Sedentario e frequente al piano, passa in ottobre e marzo (*L. T.*); sedentario, ma poco frequente (*F.*); comune (*G. Gi. Fo.*).

Emberiza Citrinella, *Zigolo giallo.* Frequente nella seconda metà di novembre ed in marzo (*L. T.*); anche in dicembre (*F.*); comune (*G.*); di passo solo (*Gi.*); comune (*Fo.*); forse sedentario ai monti.

Emberiza Cirlus, *Zigolo nero.* Frequente, di passo in ottobre-novembre e marzo-aprile; anche nidificante (*L. T.*); anche in dicembre si vede (*F.*); comune e sedentario (*G.*); frequente di passo (*Gi.*); comune (*Fo.*).

Emberiza Hortulana, *Ortolano.* Estivo, scarso, di passo in maggio, luglio ed agosto-settembre (*T. F.*); frequente, si distingue una razza piccolo detta « scopina » (*G.*); comune in estate (*Gi. Fo.*)

Digitized by Google

Emberiza Cia, *Zigolo muciatto* o *mugiatto*. Scarso (*T.*); pochi passano in novembre e dicembre (*F.*); abbondante (*G.*); di passo (*Gi.*); comune (*Fo*).

Emberiza leucocephala. Non tanto raro nell'autunno e nell'inverno, nella Collezione italiana ne conservo 5 presi a Marradi, febbraio 1874; Prato, novembre 1868; Firenze, 20 ottobre 1881, Impruneta, 12 novembre 1882.

Emberiza Schœniclus, *Migliarino*. Frequente al piano in marzo, ottobre e novembre (*T.*); accidentale (*G.*).

Emberiza pyrrhùloïdes, *Passera di padule*. Non frequente.

Calcarius nivalis. Accidentale (*T.*); ne ebbi diversi da San Cresci e da Marradi tra il novembre ed il febbraio.

Calcarius lapponicus. Accidentale (*G.*); uno preso a Pistoia in novembre 1875, ed uno colto presso Firenze 11 ottobre 1881.

Melanocorypha Calandra, *Calandra*. Scarsa al piano (*T.*).

Calandrella brachydactyla. Accidentale (*G.*); scarso in primavera e settembre (*Fo.*).

Alauda arborea, *Bonicola*, *Lodolina*. Frequentissima al poggio, di passo in marzo, settembre ed ottobre (*L. T.*); scarsa (*F.*); comune e sedentaria, scarsa al passo in primavera (15 marzo-10 aprile), abbondante in autunno (1 ottobre-10 novembre) (*G.*); comune (*Fo.*).

Alauda arvensis, *Lodola vera*, *Panterana*, *Pantiera* (Fiesole). Frequentissima, anche nidificante, ma specialmente di passo in branchi enormi dal 20 ottobre al 15 novembre (*L. T.*); sedentaria (*F.*); comune e sedentaria, abbondante al passo 15 maggio-10 aprile, e 15 ottobre-20 novembre (*G.*); comune (*G. Fo.*).

Galerita cristata, *Cappellaccia*, *Lodola ciuffa*, *Lodola cappellaccia* (Empoli). Sedentaria e frequente, erratica in settembre (*L. T. F. G, Gi. Fo.*).

Agrodroma campestris, *Corriere* (Fiesole), *Ciurlodi* (Sesto fiorentino), *Sarlodi* (Signa). Scarso al piano in settembre (*G.*); poco frequente, irregolare (*Fo.*).

Corydalla Richardi. Nella Collezione italiana sono due individui colti nei pressi di Firenze nel 1830 e nel 1843.

Digitized by Google

Anthus pratensis, *Pispolino*, *Pispola*. Frequentissima di passo in settembre, ottobre e marzo (*L. T.*); vedesi a branchi in novembre e dicembre (*F.*); frequente (*G. Gi. Fo.*).

Anthus cervinus, *Pispola*. Scarsa (*G.*); passa in aprile-maggio e ottobre-novembre, ne conservo 6 colti in provincia.

Anthus trivialis, *Prispolone*. Frequentissimo di passo in agosto-settembre e primi d'ottobre e marzo (*L. T.*); viaggia a branchetti (*F.*); comune (*G. Gi. Fo.*).

Anthus Spipoletta, *Fossacchia* (Fucecchio, Fiesole), *Fossaccio* Frequente al piano (*T.*); scarso invernale (*G. Fo.*).

Budytes flavus, *Cuttì*. Frequente di passo in maggio e meno in agosto (*T.*); comune in aprile e tutto maggio (*Fo.*).

Budytes cinereocapillus, *Strisciaiola*. Frequente di passo in maggio e meno in agosto (*T.*); comune in aprile e maggio (*Fo.*).

Budytes borealis. Non rara in primavera (*Fo.*); ogni anno vedo dei maschi adulti colti nel Fiorentino in aprile-maggio.

Budytes melanocephalus. Ho un maschio colto a Sesto fiorentino l' 11 maggio 1877.

Budytes campestris. Ebbi un maschio il 9 settembre 1885 da San Piero a Ponte (Firenze).

Motacilla alba, *Ballerina*, *Cuccustrettola*, *Batticoda bigia* o *di tetto* (Fiesole). Sedentaria ma non comune, di passo in ottobre e marzo-aprile (*T.*); comune, passo scarso 15 marzo-10 aprile e abbondante 8 ottobre-15 novembre (*G.*); scarsa al piano (*Gi.*); comune (*Fo.*).

Calobates melanope, *Cutrettola*, *Cuccustrettola*, *Batticoda gialla* o *di fosso* (Fiesole). Scarsa, sedentaria ai colli, di passo in ottobre e marzo (*T.*); frequente (*G.*); scarsa (*Gi.*); non rara (*Fo.*).

Saxicola Oenanthe, *Culbianco*, *Codibianco*, *Massaiola* (Fiesole). Estivo, frequente, di passo in marzo, aprile, agosto e settembre (*L. T. F. G. Gi. Fo.*).

Saxicola albicollis, *Monachella*. Scarsa, di doppio passo, ho un maschio colto a Pistoia nel gennaio 1875 (V. *Avi-*

Digitized by Google

fauna Italica pag. 87); ed un altro ucciso a Prato nell'aprile 1883.

Saxicola Stapazina, *Monachella a gola nera.* Assai rara in primavera.

Saxicola melanoleuca, *Monachella a collo nero.* Ne ho due presi a Prato nell'aprile 1883 e 1886.

Monticola saxatilis, *Codirossone.* Scarso (*T.*); vedonsi di passo in aprile e di ripasso dal principio di settembre ai primi d'ottobre, isolati (*F.*); estivo, frequente, nidificante al monte (*G. Gi.*); scarso (*Fo.*).

Monticola Cyanus, *Passera solitaria.* Scarsa, ma sedentaria ai monti (*T. G. Gi. Fo.*).

Merula nigra, *Merlo.* Frequente e sedentario, di passo in ottobre e novembre (*L. T. F. G. Gi. Fo.*).

Merula torquata, *Merlo con collare.* Non tanto raro dall'ottobre al marzo, ne conservo parecchi presi in Mugello.

Turdus pilaris, *Cesena.* Scarsa al piano in novembre (*L. T.*); frequente al monte (*G.*); scarsa (*Gi.*); comune (*Fo.*).

Turdus iliacus, *Sassello*, *Tordo sassello, Tordo piccolo* (Fiesole). Frequente in collina in ottobre, novembre, dicembre e marzo (*L. T. G. Gi. Fo.*).

Turdus musicus, *Tordo*, *Tordo bottaccio*, *Tordo grosso* (Fiesole). Frequentissimo in poggio, passa dal 10-30 ottobre e primi novembre ed in febbraio e marzo (*L. T.*); scarso (*F.*); frequente (*G. Gi. Fo.*).

Turdus viscivorus, *Tordela.* Frequente, sedentaria e di passo in ottobre e marzo (*L. T.*); assai diminuita (*F.*); comune (*G. Gi. Fo.*).

Aëdon Luscinia, *Rusignolo.* Estivo e frequente da aprile ad ottobre (*L. T. F. G. Gi. Fo.*).

Erithacus Rubecula, *Pittirosso*, *Pettirosso.* Frequente, qualcuno nidifica in collina, passa in ottobre e marzo (*L. T. G. Gi. Fo.*).

Cyanecula Wolfi, *Pett'azzurro.* Accidentale (*L.*); scarso in aprile nel pian di Sesto si crede che questo sia un abito primaverile del Codirosso (*Fo.*).

Ruticilla Phœnicurus, *Codirosso*, *Codirossino* (Fiesole). Fre-

Digitized by Google

quente, specialmente di passo in ottobre, qualcuno nidifica al poggio (*L. T.*); vedonsi anche dalla metà di agosto e in settembre, viaggia isolato (*F.*); comune (*G. Gi. Fo.*); giungono in marzo-aprile (*Fo.*).

Ruticilla titys, *Codirosso spazzacamino.* Non raro e certamente sedentario sui monti della provincia; ne ho avuti e veduti molti e non comprendo come questa specie sia sfuggita ai diversi osservatori.

Pratincola Rubicola, *Saltampalo*, *Saltanvette*, *Scrocchino*, *Prete* (Empoli), *Salimpunta*, *Saltanseccio* (Fiesole). Frequente e sedentario (*L. T. F. G. Gi. Fo.*).

Pratincola Rubetra, *Schiaccino* (Fucecchio), *Salimpunta di poggio* (Fiesole). Scarso al piano (*T.*); scarso al monte (*G.*); giunge in marzo e riparte in settembre (*Fo.*).

Sylvia orphæa, *Bigione.* Frequente, estivo (*T. G. Gi.*).

Sylvia cinerea, *Sterpazzola*, *Scoperagnola*, *Beccafico* (Fiesole). Estiva e frequente (*L. T. G. Gi. Fo.*).

Sylvia Curruca, *Bigione piccolo* (Fiesole). Scarsa, ma nidificante, estiva (*G.*).

Sylvia subalpina, *Beccafichino*, *Beccafico piccolo* (Fiesole). Scarsa, ma sedentaria (*T.*); frequente (*G.*).

Monachus Atricapillus, *Capinera.* Sedentaria e frequente, di passo in marzo-aprile ed ottobre (*L. T. G. Gi. Fo.*).

Monachus hortensis, *Beccafico*, *Beccafico reale* (Fiesole). Frequente, nidificante, di passo in aprile, agosto e settembre (*L. T. F. G. Fo.*).

Pyrophthalma melanocephala, *Occhiorosso.* Frequente, passa in ottobre (*L. T.*).

Melizophilus undatus, *Magnanina.* Non rara e sedentaria (*Fo.*).

Phylloscopus sibilator, *Luì verde.* Scarso, di doppio passo (*T.*); frequente, estivo e nidificante (*G.*); comune (*Fo.*).

Phylloscopus Trochilus, *Luì giallo.* Scarso, di doppio passo e nidificante ai monti (*T.*); frequente (*G. Fo.*).

Phylloscopus Bonellii, *Luì bianco.* Raro, di doppio passo (*T.*); frequente, estivo e nidificante (*G.*).

Phylloscopus rufus, *Luì.* Invernale e nidificante (*T.*); frequente (*G.*).

Digitized by Google

Hypolais icterina, *Beccafico giallo.* Estivo, frequente (*G.*).

Hypolais polyglotta, *Beccafico giallo.* Estivo, frequente (*G. Fo.*).

Acrocephalus streperus, *Cannaiola piccola*, *Sparacannelle* (Fucecchio), *Beccafico di padule* (Sesto). Estiva al piano (*T.*), scarsa (*Fo.*).

Acrocephalus arundinaceus, *Cannaiola grossa*, *Cannareccione.* Frequente ed estivo al piano (*T.*); scarso (*Fo.*).

Calamodus schœnobænus, *Forapaglie.* Accidentale (*G.*); scarso, estivo (*Fo.*).

Calamodus aquaticus, *Forapaglie.* Scarso ed estivo, l'ebbi da Sesto fiorentino nell'agosto 1882.

Lusciniola melanopogon. Scarso e localizzato, ma sedentario.

Locustella naevia. L'ebbi una sola volta, da Fiesole, il 10 settembre 1883.

Cettia Cettii, *Rusignolo di padule.* Scarso, estivo (*Fo.*).

Cisticola cursitans, *Beccamoschino.* Raro (*Fo.*); ma sedentario.

Troglodytes parvulus, *Re di macchia*, *Scricciolo*, *Foramacchie* (Fiesole). Frequente in poggio, specialmente in novembre e marzo (*L. T. G.*); sedentario (*Gi.*); comune (*Fo.*).

Cinclus aquaticus, *Merlo acquaiolo.* Scarso (*Fo.*); non raro e sedentario ai monti.

Accentor collaris, *Sordone.* Sedentario ai monti, così nell'Appennino pistoiese, scende col freddo al piano.

Accentor modularis, *Passerina stipaiola* (Fucecchio), *Passera scoparina*, *stipaiola* o *sepaiola* (Fiesole). Frequente al poggio in ottobre, novembre e marzo (*L. T. G. Fo.*).

Regulus cristatus, *Fiorrancino*, *Fiorarancino*, *Arancino* (Fiesole). Frequente in ottobre (*T. G. Fo.*); sedentario.

Regulus ignicapillus, *Fiorrancino*, *Fiorarancino*, *Arancino* (Fiesole). Frequente in ottobre (*L. T. G. Fo.*); sedentario.

Ægithalus pendulinus, *Codoncino*, *Fiaschetta* (Fucecchio). Scarso da aprile ad ottobre; nidifica (*T.*).

Acredula Irbyi, *Codibugno* (Fucecchio), *Codibugnolo* (Fiesole). Frequente e sedentario al poggio (*L.*); scarso, di comparsa irregolare in autunno (*G. Gi. Fo.*).

Acredula rosea, *Codona.* Accidentale, ne conservo una presa a Dicomano il 22 settembre 1881 (*Avif. Ital.* pag. 152).

Digitized by Google

Parus major, *Cincera* (Fucecchio, Empoli), *Cincia grossa* (Fiesole). Frequente e sedentaria (*L. T. F. G. Gi. Fo.*).

Parus ater, *Cincia mora*. Scarsa, ma sedentaria ai monti.

Cyanistes cæruleus, *Cincia turchina* (Fiesole). Scarsa ma sedentaria (*G.*).

Pœcile palustris, *Cincia bigia* (Fiesole). Frequente (*G.*); scarsa (*Fo.*); sedentaria.

Sitta cæsia, *Picchiotto*. Scarso (*T.*); frequente (*Fo.*); sedentario.

Certhia brachydactyla, *Rampichino*, *Picchio rampichino* (Fiesole). Scarso al piano, ma sedentario (*T. G. Fo.*).

Tichodroma muraria, *Muraiolo*. Non comune, ma sedentario, l'ho veduto prendere persino in Firenze (*Avif. Ital.* pag. 168).

Oriolus Galbula, *Rigogolo*. Poco frequente da aprile ad ottobre, nidifica specialmente in collina (*L. T.*); parte o ripassa in agosto e settembre (*F.*); frequente (*G. Gi. Fo.*).

Ampelis Garrulus. Accidentale, ne conservo uno preso a Marradi nel febbraio 1873 (*Avif. Ital.* pag. 170).

Lanius Excubitor, *Averlia gazzerina* (Fucecchio). Scarsa (*L. Fo.*); invernale, si vede da ottobre a gennaio.

Lanius minor, *Averlia bianca* (Fucecchio), *Velia gazzina* (Fiesole), *Velia cenerina*. Scarsa da aprile a settembre, nidifica al poggio (*L. T.*); frequente, passa 25 aprile-15 maggio e 15 agosto-15 settembre (*G.*); scarsa in estate (*Gi.*); non rara (*Fo.*).

Lanius Collurio, *Averlia rossa* (Fucecchio), *Velia comune* (Fiesole). Frequente da aprile a settembre ovunque (*L. T.*); passa abbondante 25 aprile-15 maggio e 15 agosto-15 settembre (*G.*); comune in estate (*Gi. Fo.*).

Lanius auriculatus, *Capirossa* (Fucecchio), *Velia capirossa* (Fiesole). Scarsa al piano (*T.*); estiva, ma poco comune, passa dal 25 aprile-15 maggio e 15 agosto-15 settembre (*G.*); scarsa (*Fo.*).

Butalis Grisola, *Beccamosche* (Fiesole). Estivo e frequente (*G.*); scarso (*Fo.*).

Muscicapa collaris, *Balia*. Rara; il 23 agosto 1888 il signor

Digitized by Google

Gargiolli mi portava pel Museo un esemplare assai interessante di questa specie, colto quella mattina alla sua tesa a Fiesole. Dalle dimensioni dei testicoli era un maschio adulto, eppure sulla testa e sul dorso il nero era rimpiazzato da un cenerino scuro e non v'ha traccia del bianco sulla fronte, sulla nuca e sul dietro del collo il collare caratteristico appare però nettamente segnato dal color cenerino molto più chiaro. Dubito che questo sia un abito autunnale dell'adulto, che sarebbe assunto anche dalla specie seguente e che somiglia assai a quello del giovane e della femmina.

Muscicapa Atricapilla, *Balia.* Accidentale (*G.*); scarsa in aprile (*Fo.*); io però ne ho veduto più volte in aprile sugli alberi del Viale dei Colli, Firenze.

Hirundo rustica, *Rondine vera.* Comune assai, estiva, i primi giungono alla metà di marzo, gli ultimi partono in ottobre; predilige il piano (*L. T.*); frequente (*G. Gi. Fo.*).

Hirundo rufula, *Rondine forestiera.* Accidentale, ne uccisi una che donai alla Collezione italiana (*Fo.*); il 25 marzo 1877 ne vidi volare una sull'Arno in Firenze (*Avif. Ital.* pag. 185).

Chelidon urbica, *Balestruccio.* Assai frequente, i primi giungono qualche giorno dopo la Rondine; si vede ovunque (*L. T.*); passo 30 marzo-15 aprile e 1-settembre-15 ottobre (*G. Fo.*).

Chelidon cashmiriensis. Accidentale, uno colto presso Firenze il 13 ottobre 1885 (*Avif. Ital.* pag. 187).

Clivicola riparia, *Topino*, *Bigino* (Fucecchio), *Occhi di Pulce* (Sesto). Meno frequente del Balestruccio, nidificante al piano (*L. T.*); piuttosto scarso (*Fo.*).

Cypselus Apus, *Rondone.* Frequente, giunge il 10 aprile, parte in luglio (*L. T. G. Fo.*).

Cypselus Melba, *Rondone bianco.* Scarso (*Fo.*).

Caprimulgus europæus, *Nottola*, *Stiaccione*, *Ingoiavento* (Fiesole), *Nottolaccio* (Doccia, Sesto). Scarso, estivo e nidificante (*T.*); frequente ai monti (*G.*); scarso (*Gi.*); comune ai monti (*Fo.*).

Digitized by Google

Picus major, *Picchio rosso.* Scarso (*G.*); al monte (*Fo.*); sedentario.

Picus medius, *Picchio mezzano.* Scarso assai, ne conservo uno ucciso a Prato il 20 gennaio 1876.

Picus minor, *Picchio minore.* Non comune e specialmente invernale.

Gecinus viridis, *Picchio verde*, *Picchio gallinaccio.* Scarso, ma sedentario (*T. G.*); comune (*Fo.*).

Iynx Torquilla, *Torgicollo* (Fucecchio), *Torcicollo* (Fiesole). Piuttosto scarso, ma sedentario (*L. T.*); frequente (*G. Fo.*); di passo in marzo, settembre-ottobre (*Fo.*).

Cuculus canorus, *Cuculo*, *Cuculio* (Empoli), *Cucco* (Fiesole). Scarso, giunge in magg. (*L. T.*); i primi si vedono alla metà di aprile in coppie, e così partono in sett. diretti al S. (*F.*); comune ai monti (*G.*); scarso (*Gi.*); comune (*Fo.*).

Coccystes glandarius. Accidentale (*Fo.*); ebbi per la Collezione italiana una femmina giovane uccisa a Poggio a Caiano (Firenze) il 25 marzo 1888.

Alcedo Ispida, *Piombino*, *Uccel Santa Maria*, *Beccapesci* (Sesto). Scarso, ma sedentario (*T. G. Gi.*); comune (*Fo.*).

Coracias Garrula, *Ghiandaia marina.* Rara (*L.*); scarsa in collina, vedute in maggio ed ottobre (*Fo.*).

Merops Apiaster, *Grottaione.* Scarso (*T.*); accidentale (*G.*); scarso in primavera (*Fo.*); passa anche in settembre.

Upupa Epops, *Bubbola.* Scarsa, giunge in marzo-aprile (*L. T.*); frequente (*G. Fo.*); partono in settembre (*Fo.*).

Strix flammea, *Barbagianni.* Scarso, ma sedentario (*T. G.*); di passo (*Gi.*); comune (*Fo.*).

Syrnium Aluco, *Allocco.* Non abbondante, ma sedentario in Mugello.

Asio Otus, *Gufo.* Scarso (*Fo.*); specialmente vedesi dall'ottobre al dicembre.

Asio accipitrinus, *Gufo.* Non comune (*Fo.*); vedesi più facilmente in marzo-aprile ed ottobre-novembre, ma ha nidificato presso Firenze (*Avif. Ital.* pag. 225).

Athene Noctua, *Civetta.* Frequente e sedentaria (*L. T. G. Gi. Fo.*).

Digitized by Google

Scops Giu, *Assiolo, Chiù* (Fiesole). Scarso, estivo (*T.*); frequente, passa dal 25 marzo al 15 aprile e dal 15 agosto al 15 settembre (*G.*); comune (*Gi. Fo.*). Qualcuno rimane l'inverno (*Avif. Ital.* pag. 229).

Bubo maximus, *Gufo reale.* Raro ai monti (*Fo.*).

Circus aeruginosus, *Falco di padule.* Comune (*T.*); scarso (*Fo.*); sedentario.

Circus cyaneus, *Albanella.* Accidentale (*L.*); avuta in gennaio, marzo, aprile ed ottobre, non è tanto rara.

Circus Swainsoni, *Falco bianco* (Fucecchio). Rara (*T.*): avuta più volte in marzo, aprile e novembre.

Circus cineraceus. Accidentale in primavera.

Pandion Haliaëtus, *Falco pescatore.* Scarso (*Fo.*); ne conservo tre presi in provincia nel marzo e nell'aprile.

Circaëtus gallicus, *Biancone.* Scarso, ma non raro; ebbi una grossa femmina uccisa ad Empoli il 15 marzo 1888.

Haliaëtus Albicilla, *Aquila di mare.* Un individuo fu ucciso anni sono a Poggio a Caiano, Firenze (*Magnelli*).

Aquila pomarina. Accidentale (*Avif. Ital.* pag. 239).

Aquila clanga. Accidentale, ne conservo una presa ad Empoli nell'anno 1868.

Buteo vulgaris, *Poiana, Foiana* (Sesto). Scarsa (*L. T. Gi.*); comune (*Fo.*); sedentaria.

Pernis apivorus, *Falco cappone.* Di scarso passaggio in ottobre (*L.*); più in settembre.

Milvus Ictinus, *Nibbio.* Non raro (*Fo.*).

Milvus migrans, *Nibbio nero.* Accidentale, ne conservo uno ucciso a Poggio a Caiano (Firenze) nell'anno 1856.

Falco Peregrinus, *Falcone.* Raro, ne conservo uno ucciso presso Firenze il 21 luglio 1841; ed un altro preso ad Erbaia (Mugello) il 20 settembre 1883; ed un terzo colto a Marcialla (Val di Pesa) nel luglio 1875.

Hypotriorchis Subbuteo, *Lodolaio.* Scarso (*T.*); in settembre e ottobre (*G.*); non raro (*Fo.*).

Cerchneis Tinnunculus, *Falchetto da uccelli.* Frequente e sedentario (*G. Fo.*).

Digitized by Google

Cerchneis vespertinus, *Grillaio.* Non raro, ma irregolare nelle comparse in aprile-maggio.

Astur palumbarius, *Astore.* Raro (*T.*); vedonsi specialmente i giovani in ottobre e novembre.

Accipiter Nisus, *Sparviere, Falco cenerino* (Fiesole). Scarso (*T.*); frequente e sedentario (*G. Fo.*).

Gyps fulvus, *Grifone.* Accidentale, uno fu preso molti anni fa presso Firenze (*Avif. Ital.* pag. 266).

Pelecanus Onocrotalus, *Pellicano.* Accidentale, ne conservo uno preso ad Empoli nel giugno 1836 (*Avif. Ital.* p. 269).

Phalacrocorax Carbo. Accidentale (*L.*).

Ardea cinerea, *Scarza cenerina.* Frequente in marzo ed aprile (*L. T. Fo.*).

Ardea purpurea, *Ranocchiaia.* Scarso (*T.*); non raro in aprile e maggio (*Fo.*); di passo più scarso in settembre-ottobre.

Egretta alba, *Grand'Airone d'Italia* (Sesto). Rara assai (*Fo.*); ne ebbi una da Sesto fiorentino il 15 novembre 1878.

Egretta Garzetta, *Ariotto* (Fucecchio). Non comune in maggio (*T.*).

Ardeola ralloïdes, *Scarza col ciuffo* (Sesto). Non rara di passo nell'aprile-maggio (*Fo.*); di scarso passo anche in settembre.

Ardetta minuta, *Cinciguatto* (Fucecchio). Estivo, frequente e nidificante (*T.*); arriva in aprile e maggio (*Fo.*); parte in agosto-settembre.

Botaurus stellaris, *Scarza cappona* (Fucecchio). Frequente in marzo, aprile, ottobre e novembre (*L. T.*); scarso al piano (*Fo.*); avuto anche in dicembre.

Nycticorax griseus, *Nonna col ciuffo, Pavoni africani* (Sesto). Comune di passo in aprile-maggio (*Fo.*).

Ciconia alba, *Cicogna.* Scarsa di maggio o giugno (*Fo.*).

Ciconia nigra, *Cicogna nera.* Accidentale, ne furono vedute quattro nel 1880 (*L.*); scarsa (*Fo.*).

Platalea Leucorodia. Una venne uccisa nel 1881 (*L.*).

Plegadis Falcinellus, *Mignattone* (Fucecchio). Scarso, ma ogni anno si vede in aprile-maggio e settembre (*T.*); molto

Digitized by Google

più raro in autunno, ne ebbi un giovane da Campi-Bisenzio il 1° ottobre 1881.

Cygnus musicus, *Cigno selvatico*. Scarso d'inverno (*T.*); raramente si vedono (*Fo.*).

Cygnus Bewicki. Una femmina giovane di questa rara specie venne uccisa nel padule di Fucecchio il 23 marzo 1888, dal signor Luigi Ancuri, il quale ne fece generoso dono alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani nel R. Museo di Firenze.

Bernicla ruficollis. Accidentale (*Avif. Ital.* pag. 298).

Anser cinereus, *Oca selvatica*. Scarsa in novembre e marzo (*L. T.*); non tanto rara (*Fo.*).

Anser segetum, *Oca selvatica*. Passa in novembre, marzo ed aprile (*L. T.*); non se ne vedono più (*F.*); non rara (*Fo.*).

Anas Boscas, *Germano*. Frequente, di passo in agosto-settembre e febbraio-marzo; alcuni svernano, alcuni nidificano (*L. T.*); comune ai due passi (*Fo.*).

Chaulelasmus streperus, *Marigiano* (Fucecchio), *Canapiglia*. Scarsa in febbraio e marzo (*T.*); rara (*Fo.*).

Spatula clypeata, *Mestolone*. Frequente in settembre, novembre e marzo (*L. T. Fo.*).

Dafila acuta, *Codone*. Frequente in settembre-novembre e febbraio-marzo (*L. T. Fo.*).

Mareca Penelope, *Fischione*. Frequente in settembre-novembre e febbraio-marzo (*L. T. Fo.*).

Nettion Crecca, *Bozzoletto* (Fucecchio), *Alzavola*, *Germanello*. Comune di passo in settembre-novembre e febbraio-marzo; qualcuna nidifica (*L. T. Fo.*).

Querquedula Circia, *Marzolo*, *Granaiolo* (Fucecchio), *Marzaiola*, *Carrucola* (Sesto). Frequentissima nel febbraio-marzo-aprile, più scarsa in settembre (*L. T. Fo.*); avrebbe anche nidificato nel Fassine (*Fo.*).

Fuligula rufina, *Germano turco*. Poco frequente in novembre (*L. T.*); scarso (*Fo.*).

Fulix ferina, *Morettone* (Fucecchio), *Morigiana* (Sesto). Frequente in novembre e febbraio-marzo (*L. T.*); comune (*Fo.*).

Digitized by Google

Fulix Marila, *Moretta nera.* Poco frequente in novembre (*L. Fo.*).

Fulix Fuligula, *Moretta turca.* Frequente assai in febbraio-marzo (*L. T. Fo.*).

Fulix Nyroca, *Moretta tabaccata.* Frequente in novembre, febbraio-marzo (*L. T. Fo.*).

Bucephala Clangula, *Quattr'occhi.* Scarsi gli adulti frequenti i giovani in novembre e dicembre.

Harelda glacialis, *Moretta codona.* Accidentale in novembre (*T.*); conservo un giovane ucciso presso Prato (*Avif. Ital.* pag. 319).

Mergus Merganser. Accidentale, ne conservo uno ucciso a Borgo San Lorenzo il 28 dicembre 1878 (*Avif. Ital.* pag. 325).

Mergus Serrator, *Seghettone.* Scarso (*L.*); invernale.

Mergellus Albellus, *Pescina.* Frequente in febbraio-marzo (*T.*); scarsa (*Fo.*).

Columba Palumbus, *Colombaccio.* Frequente al passo nella seconda quindicina di ottobre e primi di novembre ed in marzo (*L. T.*); scarso (*G.*); comune (*Fo.*).

Columba Oenas, *Colombella.* Frequente di passo in ottobre, novembre e marzo (*L. T. Fo.*).

Turtur tenera, *Tortola*, *Tòrtòra*, *Tortora selvatica.* Frequente da aprile e settembre (*L. T. G. Fo.*).

Starna Perdix, *Starna.* Accidentale in poggio (*L.*); piuttosto frequente ai monti (*T.*); sedentaria (*F.*); frequente e sedentaria (*G.*); si distingue in « bottaccia » e « scopina, » in novembre alcune viaggiano (*Fo.*).

Coturnix communis, *Quaglia.* Comune, giunge in marzo-aprile-maggio e nidifica, qualcuna rimane l'inverno (*L. T.*); partono o ripassano isolate dalla metà di agosto a tutto settembre, quelle che non covarono nel distretto si fermano poco (*F.*); frequente (*G. Fo.*).

Rallus aquaticus, *Porciglione* (Fucecchio). Comune di passo in marzo-aprile e settembre-novembre, ma anche sedentaria (*L. T.*); scarsa (*Fo.*).

Ortygometra Porzana, *Teccola* (Fucecchio). Comune di passo

Digitized by Google

in marzo-aprile o settembre, anche nidificante (*L. T.*); frequente (*Fo.*).

Ortygometra Bailloni, *Schiribilla* (Fucecchio), *Monachella*. Frequente, giunge in marzo-aprile, nidifica e parte in settembre (*L. T.*); comune (*Fo.*).

Ortygometra parva, *Schiribilla*, *Monachella*, *Puttanella* (Sesto). Frequente, giunge in aprile, nidifica e parte o ripassa in settembre (*L. T.*); non comune (*Fo.*).

Crex pratensis, *Re quaglio*. Scarso al piano, di doppio passo (*T. Fo.*).

Gallinula chloropus, *Fiumalbo*, *Gallinella*, *Sciabica*. Frequente di passo in marzo-aprile e settembre, anche sedentaria (*L. T.*). scarsa (*Fo.*).

Porphyrio cæruleus, *Pollo sultano*. Accidentale in primavera (*Fo.*).

Fulica atra, *Folaga*. Frequente, sedentaria e di passo in settembre-novembre e marzo (*L. T.*); non comune (*Fo.*).

Grus communis, *Grue* (Fucecchio). Scarsa (*T. Fo.*); una volta si vedevano spesso specialmente nel marzo (*Fo.*); ne conservo una colta a Prato il 6 dicembre 1879.

Otis Tarda, *Otarda*. Accidentale, ne conservo un maschio adulto preso vicino a Firenze nell'inverno 1830 (Savi, *Ornitologia Toscana*, III, pag. 231).

Otis Tetrax, *Gallina prataiola*. Accidentale (*T.*).

Œdicnemus scolopax, *Martinellone* (Fucecchio), *Regino* (Sesto). Scarso (*T.*); poco frequente, giunge in aprile e parte in settembre-ottobre; nidifica in Chianti (*Fo.*).

Cursorius gallicus. Accidentale in primavera (*Fo.*).

Charadrius Pluvialis, *Martinello*. Frequente di passaggio specialmente nel marzo (*L. T. Fo.*).

Eudromias Morinellus, *Piviere tortolino*, *Capocchino* (Sesto). Scarso di passo (*T.*); divenuto di comparsa irregolare, anni fa ne incontrai sui monti di Stamiano sopra Vaglia (*Fo.*); lo ebbi in marzo ed in settembre.

Ægialitis cantiana, *Corriere*. Non comune (*Fo.*); avuto in marzo, aprile e maggio.

Digitized by Google

Ægialitis curonica, *Corriere piccolo.* Comune, estivo e nidificante (*Fo.*).

Ægialitis Hiaticula, *Corriere.* Non comune (*Fo.*); avuto in marzo.

Vanellus Capella, *Miciola* (Fucecchio), *Pavoncella.* Frequente di passo in marzo ed aprile (*L. T. Fo.*); sverna in provincia, giungendo in ottobre-novembre.

Hæmatopus Ostralegus, *Beccaccia di mare.* Scarsa, ne uccisi una presso Firenze nel marzo 1873 (*Fo.*); avuta l'11 aprile 1886 dal pian di Sesto fiorentino.

Recurvirostra Avocetta, *Lesina.* Accidentale (*T.*); avuta da Campi-Bisenzio il 26 marzo 1883.

Himantopus candidus, *Cavalier d'Italia.* Scarso in aprile (*L. Fo.*); avuto anche nel marzo.

Phalaropus fulicarius. Accidentale, ne conservo uno ucciso a Borgo San Lorenzo nell' agosto 1870 (*Avif. Ital.* pag. 381).

Pelidna maritima. Accidentale, ne ebbi uno da San Donnino, ucciso il 10 novembre 1883 (*Avif. Ital.* pag. 384).

Pelidna subarquata, *Piovanello.* Frequente in aprile e maggio (*T. Fo.*); avuto anche in settembre e ottobre.

Pelidna alpina, *Piovanello piccolo.* Abbastanza frequente in aprile e maggio (*T. Fo.*); avuta pure in marzo e novembre.

Actodromas minuta, *Cocchíume* (Fucecchio), *Gambecchío.* Frequente in maggio (*T. Fo.*); avuto anche in settembre.

Machetes Pugnax, *Gambetta.* Comune di passo in marzo, aprile e maggio (*T. Fo.*); avuta pure in settembre.

Tringoïdes Hypoleucus, *Tirolì-Tirolì* (Fucecchio), *Pirullino.* Sesto). Comune assai (*T. Fo.*); nidificante (*Fo.*).

Totanus Ochropus, *Pirullino* (Sesto). Comune e forse nidificante (*Fo.*); avuto specialmente in marzo-aprile e settembre.

Totanus Glareola, *Pirullino* (Sesto). Comune e forse nidificante (*Fo.*); avuto in aprile, marzo e luglio.

Totanus stagnatilis, *Gambettone* (Sesto). Non raro in primavera (*Fo.*); avuto in marzo ed aprile.

Digitized by Google

Totanus Calidris, *Pettegola.* Non rara, forse anche invernale, la ebbi in aprile e novembre.

Totanus fuscus, *Gambettone.* Non raro in marzo, aprile, maggio e settembre.

Totanus nebularius, *Pantanu.* Non rara in aprile-maggio.

Limosa melanura, *Pittima.* Frequente in marzo-aprile. (*T. Fo.*).

Limosa rufa. Accidentale, ne conservo una presa presso Firenze nell'autunno 1839 (*Avif. Ital.* pag. 401); ed un'altra uccisa sull'Arno presso Firenze il 12 novembre 1887.

Scolopax Rusticula, *Beccaccía.* Frequente in novembre e marzo (*L. T.*); poche ed isolate si vedono (*F.*); frequente, tutti distinguono una razza piccola o *scopina*, passo 15-30 marzo e 25 ottobre-20 novembre (*G.*); comune (*Fo.*).

Gallinago major, *Croccolone.* Frequente in aprile-maggio, scarso in ott.-nov. (*L. T. Fo.*); avuto anche in marzo.

Gallinago cælestis, *Beccaccino.* Frequente in agosto, settembre, ottobre, novembre e marzo (*L. T. Fo.*); avuto anche in febbraio, aprile e dicembre.

Gallinago Gallinula, *Pinzacchio*, *Beccaccino mezzano*, *Vuotaborse.* Frequente in settembre-ottobre e marzo (*L. T. Fo.*); avuta anche in aprile e dicembre.

Numenius Arquata, *Chiurlo.* Scarso nel marzo (*T.*); non raro (*Fo.*); avuto anche in aprile.

Numenius tenuirostris, *Chiurlotto.* Scarso nell'inverno.

Numenius Phæopus, *Chiurletto.* Scarso nel marzo (*T.*).

Glareola Pratincola, *Pernice di mare.* Scarsa, avuta da Peretola il 1° giugno 1878.

Thalasseus cantiacus, *Beccapesci.* Accidentale (*T.*).

Sterna fluviatilis, *Rondine di mare.* Scarsa in primavera (*T.*).

Sternula minuta, *Fraticello.* Scarso in aprile-maggio (*T.*).

Hydrochelidon leucoptera, *Anima di Sbirro.* Frequente in primavera (*Fo.*); ne ho veduto qualche anno in maggio sull'Arno entro Firenze.

Hydrochelidon nigra, *Anima di Sbirro.* Comune assai al passo in primavera (*Fo.*); avuta in aprile ed in settembre.

Digitized by Google

Chroocephalus ridibundus, *Piccion di mare* (Sesto). Comune in primavera coi forti libecci (*Fo.*).

Larus cachinnans, *Mugnajaccio*. Raro coi forti libecci (*Fo.*).

Colymbus arcticus, *Strolaga*. Scarsa nell'inverno (*T.*).

Colymbus septentrionalis, *Strolaga*. Ne conservo una uccisa a Fucecchio il 10 gennaio 1879.

Podiceps cristatus, *Svasso*. Non tanto raro, ne ebbi due dal padule di Fucecchio il 9 aprile 1885 ed il 14 aprile 1887 un altro da Ugnano (Firenze) il 30 dicembre 1878.

Podiceps nigricollis, *Svasso piccolo*. Scarso (*T.*); avuto in aprile da Fucecchio.

Podiceps fluviatilis, *Tuffetto*, *German botta* (Sesto). Scarso nell'aprile (*T.*); non comune, ma si vede in ogni stagione (*Fo.*).

Elenco delle specie di uccelli le quali nidificano nel distretto di Fiesole, provincia di Firenze.[1]

Garrulus glandarius.
Fringilla cœlebs.
Passer montanus.
Passer Italiæ.
Petronia stulta.
Coccothraustes vulgaris.
Ligurinus Chloris.
Carduelis elegans.
Serinus hortulanus.
Cannabina Linota.
Loxia Curvirostra.
Miliaria Projer.
Emberiza Cirlus.
Emberiza Hortulana.
Alauda arvensis.
Alauda arborea.
Galerita cristata.
Motacilla alba.
Calobates melanope.
Saxicola Oenanthe.
Monticola saxatilis.
Monticola Cyanus.
Merula nigra.
Turdus viscivorus.
Aëdon Luscinia.
Ruticilla Phœnicurus.

[1] Compilato dal signor D. Gargiolli, il quale premette questa osservazione: « Il barbaro e vergognoso uso di togliere impunemente uova, pulcini e nidi impedisce di fare osservazioni minute ed esatte sulla nidificazione degli uccelli in questo distretto. »

Digitized by Google

Pratincola Rubicola.
Sylvia orphæa.
Sylvia Curruca.
Sylvia cinerea.
Sylvia subalpina.
Monachus Atricapillus.
Monachus hortensis.
Phylloscopus sibilator.
Phylloscopus Bonellii.
Hypolais icterina.
Hypolais polyglotta.
Parus major.
Oriolus Galbula.
Lanius minor.
Lanius Collurio.
Lanius auriculatus.
Hirundo rustica.
Chelidon urbica.
Cypselus Apus.
Caprimulgus europæus.
Gecinus viridis.
Iynx Torquilla.
Cuculus canorus.
Upupa Epops.
Strix flammea.
Scops Giu.
Athene Noctua.
Cerchneis Tinnunculus.
Accipiter Nisus.
Turtur tenera.
Starna Perdix.
Coturnix communis.

Elenco delle specie di uccelli che sono di passaggio regolare nella provincia di Firenze, distretto di Fiesole, colle indicazioni dell'arrivo e della partenza.[1]

Alauda arborea. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 1° ottobre al 10 novembre.

Alauda arvensis. A. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 15 ottobre al 20 novembre.

Scops Giu. A. Primavera, dal 25 marzo al 15 aprile. A. Estate, dal 16 agosto al 15 settembre.

Lanius auriculatus. A. Primavera, dal 25 aprile al 15 maggio. S. Estate, dal 15 agosto al 15 settembre.

Lanius Collurio. A. Primavera, dal 25 aprile al 15 maggio. A. Estate, dal 15 agosto al 15 settembre.

---

[1] Questo elenco fatto con grande accuratezza dall'ottimo D. Gargiolli ha un solo difetto, l'ordinazione, che egli fece disponendo in serie alfabetica i nomi volgari; io ho sostituito i nomi scientifici, ma non ho potuto mutar l'ordine adottato. Le lettere iniziali *A* ed *S*, significano: *abbondante* e *scarso*.

Digitized by Google

Lanius minor. A. Primavera, dal 25 aprile al 15 maggio. S. Estate, dal 15 agosto al 15 settembre.

Chelidon urbica. A. Primavera, dal 30 marzo al 15 aprile. A. Estate e Autunno, dal 1° settembre al 15 ottobre.

Motacilla alba. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Estate e Autunno, dall' 8 ottobre al 15 novembre.

Scolopax Rusticula. A. Primavera, dal 15 al 30 marzo. A. Autunno, dal 25 ottobre al 20 novembre.

Hypolais icterina. A. Primavera, dal 15 al 30 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Monachus hortensis. S. Primavera, dal 15 al 30 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Sylvia Curruca. S. Primavera, dal 15 al 30 aprile. S. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Sylvia orphæa. A. Primavera, dal 15 al 30 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Upupa Epops. A. Primavera, dal 1° al 15 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Agrodroma campestris. S. Primavera, dal 10 al 25 aprile. S. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Ligurinus Chloris. A. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dall' 8 ottobre all' 8 novembre.

Monachus Atricapillus. A. Inverno, dal 20 febbraio al 20 marzo. S. Autunno, dal 25 settembre al 15 ottobre.

Carduelis elegans. A. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dall' 8 ottobre al 15 novembre.

Turdus pilaris. A. Inverno, dal 20 gennaio al 20 febbraio. S. Autunno, dal 25 ottobre al 20 novembre.

Poecile palustris. S. Inverno, dal 20 febbraio al 20 marzo. A. Autunno, dal 10 ottobre al 10 novembre.

Parus major. A. Inverno, dal 20 febbraio al 20 marzo. A. Autunno, dal 10 ottobre al 10 novembre.

Cyanistes cæruleus. S. Inverno, dal 20 febbraio al 20 marzo. S. Autunno, dal 10 ottobre al 10 novembre.

Pyrrhula europæa. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. S. Autunno, dal 20 ottobre al 20 novembre.

Digitized by Google

Ruticilla Phœnicurus. S. Primavera, dal 20 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 15 settembre al 15 ottobre.

Monticola saxatilis. A. Primavera, dal 1° al 20 aprile. S. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Columba Palumbus. S. Inverno, dal 1° al 20 marzo. S. Autunno, dal 1° al 30 ottobre.

Corvus Cornix. S. Inverno, dal 1° al 20 marzo. A. Autunno, dal 15 ottobre al 10 novembre.

Corvus frugilegus. S. Inverno, dal 1° al 20 marzo. A. Autunno, dal 15 ottobre al 10 novembre.

Cuculus canorus. A. Primavera, dal 5 al 20 aprile. S. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Calobates melanope. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. S. Autunno, dall' 8 ottobre al 15 novembre.

Fringilla cœlebs. A. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dall' 8 ottobre al 15 novembre.

Regulus ignicapillus. A. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dall' 8 ottobre al 15 novembre.

Coccothraustes vulgaris. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dall' 8 ottobre al 15 novembre.

Cerchneis Tinnunculus. A. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dall' 8 ottobre al 15 novembre.

Garrulus glandarius. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 15 ottobre al 15 novembre.

Chrysomitris Spinus. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 15 ottobre al 10 novembre.

Phylloscopus Bonellii. A. Primavera, dal 15 al 30 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Phylloscopus Trochilus. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 25 settembre al 1° novembre.

Phylloscopus sibilator. A. Primavera, dal 15 al 30 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Saxicola Oenanthe. A. Primavera, dal 15 al 30 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Merula nigra. A. Primavera, dal 1° al 30 marzo. A. Autunno, dal 20 ottobre al 20 novembre.

Digitized by Google

Cannabina Linota. A. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dall'8 ottobre al 15 novembre.

Caprimulgus europæus. A. Primavera, dal 1° al 15 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Emberiza Hortulana. A. Primavera, dal 25 aprile al 15 maggio. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Passer Italiæ. A. Autunno, dal 1° ottobre all'8 novembre.

Petronia stulta. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 1° ottobre all'8 novembre.

Passer montanus. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 1° ottobre all'8 novembre.

Accentor modularis. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 10 ottobre al 15 novembre.

Fringilla Montifringilla. S. Primavera, dal 15 al 30 marzo. A. Autunno, dal 20 ottobre al 20 novembre.

Erithacus Rubecula. A. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 15 ottobre al 10 novembre.

Butalis Grisola. S. Primavera, dal 15 al 30 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Anthus pratensis. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 15 ottobre al 20 novembre.

Anthus cervinus. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. S. Autunno, dal 15 ottobre al 20 novembre.

Anthus trivialis. A. Primavera, dal 1° al 30 aprile. A. Estate ed Autunno, dal 10 agosto al 10 ottobre.

Coturnix communis. A. Primavera, dal 10 al 30 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Certhia brachydactyla. S. Autunno, dal 25 settembre al 10 novembre.

Serinus hortulanus. A. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dall'8 ottobre al 15 novembre.

Troglodytes parvulus. A. Primavera, dal 15 al 30 marzo. A. Autunno, dal 20 ottobre al 20 novembre.

Oriolus Galbula. A. Primavera, dal 25 aprile al 15 maggio. S. Estate, dal 15 agosto al 15 settembre.

Hirundo rustica. A. Primavera, dal 19 marzo al 15 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 30 settembre.

Digitized by Google

Cypselus Apus. A. Primavera, dal 1° al 15 aprile. A. Estate, dal 25 luglio al 15 agosto.

Aëdon Luscinia. A. Primavera, dal 15 al 30 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Pratincola Rubicola. A. Primavera, dal 1° al 30 marzo. A. Autunno, dal 1° al 30 ottobre.

Accipiter Nisus. A. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dall'8 ottobre all'8 novembre.

Anthus Spipoletta. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. S. Autunno, dal 15 ottobre al 20 novembre.

Starna Perdix. A. Autunno dal 20 settembre al 30 ottobre.

Sylvia cinerea. A. Primavera, dal 15 al 30 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Sylvia subalpina. A. Primavera, dal 15 al 30 aprile. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Pratincola Rubetra. S. Primavera, dal 15 al 30 aprile. S. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Sturnus vulgaris. A. Primavera, dal 1° marzo al 15 aprile. S. Autunno, dal 1° ottobre al 15 novembre.

Miliaria Projer. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 15 ottobre al 15 novembre.

Iÿnx Torquilla. A. Inverno, dal 20 febbraio al 1° aprile. A. Estate dal 15 agosto al 20 settembre.

Turdus viscivorus. A. Inverno, dal 20 gennaio al 20 febbraio. A. Autunno, dall'8 ottobre al 15 novembre.

Turdus musicus. A. Inverno, dal 20 gennaio al 20 marzo. A. Autunno dal 5 ottobre al 10 novembre.

Turdus iliacus. A. Inverno, dal 20 gennaio al 1° marzo. A. Autunno, dal 20 ottobre al 20 novembre.

Turtur tenera. A. Primavera, dal 15 aprile al 5 maggio. A. Estate, dal 15 agosto al 20 settembre.

Emberiza Citrinella. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 15 ottobre al 20 novembre.

Emberiza Cia. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 15 ottobre al 20 novembre.

Emberiza Cirlus. S. Primavera, dal 15 marzo al 10 aprile. A. Autunno, dal 15 ottobre al 20 novembre.

Digitized by Google

Galerita cristata. Da qui non fa passo.

Strix flammea. Da qui non fa passo.

Athene Noctua. Da qui non fa passo.

Acredula Irbyi. Fa passo irregolarissimo, ed ho veduto i primi, in alcuni anni nel mese di settembre, ed in altri nel novembre inoltrato.

Pica rustica. Capita qui irregolarmente, e non tutti gli anni: l'ho veduta nei mesi di aprile e di ottobre.

Hypotriorchis Subbuteo. I pochi individui, da me presi, capitarono sul finire del mese di settembre ed ai primi di ottobre.

Monticola Cyanus. Da qui non fa passo, e se ne trovano pochissime.

Picus major. Da qui non fa passo, e se ne trovano pochissimi.

Gecinus viridis. Da qui non fa passo, e se ne trovano pochissimi.

Alcedo Ispida. Da qui non fa passo, e se ne trovano pochissimi. [1]

Arezzo, distretto del Casentino (Beni avv. cav. Carlo, Fiorini Pietro, Pauer nob. Giuseppe):

Il Casentino confina a ponente col Valdarno Superiore, a maestro e tramontana col Mugello, a greco colla Romagna toscana, a levante colla Valle Tiberina, e a mezzogiorno col territorio di Arezzo. La valle Casentinese presenta la figura di un vasto anfiteatro cinto di monti aventi una elevazione media di metri 1300 sul mare, e derivanti dalla catena centrale degli Appennini, che da ogni parte lo circondano, aprendosi a mezzogiorno verso la pianura aretina. Il fiume Arno che nasce sul versante occidentale

[1] L'esperienza mi ha dimostrato impossibile precisare la quindicina del passo, giacchè quello anticipa o ritarda a causa dei venti e delle variazioni dell'atmosfera (*Gargiolli*).

Digitized by Google

del monte Falterona (m. 1649) traversa il Casentino nel suo maggior diametro, cioè da tramontana a mezzogiorno.

La costituzione geologica del Casentino è molto uniforme di origine e di natura. Prevalgono le rocce calcaree e arenarie, e in alcuni luoghi il cretaceo superiore. Riguardo all'età delle rocce sedimentarie e dei fossili che esse contengono si può dire non oltrepassino quella eocenica o cretacea, non esistendo traccia alcuna di produzioni vulcaniche. La valle Casentinese è irrigata da molti torrenti e altri minori corsi d'acqua, che tutti immettono nel fiume Arno.

Nelle più elevate pendici crescono il Faggio e l'Abete; inferiormente il Castagno, la Querce e il Cerro. Nella bassa valle poi, e specialmente presso il fiume Arno, prevale la coltivazione campestre propria della Toscana. La vite si coltiva anche ad altezze rilevanti, e in alcuni luoghi privilegiati vegeta anche l'ulivo. Il clima è puro e salubre, ma assai rigido nel verno; fresco in estate; sono rare le nebbie. Prevalgono i venti di nord-est e ovest. La temperatura è molto variabile. Dopo lo sconsigliato diradamento delle foreste si è notato un prolungamento nella permanenza delle nevi e un ritardo della stagione primaverile (*Beni*).

Il distretto di osservazione è situato nella provincia di Arezzo ed è composto dalle frazioni di Serravalle, Soci e Farneta del comune di Bibbiena; Badia Prataglia, Maggiona, Sierna e Ragginopoli del comune di Poppi; è nel bacino idrografico dell'Arno e precisamente nei bacini secondari dei torrenti Archiano e Sova. È confinato: ad Est dal torrente Archiano; al Sud dalla strada provinciale Casentinese; ad Ovest dal torrente Sova e confine fra il comune di Poppi e quello di Pratovecchio; al Nord dalle creste dell'Appennino che divide la provincia di Arezzo da quella di Firenze.

Questo distretto è situato parte in montagna e parte in collina, avendo una elevazione massima sul livello del mare di metri 1323 (Giogana vetta dell'Appennino) ed una

Digitized by Google

elevazione minima di metri 317 (strada provinciale casentinese). Per conseguenza si ha una grande variazione di clima ed una varietà notevole nella vegetazione; come infatti, partendo dal punto più basso del distretto, cioè dalle frazioni di Soci e Farneta dove vegeta rigogliosa la vite ed in alcuni punti anche l'ulivo, si passa alla vegetazione della Querce e del Castagno e quindi a quella del Cerro, del Carpino, del Frassino e dell'Abeto che prospera molto bene, come si vede nella stupenda foresta di Camaldoli, e per ultimo il Faggio che misto con l'Acero o Riccio, ed al Larice, introdotto da pochi anni, coprono le vette eccelse dell'Appennino nel tratto detto della Giogana e nei contrafforti del medesimo di Catozzo, Tromignone, Muschioso ec., ec. (*Fiorini*).

Il Casentino, piccola regione all'oriente della Toscana, presenta la figura di un vasto anfiteatro che ha il fondo verde di prati, campi e vigneti, e vien cinta e come rinchiusa intorno, da belle montagne. Acque sonanti e purissime la irrigano tutta per traverso e per lungo. Alte e selvagge ne sono le giogane, con larghe vedute sopra un oceano di accatastate montagne, limitate ai due mari. Queste montagne che scendono dalla catena centrale degli Appennini, dividono il Casentino, a ponente dal Valdarno Superiore, a maestro e tramontana dalla Valle di Sieve, a greco dalla Romagna e a levante dalla Valle Tiberina, aprendosi poi a mezzogiorno per dare libero il corso al primo dei fiumi toscani che nasce sul versante occidentale della Falterona, e attraversa questa provincia nel suo maggiore diametro. I Cerri ed i Castagni cuoprono la parte inferiore della montagna, mentre i Faggi e gli Abeti ne rivestono le cime.

Il clima del Casentino in generale, è più rigido nell'inverno di quello che lo comporti la sua geografica posizione, in ragione forse di trovarsi chiuso fra alti monti, la cui chioma in quella stagione suol esser carica di neve. L'elevazione media di questi può calcolarsi sui 1300 metri sul livello del mare.

Digitized by Google

Molto uniforme di origine e di natura, puossi considerare la costituzione geologica del Casentino. L'ossatura dei più alti monti e di alcuni altri subalterni, è formata di rocce calcaree ed arenarie spesso alternate da schisti-micacei a grani più o meno fini. Verso il centro della Valle sono frequenti le breccette e nel più basso Casentino s'incontrano spesso le stratificazioni di calcare compatto a grana finissima. Riguardo ai resti di esseri organizzati, ricordo un vasto letto di lignite-torba lacustre fra Pratovecchio e Porrena (*Pauer*).

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Arezzo, distretto del Casentino, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione, ecc. ecc.[1]

Corvus Corax, *Corvo reale.* Ràro, ma sedentario ai monti (*F.*).

Corvus Cornix, *Cornacchia.* Ai monti e piano, sedentaria (*B. F. P.*).

Corvus frugilegus, *Corvo.* Ai monti (*B.*) e piano (*P.*); invernale.

Garrulus glandarius, *Ghiandaja.* Comune e sedentaria (*B. P. F.*).

Nucifraga Caryocatactes. Accidentale (*B.*).

Pyrrhocorax alpinus. Uno, femmina giovane, fu ucciso a Meriggio del Sacco, Alpe di Catenaia il 2 gennaio 1888,

---

[1] Questo elenco è compilato colle liste e le notizie fornite dai signori cav. avv. Carlo Beni di Stia, Pietro Fiorini di Camaldoli e Giuseppe Pauer di Firenze e Pratovecchio. L'avv. Carlo Beni non solo ha formato in casa propria a Stia una collezione quasi completa e bellissima degli uccelli del Casentino, ma ha scritto una dotta ed interessantissima *Guida illustrata del Casentino*, Firenze, 1881 e 1889; ove alla pag. 194 (ediz. 1ª) egli dà un elenco degli uccelli di quella bellissima regione. Ho indicato colle iniziali la parte che spetta a ciascuno degli osservatori.

Digitized by Google

e donato dal cav. A. Gentili alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani a Firenze (*Giglioli*).

Sturnus vulgaris, *Storno*. Al piano, di passo in marzo ed ottobre (*B.*); specialmente autunnale (*F. P.*).

Fringilla cœlebs, *Fringuello*. Frequente ovunque e sedentario (*B. F. P.*); passa in marzo ed ottobre (*B.*).

Fringilla Montifringilla, *Peppola*. Comune e fors'anche sedentaria (*B. F.*); invernale (*P.*).

Montifringilla nivalis. Accidentale ai monti (*B.*).

Petronia stulta, *Passera lagia*. Nidificante e comune ovunque (*B.*); sedentaria (*P.*).

Passer montanus, *Passera mattugia*. Comune ovunque e sedentaria (*B. P.*).

Passer Italiæ, *Passera*. Abbondante e sedentaria (*B. F. P.*).

Coccothraustes vulgaris, *Frosone*. Frequente ai monti (*B.*); di doppio passo (*F. P.*).

Ligurinus Chloris, *Calenzòlo*. Comune e nidificante ai monti (*B.*); sedentario (*P.*).

Chrysomitris Spinus, *Lucherino*. Ai monti, scarso in ottobre (*B. P.*).

Carduelis elegans, *Calderino*. Abbondante ai monti e sedentario (*B. F. P.*).

Serinus hortulanus, *Raperino*. Frequente e nidificante ai monti (*B.*); sedentario (*F. P.*).

Cannabina Linota, *Montanello*. Frequente ovunque e nidificante (*B.*); sedentario (*P.*); e di doppio passo (*F.*).

Pyrrhula europæa, *Becotto*. Ai monti in aprile e ottobre, vi nidifica (*B. P.*); sedentario (*F.*).

Loxia Curvirostra. Raro ai monti (*B. F.*).

Miliaria Projer, *Strillozzo*, *Sermollo*. Comune ai monti, passa in aprile e settembre (*B. P.*).

Emberiza Citrinella, *Zigolo giallo*. Frequente e sedentario (*B. F. P.*); di passo in aprile e settembre-novembre (*B.*).

Emberiza Cirlus, *Zigolo*. Comune e sedentario (*B. F. P.*); di passo in aprile e settembre-novembre (*B.*).

Emberiza Hortulana, *Ortolàno*. Estivo ai monti (*B.*); passa in aprile agosto e settembre (*B. F. P.*).

Digitized by Google

Emberiza Cia, *Zigolo*, *Muciatto*. Frequente e nidificante (*B.*); sedentario (*P.*).

Emberiza Schœniclus, *Zigolo*. Scarso al piano (*B.*).

Emberiza pyrrhuloïdes, *Zigolo*. Raro al piano (*B.*).

Alauda arborea, *Lodolino*. Comune (*B.*); e sedentario (*P. F.*).

Alauda arvensis, *Lodola*. Abbondante di passo in marzo ed ottobre e anco nidificante (*B.*); sedentaria (*F. P.*).

Galerita cristata, *Cappellaccia*. Comune ai monti e sedentaria (*B. P. F.*).

Agrodroma campestris, *Lodolino*, *Re di Lodole*. Comune, nidificante; passa in marzo ed ottobre (*B. F.*).

Anthus pratensis, *Pispola*. Frequente assai al passo in aprile, scarsa in ottobre (*B. F. P.*).

Anthus cervinus, *Pispola*. Rara (*B.*).

Anthus trivialis, *Pispolone*. Comune, passa in aprile e settembre (*B. P.*).

Anthus Spipoletta, *Pispola*, *Fossaccio*. Non comune (*B. P.*); sedentaria (*F.*).

Budytes flavus, *Strisciajola*. Estivo e nidificante (*B.*).

Budytes cinereocapillus, *Strisciajola*. Di doppio passo e forse estiva (*B.*); nidificante (*P.*).

Motacilla alba, *Batticoda*, *Batticodola nera*. Abbondante e sedentaria (*B. F. P.*).

Calobates melanope, *Batticoda*, *Batticodola gialla*. Frequente ai monti e sedentaria (*B. F. P.*).

Saxicola Oenanthe, *Culbianco*. Frequente ai monti, estivo e di passo (*P.*).

Monticola saxatilis, *Codirossone*, *Tordo marino*. Frequente ai monti, giunge in aprile, parte in settembre (*B. P. F.*).

Monticola Cyanus, *Passera solitaria*. Frequente ovunque e sedentaria (*B.*); nidificante (*P. F.*).

Merula nigra, *Merlo*. Comune ovunque e sedentario (*B. F. P.*).

Merula torquata, *Merlo col collare*, *Merlo col vezzo*. Non frequente in ottobre ai monti, forse nidificante (*B. P.*); anche sedentario (*F.*).

Turdus pilaris, *Cesessa*, *Cegessa*. Non comune tutti gli anni, passa in ottobre (*B. F. P.*).

Digitized by Google

Turdus iliacus, *Sassello*. Frequente in ottobre (*B.*); passa anche in marzo (*F. P.*).

Turdus musicus, *Tordo*, *Tordo bottaio*. Nidificante e comune (*B. F. P.*); passa in marzo ed ottobre (*B. F.*).

Turdus viscivorus, *Tordela*. Comune e sedentaria (*B. F. P.*).

Oreocincla varia. Accidentale (*B.*); uno ucciso a Poggio Scali il 14 ottobre 1873 (*Avif. Ital.* pag. 103).

Aëdon Luscinia, *Usignolo*. Comune, estivo e nidificante (*B. P. F.*).

Erithacus Rubecula, *Pettirosso*. Nidificante, frequente (*B. P.*); anche sedentario (*F. P.*).

Cyanecula Wolfi, *Pett'azzurro*. Raro assai (*B.*).

Ruticilla Phœnicurus, *Codirosso*, *Codirossolo*. Frequente in maggio e settembre, nidificante (*B. P. F.*).

Ruticilla titys, *Spazzacamino*. Non comune, nidificante; vedesi in maggio ed in settembre (*B. F.*).

Pratincola Rubicola, *Saltastecce*. Comune e sedentario (*B. F. P.*).

Pratincola Rubetra, *Saltastecce*. Frequente, estiva e nidificante (*B. P.*).

Sylvia orphæa, *Sepajola*. Non comune, nidificante (*B.*).

Sylvia cinerea, *Sepajola*. Non comune, nidificante (*B. P.*).

Sylvia subalpina, *Sepajola*. Non comune (*B.*).

Monachus Atricapillus, *Sepajola*, *Capinera*. Frequente, nidificante (*B.*); sedentaria (*F. P.*).

Monachus hortensis, *Beccafico*. Non comune, giunge in aprile e parte in settembre (*B. F. P.*).

Melizophilus undatus. Rara (*B*).

Phylloscopus sibilator, *Luì*. Non comune in aprile e settembre; anche nidificante (*B. P.*).

Phylloscopus Trochilus, *Luì*. Frequente, di passo in aprile e settembre, nidificante (*B. P.*).

Phylloscopus Bonellii, *Luì*. Non comune (*B.*).

Phylloscopus rufus, *Luì*. Non comune, nidificante (*B. P.*); sedentario (*F.*).

Hypolais icterina, *Luì*, *Beccafico*. Estivo, non comune (*B.*).

Hypolais polyglotta, *Beccafico*, *Luì*. Comune, estivo (*P.*).

Troglodytes parvulus, *Scricciolo*, *Sborro*. Comune e sedentario (*B. F. P.*).

Digitized by Google

Cinclus aquaticus, *Merlo acquajolo.* Comune (*B.*); sedentario (*F. P.*).

Accentor collaris, *Uccello della neve*, *Grottajone.* Raro in novembre e dicembre (*B. F.*).

Accentor modularis, *Scopajola*, *Scopina.* Nidificante e frequente (*B. P.*); sedentaria (*F.*).

Regulus cristatus, *Arancino.* Nidificante e frequente (*B.*); sedentario (*F.*).

Regulus ignicapillus, *Arancino.* Nidificante e meno frequente (*B.*); sedentario (*F. P.*).

Acredula Irbyi, *Codibugnolo.* Frequente ovunque e sedentario (*B. P.*).

Parus major, *Capinera*, *Fiaschetta.* Abbondante e sedentaria (*B. F. P.*).

Parus ater, *Capinera*, *Capinera piccola.* Non frequente, ma sedentaria (*B. F. P.*).

Cyanistes cæruleus, *Cincina*, *Capinera piccola.* Abbondante e sedentaria (*B. F. P.*).

Pœcile palustris, *Capinera.* Non comune (*B.*).

Sitta cæsia, *Picchio muratore*, *Picchiotto.* Frequente e sedentario (*B. F. P.*).

Certhia brachydactyla, *Picchio farfallino.* Comune e sedentario (*B. F. P.*).

Tichodroma muraria, *Picchio ragno.* Non comune (*B. P.*); ma sedentario (*F.*).

Oriolus Galbula, *Golo*, *Rigogolo.* Comune al piano, estivo e nidificante (*B. F. P.*).

Lanius minor, *Castrice.* Frequente, giunge in aprile e parte nella prima metà di settembre (*B. P.*).

Lanius Collurio, *Castrice.* Abbondante, arriva in aprile, parte in settembre (*B. P.*); trovai un nido con 3 pulcini sul monte della Consuma il 20 agosto (*P.*).

Lanius auriculatus, *Castrice.* Frequente, giunge in aprile, parte in settembre (*B.*).

Muscicapa collaris, *Bucciajola.* Estiva, non comune (*B. P.*).

Muscicapa Atricapilla, *Bucciajola.* Estiva, non comune (*B. F.*).

Digitized by Google

Butalis Grisola, *Chiappamosche.* Non frequente, estiva e nidificante (*B.*).

Hirundo rustica, *Rondine.* Abbondante, giunge in marzo, parte in ottobre (*B. F. P.*).

Chelidon urbica, *Balestruccio.* Abbondante, giunge in marzo, parte in ottobre (*B. F. P.*).

Clivicola riparia. Non comune (*B.*).

Cypselus Apus, *Rondone.* Abbondante, giunge in maggio, parte in settembre (*B. F. P.*).

Caprimulgus europæus, *Cova-in-terra.* Non frequente, giunge in maggio, parte in settembre-ottobre (*B. F. P.*).

Picus major, *Picchio rosso.* Non comune, sedentario (*B. F. P.*).

Picus Lilfordi. Accidentale, un maschio preso a Camaldoli nell'agosto 1883 (*Avif. Ital.* pag. 202, *B. P.*); ne ebbi un secondo il 20 ottobre 1888 (*B.*).

Picus minor, *Picchio rosso piccolo.* Raro, ma nidificante (*B. F. P.*).

Gecinus viridis, *Picchio gallinaccio, Picchio verde.* Frequente e sedentario (*B. F. P.*).

Iynx Torquilla, *Collotorto.* Comune, estivo (*B. F. P.*).

Cuculus canorus, *Cucco.* Frequente, giunge in aprile, parte in settembre (*B. F. P.*).

Alcedo Ispida, *Uccel Santa Maria, Beccapesci, Chiappapesci.* Comune al piano, sedentario (*B. F. P.*).

Coracias Garrula, *Ghiandaja di mare.* Non comune (*B.*).

Merops Apiaster, *Grottajone.* Scarso (*B.*).

Upupa Epops, *Bubbola.* Comune, arriva in marzo, parte in settembre-ottobre (*B. P.*); passa anche in maggio (*F.*).

Strix flammea, *Barbagianni.* Comune al piano, sedentario (*B. F. P.*).

Syrnium Aluco, *Allocco.* Comune ai monti e sedentario (*B. F. P.*).

Asio Otus, *Gufo, Allocco.* Non comune, ma sedentario (*B. P.*).

Asio accipitrinus, *Gufo, Allocco.* Non comune (*B. P.*).

Athene Noctua, *Civetta.* Comune al piano, sedentaria (*B. F. P.*).

Scops Giu, *Chiù.* Comune al piano da marzo ad ottobre (*B. F. P.*).

Digitized by Google

Bubo maximus, *Gufo reale.* Raro ai monti (*B.*); sedentario (*F.*).

Circus æruginosus, *Falco.* Scarso al piano (*B.*).

Circus cyaneus, *Falco.* Raro al piano (*B.*).

Aquila Chrysaëtus, *Aquila.* Sedentaria ai monti (*B. F. P.*).

Buteo vulgaris, *Falco, Falco cappone.* Comune ai monti e sedentario (*B. F. P.*).

Pernis apivorus, *Falco.* Raro (*B.*).

Milvus Ictinus, *Falco.* Raro (*B.*).

Hypotriorchis Subbuteo, *Lodolajo.* Non raro, di doppio passo (*P. F.*).

Cerchneis Tinnunculus, *Gheppio.* Comune e sedentario (*B. P.*).

Cerchneis vespertinus, *Falchetto.* Di passo irregolare in aprile, non comune (*B.*).

Astur palumbarius, *Astore.* Non frequente, ma sedentario (*B. F. P.*).

Accipiter Nisus, *Falchetto, Sparviere.* Comune é sedentario (*B. F. P.*).

Ardea cinerea, *Scarza, Scarza bigia.* Comune al piano in marzo ed aprile (*B. P.*).

Ardea purpurea, *Scarza, Scarza rossa.* Comune al piano in aprile (*B. P.*).

Egretta Garzetta, *Scarza bianca.* Rara in aprile (*B. P.*).

Ardeola ralloïdes, *Scarzetta.* Rara in aprile (*B. P.*).

Ardetta minuta, *Scarzetta.* Non comune in aprile (*B. P.*).

Botaurus stellaris, *Tarabuso.* Non comune in marzo (*B. P.*).

Nycticorax griseus, *Scarzotto*, *?Pavone affricano.* Comune al piano in aprile (*B. P.*); passa in maggio (*F.*).

Ciconia alba, *Ciconia.* Accidentale, una venne uccisa a Poppi alla fine del maggio 1887 (*B.*).

Ciconia nigra, *Cicogna.* Accidentale, una venne presa a Poppi (*B. P.*).

Plegadis Falcinellus, *Mignattajo.* Ebbi uno a Bibbiena il 5 ottobre 1888 (*B.*).

Anser segetum, *Oca selvatica.* Rara (*B. P.*).

Anas Boscas, *Germano reale.* Frequente al piano in marzo-aprile (*B.*); anche in gennaio (*F. P.*).

Digitized by Google

Nettion Crecca, *Arzavola*, *Germano*. Scarsa in marzo-aprile (*B. F. P.*).

Querquedula Circia, *Marzajola*. Scarsa in marzo-aprile (*B. F. P.*).

Fulix Nyroca, *Morettone*. Raro in marzo-aprile (*B.*).

Mergellus Albellus, *Pesciajola*. Accidentale in marzo (*B.*).

Columba Palumbus, *Colombaccio*. Frequente nel passo d'ottobre, scarso in quello di marzo; nidificante (*B. P.*); anche sedentario (*F.*).

Columba Oenas, *Colombella*. Non comune, forse nidificante (*B.*); di doppio passo (*F. P.*).

Turtur tenera, *Tortora*. Abbondante, giunge in aprile, parte in settembre-ottobre (*B. F. P.*).

Perdix saxatilis, *Coturnice*. Rara (*B.*).

Starna Perdix, *Starna*. Comune e sedentaria (*B. F. P.*); si distingue la razza « *stipajola* » che fu assai abbondante nel 1887 (*F.*).

Coturnix communis, *Quaglia*. Frequente, passa alla fine di aprile ed in settembre (*B. F.*); nidificante (*P.*).

Rallus aquaticus, *Gallinella*. Comune in marzo (*B.*); ed in autunno (*F. P.*).

Ortygometra Porzana, *Schiribilla*, *Voltolino*. Non comune in aprile (*B. P.*).

Ortygometra Bailloni, *Schiribilla*. Non comune in aprile (*B. P.*).

Ortygometra parva, *Schiribilla*. Non comune in aprile (*B. P.*).

Crex pratensis, *Re di quaglie*. Scarso in aprile (*B.*); passa anche in autunno (*F. P.*).

Gallinula chloropus, *Sciabiga*. Non comune in aprile (*B.*).

Fulica atra, *Folaga*. Rara in marzo (*B.*); accidentale in autunno (*F. P.*).

Œdicnemus scolopax, *Occhione*, *Tallurino*. Non comune in marzo (*B. P.*).

Charadrius Pluvialis, *Piviere*. Non comune, passa in marzo (*B. P.*).

Eudromias Morinellus, *Piviere tortolino*. Non raro di passo (*P.*)

Ægialitis curonica, *Corriere*. Non frequente in aprile (*B.*); nidificante, presi un pulcino il 30 agosto lungo l'Arno presso Pratovecchio (*P.*).

Digitized by Google

Vanellus Capella, *Pavoncella.* Non comune in marzo (*B.*); ed in autunno (*F. P.*).

Himantopus candidus, *Cavalier d'Italia.* Raro in aprile (*B.*).

Machetes Pugnax, *Gambetta.* Scarsa nel marzo (*B.*).

Tringoïdes Hypoleucus, *Martinello.* Frequente in marzo ed aprile (*B.*).

Totanus Ochropus, *Culbianco acquatico.* Raro in maggio (*F.*).

Limosa melanura, *Pittima.* Rara in marzo (*B.*).

Scolopax Rusticula, *Beccaccia.* Abbondante in novembre, scarsa in marzo; nel settembre 1885 ne venne trovata una (*B.*); si vede anche in febbraio (*F. P.*).

Gallinago major, *Croccolone.* Scarso in marzo ed ottobre (*B.*); passa in maggio (*F. P.*).

Gallinago cælestis, *Beccaccino.* Non comune in marzo ed ottobre (*B. F. P.*).

Gallinago Gallinula, *Vuota borse.* Non comune (*B.*); in autunno (*F. P.*).

Numenius tenuirostris, *Chiurlo.* Raro in marzo (*B.*).

Sternula minuta, *Rondine di mare.* Rara in aprile (*B. P.*).

Hydrochelidon nigra, *Rondine di mare.* Non frequente in aprile e settembre (*B. P.*); avuta anche l'8 ottobre (*B.*).

Chroocephalus ridibundus. Accidentale, preso in febbraio 1888 (*B.*).

Colymbus septentrionalis, *Strolaga.* Accidentale (*B.*).

Podiceps fluviatilis, *Tuffetto.* Non comune (*B.*); in autunno (*F. P.*).

Arezzo e Siena, distretto di Val di Chiana (Arrighi-Griffoli nob. ing. Giacomo):

La Valle della Chiana prende il nome dal canale della Chiana, il quale fu artificialmente creato a raccogliere le acque che un tempo impaludavano gran parte della pianura e versarle nel fiume Arno, dopo un percorso di ol-

Digitized by Google

tre trenta chilometri dalla sua origine presso i laghi di Montepulciano e Chiusi, ai quali serve di emissario, e la serra detta dei Monaci, in prossimità di Arezzo, ove sbocca in Arno.

La Valdichiana varia molto in larghezza, non è intieramente pianeggiante, ma è tagliata longitudinalmente da piccole e numerose catene di colline poco elevate. Essa si stende fra la catena dei contrafforti Appenninici che la limitano all'Est dividendola dalla valle del Tevere, sino all'altra catena di colline elevate che servono di base al gruppo montuoso che ha per culmine il monte Amiata. L'asse longitudinale della Valle, da Sud a Nord, e il suo territorio, è diviso in vari Comuni che fanno parte respettivamente delle provincie di Arezzo, di Siena e di Perugia.

Le mie osservazioni di cacciatore e di dilettante di Ornitologia, si sono fermate principalmente alla parte superiore della Valle della Chiana, che è anche la più larga, e precisamente dal territorio di Chiusi (provincia di Siena) a quello di Monte San Savino (provincia di Arezzo). I laghi di Chiusi e di Montepulciano, come pure (sebbene più di rado) il Trasimeno, furono da me spesso frequentati a scopo di caccia e di raccolte ornitologiche, come pure le adiacenze del canale della Chiana e le grandi colmate che si trovano nei Comuni di Foiano e di Cortona. Però il territorio del Comune di Lucignano, avendo in questo la mia stabile dimora e vasto possedimento, sia in piano, sia in colle, e coltivato e boscoso, fu quello naturalmente più spesso e con maggior cura esplorato e che maggiormente contribuì a costituire la piccola raccolta ornitologica la quale oggi mi serve di base per riportare in questo formulario, con la maggior possibile esattezza, tutte quelle osservazioni (non molte in vero) che ebbi luogo di fare in questi ultimi 10 anni, cioè da che incominciai ad occuparmi di Ornitologia.

Come si potrà desumere dall'elenco delle specie osservate di passaggio normale o irregolare, di accidentale comparsa oppure stazionarie, la Valdichiana può dirsi ornitica-

Digitized by Google

mente assai ricca e ciò è da attribuirsi alla ubicazione sua nel centro della penisola e proprio sulla grande strada che seguono gli uccelli nelle loro periodiche migrazioni.

Elenco delle specie di uccelli osservate nella Val di Chiana, provincie di Arezzo e di Siena, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione, ec., ec.[1]

Corvus Cornix, *Cornacchia.* Assai comune all'epoca del passo; se ne vedono in ogni stagione, è nidificante nei nostri boschi.

Corvus frugilegus, *Corvo.* Comunissimo nei due passi, in inverno staziona in grossi branchi nei nostri piani e alla sera alloggia nei boschi di Lecci sui colli circonvicini.

Lycos Monedula. Accidentale.

Pica rustica, *Gazza* o *Cecca.* Comune assai; specie sedentaria, nidifica sugli alti alberi specialmente sui pini.

Garrulus glandarius, *Ghiandaja.* Comunissima e sedentaria in bosco e piano.

Sturnus vulgaris, *Storno.* Comunissimo nei due passi in pianura; qualche coppia nidifica presso i nostri laghi ove è sedentario.

Fringilla coelebs, *Fringuello.* Comunissimo in ogni stagione.

Fringilla Montifringilla, *Peppola.* Comune nel passo di autunno, meno in quello di primavera.

Petronia stulta, *Lagia.* Comune in ogni stagione, nidifica nei boschi; si riunisce in branchi numerosi verso il settembre.

---

[1] Il signor G. Arrighi-Griffoli, appassionato cultore della Ornitologia, ha riunito nella sua villa di Fabbriche una bellissima raccolta che illustra in modo quasi completo la Avifauna della Val di Chiana.

Digitized by Google

Passer montanus, *Passera salcina.* Numerosa e sedentaria, nidifica nei tetti e sugli alberi, frequenta più il piano che il colle.

Passer Italiæ, *Passera.* Comunissima e numerosissima, danneggia le raccolte del frumento e cereali affini. Sedentaria.

Coccothraustes vulgaris, *Frusone.* Non è in ogni anno egualmente abbondante, in primavera scarsissimo, qualche coppia nidifica.

Ligurinus Chloris, *Verdone.* Comune assai, nidifica; nel passo di autunno è più abbondante.

Chrysomitris Spinus, *Lucherino.* Era abbondantissimo nel passo di autunno anni indietro, adesso è fatto scarsissimo, non si vede fuori del passo.

Carduelis elegans, *Calderino.* Comune in ogni stagione, in piano e in monte.

Serinus hortulanus, *Raperino.* Comune come la specie precedente e sedentario.

Cannabina Linota, *Montanello.* Comune nei due passi, si trova sedentario in ogni stagione.

Pyrrhula europæa, *Fringuello marino.* Se ne vedono in novembre, ma non in ogni anno egualmente, rarissimo in primavera.

Loxia Curvirostra, *Crociere.* Poco frequente, pure qualcuno se ne vede.

Miliaria Projer, *Strillozzo.* Non molto frequente, pure se ne vedono in ogni stagione.

Emberiza Citrinella, *Pagliaresca.* Poco comune nel passo di autunno, raro in primavera.

Emberiza Cirlus, *Zigolo* o *Nizzola.* Comune nella fine del passo autunnale e nell'inverno, raro in altre stagioni.

Emberiza Hortulana, *Ortolano.* Comune e nidificante da noi, più frequente in fine di agosto e settembre.

Emberiza Cia, *Nizzola.* Comune nel passo di autunno, raro in altre stagioni.

Emberiza Schœniclus, *Muciatto.* Comune nei due passi, specialmente in piano.

Digitized by Google

Emberiza pyrrhuloïdes, *Passera di padule.* Se ne trovano, ma scarse, ai laghi nostri, e probabilmente vi nidificano.

Melanocorypha Calandra, *Calandra.* Qualcuna se ne vede nel passo di autunno, ma di rado.

Calandrella brachydactyla, *Calandrino.* Di passo in primavera specialmente.

Alauda arborea, *Lodolino.* Comune e nidificante, più frequente nel passo.

Alauda arvensis, *Lodola buona.* Comunissima in ogni stagione nei luoghi aperti e spogliati, nidifica in buon numero; nei due passi è la specie più numerosa.

Galerita cristata, *Cappellaccia.* Comune e sedentaria affatto, in piano e in colle.

Agrodroma campestris, *Calandro.* Poco frequente nel passo di autunno e anche meno in quel di primavera.

Anthus pratensis, *Pispola* o *Babbusso.* Comunissima nei due passi e nell'inverno, in grossi branchi nelle pasture del piano.

Anthus Spipoletta, *Fosso* o *Fossaccio.* Comune nei due passi (ott. e marzo); l'ho trovato in fine aprile a Chiusi sul lago.

Anthus trivialis, *Pispolone* o *Tordina.* Comunissimo in agosto (fine) e settembre, raro in primavera.

Budytes flavus, *Codazzinzola* o *Boarina.* Comune nei due passi (marzo-aprile e agosto-settembre) in pianura.

Budytes cinereocapillus. Si confonde dai cacciatori colla specie precedente di cui è assai meno frequente.

Motacilla alba, *Codazzinzola* o *Zinzella.* Comune e stazionaria: nidifica spesso sui tetti insieme al *Passer Italiæ* e al *P. montanus.*

Saxicola Oenanthe, *Culbianco.* Comune nei due passi (marzo-aprile ed agosto-settembre) nei luoghi aperti e nudi, in piano e in colle.

Saxicola Stapazina, *Culbianco.* È confusa colla specie precedente, però qualcuna se ne vede nel passo mista alla *S. Oenanthe.*

Monticola saxatilis, *Codirossone.* Di rado qualcuno se ne vede in colle.

Digitized by Google

Monticola Cyanus, *Passera solitaria*. Comune e stazionaria presso l'abitato, nidifica sui tetti e vecchie fabbriche.

Merula nigra, *Merlo*. Comune e stazionario.

Turdus pilaris, *Tordela* o *Cesena*. Poco frequente in autunno e inverno.

Turdus iliacus, *Alpigino*. Comune nei due passi, ma tardivo in autunno.

Turdus musicus, *Tordo*. Comunissimo in autunno, inverno e primavera, in questa epoca si trova più in piano che in colle.

Turdus viscivorus, *Gazzarro*. Stazionaria e meno comune ora che in passato.

Aëdon Luscinia, *Rusignolo*. Comunissimo nella buona stagione.

Erithacus Rubecula, *Pettiere*. Comunissimo nei passi e d'inverno, qualcuno passa l'estate nei boschi folti e vi nidifica.

Cyanecula Wolfi, *Pettazzurro*. Ho veduto (ma non ho mai ucciso) dei Pettazzurri sui nostri laghi in primavera.

Ruticilla Phœnicurus, *Codirosso*. Comune nei due passi (marzo e settembre); scarso nell'inverno.

Ruticilla titys, *Codirosso*. Più scarso della precedente, raro nell'inverno.

Pratincola Rubicola, *Saltimpalo*. Stazionario e comune specialmente in piano.

Pratincola Rubetra. Di passo in marzo e settembre fra noi, qualcuno rimane l'estate; è confusa colla specie precedente di cui è meno frequente.

Sylvia orphæa, *Beccafico*. Raro da noi, pure ogni anno qualcuno se ne vede in primavera (aprile); non nidifica.

Sylvia cinerea, *Sterpazzola*. Comunissima in aprile, rara in estate nei boschi.

Sylvia Curruca. È confusa colla precedente di cui è più scarsa.

Monachus Atricapillus, *Beccafico* o *Capinera*. Comune e stazionaria, nei boschi.

Monachus hortensis, *Beccafico*. Comunissimo in settembre e ottobre anche, raro nell'inverno.

Digitized by Google

Pyrophthalma melanocephala, *Occhio rosso.* Non è frequente, ma è stazionario.

Melizophilus undatus, *Occhiorosso.* Sedentario e comune nei nostri boschi.

Phylloscopus sibilator, *Luì.* Comunissimo nel passo di primavera (aprile), nei boschi.

Phylloscopus Trochilus, *Luì.* Meno comune della specie precedente alle stesse epoche.

Phylloscopus rufus, *Luì.* Sedentario, ma nel passo è assai più numeroso, specialmente in primavera.

Hypolais icterina, *Beccafico canapino.* Questa specie confusa colla seguente, si trova in estate al piano, specialmente nei campi di canape.

Hypolais polyglotta, *Beccafico canapino.* Estivo al piano.

Acrocephalus streperus, *Cannaiola.* Comune sui nostri laghi, in primavera ed estate.

Acrocephalus arundinaceus, *Cannaiola.* Comunissimo in primavera ed estate sui laghi.

Calamodus schœnobænus, *Forapaglie.* Si trova sui nostri laghi, ma in scarso numero.

Calamodus aquaticus, *Forapaglie.* Come la specie precedente, è poco frequente.

Lusciniola melanopogon, *Forapaglie.* Più rara che le precedenti.

Cettia Cettii, *Rusignolo di padule.* Specie poco comune, ma sedentaria. È poco conosciuta dai cacciatori, al pari dei Forapaglie, poichè tutte queste specie di uccelletti stanno sempre nel più folto dei canneti, e non vengono uccisi a scopo di lucro.

Troglodytes parvulus, *Scricciolo.* Comune nei boschi nei due passi e nell' inverno.

Cinclus aquaticus, *Merlo acquaiolo.* Qualcuno se ne trova nel Cortonese, ma poco comune, è sedentario.

Accentor collaris, *Sordone.* Raro da noi, tranne nei grandi freddi in cui se ne sono veduti più volte.

Accentor modularis, *Passera matta* o *scopina.* Comune nei due passi e in inverno, nei boschi e siepi.

Digitized by Google

Regulus cristatus, *Arancino.* Questa e la specie seguente vengono confuse, sono comuni in autunno e primavera, e svernano in buon numero nei nostri boschi.

Regulus ignicapillus, *Arancino.* Invernale e comune.

Ægithalus pendulinus, *Fiaschettone.* È stato trovato talvolta il nido di questa specie sul lago di Chiusi fra i canneti e le salciaie, però la credo rara.

Acredula Irbyi, *Codibugnolo.* Comune e sedentario fra noi.

Panurus biarmicus, *Monachina.* Era prima assai comune e nidificava in buon numero sui laghi nostri, in questi ultimi anni si è fatto assai scarso.

Parus major, *Potazzina* o *Perlina.* Sedentaria e comune in piano e in colle.

Parus ater, *Cincia nera.* Alcuni anni in autunno (settembre) assai frequente, rarissima in primavera (marzo), non si trattiene.

Cyanistes caeruleus, *Potazzina piccola.* Sedentaria nei nostri boschi, ma non molto comune; più frequente in autunno nel passo.

Sitta cæsia, *Picchietto.* Sedentario, ma non molto comune come lo era prima, forse pei diboscamenti.

Certhia brachydactyla, *Rampichino.* Comune e sedentario ovunque.

Trichodroma muraria, *Picchio murajolo.* Se ne vede qualcuno, ma raramente negli inverni crudi.

Oriolus Galbula, *Golo.* Comune in estate nei boschi, ove nidifica in copia.

Lanius Excubitor, *Vastrica colombina.* Piuttosto rara, ne ho vedute in inverno e primavera (marzo).

Lanius minor, *Vastrica.* È poco frequente, ne ho uccise in estate e anche talvolta in ottobre.

Lanius Collurio, *Vastrica.* È la specie più comune, nidifica nei nostri boschi.

Lanius auriculatus, *Vastrica a capo rosso.* Piuttosto comune nei nostri piani in estate.

Muscicapa collaris. Accidentale affatto.

Muscicapa Atricapilla, *Beccamosche.* Piuttosto comune nel

Digitized by Google

passo di primavera (aprile), non l'ho mai veduta in autunno.

Butalis Grisola, *Beccamosche.* Comune in primavera (aprile-maggio), ma per pochissimi giorni, non l'ho mai veduta in autunno.

Hirundo rustica, *Forcinella.* Comunissima, specie estiva.

Chelidon urbica, *Balestruccio.* Comunissima, specie estiva. Presso Cortona ne ho veduto volare uno in gennaio.

Clivicola riparia, *Topino.* Comune in estate in pianura nelle colmate, dove arriva insieme alle altre Rondini.

Cypselus Apus, *Rondone.* Comunissimo negli abitati, arriva in aprile e parte in agosto.

Caprimulgus europæus, *Piattone.* Comune nei due passi (aprile-maggio ed agosto-settembre), ma non si ferma che pochissimo.

Picus major, *Picchio rosso* o *Picchio cavallo.* Sedentario, ma scarso.

Pious minor, *Picchio rosso piccolo.* Sedentario, ma scarsissimo.

Gecinus viridis, *Picchio galletto.* Sedentario ed assai più frequente delle specie di Picchi sopraccennate.

Iynx Torquilla, *Torcicollo.* Comune in estate, giunge in primavera e riparte in settembre, però ne ho uccisi nell'inverno (dicembre).

Cuculus canorus, *Cuculo.* Comune nei nostri boschi, dove comparisce ai primi di aprile e rimane sino ai primi di settembre.

Coccystes glandarius. So di uno solo che fu mangiato; vidi le penne.

Alcedo Ispida, *Piombinello.* Piuttosto frequente lungo i fiumi e sui laghi, ove è sedentario.

Coracias Garrula, *Ghiandaia marina.* Piuttosto rara, però ne ho vedute in primavera inoltrata, mai in autunno.

Merops Apiaster, *Grottaione.* Comune, ma non ogni anno nella stessa misura; passa in maggio e settembre in grossi branchi.

Upupa Epops, *Bubbola.* Comune in estate nei boschi folti, in agosto si trova in pianura.

Digitized by Google

Strix flammea, *Barbagianni*. Sedentario e comune, nidifica nelle vecchie mura e nelle soffitte.

Syrnium Aluco, *Allocco*. Sembra sedentario, ma non è comune, è più abbondante in autunno; abita i boschi, talvolta però è stato preso o veduto anche lontano da essi.

Asio Otus, *Gufo*. Sedentario, ma non comune; forse sembra anche meno frequente per le abitudini essenzialmente notturne, come il seguente.

Asio accipitrinus, *Gufo*. Viene abitualmente confuso con la specie precedente, ma mi sembra meno comune; sarebbe sedentario.

Athene Noctua, *Civetta*. Sedentaria e comunissima.

Scops Giu, *Chiù*. Comune assai in estate, ma non sverna.

Bubo maximus, *Gufo reale*. Assai raro, ma talvolta ne sono stati veduti e presi nei dintorni di Lucignano.

Circus æruginosus, *Falco di padule*. Sedentario, ma non comune sui nostri laghi; in primavera sembra che ne passino in buon numero.

Circus cyaneus, *Falco di padule bianco*. Vedesi solo nell'epoca del passo, ma è piuttosto rara.

Circus Swainsoni, *Falco di padule bianco*. Scarsa di passo.

Circaëtus gallicus, *Biancone*. Non credo possa chiamarsi sedentario, però ne sono stati uccisi anche nell'inverno, forse venuti in cerca di cibo dalla vicina Maremma dove è molto più abbondante che da noi.

Buteo vulgaris, *Falco cappone*. Sedentario e piuttosto comune.

Pernis apivorus, *Pecchiaiolo*. Scarso da noi, si trova soltanto nell'epoca del passo in primavera.

Milvus Ictinus, *Nibbio*. Scarso da noi, però ne sono stati veduti e presi in varie stagioni.

Milvus migrans, *Nibbio nero*. Raro da noi, pure ne ho veduti e ne ho avuto uno ucciso presso Lucignano.

Falco Peregrinus, *Falcone*. Scarso assai, ne ho avuti due uccisi nell'inverno.

Hypotriorchis Subbuteo, *Lodolaio*. Specie piuttosto rara da noi, però ne ho veduti parecchi in autunno, ma ne ho

Digitized by Google

veduti ed uccisi anche in agosto e settembre, forse dovrebbe riguardarsi come sedentario per noi.

Æsalon regulus, *Renello.* Piuttosto raro, si vede in autunno e ne ho presi spesso colle reti aperte tendendo alle Lodole.

Cerchneis Tinnunculus, *Gheppio.* Comune e sedentario da noi.

Cerchneis Naumanni, *Grillaio.* È piuttosto raro da noi, l'ho veduto ed ucciso in primavera presso i laghi di Chiusi e Montepulciano, dove era unito alla specie seguente.

Cerchneis vespertinus, *Falco cuculo.* È abbondantissimo in alcuni anni e scarso in altri, sempre per pochissimi giorni in primavera (raramente in autunno) nelle pianure e colmate.

Astur palumbarius, *Astore.* Rara è questa specie, però quasi ogni anno ne ho veduti nel passo.

Accipiter Nisus, *Sparviere.* È il più comune dei nostri Falchi, è sedentario, ma ne passano moltissimi in ottobre.

Pelecanus Onocrotalus. Accidentale.

Phalacrocorax Carbo, *Marangone.* Raramente, ma se-ne vedono sui laghi d'inverno; dicono sia sedentario sul Trasimeno.

Ardea cinerea, *Scarza.* Piuttosto comune nei due passi, l'ho veduto anche in inverno e estate, ma non ho mai constatato che nidificasse.

Ardea purpurea, *Scarza rossa.* È comune in primavera (aprile) sui nostri paduli, l'ho trovato nelle colmate in giugno; forse venuto dalle vicine maremme dove nidifica, ripassa in settembre.

Egretta alba, *Scarza bianca.* Comparisce accidentalmente sui nostri laghi d'inverno.

Egretta Garzetta, *Mugnaio.* In alcuni anni è comune, in altri scarsa; si vede sui nostri paduli sempre in primavera (maggio o fine aprile), mai l'ho visto in autunno.

Ardeola ralloïdes, *Gallina ceciata.* Comune in aprile (fine) e maggio sui nostri laghi, mai l'ho vista in autunno.

Ardetta minuta, *Sgotto.* È numeroso nelle macchie di salci lungo i paduli da aprile a agosto.

Digitized by Google

Botaurus stellaris, *Capponaccio.* Si può dire specie comune e anche sedentaria perchè quasi in ogni stagione se ne trovano nei nostri paduli; è più frequente d'inverno.

Nycticorax griseus, *Bacco.* È piuttosto comune in abito di gioventù sui nostri laghi in primavera (aprile), raro in autunno (ottobre).

Ciconia alba, *Cicogna.* È piuttosto rara questa specie da noi e si vede solo in giugno, mai in autunno.

Ciconia nigra. So di una sola cattura.

Platalea Leucorodia, *Spatola.* Raramente se ne vedono nelle nostre colmate, ma vi capita certamente, avendone vedute due io stesso in primavera vari anni in dietro.

Plegadis Falcinellus, *Gallina giudea.* È piuttosto abbondante nel passo di primavera, raro in quello d'autunno, anzi io, personalmente, non ne ho mai vedute in quest'epoca.

Cygnus musicus. Accidentale.

Anser segetum, *Oca.* Si vede di passaggio regolare in grandi branchi nei due passi, comparisce dalla vicina Maremma durante l'inverno.

Tadorna cornuta. Accidentale.

Anas Boscas. Comune è il Germano reale anche da noi nell'inverno, specialmente se il freddo è intenso; si può riguardare come specie sedentaria perchè nidifica sui nostri laghi.

Chaulelasmus streperus, *Erbaio*, *Marigiana.* È piuttosto scarsa questa specie, pure ne ho veduto spesso dei branchi sul lago di Chiusi in primavera, ne ho avute anche in novembre e dicembre.

Spatula clypeata, *Specchio?* o *Cappellone.* Non è comune sui nostri laghi e si vede in autunno e primavera.

Dafila acuta, *Codone* o *Codolo.* Abbondantissimo nel passo di primavera per pochi giorni, meno in quello di autunno, sverna spesso da noi sui laghi e paduli.

Mareca Penelope, *Fischione.* È forse la specie di Anatra più abbondante da noi nel doppio passo.

Nettion Crecca, *Grecorello* o *Barazzuolo.* È comune nei due passi e d'inverno; sparisce al principio di primavera.

Digitized by Google

Querquedula Circia, *Gregorello* o *Racanella*) Comune in marzo e aprile, non si vede in autunno; forse nidifica, avendone ucciso un giovane in luglio.

Fuligula rufina, *Fischione turco.* Raramente si vedono di questa specie alcuni individui nell' inverno, sui nostri laghi.

Fulix Marila. Accidentale.

Fulix ferina, *Bosco.* Comune d' inverno e primavera sui nostri laghi che lascia in aprile.

Fulix Fuligula, *Moretta.* Piuttosto comune nell'inverno, scarsa in primavera.

Fulix Nyroca, *Moretta tabaccata.* Più comune della specie precedente in primavera, meno nell' inverno.

Bucephala Clangula, *Quattrocchi.* È piuttosto rara da noi questa specie, però ne ho veduti più volte sempre d' inverno.

Mergus Merganser. Accidentale, ebbi una sola femmina nel 1881.

Mergus Serrator, *Pesciaiola grossa.* Piuttosto raro in inverno sui nostri laghi.

Mergellus Albellus, *Pesciaiola.* Piuttosto comune (i giovani) durante gli inverni rigidi, l' ho vista sui nostri fiumi tuffarsi sotto il ghiaccio profittando dei fori che accidentalmente vi si trovano.

Columba Palumbus, *Colombaccio.* Comunissimo nei due passi, è specie per noi sedentaria, perchè alcune coppie nidificano nei nostri boschi.

Columba Oenas, *Colombella.* Comunissima nei due passi, e d' inverno in colle e in piano; non so che nidifichi.

Turtur tenera, *Tortora.* È numerosa nei nostri boschi questa specie e vi nidifica, nella buona stagione; giunge in aprile (fine) e parte alle prime pioggie del settembre.

Perdix rufa. Accidentale.

Starna Perdix, *Starna.* Comune e sedentaria nei nostri boschi e colline, scende al piano in autunno inoltrato.

Coturnix communis, *Quaglia.* Comunissima nelle nostre pianure dove nidifica in copia; giunge alla fine di aprile,

Digitized by Google

parte alla fine di agosto, talvolta ne sono rimaste e ne ho viste nell' inverno.

Rallus aquaticus, *Spurcido*. Piuttosto comune sui nostri laghi e credo possa riguardarsi come specie sedentaria.

Ortygometra Porzana, *Pollastrina*. Comunissima in primavera, meno abbondante in autunno; fosse nidifica in piccol numero nei canneti dei nostri laghi.

Ortygometra Bailloni, *Cannellone*. Piuttosto scarsa questa specie sui nostri paduli, dove si confonde dai cacciatori colla seguente.

Ortygometra parva, *Cannellone*. È piuttosto abbondante, ma per pochi giorni in primavera, scarsa in autunno.

Crex pratensis, *Re di Quaglie*. È specie poco frequente da noi, si vede più frequente in estate che in altre stagioni; passa in aprile ed agosto–settembre.

Gallinula chloropus, *Pollastrona*. Può dirsi sedentaria perchè se ne vedono in ogni stagione, è abbondante in marzo (fine) e aprile.

Fulica atra, *Folcora*. È specie sedentaria, ma scarsa; è abbondantissima nei due passaggi sui nostri laghi.

Grus communis, *Grù*. Si vede ogni anno di passaggio, ma non si ferma che raramente.

Otis Tetrax. Accidentale.

Œdicnemus scolopax, *Tallurino*. Si vede, ma in scarso numero nei due passi.

Charadrius Pluvialis, *Piviere*. Abbondante nel passo di primavera (ma non ogni anno egualmente), lo è assai meno in quello di autunno.

Squatarola helvetica, *Pivieressa*. Raramente, ma pur di tanto in tanto ho veduto e avuto delle Pivieresse sempre però in maggio (fine) e giugno.

Eudromias Morinellus, *Francolino*. È specie scarsa, ma quasi ogni anno ne ho veduti passare in agosto ed in settembre.

Ægialitis cantiana, *Occhio di bove*. È piuttosto raro da noi e si trova lungo le sponde dei laghi e fiumi; in primavera soltanto ne ho avuti.

Digitized by Google

Ægialitis curonica, *Corrierino.* Anche questa specie è piuttosto rara, ma si trova nei due passi.

Ægialitis Hiaticula, *Corriere.* È questa la specie più comune da noi, ne ho veduti anche in grossi branchi in primavera, meno abbondante in autunno.

Vanellus Capella, *Mivola.* Comunissima nei due passi, si trattiene in piccol numero nei nostri paduli a svernare se l'inverno è mite, ne uccisi una in giugno nelle colmate cortonesi.

Hæmatopus Ostralegus, *Beccaccia di mare.* Più volte è stata veduta e presa questa specie sui nostri laghi, ma sempre in primavera.

Recurvirostra Avocetta, *Monachina.* Non è raro il vederla sui nostri laghi in primavera, mai in altre stagioni.

Himantopus candidus, *Cavalier d'Italia.* Ogni anno se ne vedono in buon numero, ma sempre in primavera (marzo-aprile).

Pelidna subarquata, *Piovanello.* Comunissimo in aprile (fine) e maggio sui nostri paduli, raramente si vede in autunno; ne ho veduto in agosto.

Actodromas minuta, *Gambettino.* Comune quanto la precedente, si vede in maggio ed in agosto.

Actodromas Temmincki, *Gambettino.* Vien confuso colla specie precedente, ma è invece scarsissima in primavera, non ne ho mai avuti nè veduti in autunno.

Calidris Arenaria. Accidentale.

Machetes Pugnax, *Gambetta.* Comunissima in autunno inverno e primavera i giovani, rarissimi gli adulti; ho ucciso Gambette alla fine di maggio.

Tringoïdes Hypoleucus, *Gambettino.* Comune lungo i fiumi in agosto e in aprile, e forse nidificante.

Totanus Ochropus, *Merletta.* Comune in ogni stagione, lo è maggiormente in primavera; in estate ne ho uccisi parecchi e quasi son certo che nidifichi.

Totanus Glareola, *Pirullino.* È la più comune delle Gambette, specialmente in primavera (aprile); passa anche in settembre.

Digitized by Google

Totanus Calidris. Comune in primavera la Pettegola, sverna talvolta da noi.

Totanus fuscus, *Gambetto nero.* Piuttosto scarsa, ne ho vedute però in autunno e in primavera e ne ho uccise in luglio.

Totanus nebularius, *Chioco.* È poco frequente, ma si vede quasi in ogni stagione.

Limosa melanura, *Pittima.* È comune nel passo di primavera (aprile), scarsa in quello di autunno (settembre).

Scolopax Rusticula, *Beccaccia.* Comune nei due passi, ne trovai una in estate nei miei boschi.

Gallinago major, *Pizzardo.* Comune in primavera (aprile-maggio), non ne ho mai veduti in autunno.

Gallinago cælestis, *Beccaccino.* Comunissimo in novembre e marzo, però tranne che in giugno, ne ho veduti in ogni stagione.

Gallinago Gallinula, *Bagiongolo.* Comunissimo in primavera; lo è meno in autunno.

Numenius Arquata, *Pivolone.* Piuttosto scarso, ma si vede sempre nei due passi.

Numenius tenuirostris, *Pivolone piccolo.* È piuttosto scarso, come il precedente.

Numenius Phæopus, *Pivolone piccolo.* È assai più raro che il precedente con cui generalmente si confonde.

Glareola Pratincola, *Pernice di mare.* Non è infrequente il trovarla (sempre in maggio) sulle praterie vicino ai nostri laghi.

Gelochelidon anglica, *Rondone.* È rarissimo da noi, ne ho veduti però in primavera sui laghi.

Sterna fluviatilis, *Rondone.* Se ne vedono in primavera sui nostri laghi, ma in piccol numero.

Sternula minuta, *Rondone.* In alcuni anni in maggio è abbondantissimo, in altri meno; sempre però se ne vedono.

Hydrochelidon hybrida, *Rondone.* Ne ho visto quasi ogni anno in piccol numero sui nostri laghi.

Hydrochelidon leucoptera, *Rondone.* È piuttosto frequente,

Digitized by Google

mista alla specie seguente, sempre in aprile-maggio; scarso in settembre.

Hydrochelidon nigra, *Rondone*. Comunissimo nel passo di primavera (aprile-maggio), lo è assai meno in quello di autunno (settembre) ne ho veduti anche in luglio.

Rissa tridactyla. Accidentale, ne ebbi uno nel febbraio 1879 da Lucignano.

Chroocephalus minutus, *Gabbianello*. È in alcuni anni comunissimo sui nostri laghi dove compare in aprile inoltrato, ordinariamente, ma per due o tre giorni.

Chroocephalus ridibundus, *Gabbiano*. (*Nalda* a Chiusi). Ne ho veduti in gran quantità nei prati paludosi per alluvioni, trattenersi anche durante l'inverno; passa in autunno e primavera.

Colymbus septentrionalis, *Strolaga*. Sul Trasimeno si vedono non raramente alcuni individui di questa specie specialmente in inverno, ma sempre isolatamente.

Podiceps cristatus, *Svaso*, *Suasso*. Comune in primavera sui nostri laghi, dove apparisce in fine marzo e vi nidifica in buon numero.

Podiceps nigricollis, *Circolessa*. Assai meno comune dell'altra specie a differenza della quale però si vede anche nell'inverno.

Podiceps fluviatilis, *Tuffolino*. Comunissimo nell'epoca del passo, lo è meno nelle altre stagioni, ma sempre se ne trovano, sicchè è specie per noi sedentaria.

Siena, distretto di Sarteano, Chiusi (Bargagli marchese Piero):

I limiti del comune di Sarteano sono quelli entro i quali si effettuarono le osservazioni ornitologiche qui riferite e che ebbero luogo sul finire della estate ed al principio di autunno dell'anno 1887, cioè dal 19 luglio al

Digitized by Google

6 di ottobre. Quanto riguarda l'alimentazione degli uccelli abbraccia peraltro varie altre condizioni di luogo e di tempo, essendo mio intendimento di rivolgere più estesamente le mie osservazioni su questo importante soggetto e di continuarle quanto mi sarà possibile.

Il territorio di Sarteano si estende a traverso una catena di monti che separano la valle dell'Orcia da quella dell'Astrone, ed è confinato dai vicini comuni di Chianciano, Chiusi, Cetona, San Casciano dei bagni, Radicofani e Pienza, i quali comuni, per condizioni geografiche e topografiche, possono presentare circostanze ornitologiche poco diverse da quelle di Sarteano, eccetto alcuni di essi che dai laghi detti di Chiusi e Montepulciano e dalle pianure della Val di Chiana, sono in misura di fornire un contributo assai più ricco e variato all'Avifauna Italiana.

I monti di Sarteano fanno parte di una delle non poche catene minori parallele all'Appennino centrale, e mentre da S. E. si inalzano tanto da formare la montagna detta di Cetona, perchè la più alta cima (1140 m.) è compresa nel territorio di queste comune, trovano a N. O. continuità di andamento nei monti di Chianciano, di Montepulciano, di Montefollonico e di Sinàlunga, finchè più oltre per varie diramazioni, si volgono verso la catena del Chianti da un lato, e dall'altro alla Montagnola senese. Due corsi d'acqua, cioè l'Astrone a levante ed a tramontana, e l'Orcia a ponente, lambiscono con direzione reciprocamente opposta, il territorio di Sarteano, ed affluiscono il primo nella Paglia e per essa nel Tevere, il secondo nell'Ombrone.

La natura dei terreni sarteanesi è assai variata ed essenzialmente sedimentaria; nè alcuna delle rocce eruttive che costituiscono i vicini monti di Radicofani e l'Amiata emerge in questa località, e solo dal capitano Verri furono osservati alcuni affioramenti ofiolitici presso Castiglioncello del Trinoro. Tuttavia la importanza geologica dei monti sarteanesi è assai conosciuta; perchè, specialmente i monti di Cetona e di Sarteano, come un tempo emersero dai mari pliocenici e ne formarono una isoletta, così oggi si sol-

Digitized by Google

levano sui fondi di questi mari che coi loro depositi di sabbie gialle e di argille turchine ne rivestirono la base e ne formano ora le appendici minori. Costituiscono questi monti notevoli formazioni posterziarie, terziarie e secondarie; giacchè vi si riscontrano i travertini ed i tufi calcarei, i calcari ad *Amphistegine* in strati potentissimi, i calcari dolomitici, le varie e molteplici stratificazioni ora scistose, ora ftanitiche, ora calcaree ammonitifere del Lias medio, superiore ed inferiore, le quali stratificazioni formano il vero nucleo della montagna di Cetona, considerata da alcuni geologi come il lembo più orientale della catena metallifera. Una delle recentissime formazioni deve essere specialmente menzionata perchè ha grande importanza nella configurazione topografica dei dintorni di Sarteano; dove i travertini a guisa di estesi altipiani a colossali gradini sono addossati al fianco orientale dei monti sarteanesi, e, con alternanza di vaste superfici orizzontali e di scoscesi dirupi, si interpongono tra il livello del torrente Astrone ed il paese di Sarteano che risiede appunto nel più vasto e sul più elevato di questi altipiani, a circa 600 metri sul livello del mare.

Le medesime sorgenti di acque semitermali che oggi servono di forza motrice a numerosi molini ed a considerevoli industrie, nonchè alla irrigazione dei campi, possono ritenersi come ultimi resti di antiche sorgenti assai più ricche di acque e di materiali calcarei, le quali in condizioni geologiche e topografiche diverse da quelle d'oggidì, devono avere alimentato quei laghi successivamente situati ad altezze differenti, i quali oggi sono rappresentati da vari livelli orizzontali dei travertini che ne costituirono il fondo.

Tali notizie non sono del tutto estranee alle condizioni ornitologiche locali; giacchè, oltre ai rapporti mediati per mezzo della flora, troviamo pure dei rapporti diretti tra le condizioni del suolo e gli uccelli; giacchè, per esempio, in quegli elevati dirupi, in quei caotici ammassi ruiniformi di travertini che « per sostegno manco » si staccarono dai margini degli altipiani suddetti, trovano

Digitized by Google

sicuro asilo e sede per i loro nidi, e Falchi, e Gufi, e Rondoni e Passere solitarie e Ciuffolotti dal nido di graminacee intrecciato a cespugli che pendono dai più paurosi precipizi; perchè qui pure vanno tranquillamente a cercar cibo in oscuri ripostigli i Merli, i Tordi e molti altri uccelli minori. Vediamo ancora come alcuni di quei rilievi, come appunto il margine N. E. del più elevato di cotesti altipiani, rivestito di Querci e di Cerri nel suo pendio meno scosceso ed in parte anche nel piano, sono luoghi ben conosciuti dai cacciatori di Colombacci, i quali uccelli, dopo aver traversato le ampie pianure della Val di Chiana, rimontano le pendici di quasi tutta quella catena di monti per traversarla, come poi traversano la Valle dell' Orcia, per recarsi quindi all'Amiata ed al mare. Nè sono estranee agli uccelli certe pendici opportunamente esposte, ed alcune insenature di quei monti; perchè vediamo che esse sono preferite dagli Storni, dagli uccelli emigranti e perchè trovano in esse sede opportuna, i paretai, i roccoli, i boschetti da Tordi. Ed oltre a questo è pur facile il domandarsi se il Tallurino, il Grottaione, lo Strillozzo potrebbero trovarsi in questi luoghi se le deserte lande di argilla della Val d'Orcia non offrissero sicura ed opportuna sede a queste specie; e se non fosse a cagione delle acque semitermali, che mai si congelano nemmeno nelle più crude invernate, non si vedrebbero forse come ora si vedono talvolta anche nel cuor dell'inverno Beccacce e Beccaccini lungo i fossetti, il Pett' azzurro e il Beccapesci sulle gore dei molini, dove pur nuotano non di rado e Barazzuoli, e Germani ed altri uccelli acquatici.

Le condizioni della flora sono quali possono aspettarsi in monti dell' Italia centrale, che comprendono dalla zona dell'Ulivo (il quale per circostanze favorevoli di suolo vegeta mirabilmente nei dintorni di Sarteano e rimonta fino a non comuni elevazioni), alla zona del Faggio che ricopre la parte più elevata della montagna di Cetona e si mostra ancora in qualche altro punto dei monti minori. Ai Faggi secolari su quella cima si associano pure grossi al-

Digitized by Google

beri di Acero (*Acer pseudo-platanus*) o Piatina, come li chiamano volgarmente. Succedono quasi immediatamente ai Faggi i boschi di Cerro e poi di Querce, essendo notevole l'assenza quasi completa della zona del Castagno, del quale non saprei ben dire se i pochi rappresentanti che si trovano sui monti sarteanesi siano vetusti saggi di cultura di questo utilissimo albero o se possano considerarsi come gli ultimi superstiti di castagneti spontanei che nella naturale lotta per l'esistenza dovettero cedere il campo alla preponderanza del Cerro e della Querce. E nemmeno l'Abeto, fedel confidente della zona del Faggio, cresce su questi monti, ed i pochi esemplari che vi si osservano sono stati importati dalla mano dell'uomo; nè i Pini silvestri, che altrove rivestono aride pendici, figurano nella flora di questi luoghi.

Delle querci solo la *Quercus cerris* Linn. e la *Q. sessiliflora* Sal. costituiscono i boschi in gran parte tenuti a ceduo, sebbene ancora non siano rare le estensioni di boscaglie ad alto fusto; il Leccio *Q. ilex* Linn. e la Farnia *Q. pedunculata* W. crescono spontanei in poche di quelle località, se pure quest'ultima pianta non v'è assolutamente estranea. Un bell'alberetto il Ciavardello (*Pyrus torminalis* Ehr.), i cui frutti sono avidamente ricercati dai Tordi, sostituisce nei monti suddetti i Corbezzoli, in parte i Ginepri e le altre piante di climi più caldi.

La bassa vegetazione, oltre a quella artificiale della cultura a grano, a formentone, a lino, a canape, a foraggi d'erba medica e di lupinella, a viti ed ulivi, è quella consueta dell'interno e dei margini dei boschi, quella dei pascoli montuosi, quella di pendici ora umide, ora asciutte, ora aride e sassose; quella dei corsi d'acqua a carattere torrentizio; e quella infine speciale delle brutte estensioni costituite dalle argille della Val d'Orcia, dove crescono le Tamerici, gli Assenzi, i Cardi e molte gramigne ed erbe diverse. Infine altro carattere notevole della vegetazione di questi monti è la straordinaria abbondanza di Bossoli spontanei (*Buxus sempervirens* Linn.) che nascono e crescono

Digitized by Google

fino nei crepacci delle roccie e rivestono insieme al Carpine (*Carpinus betulus* Linn.) ed ai rovi i margini più dirupati degli altipiani sarteanesi di cespugli foltissimi e di folti macchioni; circostanze spesso ricercate da quegli uccelli che vogliono costruire il nido a poca distanza da terra.

Credo infine opportuno il dare qualche schiarimento sul modo col quale ho praticato le mie osservazioni sull'alimentazione degli uccelli, che è stato e sarà il punto principale a cui sono indirizzate le mie indagini. L'esame delle materie contenute nello stomaco di uccelli di sicura provenienza è stata l'unica via fin qui seguìta. Ho tenuto conto dell'apparenza e del volume della massa alimentare, notandone il colore, quando questo lo meritava, e misurando in tubo graduato il sedimento formato dalle dette materie sciolte in acqua abbondante, con che ottenevo pure una opportuna lavatura delle materie stesse. Ho spinto l'approssimazione di questa misura, naturalmente un po'sommaria, al quarto di centimetro cubo. Nel determinare la natura dei frammenti sono andato assai cauto, contentandomi di darne bene spesso indicazioni generiche, piuttostochè affermare cose troppo incerte; e ciò facilmente potrà comprendersi se si considera come talvolta sia assai difficile di determinare un insetto completo, e come questa difficoltà divenga centuplicata nel dovere studiare frammenti di piccoli animali, almeno finchè un numero considerevole di osservazioni non avrà facilitato la cosa coll'esperienza. Ho creduto pure opportuno di tener conto della presenza delle pietruzze che facilitano la digestione di materie solide, prendendo nota della loro quantità, della loro apparenza e colore e della loro natura calcarea o silicea che potei facilmente riscontrare saggiandoli con acido idroclorico. Devo pure far noto come io sia debitore al signor prof. Adolfo Targioni-Tozzetti che volle indicarmi i nomi esatti delle diverse specie di molluschi terrestri trovati nello stomaco di vari uccelli; ed al sig. prof. Carlo Emery che volle compiacersi di determinare le formiche trovate tra i suddetti alimenti. Lo studio dei semi fu affidato al professore

Digitized by Google

Odoardo Beccari ed al sig. Ugolino Martelli e fino ad ora non sono indicati se non quelli della natura dei quali ero sicurissimo.

Elenco delle specie di uccelli osservate nel distretto di Sarteano, provincia di Siena, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione ecc.

Corvus Corax. Non raro in inverno alle pianure.

Corvus frugilegus. Frequente in inverno, ma sembra che qualche individuo rimanga stazionario per tutto l'anno sui monti.

Corvus Cornix, *Cornacchia.* Sedentaria.

Pica rustica, *Gazzera.* Sedentaria.

Garrulus glandarius, *Ghiandaia.* Sedentaria e comunissima al piano e sui monti.

Sturnus vulgaris, *Storno.* Passano in autunno trattenendosi ai piani e nelle olivete.

Fringilla cœlebs, *Fringuello.* Di passo e stazionario.

Fringilla Montifringilla, *Peppola.* Di passo col precedente.

Petronia stulta, *Passera lagia.* Estiva.

Passer montanus, *Passera mattugia.* Sedentaria.

Passer Italiæ, *Passera.* Sedentaria ed abbondante.

Coccothraustes vulgaris, *Frusone.* Passa in ottobre, è anco nidificante.

Ligurinus Chloris, *Verdello.* Sedentario e di passo.

Chrysomitris Spinus, *Lucherino.* Qualche anno è abbondantissimo, sempre in autunno.

Carduelis elegans, *Cardellino, Calderino.* Sedentario e di passo.

Serinus hortulanus, *Crespolino.* Sedentario e di passo.

Cannabina Linota, *Fanello.* Passa in autunno ed è anco nidificante.

Digitized by Google

Pyrrhula europæa, *Ciuffolotto*. Sui monti nidifica, è anco di scarso passo autunnale.

Loxia Curvirostra, *Crociere*. Di passo irregolare in autunno, talvolta in gran numero.

Miliaria Projer, *Strillozzo*. In Val d'Orcia è sedentario.

Emberiza Citrinella, *Zigolo giallo* o *Nizzola*. Invernale.

Emberiza Cirlus, *Nizzola nera*. Sedentario.

Emberiza Hortulana, *Ortolano*. Comune in piano e sui monti, dall'aprile al settembre.

Emberiza Cia, *Nizzola cenerina* o *prataiola*. Di scarso passo.

Emberiza Schœniclus, *Nizzola di padule*. Di scarso passo.

Melanocorypha Calandra, *Calandra* o *Palandra*. Invernale e di passo in ottobre.

Alauda arborea, *Lodolicchio* o *Lodolino*. Sedentaria, più abbondante in ottobre.

Alauda arvensis, *Lodola*. Sedentaria e di passo in ottobre.

Galerita cristata, *Cappellaccia*, *Ciuffotta* o *Pantiera*. Nei piani; sedentaria.

Anthus pratensis, *Pispola*. Comune anco sui monti, passa in aprile e settembre e sverna.

Anthus cervinus. Rara di passo.

Anthus trivialis, *Pispolone*. In pianura di passo nell'estate.

Budytes flavus, *Codazinzera*, *Batticoda*. Di doppio passo.

Motacilla alba, *Coditremola*. Frequente in inverno.

Calobates melanope, *Boarina*. Non comune, si trova tutto l'anno in pianura.

Saxicola Oenanthe, *Culbianco*. Estivo nei luoghi aridi e sassosi, più al monte che ai piani.

Saxicola Stapazina. Col nome di *Stapazina* o *Culbianco a gola nera*, questa specie sembra esser confusa colla seguente; sono rare entrambe di passo.

Saxicola melanoleuca. Rara di solo passo.

Monticola saxatilis, *Codirossone*, *Tordo marino*. Non raro sui monti, giunge in aprile-maggio, parte in settembre.

Monticola Cyanus, *Passera solitaria*. Nei campanili, nei vecchi muri e nei dirupi, sedentaria.

Merula nigra, *Merlo*. Sedentario e comune.

Digitized by Google

Merula torquata. Qualche cacciatore dice di averlo ucciso col fucile, ma non è certo comune.

Turdus atrigularis. Si dice che ne fossero presi tre individui ad un boschetto molti anni indietro.

Turdus pilaris, *Gaggi.* Non comune in inverno nei boschi e nei prati.

Turdus iliacus, *Alpigino.* Invernale, si vede alla fine d'ottobre.

Turdus musicus, *Tordino.* Di passo in settembre-novembre ed in marzo; qualche coppia nidifica ai monti.

Turdus viscivorus, *Tordela.* Sedentaria.

Aëdon Luscinia, *Rusignolo*, *Usignolo.* Comune da aprile ad ottobre al monte ed al piano.

Erithacus Rubecula, *Pettiere* o *Picchieri.* Sedentario ai monti, di passo in ottobre e marzo, ed invernale.

Cyanecula Wolfi, *Pett'azzurro.* Raramente si vede intorno alle acque semitermali e presso le gore dei molini in inverno.

Ruticilla Phœnicurus, *Codirosso.* In pianura e sui monti, comune in estate.

Pratincola Rubicola, *Salimpunta.* Sedentaria.

Pratincola Rubetra, *Tomio*, *Tuina*, *Piagnucolone.* Comune da marzo a settembre.

Sylvia cinerea, *Beccafico passerino*, *Passera sepaiola.* Comune dall'aprile al luglio.

Monachus Atricapillus, *Capinera.* Sedentaria e comune in pianura ed ai monti.

Monachus hortensis, *Beccafico.* Estivo.

Pyrophthalma melanocephala, *Bigia.* Invernale, dal gennaio al marzo.

Phylloscopus rufus, *Luì.* Sedentario.

Troglodytes parvulus, *Re di macchia*, *Scricciolo*, *Beccaccino.* Sedentario, ma specialmente invernale.

Accentor modularis, *Passera scopaiola*, *Scopaiola.* Invernale.

Regulus ignicapillus, *Fiorancino.* Invernale.

Acredula Irbyi, *Codibugnolo* o *Paglianculo.* Sedentario, cova sui monti.

Digitized by Google

Parus major, *Perlonza capinera, Cingallina reale.* Sedentaria e comune.

Cyanistes cæruleus, *Perlonzina, Cincia, Cingallina piccola.* Sedentaria.

Sitta caesia, *Muraiolo.* Comunissimo e sedentario nei boschi di querce e di Cerro.

Certhia brachydactyla, *Rampichino.* Comune nei boschi di querce e sedentario.

Trichodroma muraria, *Picchio muraiolo.* Sedentario.

Oriolus Galbula, *Golo.* Comune da aprile ad ottobre.

Lanius minor, *Castrica, Castrocchia.* Estiva.

Lanius Collurio, *Castrica, Castrocchia.* Estiva.

Hirundo rustica, *Rondine.* Comune ed estiva.

Chelidon urbica, *Balestruccio.* Estivo comune.

Cypselus Apus, *Rondone.* Estivo, ai primi d'agosto parte.

Cypselus Melba, *Rondone.* Sembra che anche questa specie venga nei monti sarteanesi e nidifichi nei molti luoghi rocciosi e dirupati.

Caprimulgus europæus, *Piattaione.* Estivo.

Picus major, *Picchio rosso, Picchio cavallo.* Sedentario e frequente.

Picus minor. Scarso, ma sedentario.

Gecinus viridis, *Picchio giallo.* Sedentario.

Iÿnx Torquilla, *Torcicollo.* Estivo.

Cuculus canorus, *Cucule.* Comune da aprile a luglio.

Alcedo Ispida, *Beccapesci, Uccel Santa Maria.* Si vede non di rado lungo i margini delle gore dei molini. Sedentario.

Merops Apiaster, *Grottaione.* Si trova nell'estate in Val d'Orcia, ove nidifica.

Upupa Epops, *Puppola.* Estiva.

Strix flammea, *Barbagianni.* Sedentario.

Syrnium Aluco, *Alocco.* Sedentario nei monti.

Athene Noctua, *Civetta.* Sedentaria e comune.

Scops Giu, *Chiù, Chiurlo.* Comune più in Val d'Orcia che nei monti di Sarteano nell'estate.

Circus aeruginosus. Non comune.

Digitized by Google

Aquila Chrysaëtus, *Aquila.* Un solo individuo ♂, da circa quattro anni, fu ucciso nel novembre 1886 sul monte di Cetona mentre divorava un tacchino sopra un Cerro.

Cerchneis Tinnunculus, *Falchetto, Falco da uccellini.* Frequente nelle roccie e nei dirupi. Sedentario.

Anser segetum, *Oca.* Di doppio passo.

Anas Boscas, *Germano, Germano reale.* Si trova talvolta in inverno nel torrente Astrone.

Nettion Crecca, *Germanello, Barazzuolo.* Nell'inverno si vedono nell'Astrone e nelle gore dei molini.

Columba Palumbus, *Colombaccio, Collarone.* Qualche coppia rimane sedentaria e cova sui Faggi e sui Cerri in montagna. Passa in ottobre e marzo.

Columba Oenas, *Colombella.* Sta nell'inverno alla pianura e specialmente in Val d' Orcia.

Columba livia, *Piccion torraiolo.* Abbondantissimo nelle torri, nelle piccionaie, nei campanili e specialmente nella torre del castello di Sarteano.

Turtur tenera, *Tortora, Tortola.* Comune in estate in pianura e sui monti.

Starna Perdix. Comune e sedentaria nei campi, nei prati e nei luoghi coltivati. Molto più comune nella Val d'Orcia. [1]

Coturnix communis. Comune in estate nei luoghi aperti; non sembra che si trattenga sui monti.

Rallus aquaticus, *Gallinella.* Viene per i fossetti in inverno.

Œdicnemus scolopax, *Tallurino.* Sedentario e pare anco di passo, vedesi in Val d'Orcia talvolta in branchi numerosi e appena risale le prime appendici dei monti nel versante di ponente.

Charadrius Pluvialis, *Piviere.* È raro nei luoghi aperti e spogliati; più facilmente si trova in Val d'Orcia. Di doppio passo.

---

[1] Alcuni possidenti del circondario hanno tentato inutilmente di acclimatarvi la *Perdix petrosa* di Sardegna; le varie coppie lasciate libere sui pendii che guardano l' Orcia si dispersero e vennero uccise a considerevoli distanze.

Digitized by Google

Eudromias Morinellus. Di scarso passo.

Scolopax Rusticula, *Beccaccia.* Comune nei primi mesi d'inverno per i boschi ed anche presso i fossetti delle acque calde quando tutto il terreno è gelato. Si distingue una razza piccolo detta « scopina. »

Gallinago cælestis, *Beccaccino.* Si vede in novembre e dicembre.

Siena, distretto di San Gimignano (Paulucci marchesa M., Marri Ezio):

Scarsi e di limitato interesse scientifico saranno i ragguagli che io potrò fornire in quanto alle specie di uccelli osservate nel distretto del quale mi occuperò nelle presenti note, perchè queste si riferiranno soprattutto agli animali catturati al paretaio, a mezzo delle reti e comprenderanno perciò principalmente, tanto le specie che vi si acchiappano comunemente o che è ovunque consueto prendere con quel genere di tesa, quanto le poche altre che vi capitano solo per caso e perciò si devono considerare come avventizie.

Il mio paretaio, dipendente dalla fattoria del Monte a Puliciano, è in Val d'Elsa, in prossimità di Certaldo, provincia di Siena (sul limitare quasi della provincia di Firenze); fa parte del comune di San Gimignano, ed è situato su di un piccolo ripiano poco superiore al torrente Casciano, a circa 120 m. sul livello del mare. Il soprassuolo è coperto in buona parte da boschi di Querci, in parte è coltivato, soprattutto ad Ulivi; vi sono pure frammischiate alcune piagge incolte ove a mala pena nasce l'erba; il terreno di formazione pliocenica, è caratterizzato dalle sabbie gialle, dai mattaioni e da strati conchigliferi, ove primeggiano le grandi Bivalvi, come *Ostræa*, *Perna*, *Panopæa*, *Lutraria* ec., ec.

Alle specie catturate al paretaio aggiungerò pure quelle uccise nella stessa tenuta o nei dintorni (estesi pure nella provincia di Firenze, comune di Montaione) e che fanno

Digitized by Google

parte della mia Collezione ornitologica, principiata solo nel 1880. Nell'iniziare questa collezione il mio scopo era di facilitare a me ed ai miei dipendenti la cognizione delle specie di uccelli che si catturano con quel mezzo di tesa e credevo così limitarla; in seguito però ed in grazia di alcune favorevoli circostanze che mi si sono presentate, il mio programma è andato mano mano allargandosi, sicchè oggi mi trovo a possedere 128 specie rappresentate da 252 esemplari, alcune delle quali non affatto comuni.

Non lontano dal paretaio, sulla riva opposta del torrente Casciano, esistono estese e folte boscaglie che cuoprono la maggior parte dei monti sino alla strada provinciale che da Montaione, per i Cornocchi, conduce a Volterra (*Paulucci*).

San Gimignano si trova sul fianco settentrionale di una delle più ridenti colline della Val d'Elsa, sopra il livello del Mediterraneo metri 386. È posta fra il 28°, 4′ 1″ long., ed il 42°, 27′ 5″ lat. Alla distanza di circa 7 miglia all'Est le sta Poggibonsi; a miglia 6 al Sud Colle di Val d'Elsa; a miglia 22 nella stessa direzione Siena; a miglia 20 all'Ovest Volterra; a miglia 7 al Nord Certaldo ed a miglia 30 nella stessa direzione Firenze.

Il terreno del circondario Sangimignanese è montuoso per eccellenza e dalla parte di Nord-Est e di Sud-Est un po'meno aspro, affatto diboscato, con poggi e colline ben coltivate, che si estendono giù fino alle rive dell'Elsa ad Est, che segna il confine del nostro circondario. Nè da queste parti difettasi d'acqua, poichè il ruscello dei Fosci, il torrente dell' Imbrotoni e dei Riguardi, confluenti dell'Elsa dalla parte di Sud-Est, e il torrente Casciano dalla parte di Nord-Est, sono sufficientemente ricchi d'acqua anche nella stagione estiva. Ma dalle altre parti: Nord, Sud e Ovest specialmente, si trovano monti e valloni rivestiti di boscaglie e un terreno ineguale, sassoso, faticosissimo, che va su fino all' elevata montagna del Cornocchio, e fino a quella catena di monti detta la Serra Volterrana dalla

Digitized by Google

parte di Nord e Ovest, e fino ai boschi di Berignone dalla parte di Sud-Ovest. Qui si difetta d'acqua perchè quantunque frequenti vi si incontrino i torrenti, questi son tali che recano acque abbondanti e rovinose subito dopo le pioggie, ma dopo poco tempo si prosciugano talmente che non vi si trova più nessuna traccia di umidità. Noterò che fra i nostri boschi rarissimi sono quelli costituiti da piante secolari, poichè per avidità di guadagno ogni 6 o 8 anni si tagliano, e per di più in molti luoghi si dibosca addirittura ed è desiderio di tutti che una legge giunga in tempo ad impedire il diboscamento generale, poichè fin da quando questo ha cominciato a prender largo sviluppo le condizioni climatologiche sono variate assai (*Marri*).

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Siena, distretto di San Gimignano, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione ecc., ecc.[1]

Corvus Cornix, *Cornacchia.* Sedentaria e di passo in ottobre; comune (*P. M.*).

Corvus frugilegus, *Corvo.* Autunnale ed invernale (*P. M.*).

Pica rustica, *Gazza*, *Gazzera*, *Cecca.* Sedentaria, comune (*P. M.*).

Garrulus glandarius, *Ghiandaia.* Sedentaria, comune (*P. M.*).

Sturnus vulgaris, *Storno.* Invernale (*P.*); e di passo (*M.*).

Fringilla cœlebs, *Fringuello*, *Filunguello.* Sedentario e di passo, comune (*P. M.*).

Fringilla Montifringilla, *Peppola.* Comune al passo autunnale (*P. M.*).

---

[1] Questo elenco è compilato sulle liste e le notizie fornite dalla marchesa M. Paulucci e dal signor Ezio Marri. Con iniziali ho indicato la parte che spetta a ciascun osservatore.

Digitized by Google

Petronia stulta, *Passera lagia.* Comune al passo autunnale (*P. M.*).

Passer montanus, *Mattugia*, *Passerucchia.* Sedentaria e di passo autunnale (*P. M.*).

Passer Italiæ, *Passera*, *Passera casolina*, *Passerotto.* Sedentaria, abbondante e di passo in autunno (*P. M.*).

Coccothraustes vulgaris, *Frosone.* Comune al passo autunnale; furono abbondanti nel 1884, scarsi nel 1886 (*P. M.*).

Ligurinus Chloris, *Calenzolo.* Sedentario e di passo in autunno (*P. M.*).

Chrysomitris Spinus, *Lucherino.* Sedentario e di passo autunnale irregolare, cioè ora abbondante ora scarso (*P. M.*).

Carduelis elegans, *Cardellino*, *Calderino.* Sedentario e di passo in autunno (*P. M.*).

Serinus hortulanus, *Raperino.* Sedentario, comune e di passo autunnale ora abbondante ora scarso (*P. M.*).

Cannabina Linota, *Montanello*, *Fanello.* Sedentario e di passo in autunno, non però regolare; molti passarono nel 1882 e 1884, pochi o punti nel 1883 e 1886 (*P. M.*).

Pyrrhula europæa, *Ciufolotto.* Scarso, invernale; quando i boschi non erano distrutti, questa specie era comune e sedentaria (*P. M.*).

Loxia Curvirostra. Di passo irregolare in autunno (*P.*).

Miliaria Projer, *Stiattardo*, *Stiattajone.* Comune nel passo autunnale (*P. M.*).

Emberiza Citrinella, *Zigolo giallo.* Di passo nell' autunno (*P. M.*).

Emberiza Cirlus, *Zigolo nero.* Sedentario e di passo (*P. M.*).

Emberiza Hortulana, *Ortolano.* Accidentale nel passo autunnale (*P.*); estivo, non abbondante (*M.*).

Emberiza Cia, *Zigola.* Comune al passo autunnale (*P. M.*).

Calcarius nivalis. Accidentale, ne ebbi una femmina il 5 dicembre 1885 (*P.*).

Alauda arborea, *Lodolino.* Comune, sedentario e di passo; divenuto scarso da qualche anno (*P. M.*).

Digitized by Google

Alauda arvensis, *Lodola.* Sedentaria, comune e di passo in ottobre (*P. M.*).

Galerita cristata, *Lodola cappellaccia.* Sedentaria (*P. M.*).

Agrodroma campestris, *Corrisodo.* Estivo, non comune, nidifica solo sul Cornocchio ai sodi di Pignano (*M.*).

Anthus pratensis, *Pispolo.* Comune al passo autunnale (*P. M.*).

Anthus trivialis, *Pispolone.* Scarso al passo autunnale (*P. M.*).

Motacilla alba, *Batticoda.* Comune e sedentaria (*P. M.*).

Calobates melanope, *Boarina.* Scarsa al passo autunnale (*P.*); sedentaria (*M.*).

Saxicola Oenanthe, *Codibianco.* Estivo (*P. M.*).

Monticola Cyanus, *Passera solitaria.* Avuta nel maggio (*P.*); sedentaria (*M.*).

Merula nigra, *Merlo.* Sedentario e comune; si distinguono come « Merli forestieri » o « di montagna » quelli colle parti inferiori rossiccie e dicesi che giungono tardi di passo; sono sempre femmine (*P. M.*).

Merula torquata. Avuto nel gennaio 1883 (*P.*).

Turdus pilaris. Avuta nel dicembre (*P.*).

Turdus iliacus, *Tordo alpigino.* Avuto in gennaio (*P.*); invernale (*M.*).

Turdus musicus, *Tordo.* Autunnale ed invernale (*P. M.*).

Turdus viscivorus, *Tordela.* Avuta in gennaio e febbraio (*P.*); sedentario (*M.*).

Aëdon Luscinia, *Rossignolo.* Avuti maschio e femmina il 14 ottobre 1884 (*P.*); estivo (*M.*).

Erithacus Rubecula, *Pettirosso.* Sedentario e di passo (*P. M.*).

Ruticilla Phœnicurus, *Codirosso.* Avuto in ottobre (*P.*); estivo (*M.*).

Ruticilla titys. Accidentale e scarso in autunno (*P.*).

Pratincola Rubicola, *Saltimpalo, Saltanselce.* Sedentario (*P. M.*).

Sylvia cinerea, *Beccafico.* Avuta in giugno (*P.*); estiva (*M.*).

Monachus Atricapillus, *Capinera.* Comune (*P.*); sedentaria (*M.*).

Pyrophthalma melanocephala, *Bigina, Occhiocotto.* Sedentario (*P. M.*).

Melizophilus undatus. Avuta nel marzo (*P.*).

Phylloscopus rufus, *Luì.* Sedentario (*P. M.*).

Digitized by Google

Hypolais polyglotta. Estivo, avuto in giugno (*P.*).

Troglodytes parvulus, *Re di macchia.* Autunnale (*P.*); sedentario (*M.*).

Cinclus aquaticus, *Merlo acquaiolo.* Avuto nell'estate (*P.*); sedentario (*M.*).

Accentor collaris. Avuto in dicembre e gennaio (*P.*).

Accentor modularis, *Scopina. Scopaiola.* Sedentaria e di passo in autunno (*P. M.*).

Regulus cristatus, *Fiorrancino.* Sedentario (*P. M.*).

Regulus ignicapillus, *Fiorrancino.* Sedentario (*P. M.*).

Acredula Irbyi, *Codibugno, Codibugnolo.* Sedentario e comune (*P. M.*).

Parus major, *Cinciallegra, Cíngallera.* Sedentaria e comune (*P. M.*).

Parus ater. Avuta in ottobre e dicembre (*P.*).

Cyanistes cæruleus. Comune (*P.*).

Pœcile palustris. Avuta in novembre (*P.*).

Sitta cæsia, *Picchio muratore.* Avuto in marzo e dicembre (*P.*); sedentario (*M.*).

Certhia brachydactyla, *Rampichino.* Sedentario ed autunnale (*P. M.*).

Oriolus Galbula, *Rigogolo.* Avuto in giugno (*P.*); estivo (*M.*).

Lanius Excubitor. Avuto un maschio nel 1883 (*P.*).

Lanius minor, *Velia.* Avuta in giugno (*P.*); estiva (*M.*).

Lanius Collurio, *Velia.* Avuta in giugno (*P.*); estiva (*M.*).

Lanius auriculatus, *Velia.* Avuta in giugno (*P.*); estiva (*M.*).

Hirundo rustica, *Rondine.* Estiva (*P. M.*).

Chelidon urbica, *Balestruccio.* Estivo (*P. M.*).

Cypselus Apus, *Rondone.* Estivo e comune (*M.*).

Caprimulgus europæus, *Nottolaccio, Nottolone, Merdaiolo.* Avuto in luglio (*P.*); estivo (*M.*).

Picus major. Avuto in novembre e dicembre (*P.*).

Picus minor. Avuto in novembre (*P.*).

Gecinus viridis, *Picchio verde, Picchio galletto.* Sedentario (*P. M.*).

Iynx Torquilla, *Torcicollo.* Di passo in autunno (*P.*); estivo (*M.*).

Cuculus canorus, *Cuculo.* Avuto in aprile (*P.*); estivo (*M.*).

Digitized by Google

Alcedo Ispida, *Uccel Santa Maria*. Avuto in ottobre e novembre (*P.*); sedentario (*M.*).

Merops Apiaster, *Tordo marino*. Ebbi maschio e femmina in settembre 1885 (*P.*); di scarso passaggio (*M.*).

Upupa Epops, *Bubbola*. Avuta in giugno (*P.*); estiva (*M.*).

Strix flammea, *Barbagianni*. Avuto in primavera (*P.*); sedentario (*M.*).

Syrnium Aluco, *Allocco*. Sedentario nei boschi (*M.*).

Asio Otus, *Gufo*. Avuto in primavera ed in dicembre (*P.*); sedentario (*M.*).

Asio accipitrinus. Avuto in dicembre (*P.*).

Athene Noctua, *Civetta*. Sedentaria (*P. M.*).

Scops Giu, *Chiù*. Avuto in giugno (*P.*); estivo (*M.*).

Circus Swainsoni. Ebbi un maschio adulto il 13 marzo 1886 (*P.*).

Circaëtus gallicus, *Biancone*. Ebbi una femmina il 2 settembre 1886 (*P.*).

Aquila clanga. Ebbi un maschio il 1° novembre 1885 (*P.*).

Buteo vulgaris. Avuta in ottobre (*P.*).

Milvus migrans. Ebbi una femmina il 3 settembre 1886 (*P.*).

Hypotriorchis Subbuteo. Avuto nell'ottobre 1886, ucciso da un branchetto di 6 o 7 individui (*P.*).

Æsalon regulus. Ne presi due al paretaio nell'autunno 1884 (*P.*).

Cerchneis Tinnunculus, *Guglia*. Avuto in autunno (*P.*); sedentario (*M.*).

Accipiter Nisus, *Falchetto*. Avuto in autunno (*P.*); sedentario (*M.*).

Ardea purpurea. Avuto nell'ottobre 1882 (*P.*).

Ardeola ralloïdes. Ebbi una femmina l'11 gennaio 1883 (*P.*).

Columba Palumbus, *Colombaccio*. Avuto in ottobre (*P.*); in scarso numero, anche sedentario (*M.*).

Columba Oenas, *Colombo*. Avuta in ottobre e dicembre (*P.*); invernale (*M.*).

Columba livia, *Piccion torraiolo*. Una volta assai comune e sedentario, ora quasi sterminato (*M.*).

Turtur tenera, *Tortora*. Avuta in giugno (*P.*); estiva (*M.*).

Digitized by Google

Perdix rufa, *Pernice.* Avuta in gennaio ed ottobre (*P.*); sedentaria (*M.*).

Starna Perdix, *Starna.* Avuta in febbraio (*P.*); sedentaria (*M.*).

Coturnix communis, *Quaglia.* Estiva, ma non abbondante (*M.*).

Crex pratensis, *Re quaglia.* Non comune, di passo (*M.*).

Vanellus Capella, Avuta in dicembre (*P.*).

Scolopax Rusticula, *Beccaccia.* Avuta in gennaio (*P.*); invernale (*M.*).

Gallinago cælestis. Avuto in dicembre (*P.*).

Siena e **Grosseto** (Dei prof. Apelle); **Grosseto** (Ademollo cav. prof. Alfonso):

La zona da me presa ad osservare in Toscana, comprende le due provincie di Siena e Grosseto: la seconda peraltro per quella parte soltanto che ha per confine il mare.

La provincia di Siena da me preferibilmente studiata, rimane fra la catena degli Appennini ed il Mediterraneo, ed i gradi di longitudine 28°, 35′ e 29°, 31′, e di latitudine 42°, 49′ e 43°, 31′. È montuosa, con pianure limitate, poggi estesi e colline. La sua area è calcolata, in giro, 408 chilometri, e in superficie, circa 380,000 ettari. La sua figura è quella di un quadrilatero irregolare piuttosto allungato nel senso da N.O. a S.E. per circa 110 chilometri, e largo al più 60 chilometri da N.E. a S.O. Confina ad O. con la provincia di Pisa; a N.O. e N. con quella di Firenze, ad E. con le altre di Arezzo per mezzo dei monti del Chianti; a E. da S.E. con l'Umbria, l'antico Stato Romano, fino al Siele, e in tutto il resto con la provincia di Grosseto; la quale a sua volta, è confinata a S. e S.O. dal Mediterraneo e a S.O. dall'ex Stato Romano.

Il fiume principalissimo è l'Ombrone che nascendo nelle alture di San Gosmè in Chianti, e attraversando ambedue le provincie Senese e Grossetana, si scarica in mare. Nel suo tragitto dà il nome a due valli principali, cioè la

Digitized by Google

Valle d'Ombrone superiore, la quale con le valli secondarie, costituisce, si può dire, la provincia Senese, e la Valle d'Ombrone inferiore. Nella Valle superiore dell'Ombrone, esso ha per tributari principali, l'Arbia, che nascendo fra la Castellina e Monte Petroso, scende per i viniferi colli del Chianti, passa presso Siena e sbocca nell'Ombrone sotto Buonconvento dando nome ad una delle più importanti valli secondarie, cioè alla Valdarbia. Poi la Merse, che avendo origine sul fianco occidentale dei poggi di Prata (provincia Grossetana) e dirigendosi sotto Chiusdino (nel Senese) e quindi serpeggiando intorno all' ultimo sprone meridionale della Montagnola, passa per le gole tra i poggi di Murlo e Tocci e dopo un corso di circa 90 chilometri si scarica nell'Ombrone e dà il nome alla Val di Merse. L'Orcia finalmente che, nascendo sul versante O. del Monte di Cetona versa le sue acque nell' Ombrone, dando il nome alla Valdorcia, la quale peraltro resta per la massima parte nel Senese, ma presso l'Ombrone va per intiero, poichè l'Orcia dal punto del suo sbocco in detto fiume, fino a l' Ente, marca il confine fra la Valle d'Ombrone superiore e quella inferiore.

La Valle d'Ombrone superiore dunque, con le tre secondarie dell'Arbia, della Merse e dell'Orcia, sono le Valli principali e centrali, che insieme ad altre di minor conto ed altre che dirò estreme, come la Val d'Elsa verso N.O. e Val di Poglie verso S.E. ecc. costituiscono la provincia Senese.

I monti più elevati sono: il Monte Amiata, alto 1722 metri sul mare che alla base occupa una superficie di circa 330 chilometri quadrati, in parte nel Senese, in parte nel Grossetano. La Montagna di Cetona alta 1140 metri; ed il Monte di Radicofani alto metri 900. E finalmente si notano i monti del Chianti e l'umile catena della Montagnola senese.

Come si può arguire dal poco già detto, l'aspetto della provincia senese è assai variato. La sua parte centrale infatti costituita da terreno pliocenico, è vestita di boschi, e specialmente da viti e olivi, nel coltivato, ove emerge lo strato superiore delle sabbie gialle, dette impropriamente

Digitized by Google

tufo, come presso Siena, Trequanda, Montepulciano, Chianciano, Chiusi ecc.; si vede nudo e brullo il vastissimo tratto nel quale è restato scoperto lo strato inferiore cioè l'argilla detta impropriamente *creta*, il quale col suo colore cinereo, colle sue frane, la sua nudità, dà al paese un aspetto triste e monotono. L'aspetto peraltro della sua parte periferica, è tutt'altro: giacchè questa è vestita di boschi, vigne e oliveti. Sui monti del Chianti infatti, costituiti da terreno Eocenico (alberese, cioè galestro ec.) crescono boschi di Cerri, Querci ecc. e nel coltivato gli olivi e sopratutto le viti. Anche l'alberese o i galestri di Rigomagno e Modanella; le sabbie gialle, le torbiere di Bettolle, Salario e dei laghi di Chiusi e di Montepulciano, sono esse pure coperte da boschi e coltivazioni. I medesimi galestro e alberese di San Casciano dei Bagni, sono parimente vestiti di coltivazioni e di boschi. Di boschi pure di Castagni e di Faggi son coperte le trachiti del Monte Amiata. Come vestito da boschi e da coltivazioni è anche tutto il resto del contorno a S.O. fino ai monti del Chianti, dai quali mi son partito.

La provincia di Grosseto è costituita da vaste pianure e da stagni e circondata da monti; cioè, il Monte Labro, che è il principale, nudo dalla base alla cima, il poggio di Montieri con i poggi di Gerfalco, il Monte Argentario, vestito di Lecci e in buona parte da viti, ed il Giglio, isola granitica.

Il fiume principale è l'Ombrone dall'Orcia fino al mare che dà nome alla Valle d'Ombrone inferiore. In questo secondo tratto non ha per tributari che dei torrenti, i più notabili dei quali sono il Lanzo, il Gretona, il Melacca ed il Trasubbia. Peraltro non è il solo fiume della provincia, e fra gli altri noterò come i primarii dopo l'Ombrone, l'Albegna e la Fiora che terminano al mare.

Non mi estendo di più per questa provincia, perchè i miei studi e le mie osservazioni ornitologiche in esse fin qui fatte, si limitano alla riviera quasi tutte, il Monte Argentario ed il Giglio, e non altro (*Dei*).

Digitized by Google

Il distretto affidato alle mie osservazioni ornitologiche si compone dell'intera provincia di Grosseto, situata nella parte occidentale dell'Italia di mezzo, che nel sistema geografico peninsulare a cui appartiene l'Italia, dicesi parte mediterranea. Fra le provincie mediterranee italiane, quella di Grosseto è situata precisamente nei gradi di longitudine 28°, 12′, e 39°, 6′, e di latitudine 42°, 22′, e 43°, 6′ in modo che il suo lato SS.E. (levante-scirocco), confina colla provincia di Roma e trovasi a gradi 34°, 55′ di longitudine; il suo lato O.N.O. (ponente-maestro), che confina con la provincia di Pisa, trovasi a gradi 33°, 50′ di longitudine; il suo lato mediterraneo o marino che confina tutto col mare e che trovasi esposto a SS.O. (mezzogiorno-libeccio) è nei gradi di latitudine 41°, 55′, come il suo lato NN.E. (greco-tramontana) e che confina colla provincia di Siena, rimane nei gradi 42°, 40′ della medesima latitudine.

La provincia di Grosseto colla sua costa fronteggia tutte le isole che costituiscono l'Arcipelago toscano, alcune delle quali gli appartengono. Essa ha la figura di un quadrato allungato o di un ovoide allungato, o meglio di un vasto anfiteatro con lati frastagliati. La provincia di Grosseto è molto vasta, avendo un'estensione territoriale di 442,057 ettari quadrati, 69 ari, 77 centimetri, pari a 4434 chilometri quadrati, cifra che ascende a 5 mila chilometri quadrati, se vi aggiungiamo la superficie delle isole e delle isolette che gli appartengono. La percorrenza della sua costa mediterranea, senza tener conto delle sporgenze e sinuosità, è di chilometri 107. Le maggiori distanze di questa provincia sono dal fiume Cornia e dal Frassine in comune di Massa Marittima, al torrente Tasono e Montauto in comune di Manciano, linea che lo attraversa longitudinalmente e che dal confine Pisano procede a quello Romano, ha una percorrenza di 130 mila metri. Altra linea che partendo dalla costa a Talamone in comune di Orbetello, risalendo traversalmente al Monte Amiata, al di là dei torrenti Vivo e Vetra cioè, al confine Senese ha una percorrenza di oltre 100 mila metri; le linee poi oblique traversanti la pro-

Digitized by Google

vincia danno una quasi equidistanza di 120 mila metri. Queste distanze aumentano dai 20 ai 30 mila metri se noi vi includiamo il promontorio Argentario e le isole di Giannutri e del Giglio.

Le vallate principali della provincia di Grosseto, procedono da est per ovest, sono quelle dei fiumi Paglia, Fiora, Albegna, Ombrone, Bruna, Alma, Pecora e Cornia e molti altri corsi di acqua di ordine secondario. Le maggiori pianure, ove hanno sede i paduli dimora prediletta di molti generi di uccelli, sono quelle di Grosseto, dell'Alberese, degli Acquisti, del Collecchio, di Talamone, di Camporegio, delle Basse, di Orbetello, delle Piane, dell'Alma, di Gualdo, di Rocca, di Paganico, di Follonica, di Sovana ed altre di minor conto. Dalle valli e pianure si ascende alle colline che sono con i poggi, innumerevoli, ed ai monti che serrano la provincia, quali sono i principali, il Monte Amiata colle sue eccelse vette il Pizzo dell' Uccello, il Monte Labro, il Sasso di Maremma, i Monti di Montieri, le Cornate di Gerfalco, il Monte Elmo, il Vitozzo ed altri. Le montuosità, i luoghi poggivi e collinosi della Maremma occupano due terzi della sua estensione, mentrechè la pianura ne occupa un solo terzo. Circa l'altimetria ed orografia, dal livello stesso del mare e delle foci dei fiumi, s'incontrano tutte le elevazioni fino a metri 1722 che tanti ne misura l'Amiata nel punto detto Sasso di Maremma, il più culminante. Inoltre è da accennarsi, che la Maremma possiede più promontorii, più punte ed istmi, non che un numero ragguardevole di località umide, frigide, acquitrinose, palustri e lacustri. Alcuni paduli e laghi hanno ragguardevoli estensioni, quali il padule di Castiglione ed i laghi di Orbetello e di Burano, i quali ultimi, per le comunicazioni col mare, sono costituiti da acque salse.

Nei terreni bassi e di pianura del distretto di osservazione ornitologica di Grosseto, geologicamente predominano i terreni terziari, quaternari, alluvionali e d'importazione, più limitatamente arenosi, costituiti da dune e da tomboli

Digitized by Google

In questa zona piana e pianeggiante, pressochè tutta afflitta dalla malaria, si fanno le grandi colture del frumento, delle biade, dei fieni ed ivi sono situati estesi pascoli per l'allevamento dei Bovini, Cavallini, Ovini numerosissimi, essendo la provincia di Grosseto molto ricca a pastorizia. Non manca la coltura della zea, della segala, dell'orzo, degli olivi, delle viti, dei gelsi, dei pomari, ma molto più ristrettamente. Le dune e tomboli arenosi sono rivestiti generalmente di Pini domestici e silvestri, nonchè di Mirti, Lentischi, Rosmarini, Corbezzoli, Tamerischi, come questi ultimi rivestono molti poggi e monti prospicenti il mare; devo aggiungere che in molti luoghi piani sviluppa benissimo il *Quercus suber* (la Sughera).

Nelle regioni delle colline e dei poggi si raddoppia la olivocoltura, la viticoltura, mentre va diminuendo quella dei grani, biade, fieni ed incominciano i boschi e la silvicoltura. Le piante predominanti nelle boscaglie, colline e poggi sono le ginestre, le eriche, i sontri, gli ornelli, i corbezzoli, gli scopi, misti e formanti macchie o boscaglie per lo più cedue, più di rado di alto fusto per l'aggiunzione di Lecci, Cerri e Querci. Nei monti ove predomina il bosco, questo è di alto fusto e costituito da Querci, Lecci e Cerri, più in alto da Castagni e più in alto ancora da Fargne. Al piano predominano geologicamente i terreni alluvionali e nettuniani; in alcuni punti gli alabastri, il marmo, il travertino, il calcare liassico o breccia, le argille, l'arenaria, la pietra da calce. Al monte predominano le trachiti, il granito, il macigno silicico, le tufe vulcaniche, la pietra focaja, quella da sarti, i calcari di tutte le qualità, gli schisti, gli spati, molti prodotti metallici di rame, ferro, mercurio e zinco, solfo, lignite, molte acque minerali, non meno di 40 sorgenti, di cui 7 saline, 12 acidulo-ferruginose, 8 solfuree, 7 salino acidule, 2 ferruginose, 2 solfureo-ferruginose, rivelano la ricchezza del suolo e sottosuolo maremmano (*Ademollo*).

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli osservate nelle provincie di Siena e di Grosseto, coi nomi volgari locali, indicazioni di frequenza e notizie sulle migrazioni, nidificazione, ecc. ecc.[1]

Corvus Corax, *Corvo grosso.* Raro e sedentario ai monti (*A.*).

Corvus Corone, *Cornacchia nera.* Rara assai (*A.*).

Corvus Cornix, *Cornacchia*, *Mulacchia.* Comune e sedentaria (*D. A. C.*).

Corvus frugilegus, *Corvo.* Abbonda da ottobre a marzo (*D. A. C.*).

Lycos Monedula, *Taccola, Corvacchia, Gracchiola, Merlo marino.* Accidentale nel Senese, comune e sedentaria nel Grossetano (*D. A.*); di passo in ottobre (*C.*).

Nucifraga Caryocatactes, *Corvo marino.* Accidentale; circa 30 anni fa non era tanto raro e nell'autunno più specialmente qualcuno si vedeva nel Senese, dal 1858 non ne vidi più (*D.*).

Pica rustica, *Gazzera, Cecca, Pica.* Abbondante e sedentaria (*D.*); non frequente (*A. C.*).

Garrulus glandarius, *Ghiandaja, Bertina.* Comune e sedentaria (*D.*); non frequente (*A. C.*).

Sturnus vulgaris, *Storno.* Invernale e comune; abbondante in autunno, scarso in primavera; alcune coppie sono

---

[1] Questo elenco è stato compilato sulle liste e colle notizie inviate dai signori: prof. Apelle Dei per entrambe le provincie, dott. cav. Alfonso Ademollo per quella di Grosseto, e notaio Elvidio Cambi pel distretto di Gavorrano in quella di Grosseto. Colle iniziali ho indicato la parte che spetta a ciascuno degli osservatori. Debbo infine dire che il prof. A. Dei ha pubblicato un *Catalogo degli uccelli della prov. Senese*, Siena, 1862, con *Aggiunte e correzioni*, Siena, 1872-73; opera pregevole che si occupa della prov. Senese nella sua antica estensione, cioè anche di quella Grossetana. Il cav. dott. A. Ademollo ha poi pubblicato l' *Ornitologia Maremmana*, Grosseto, 1877. Queste due opere sono qui state utilizzate.

Digitized by Google

sedentarie e nidificano da noi (*D.*); abbondante al piano (*A.*); in ottobre (*C.*).

Sturnus unicolor. Accidentale (*D.*).

Pastor roseus, *Storno marino.* Accidentale nel giugno, varî veduti e due presi presso Siena nel 1885 (*D.*).

Fringilla cœlebs, *Fringuello.* Sedentario, invernale e di passo abbondante in ottobre e marzo (*D. A. C.*).

Fringilla Montifringilla, *Peppola, Fringuello marino.* Comune di passo in autunno, vedonsi da ottobre a febbraio (*D. A.*).

Petronia stulta, *Passera lagia.* Di passo in ottobre ora scarso ora copioso, ma anche nidificante (*D.*); invernale (*A.*).

Passer montanus, *Passera mattusa.* Comune e sedentaria (*D.*).

Passer Italiæ, *Passera reale.* Abbondantissima e sedentaria (*D. A. C.*).

Coccothraustes vulgaris, *Frosone.* Sedentario, ma specialmente di passo irregolare in settembre, ottobre e marzo (*D.*); invernale (*A.*).

Ligurinus Chloris, *Verdone, Verdello.* Comune e sedentario (*D.*); anche di passo (*A. C.*).

Chrysomitris Spinus, *Lucarino.* Di passo ora copioso, ora scarso in ottobre e novembre (*D.*).

Carduelis elegans, *Cardellino, Cardello.* Comune o sedentario, col nome di « Cardellino montanaro » si distingue una razza di dimensioni sensibilmente maggiori e colori più vivaci, che non è sedentaria da noi, ma giunge verso la metà d'ottobre (*D.*); abbondante (*A. C.*).

Serinus hortulanus, *Raperino, Crespolino.* Comune di passo e sedentario (*D. A. C.*).

Cannabina Linota, *Montanello, Gricciolo.* Sedentario, ma assai più abbondante in autunno ed inverno (*D.*); non frequente (*A.*).

Ægiothus rufescens. Accidentale, uno colto a Ponte d'Arbia in ottobre 1864 (*D.*).

Pyrrhula europæa, *Ciuffolotto.* Scarso in ottobre e novembre al piano, sedentario ai monti, così sul Monte Amiata, su quello di Cetona ec. (*D.*); erratico (*A.*).

Digitized by Google

Loxia Curvirostra, *Crociere.* Accidentale in ottobre e novembre (*D.*).

Miliaria Projer, *Strillozzo.* Invernale e comune, in scarso numero anche sedentario e nidificante (*D. A. C.*).

Emberiza Citrinella, *Zigolo giallo, Gialletto.* Invernale, cioè dalla fine d' ottobre al marzo (*D.*); non comune (*A.*).

Emberiza Cirlus, *Nizzola.* Sedentario, molti giungono in ottobre (*D. A. C.*).

Emberiza Hortulana, *Ortolano.* Comune da marzo a settembre (*D.*); scarso in agosto (*A.*).

Emberiza Cia, *Muciattola, Nizzola muciattola.* Non tanto comune, invernale (*D.*); erratico (*A.*).

Emberiza Schœniclus, *Migliarino.* Invernale e non comune nel Senese, nidifica in Maremma (*D.*); sedentario (*A. C.*).

Emberiza pyrrhuloïdes, *Passera di padule.* Invernale e non comune (*D.*); estiva (*A.*).

Calcarius nivalis. Raro assai, ne ebbi uno il 12 ottobre 1865 (*D.*).

Melanocorypha Calandra, *Calandra, Culandra.* Sedentaria in Maremma (*D. A.*).

Calandrella brachydactyla, *Calandrino.* Comune di doppio passo in Maremma (*D. A. C.*).

Alauda arborea, *Lodolina. Trullora.* Abbastanza comune, sedentaria e di passo (*D. C.*).

Alauda arvensis, *Lodola pantera.* Vedesi abbondante dall' ottobre al marzo, non mi risulta che abbia mai nidificato nel Senese (*D.*); comune e sedentaria (*A. C.*).

Galerita cristata, *Cappellaccia, Lodola cappellana* (Grosseto). Sedentaria e comunissima (*D. A. C.*).

Agrodroma campestris, *Corrisodo, Corriere.* Comune sulle *crete* da agosto ad ottobre (*D.*); erratico (*A.*).

Corydalla Richardi. Accidentale, ne ebbi uno il 20 ottobre 1863 (*D.*).

Anthus pratensis, *Pispola.* Invernale e comune (*D. A.*); passa in ottobre (*C.*).

Anthus trivialis, *Tordino.* Abbondante di passo in settembre ed aprile (*D.*); e dal luglio al settembre (*A.*).

Digitized by Google

Anthus Spipoletta, *Spioncello*, *Pispola di padule*. Invernale e scarso (*D. A.*).

Budytes flavus, *Cutti*. Scarso, di passo in aprile ed agosto (*D.*).

Budytes cinereocapillus, *Strisciajola*. Scarsa, di passo in aprile (*D.*); di passo in agosto e settembre (*A.*).

Motacilla alba, *Coditremola*, *Cutrettola*. Comunissima e sedentaria (*D. A. C.*).

Calobates melanope, *Coditremola gialla*, *Codizzinzola* (Grosseto). Sedentaria, ma scarsa (*D. A. C.*).

Saxicola Oenanthe, *Codibiancola*. Estivo e comune in settembre (*D.*); si vede in agosto e settembre (*A.*); e ottobre (*C.*).

Saxicola Stapazina. Rara, avuta il 4 maggio 1866 da Orbetello (*D.*).

Dromolæa leucura. Ne ebbi una da Orbetello il 2 maggio 1865 (*D.*); accidentale (*A.*).

Monticola saxatilis, *Codirossone*, *Tordo marino*. Estivo, ora più ora meno abbondante (*D. A.*).

Monticola Cyanus, *Passera solitaria*. Comune e sedentaria (*D. A. C.*).

Merula nigra, *Merlo*. Comune e sedentario, molti giungono a svernare (*D. A. C.*).

Merula torquata, *Merlo col petto bianco*. Di comparsa irregolare e scarsa (*D.*).

Turdus atrigularis. Accidentale, ebbi un maschio da Belforte il 30 novembre 1863 (*D.*).

Turdus obscurus. Accidentale, uno sarebbe stato preso nel Senese alla metà del dicembre 1877 (*D.*).

Turdus pilaris, *Tordela alpigina*. Invernale, ora più ora meno abbondante, dall'ottobre al marzo 1885 molte rimasero nei boschi di Val d'Orcia (*D. A.*).

Turdus iliacus, *Tordo alpigino*. Invernale, più comune della precedente (*D. A. C.*).

Turdus musicus, *Tordo*. Abbondante d'inverno, in scarso numero sedentario (*D. A. C.*).

Turdus viscivorus, *Tordela*, *Tordo maggiore*. Scarsa, sedentaria, abbondante d'autunno e d'inverno (*D. A.*).

Digitized by Google

Aëdon Luscinia, *Rusignolo.* Abbondante da aprile alla metà di settembre; l'ho udito già cantare il 25 marzo, alla fine del settembre quasi tutti sono andati (*D. A. C.*).

Erithacus Rubecula, *Pettiere.* Scarsamente sedentario, assai copioso in autunno ed inverno, cioè dall'ottobre al marzo (*D. A. C.*).

Cyanecula Wolfi. Raro, avuto in aprile ed ottobre (*D.*).

Ruticilla Phœnicurus, *Codirosso.* Ora più ora meno abbondante in marzo, aprile e settembre, qualche coppia rimane l'estate e nidifica al Monte Amiata ed alla Montagnola Senese (*D. A. C.*).

Ruticilla titys. Raro assai (*D.*).

Pratincola Rubicola, *Saltinpalo*, *Frocasini.* Sedentario e comune (*D. A. C*).

Pratincola Rubetra, *Saltinpalo*, *Saltancecce.* Poco comune da settembre a novembre (*D.*); passa anche in aprile (*A.*).

Sylvia orphæa, *Bigia grossa*, *Beccaficone.* Estiva, ma non comune (*D.*).

Sylvia cinerea, *Beccafico passerino.* Abbondante da aprile a settembre (*D.*).

Sylvia Curruca. Assai rara, ne ebbi un solo nell'agosto 1857 da Radi (*D.*).

Sylvia subalpina, *Beccafico*, *Occhio rosso.* Comune da maggio a ottobre (*D.*); sedentaria (*A. C.*).

Monachus Atricapillus, *Capinera.* Comune e sedentaria (*D. A. C.*).

Monachus hortensis, *Beccafico.* Di passo regolare in settembre (*D. A. C.*).

Pyrophthalma melanocephala, *Occhio cotto*, *Occhio rosso.* Comune e sedentario in Maremma (*D. A. C.*).

Melizophilus undatus, *Occhi rossi.* Sedentaria e comune, abbonda più d'inverno (*D. A.*).

Phylloscopus sibilator, *Luì verde.* Giunge in ottobre e anche in novembre e si trattiene sino all'aprile (*A.*).

Phylloscopus Trochilus, *Luì grosso.* Giunge in aprile e parte in settembre (*A.*).

Digitized by Google

Phylloscopus Bonellii, *Luì*. Non comune, giunge in aprile, parte in settembre (*D. A.*).

Phylloscopus rufus, *Luì*. Comune dal settembre al marzo (*D.*); sverna da noi (*A.*); sedentario (*C.*).

Hypolais icterina, *Beccafico*, *Canapino*. Arriva in maggio e parte in settembre (*A.*).

Hypolais polyglotta, *Beccamoro*. Comune da marzo a settembre (*D.*).

Acrocephalus streperus, *Beccafico di padule*. Estiva, ma non comune (*D. A.*).

Acrocephalus arundinaceus, *Cannareccione*. Piuttosto raro (*D.*); estivo (*A.*).

Calamodus schœnobænus, *Forapaglie*. Raro (*D.*); sedentario (*A.*).

Calamodus aquaticus, *Pagliarolo*. Avuto in maggio e settembre (*D.*); vedesi da agosto ad ottobre (*A.*).

Lusciniola melanopogen. Ne ebbi un solo il 25 dicembre 1863, da Grosseto (*D.*).

Potamodus luscinioïdes, *Salciaiola*. Si vede da aprile ad ottobre (*A.*).

Cettia Cettii, *Rusignolo di padule*. Sembra essere sedentario in Maremma (*D. A.*).

Cisticola cursitans, *Becca moschino*. Sedentario e comune verso Montepescali (*D. C.*); specialmente estivo (*A.*).

Troglodytes parvulus, *Scricciolo*. Autunnale ed invernale, comune e sedentario (*D. A. C.*).

Cinclus aquaticus, *Merlo acquajolo*. Sedentario, ma scarso (*D. A.*).

Accentor collaris, *Sordone*, *Gogo*. Accidentale d'inverno; nel 1878 ne comparvero molti a Rocca Federighi (*D.*); vedesi in ottobre (*C.*).

Accentor modularis, *Passera scopajola*. Comune d'autunno e d'inverno (*D.*); piuttosto rara, ma sedentaria (*A.*); di passo in ottobre (*C.*).

Regulus cristatus, *Fiorrancino*. Invernale (*D.*); sedentario (*C.*).

Regulus ignicapillus, *Fiorrancino*. Invernale (*D.*).

Ægithalus pendulinus, *Fiaschettone*. Scarso, avuto in settembre; è però nidificante (*D. A.*).

Digitized by Google

Acredula Irbyi, *Codibugnolo.* Sedentario e comune (*D. A. C.*).

Panurus biarmicus, *Basettino.* Scarso, nidificante al lago di Chiusi (*D.*); sedentario (*C.*).

Parus major, *Cingalina.* Comune e sedentaria (*D. A. C.*).

Parus ater. Invernale e scarsa (*D.*).

Cyanistes cæruleus, *Potazzina.* Comune e sedentaria (*D. A. C.*).

Poecile palustris, *Cincia bigia.* Poco frequente, cova alla Montagnola Senese (*D.*); sedentaria (*A.*).

Sitta cæsia, *Picchio bigio*, *Picchietto.* Comune e sedentario (*D. A. C.*).

Certhia brachydactyla, *Rampichino.* Comune e sedentario (*D. A. C.*).

Tichodroma muraria, *Picchio murajolo.* Non comune, ma sedentario (*D. A. C.*).

Oriolus Galbula, *Rigogolo.* Estivo, più abbondante all'arrivo in aprile che non in settembre (*D. A. C.*); ne vidi già nel mio orto il 20 marzo 1863 ed il 18 marzo 1875 (*D.*).

Lanius Excubitor, *Gazzina reale*, *Gueja gazzina reale.* Non comune in primavera, autunno ed inverno (*D.*); scarso in novembre e dicembre (*A.*).

Lanius minor, *Gueja gazzina*, *Gazzina.* Comune da aprile a settembre (*D. A.*).

Lanius Collurio, *Gueja cenerina*, *Gueja*, *Velia*,—*Scopina*, *Scopaiola*, *Ghierla* (Grosseto). Assai comune ed estiva (*D.*); non frequente (*A. C.*).

Lanius auriculatus, *Gazzina rossa*, *Velia rossa* o *Capirossa.* Comune ed estiva (*D. A. C.*).

Muscicapa collaris, *Balia.* Rara assai in aprile (*D.*); estiva (*A.*).

Butalis Grisola. Avuto in agosto e settembre; nel maggio trovai il nido colle uova al Monte Argentario (*D.*); estivo (*C.*).

Hirundo rustica, *Rondine.* Abbondante dal marzo al settembre (*D. A. C.*).

Chelidon urbica, *Balestruccio.* Abbondantissimo ed estivo, arriva e parte poco dopo la Rondine (*D. A. C.*).

Clivicola riparia. Estivo, abbondante, nidifica a colonie lungo l'Ombrone e la Bruna (*A.*).

Digitized by Google

Cotile rupestris. Ne ebbi uno dalla Maremma (*D.*).

Cypselus Apus, *Rondone.* Giunge abbondante circa un mese dopo la Rondine, parte in luglio, potrei dire con precisione dal 20 al 21 di quel mese, raramente si vede qualche giovane in agosto, sarebbero quelli di una seconda covata, che ha luogo quando è andata a male la prima; nei casi usuali fa una sola covata (*D.*); si vede anche in settembre (*A. C.*).

Cypselus Melba, *Rondone di mare.* L'ebbi dalla Maremma, cova tra le roccie del Monte Argentario (*D.*); vi giunge dai primi al 26 maggio e parte in luglio (*D. A. C.*).

Caprimulgus europæus, *Stiaccione, Succiacapre, Nottolone, Piattaione.* Estivo e comune (*D. A. C.*).

Picus major, *Picchio rosso maggiore.*[1] Raro nel Senese, comune in Maremma, sedentario (*D. A.*).

Picus medius, *Picchio rosso mezzano.* Scarso nella Maremma (*D.*).

Picus minor, *Picchio rosso minore.* Sedentario e comune in Maremma (*D. A. C.*).

Gecinus viridis, *Picchio, Picchio galletto, Gallinaccio, — Picchio cavallo* (Rapolano). Comune e sedentario (*D. A. C.*).

Iynx Torquilla, *Storcicollo.* Comune, specialmente estivo, ma anco sedentario (*D. A. C.*).

Cuculus canorus, *Cuccule.* Comune dall'aprile al settembre; gli adulti partono in agosto (*D. A. C.*).

Coccystes glandarius. Avuta una femmina in Siena il 25 aprilo 1873 (*D.*).

Alcedo Ispida, *Uccel Santa Maria.* Comune e sedentario (*D. A. C.*).

Coracias Garrula, *Ghiandaia marina.* Estiva, ma non comune (*D.*); di passo in agosto e settembre (*A.*); anche in aprile (*C.*).

Merops Apiaster, *Grottaione, Gorgoglione.* Comune dal maggio al settembre (*D. A. C.*).

---

[1] Il dott. Ademollo ricorda il *Dryocopus martius,* come di comparsa accidentale in Maremma; io ritengo che ciò dipende da qualche equivoco.

Digitized by Google

Upupa Epops, *Puppola.* Comune dall'aprile al settembre (*D. A. C.*).

Strix flammea, *Barbagianni.* Comune e sedentario (*D. A. C.*).

Syrnium Aluco, *Locco, Allocco.* Comune e sedentario (*D. A. C.*).

Asio Otus, *Allocco.* Non comune (*D. A.*); sedentario (*C.*).

Asio accipitrinus, *Allocco di padule.* Piuttosto comune (*D.*); sedentario (*A.*).

Athene Noctua, *Civetta.* Comunissima e sedentaria (*D. A. C.*).

Scops Giu, *Assiolo, Chiù.* Comune da aprile a settembre (*D. A.*).

Bubo maximus, *Gufo reale.* Sedentario, non comune (*D. A.*).

Circus aeruginosus, *Falco di padule.* Non comune (*D.*); sedentario (*A. C.*).

Circus cyaneus. Raro (*D.*); frequente e sedentaria (*A. C.*).

Circus cineraceus. Forse sedentaria, ma non comune (*A.*).

Circaëtus gallicus, *Biancone.* Poco frequente, cova al Monte Amiata (*D.*); sedentario (*A. C.*).

Pandion Haliaëtus. Accidentale, ne ebbi un solo nel settembre 1858 (*D.*); accidentale (*A.*).

Haliaëtus Albicilla. Di passo accidentale in Maremma (*D.*); ben di rado d'inverno lungo il mare (*A.*).

Aquila clanga. Accidentale (*D.*).

Nisaëtus pennatus. Accidentale, una fu presa il 19 ottobre 1830 presso Mondingegnoli (*D.*).

Archibuteo lagopus. Avuta una sola volta da Grosseto (*D.*); assai raro ne' rigidi inverni (*A.*).

Buteo vulgaris, *Astore, Falco gallinaio.* Comune e sedentaria (*D. A. C.*).

Pernis apivorus. Assai raro (*D.*); in primavera ed estate (*A.*).

Milvus Ictinus. Raro (*D.*); di scarso passo d'inverno (*A.*); sedentario (*C.*).

Milvus migrans. Ne ebbi uno nell'aprile 1864 (*D.*).

Falco Peregrinus, *Falcone.* Piuttosto raro, ma sedentario (*D. A.*).

Hypotriorchis Subbuteo, *Lodolaio.* Di passo in primavera e talvolta nidificante (*D.*); frequente ai due passi (*A.*).

Digitized by Google

Æsalon regulus, *Smeriglio.* Poco frequente, l'ebbi in novembre e dicembre (*D.*); raro autunnale (*A.*).

Cerchneis Tinnunculus, *Falco rosso*, *Falchetto da uccelli.* Comune assai e sedentario (*D. A. C.*).

Cerchneis Naumanni. Avuto il 10 maggio 1870 soltanto (*D.*); di passo irregolare in primavera (*A.*).

Cerchneis vespertinus, *Falco cuculo.* Di passo ora più, ora meno copioso in aprile, maggio e anche giugno (*D. A.*).

Astur palumbarius, *Astore.* Raro assai (*D.*); sedentario (*A. C.*).

Accipiter Nisus, *Falchetto*, *Falchetto fringuellaio.* Comune di autunno e d'inverno (*D.*); scarso di doppio passo (*A.*); sedentario (*C.*).

Vultur monachus. Di rara e casuale comparsa (*A.*).

Neophron Percnopterus, *Capovaccajo*, *Aquilotto.* Non comune, ma sedentario in Maremma (*D. A.*).

Pelecanus Onocrotalus, *Pellicano.* Accidentale, è stato ucciso lungo l'Arbia (*D.*); casuale dopo burrasche ad Orbetello, Burano e Castiglione della Pescaia (*A.*).

Phalacrocorax Carbo, *Marangone.* Comune e sedentario in Maremma (*D. A.*).

Ardea cinerea, *Nonna*, *Cecero.* Scarso od accidentale nel Senese, sedentario e comune in Maremma ove giunge anche in abbondanza per svernare (*D. A. C.*).

Ardea purpurea, *Ranocchiaja*, *Nonna rossa.* Di passo regolare in primavera (*D.*); estivo (*A. C.*).

Egretta alba, *Airone maggiore.* Accidentale, avuta in maggio (*D.*); rara, nell'inverno 1880 varie comparvero nel padule di Scarlino ne ebbi una (*A.*); passa in novembre (*C.*).

Egretta Garzetta, *Airone minore.* Estiva e nidificante nel padule di Castiglione della Pescaia (*D. A. C.*).

Ardeola ralloïdes. Di passo in marzo, aprile e maggio (*D.*); passa anche in autunno (*A.*).

Ardetta minuta, *Nonnotto.* Estivo e comune, in Maremma specialmente (*D.*).

Botaurus stellaris, *Cappone di padule.* Non comune, sedentario in Maremma, invernale nel Senese (*D.*); abbonda più in primavera ed autunno (*A. C.*).

Digitized by Google

Nycticorax griseus, *Pavoncella di padule.* Comune di passo in maggio; estivo e nidificante in Maremma, parte in settembre (*D.*); di passo specialmente in maggio (*A.*).

Ciconia alba. Accidentale, avuta in maggio (*D.*).

Ciconia nigra. Rarissima (*D.*).

Platalea Leucorodia. Ne ebbi due, uno in maggio 1854 da Castiglione, l'altro in aprile 1856 da Orbetello (*D.*).

Plegadis Falcinellus, *Mignattaio.* Di passo regolare in aprile e maggio, si trattiene circa un mese (*D. A.*).

Phœnicopterus roseus, *Fiammante.* Di comparsa accidentale (*D.*); dopo violenti burrasche da mezzogiorno (*A.*).

Cygnus Olor, *Cigno reale.* Di comparsa accidentale, nel gennaio 1845 ne comparvero 13 sul padule di Castiglione (*D.*); casuale d'inverno, uno fu ucciso sul lago di Orbetello (*A.*).

Cygnus musicus, *Cigno salvatico.* Accidentale, uno venne ucciso nel padule di Scarlino il 6 febbraio 1861 (*D.*); raro assai (*A.*).

Anser cinereus, *Oca paglietana.* Di passo invernale irregolare (*A.*); in novembre (*C.*).

Anser segetum, *Oca granajola.* Invernale, giunge a grossi branchi (*D. A.*).

Anser albifrons. Accidentale affatto (*D.*).

Tadorna cornuta. Di passo accidentale, avuta in febbraio e marzo (*D.*).

Anas Boscas, *Germano.* Sedentario in scarso numero nella Maremma, ed invernale in abbondanza (*D. A. C.*).

Chaulelasmus streperus, *Morigiana.* Invernale e comune in Maremma (*D.*).

Spatula clypeata, *Mestolone.* Invernale e di passo più o meno copioso in novembre e marzo (*D.*); passa anche in settembre (*A.*).

Dafila acuta, *Codona.* Non tanto comune nel marzo (*D.*); invernale (*A. C.*).

Mareca Penelope, *Fischione, Caporosso.* Comunissimo, specialmente in marzo in Maremma (*D.*); invernale (*A.*).

Digitized by Google

Nettion Crecca, *Barazzolo.* Sedentaria, ma abbondantissima nell' inverno (*D. A. C*).

Querquedula Circia, *Marzajola.* Meno abbondante, passa in marzo (*D.*); anche in febbraio (*A.*).

Fuligula rufina. Accidentale, avuto in dicembre (*D.*); scarso (*A.*).

Fulix ferina, *Moriglione.* Comune, invernale (*D. A.*).

Fulix Marila, *Moretta grigia.* Invernale e scarsa (*A.*).

Fulix Fuligula, *Moretta.* Invernale e comune (*D. A.*).

Fulix Nyroca. Non comune, avuta in marzo (*D.*); passa in novembre (*C.*); ed in marzo-aprile, qualche coppia nidifica in Maremma (*A.*).

Bucephala Clangula, *Morettone.* Invernale (*A.*).

Harelda glacialis. Accidentale in novembre (*A.*).

Œdemia fusca. Accidentale, avuto in dicembre e gennaio (*D. A.*).

Œdemia nigra. Di rara comparsa (*A.*).

Erismatura leucocephala. Accidentale nell'inverno (*A.*).

Mergus Merganser. Ebbi un maschio da Orbetello il 24 dicembre 1862 (*D.*); raro assai (*A.*).

Mergus Serrator. Raro (*D. A.*).

Mergellus Albellus, *Calcinaiola.* Non comune, rarissimi gli adulti; giunge in novembre e parte in febbraio (*D.*); alla foce dei fiumi da gennaio a marzo (*A.*).

Columba Palumbus, *Colombaccio.* Sedentario e di passo copioso in ottobre e marzo (*D. A. C.*).

Columba Oenas, *Colombella.* Anco sedentaria, abbondante da ottobre a marzo, ne vidi di passo all'isola del Giglio anche in maggio; ebbi i nidiacei dal Senese e dalla Maremma nel 1858 e nel 1885, ma il caso non è usuale (*D.*); passa anche in settembre (*A. C.*).

Columba livia. Sedentario tra le rupi del Monte Argentario (*D. A.*).

Turtur tenera, *Tortola boscajola.* Comune da aprile a settembre (*D. A. C.*).

Perdix rufa, *Pernice.* Comune e sedentaria ai monti (*D. C.*).

Starna Perdix, *Starna.* Comune e sedentaria; quelle che co-

Digitized by Google

vano sul Monte Amiata, scendono in basso col freddo, dicesi siano una razza più piccola (*D.*); non tanto comune in Maremma (*A. C.*).

Coturnix communis, *Quaglia.* Comune dall'aprile al settembre, alcune svernano; il grosso del passo primaverile è tra la metà d'aprile e quella di maggio; in agosto cominciano a partire i giovani più robusti coi genitori, i giovani della seconda covata sono gli ultimi a partire. Al Monte Argentario ne uccisi in dicembre e gennaio (*D.*); anche sedentaria (*A. C.*).

Rallus aquaticus, *Gallinella.* Comune e sedentaria in Maremma (*D. A.*); anche di passo in ottobre (*C.*).

Ortygometra Porzana, *Voltolino.* Comune dal marzo al settembre (*D.*); passa abbondante in primavera (*A. C.*).

Ortygometra Bailloni, *Schiribilla.* Passa in aprile (*A.*).

Ortygometra parva, *Schiribilla.* Passa in aprile (*D. A. C.*).

Crex pratensis, *Re di Quaglie.* Piuttosto scarso (*D.*); di doppio passo (*A. C.*).

Gallinula chloropus, *Fiumalbo, Gianfruscola.* Comune in Maremma (*D.*); specialmente al passo primaverile (*A.*); passa in ottobre (*C.*).

Fulica atra, *Folaga.* Comune e sedentaria (*D. A. C.*); molte giungono d'inverno (*A.*).

Grus communis, *Grue.* Di passo irregolare, avuta in marzo e dicembre (*D.*); ora scarsa ora frequente (*A.*).

Otis Tarda, *Otarda.* Accidentale, si ebbe un solo preso a Lucignano d'Arbia il 5 febbraio 1842 (*D.*); casuale nell'inverno (*A.*).

Otis Tetrax, *Gallina prataiola.* Rara assai, una venne uccisa nel Senese il 20 dicembre 1878 (*D.*); accidentale d'inverno (*A.*).

Œdicnemus scolopax, *Tallurino, Corrisodo.* Comune nelle *crete* ove cova (*D.*); sedentario (*A.*).

Cursorius gallicus. Accidentale affatto (*A.*).

Charadrius Pluvialis, *Piviere.* Invernale e di passo nel marzo (*D.*); giunge a branchi in ottobre e rimane sino ad aprile (*A.*).

Digitized by Google

Squatarola helvetica. Scarsa nell'inverno (*A.*).

Eudromias Morinellus. Raro, avuto in settembre e novembre (*D.*); invernale e scarso (*A.*).

Ægialitis curonica, *Corriere piccolo.* Non comune (*D.*); sedentario (*A.*).

Ægialitis cantiana. Scarso (*A.*).

Ægialitis Hiaticula, *Corriere grosso.* Piuttosto raro, avuto in maggio (*D.*); di passo abbondante in maggio e anche sedentario (*A.*).

Chettusia gregaria. Un solo fu preso presso Montepulciano nell'aprile 1856 (*D.*).

Vanellus Capella, *Fifa, Miccola.* Invernale e comune in Maremma (*D. A. C.*).

Strepsilas Interpres. Rarissimo, avuto nel maggio 1847 da Orbetello (*D.*); accidentale (*A.*).

Hæmatopus Ostralegus, *Beccaccia di mare.* Rara, avuta in marzo (*D.*); accidentale nell' inverno e primavera (*A.*).

Himantopus candidus, *Cavalier d' Italia.* Raro in primavera (*D.*); di passo irregolare in maggio e giugno (*A.*).

Pelidna subarquata, *Piovanello pancia rossa.* Comune di passo in primavera (*D.*); sverna e giunge in maggio a grossi branchi (*A.*).

Pelidna alpina, *Piovanello pancia nera.* Non comune (*D.*); giunge in autunno e sverna (*A.*).

Actodromas minuta, *Gambecchio.* Comune in primavera (*D.*); passa in maggio e ripassa in settembre (*A.*).

Actodromas Temmincki. Passa in maggio (*A.*).

Tringa Canutus. Passa in aprile (*A.*).

Calidris Arenaria. Rara (*A.*).

Machetes Pugnax, *Gambetta.* Di passo regolare in marzo ed aprile (*D. A.*).

Tringoïdes Hypoleucus, *Beccapesci, Quaglia marina.* Non comune, nidifica in Maremma (*D.*); estivo (*A.*).

Totanus Ochropus, *Beccapesci.* Comune, veduto anche in agosto e settembre; fui assicurato che cova in Val d'Orcia (*D.*); di doppio passo e nidificante (*A.*).

Digitized by Google

Totanus Glareola, *Beccapesci.* Non comune (*D.*); giunge in aprile a branchi e rimane l' estate (*A.*).

Totanus Calidris, *Gambetta.* Non comune, avuta in febbraio e marzo (*D.*); passa in primavera, è rara (*A.*).

Totanus stagnatilis. Scarso in primavera (*A.*).

Totanus fuscus, *Gambetta.* Non comune, avuta in febbraio e marzo (*D.*); passa in primavera (*A.*).

Totanus nebularius, *Gambetta.* Scarsa, avuta in febbraio (*D.*); estiva e non comune (*A.*).

Limosa melanura, *Pittima.* Non comune (*D.*); passa in autunno ed in marzo-aprile (*A.*).

Limosa rufa. Rara, avuta in settembre ed il 29 agosto (*D.*); accidentale d' estate (*A.*).

Scolopax Rusticula, *Beccaccia.* Invernale in Maremma, di passo dalla metà di novembre alla metà di dicembre e nel marzo ed aprile nel Senese; raramente vedonsene in settembre ed ottobre (*D.*); giunge alla metà di dicembre, pochi svernano, ripassa in marzo (*A. C.*).

Gallinago major, *Croccolone.* Di passo regolare in maggio (*D.*); passa irregolare in ottobre-novembre ed aprile-maggio (*A. C.*).

Gallinago cælestis, *Beccaccino reale.* Di doppio passo nel Senese, invernale in Maremma; è però specie che si vede dal luglio all' aprile da noi (*D. A. C.*).

Gallinago Gallinula, *Frullino.* Di doppio passo (*D.*); invernale (*A. C.*).

Numenius Arquata, *Chiurlo maggiore.* Non comune di passo (*D.*); giunge in ottobre e riparte alla metà di aprile (*A.*).

Numenius tenuirostris, *Ciurlottello.* Scarso, avuto in febbraio ed aprile (*D.*); raro (*A.*).

Numenius Phæopus, *Chiurlo piccolo.* Scarso (*D.*); giunge in ottobre e parte alla metà di aprile (*A.*).

Glareola Pratincola, *Pernice di mare.* Di passo quasi regolare in maggio, specialmente in Maremma (*D.*); è estiva e passa anche in autunno (*A.*).

Thalasseus cantiacus. Raro assai, avuto nell' inverno del 1886 dalla Maremma (*D.*).

Digitized by Google

Gelochelidon anglica. Scarso (*A.*).

Sterna fluviatilis. Non comune (*D. A.*).

Sternula minuta. Non comune (*D. A.*).

Hydrochelidon hybrida. Raro in primavera (*A.*).

Hydrochelidon leucoptera. Passa in maggio ed in agosto (*A. C.*).

Hydrochelidon nigra, *Mignattino.* Di passo regolare in maggio ed agosto (*D. A.*).

Chroocephalus minutus. Comune in Maremma (*D.*); invernale (*A.*).

Chroocephalus melanocephalus. Avuto in maggio e dicembre da Orbetello (*D.*); scarso (*A.*).

Chroocephalus ridibundus, *Gabbiano, Francolo.* Comune in Maremma (*D.*); sedentario, ma specialmente invernale (*A.*).

Rissa tridactyla. Raro (*D.*).

Larus canus. Comune (*D.*); e sedentaria (*A.*).

Larus fuscus. Scarso in Maremma (*D. A.*).

Larus cachinnans, *Gabbiano reale.* Avuto in novembre (*D.*); sedentario (*A. C.*).

Stercorarius pematorhinus. Accidentale (*D. A.*).

Stercorarius crepidatus. Accidentale (*A.*).

Puffinus Kuhli, *Berta.* Sedentaria, raramente si scosta dal mare (*A.*).

Puffinus anglorum. Non comune sul mare (*A.*).

Utamania Torda. Sconosciuta o quasi per lo innanzi, capitò in gran numero verso il Natale 1885, lo stagno di Orbetello ed il mare intorno all' Argentario ne erano coperti (*D.*); accidentale (*A.*).

Fratercula arctica. Accidentale (*A.*).

Colymbus glacialis. Invernale, rarissima (*A.*).

Colymbus arcticus. Rara d' inverno (*A.*).

Colymbus septentrionalis, *Strolaga.* Invernale (*D. A.*).

Podiceps cristatus, *Suasso.* Comune (*D.*); i giovani stazionari (*A.*).

Podiceps nigricollis, *Suasso piccolo, Crocchiotto.* Comune (*D.*); invernale (*A.*).

Podiceps fluviatilis, *Tuffetto, Brinzo.* Comune (*D.*); sedentario (*A.*).

Digitized by Google

Grosseto, isola del Giglio (Bianchi dott. Onorato):

Il distretto di cui è parola, è un' isola dell' arcipelago Toscano situata ad 8 miglia marine S. S.O. dal Monte Argentario.

Misura una circonferenza di circa 23 chilometri, con limite al mare; è di natura rocciosa molto accidentata, quasi per intiero granitica se si eccettui una piccola porzione di natura calcarea e tutta ricoperta di bosco ad Ovest. Per un terzo circa l' isola è coperta di bosco costituito da Eriche, Corbezzoli, Lentisco e Leccio, il rimanente è coltivato a vigna o destinato a sementa di legumi e cereali.

Elenco delle specie di uccelli osservate sull' isola di Giglio, provincia di Grosseto, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione, ec., ec. [1]

Corvus Corax, *Corvo.* Sedentario.
Sturnus vulgaris, *Storno.*
Fringilla coelebs, *Fringuello.* Passa in ottobre.
Passer Italiæ, *Passerotto.* Sedentario e nidificante.
Petronia stulta, *Passera lagia.*
Ligurinus Chloris, *Verdone.*
Carduelis elegans, *Cardellino.* Sedentario e nidificante.
Serinus hortulanus, *Raperino.*
Cannabina Linota, *Faringuello.* Sedentario.
Miliaria Projer, *Strillozzo.*

---

[1] La piupparte delle specie in questo elenco sono per l'isola immigratori i quali vi si trattengono un giorno o poco più. (*Bianchi*).

Digitized by Google

Emberiza Cirlus, *Zigolo.* Sedentario e nidificante.
Emberiza Hortulana, *Ortolano.*
Calandrella brachydactyla, *Lodola.*
Alauda arborea, *Lodola.* Passa in aprile, abbondante.
Alauda arvensis, *Lodola.* Passa in aprile, abbondante.
Agrodroma campestris, *Lodolicchio.* Passa in settembre.
Anthus pratensis, *Pispola.*
Budytes flavus, *Prispola.*
Budytes cinereocapillus, *Prispola.*
Calobates melanope, *Prispola.*
Saxicola Oenanthe, *Codibianco.* Passa in aprile ed agosto-settembre, abbondante.
Saxicola albicollis, *Codibianco.* Passa in aprile, non scarsa.
Saxicola Stapazina, *Codibianco*, *Pietrino.* Passa in aprile.
Saxicola melanoleuca, *Codibianco*, *Pietrino.* Passa in aprile.
Monticola saxatilis, *Codirosso reale.* Passa nella prima metà di settembre.
Monticola Cyanus, *Merla.* Sedentaria e nidificante.
Merula nigra, *Merlo.* Passa in ottobre e novembre, abbondante.
Turdus pilaris, *Tordo.* Di scarso passaggio.
Turdus iliacus, *Tordo.*
Turdus musicus, *Tordo.* Passa nella prima metà di marzo ed in ottobre-novembre, abbondante.
Turdus viscivorus, *Tordessa.* Passa dalla metà di ottobre alla metà di novembre.
Aëdon Luscinia, *Usignolo.* Passa nella seconda metà di aprile, abbondante.
Erithacus Rubecula, *Pettirosso.* Passa ai primi di marzo ed in settembre-ottobre, abbondante.
Ruticilla Phœnicurus, *Codirosso.* Passa in maggio, abbondante.
Ruticilla titys, *Codirosso.* Non raro di passo.
Pratincola Rubicola, *Scoterzolo.* Passa nella seconda metà di aprile, abbondante.
Pratincola Rubetra, *Scoterzolo.* Passa nella seconda metà di aprile, ed in settembre, abbondante.
Sylvia cinerea, *Gricciaiola.* Sedentaria e nidificante.

Digitized by Google

Sylvia subalpina, *Gricciaiola*. Sedentaria e nidificante.
Monachus Atricapillus, *Gricciaiola*. Passa in maggio.
Pyrophthalma melanocephala, *Gricciaiola*.
Melizophilus undatus, *Gricciaiola*. Sedentaria.
Phylloscopus sibilator, *Luì*.
Phylloscopus Trochilus, *Luì*.
Phylloscopus rufus, *Luì*.
Troglodytes parvulus, *Re di macchia*.
Accentor modularis, *Passera macchiaiola*.
Regulus cristatus.
Regulus ignicapillus.
Tichodroma muraria, *Uccello muratore*. Sedentario.
Oriolus Galbula, *Gregorio*. Passa in maggio.
Lanius Collurio, *Capigrosso*. Nidificante ed estiva.
Lanius auriculatus, *Capirosso*.
Muscicapa collaris, *Sarchianaccio*. Scarsa ed estiva.
Hirundo rustica, *Rondinella*. Passa abbondante.
Chelidon urbica, *Balestruccio*. Passa abbondante.
Cotile rupestris, *Rondine d' inverno*.
Cypselus Apus, *Moracchiolo*. Estivo e nidificante.
Cypselus Melba, *Rondone*. Estivo e nidificante.
Caprimulgus europæus, *Dormiglione*. Passa in aprile e maggio, anco nidificante.
Iynx Torquilla, *Giracollo*. Passa in maggio e giugno.
Cuculus canorus, *Cu-cù*. Passa in maggio.
Coracias Garrula, *Uccello turco*. Raro.
Merops Apiaster, *Acquaiolo*. Passa in maggio e giugno.
Upupa Epops, *Bumbola*. Passa dalla metà di marzo a quella d'aprile e nella prima quindicina di settembre.
Athene Noctua, *Civetta*. Sedentaria e nidificante.
Circaëtus gallicus. Nidificante.
Buteo vulgaris, *Nibbio*. Nidificante.
Milvus migrans, *Nibbio*.
Falco Peregrinus, *Falco reale*. Sedentario e nidificante.
Hypotriorchis Subbuteo, *Canivello*. Sedentario e nidificante.[1]

---

[1] Temo vi sia qui un errore nella determinazione.

Digitized by Google

Cerchneis Tinnunculus, *Falchetto.* Sedentario.
Neophron Percnopterus, *Baccalotto.* Nidificante.
Ardea purpurea. Raro.
Egretta alba. Rara.
Phœnicopterus roseus. Accidentale, veduto due volte in seguito a burrasche.
Anser segetum, *Oca selvatica.*
Anas Boscas, *Germano.*
Columba Palumbus, *Piccione.* Passa abbondante in marzo ed ottobre.
Columba Oenas, *Colombella.* Passa in ottobre, abbondante.
Columba livia, *Piccione marino.* Sedentario e nidificante.
Turtur tenera, *Tortola.* Passa in maggio, abbondante.
Coturnix communis, *Quaglia.* Passa in maggio e giugno e nella prima metà di settembre, abbondante.
Rallus aquaticus, *Gallinella.*
Œdicnemus scolopax, *Piviere reale.*
Charadrius Pluvialis, *Piviere.*
Tringoïdes Hypoleucus, *Quaglia marina.*
Scolopax Rusticula, *Beccaccia.* Passa tra la metà di febbraio e quella di marzo e nella seconda quindicina di ottobre e di novembre, abbondante.
Gallinago major, *Coccolone.* Raro.
Gallinago cælestis, *Beccaccino.* Scarso.
Larus cachinnans, *Gabbiana.*
Puffinus Kuhli, *Fallante.* Sedentaria.
Puffinus anglorum, *Fallante.* Sedentaria.
Utamania Torda, *Sottanello.* Invernale.

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli osservate in Toscana, con notizie sulla frequenza, intorno alle migrazioni, alla nidificazione ecc., ecc.[1]

Corvus Corax. Sedentario, scarsissimo, vive sui contrafforti dell' Appennino e non scende al piano. Nel 1883 vidi due giovani nidiacei catturati nei pressi di Barberino (Mugello).

Corvus Cornix. Sedentaria, scarsa, non rara in inverno per i branchi di individui immigranti.

Corvùs frugilegus. Invernale, abbondante al piano ed ai monti.

Pica rustica. Sedentaria, abbondante, ho veduto una coppia nidificare quattro anni di seguito sulla medesima pianta di noce. Nel 1883 i piccoli uscirono dal nido il 21 maggio, nel 1885 il 27 dello stesso mese ed erano 4 individui.

Garrulus glandarius. Sedentaria, comunissima. Non torna mai a nidificare nel nido di cui si è una volta servita.

Pyrrhocorax alpinus. Sedentario, comunissimo in alcune montagne dell'Alpi Apuane dove è gregario; vive e nidifica in luoghi inaccessibili all'Uomo.

Sturnus vulgaris. Sedentario, abbondante all'epoca del passo, non l' ho mai veduto nidificante.

Pastor roseus. Di passaggio irregolare, scarso; ho veduto varie volte i giovani catturati sempre nell' ottobre o nel novembre, non ho mai veduto adulti catturati da noi.

Fringilla cœlebs. Sedentario, comunissimo ed abbondantissimo, specialmente nel passo; qualche volta le femmine giungono prima dei maschi. Fanno il nido sempre colle

[1] Questo elenco è compilato dal dott. A. D. Roster ed è il risultato di più anni di osservazioni.

Digitized by Google

stesse erbe e coi medesimi muschi in modo da renderlo caratteristico.

Fringilla Montifringilla. Sedentaria, abbondante nel tempo del passo; nidificante nel Casentino e nell'Appennino pistoiese, dove non è rara.

Petronia stulta. Sedentaria, abbondante; i voli immensi che vengono a noi dalle Marche, mi fanno credere che nidifichi in quelle regioni insieme ai Frosoni.

Passer montanus. Sedentaria, abbondantissima, non di rado gregaria.

Passer Italiæ. Sedentaria, abbondantissima.

Coccothraustes vulgaris. Sedentaria, abbondante; ha nidificato nel 1885 nei pressi di Firenze. I giovani son chiamati dai cacciatori « Frusoni scopini » e considerati come specie distinta che passa, al dire di essi, prima dei veri Frosoni, non fa meraviglia che i giovani prevalendo per numero dian luogo a questo creduto primo passo autunnale.

Ligurinus Chloris. Sedentario, abbondante. Nell' Appennino pistoiese ho veduto abbondantissimi i giovani nel settembre 1885.

Chrysomitris Spinus. Sedentario, scarso, ma nel tempo del passo, alcuni anni, abbondantissimo; ho veduto un giovane catturato nell'agosto a Vallombrosa e che evidentemente era nato in quei dintorni. Non credo che alcuni anni non passi altri sì, sebbene per il numero ora scarso ora abbondantissimo, abbia dato luogo alla nota idea dell'intermittenza.

Carduelis elegans. Sedentario, abbondantissimo. I maschi conosciuti col nome « di Cardellini lombardi », passano separati dalle femmine e dai giovani.

Serinus hortulanus. Sedentario, abbondante. Nel 1884 notai un nido coi piccoli implumi il 21 agosto.

Cannabina Linota. Sedentario (?), abbondante. Credo, non posso però affermarlo di mia esperienza, che nidifichi in alcuni luoghi della Toscana (San Miniato, Empoli).

Carpodacus erythrinus. Di passo irregolare, scarsissimo, pure

Digitized by Google

tutti gli anni credo che qualche giovane venga da noi nel settembre ed ottobre.

Pyrrhula europæa. Sedentario, comune; nidifica indistintamente sui nostri monti.

Loxia Curvirostra. Di passo irregolare, abbondante più o meno secondo le annate.

Miliaria Projer. Sedentario, abbondante nei luoghi bassi, scarso sui monti. Nidifica nell'aprile ed è tra i primi a deporre le uova in numero di 7 od 8.

Emberiza Citrinella. Sedentario ed abbondante, nidifica ai monti.

Emberiza Cirlus. Sedentario e meno abbondante della precedente, nidifica nel maggio, giugno e luglio; io ne ho veduto i giovani alla Consuma (Casentino) il 17 luglio 1884.

Emberiza Hortulana. Specie estiva per la Toscana. Nidificante in gran copia sui nostri monti.

Emberiza Cia. Sedentario, e non scarso nel tempo del passo.

Emberiza Schœniclus. Comune e sedentario in alcuni luoghi della Toscana; nell'inverno capita sul mercato di Firenze a ceste di varie centinaia a cui sono uniti individui della forma *E. intermedia.*

Emberiza pyrrhuloïdes. Comune e sedentaria. La forma *E. intermedia*, per me, è rappresentata da individui di passo, ma non da ibridi.

Melanocorypha Calandra. Specie sedentaria localizzata e di passo irregolare per la Toscana. Scarsissima sui nostri monti. Ne ho veduti varii individui nel maggio 1883 sopra Compiobbi.

Calandrella brachydactyla. Scarso da noi e di passo regolare; in primavera si ferma qualche volta nei nostri prati e sui nostri monti. È eminentemente gregario.

Alauda arborea. Sedentaria, abbondante; nidifica al monte.

Alauda arvensis. Sedentaria, abbondante; nel tempo del passo è la specie più comune. V'è chi distingue la forma stazionaria più piccola, più colorita e che canta con gorgheggi più modulati, dalla forma gregaria di

Digitized by Google

passo da noi, ciò va attribuito a che noi uccidiamo le giovani stazionarie e ne sentiamo il canto giovanile.

Galerita cristata. Comune e stazionaria in tutta la Toscana al monte ed al piano.

Agrodroma campestris. Specie estiva, abbondante, irregolarissima nelle migrazioni. Giunge in aprile, fa due covate e nell'agosto un gran numero riparte, generalmente rimangono i giovani della 2ª covata che alla apertura di caccia sono appena impennati. Nel 1881 vidi sul mercato di Firenze un individuo d'*A. campestris* ucciso il 21 marzo; il 17 novembre 1886 ne ho ucciso uno perfettamente sano presso Signa. Nel 1884 fu abbondantissima. Nel 1885 e 1886 scarsa.

Anthus pratensis. Specie di passo autunnale abbondante.

Anthus cervinus. Specie di passo scarsissimo, ma io credo regolare; ogni anno qualche esemplare si vede da noi.

Anthus trivialis. Comunissimo, estivo; nidificante nei nostri monti dai quali scende al piano nell'agosto e settembre.

Anthus Spipoletta. Comune all'epoca dei due passi autunnale e primaverile, nell'inverno 1884 ebbi un numero grandissimo di individui dal Mugello, generalmente negli ultimi anni è stata specie scarsa.

Budytes flavus. Specie comunissima, abbondante nel passo primaverile, scarsa nell'autunnale.

Motacilla alba. Abbondante, sedentaria. Durante il passo non è gregaria, ma quando si è stabilita in un luogo lo diviene per modo che la sera si riunisce in branchi di varie centinaia per andare all'albergo.

Calobates melanope. Abbondante, sedentaria; nell'estate sta al monte, alla cattiva stagione scende alla pianura.

Saxicola Oenanthe. Abbondante in estate, nidifica e riparte prestissimo.

Saxicola Stapazina. Scarsa nel passo primaverile, qualche esemplare viene spesso colto nei dintorni di Firenze.

Monticola saxatilis. Specie estiva, nidificante abbondantemente in Mugello e nel Chianti.

Digitized by Google

Monticola Cyanus. Sedentaria, comunissima nei luoghi abitati, fa tre covate.

Merula nigra. Sedentario, comunissimo, nell'epoca del passo giungono numerosissime femmine col petto color ruggine che vengon dette « Merle forestiere »; son frequentissimi isabellismi ed albinismi totali e parziali.

Merula torquata. Sedentario, non raro in inverno, è l'ultima specie a passare, si cattura non infrequente coi branchi di *T. pilaris;* in estate è scarsissimo.

Turdus pilaris. Specie invernale, comunissima in alcune annate in altre rara, nel 1884 fu oltremodo abbondante; nelle annate fredde è sempre più frequente che in quelle miti perchè il freddo e la neve la costringono a scendere al piano.

Turdus iliacus. Specie invernale comunissima, passa in ottobre preceduta dalla specie seguente.

Turdus musicus. Specie sedentaria, abbondantissima al tempo del passo.

Turdus viscivorus. Specie sedentaria, è la prima che da noi metta mano al nido ed allevi i piccoli, io ne ho veduti i giovani ai primi di marzo 1884.

Aëdon Luscinia. Specie estiva, comune, se non vi fossero i Gatti che ne sono acerrimi nemici; qualche individuo svernerebbe da noi, io ne ho ucciso nel novembre (21) un bellissimo esemplare nei dintorni di Firenze; nel piano d'Ema mi si disse che era rimasto anche fino a metà di dicembre.

Erithacus Rubecula. Sedentario, comunissimo; i nostri che hanno nidificato, scendono i primi al piano e servono di avanguardia agli esteri che costituiscono il vero passo e che li seguono a 7 od 8 giorni di distanza.

Cyanecula Wolfi. Specie non scarsa da noi al piano in primavera ed autunno.

Ruticilla Phoenicurus. Specie estiva, comunissima al monte.

Ruticilla titys. Specie sedentaria, ma scarsa; in inverno scende al piano insieme agli individui di passo.

Pratincola Rubicola. Comunissimo, sedentario, nidifica nella

Digitized by Google

borraccina dei balzi, dei boschi, appena appena intrecciando due crini o due pagliuzze; fa tre covate.

Pratincola Rubetra. Specie estiva non scarsa.

Sylvia orphæa. Specie estiva, abbondante in Toscana specialmente nei dintorni di Firenze ed in Mugello; ne ho avuti esemplari da questa ultima località anche ad ottobre inoltrato.

Sylvia cinerea. Specie estiva comunissima, alleva due covate senza cambiar nido, rifacendolo solo.

Sylvia Curruca. Specie estiva scarsissima; ne ho avuti 3 individui, 2 dal Mugello, 1 dai dintorni di Firenze.

Sylvia subalpina. Specie estiva, non rara. Nidifica.

Sylvia conspicillata. Specie estiva, rara da noi. Nidifica.

Monachus Atricapillus. Comunissima, sedentaria. Fa tre covate, ma non sempre.

Monachus hortensis. Specie comunissima da noi al tempo del passo; non ho mai veduto il nido nè i giovani, però venni assicurato che in Mugello nidifica non raramente, facendo due covate nel medesimo nido.

Pyrophthalma melanocephala. Sedentaria, comune. Nidifica abbondantemente nei nostri boschi, fa una sola covata. I giovani si allontanano appena impennati e lasciano i genitori che rimangono appaiati anche nell'inverno.

Melizophilus undatus. Comune, sedentaria. Nidifica nei nostri boschi dove rimane tutto l'inverno senza muoversi dalle piante nelle quali ha nidificato.

Phylloscopus sibilator. Specie estiva, non rara da noi e nidificante.

Phylloscopus Trochilus. Specie estiva, meno frequente della precedente. Nidifica.

Phylloscopus Bonellii. Specie estiva, non rara nei dintorni di Firenze e nel Mugello dal quale ogni mattina venivano sul mercato 4 o 5 individui. Nel 1885 potei osservare una coppia nidificante sopra un alto albero, lungo il fiume Ema. Il nido era già pronto alla fine di aprile, i piccoli uscirono dopo 24 o 25 giorni ed erano quattro, mi impadronii di uno, ma non fu possibile

Digitized by Google

imbalsamarlo; nel luglio scomparvero di là e non potei averne più traccia, il fischio differisce da quello delle specie affini per essere più sottile e ripetuto per varie volte.

Phylloscopus rufus. Specie comune da noi specialmente in ottobre.

Hypolais polyglotta. Non raro in aprile e maggio, credo che poche coppie rimangano a nidificare.

Cisticola cursitans. Frequentissimo nei luoghi paludosi. Alle bocche del Calambrone, in pochi cespuglietti di canne, ne avrò veduti 50 individui.

Troglodytes parvulus. Sedentario ed abbondantissimo; scendono dal monte al piano alle prime nevi insieme ai *Parus*, agli *Erithacus* ecc.

Cinclus aquaticus. Sedentario, abbondante lungo i corsi di acqua delle nostre montagne. Ne ho uccisi molti giovani nella Romagna cercando di trovare qualche esemplare che corrispondesse alle forme *C. albicollis* e *C. melanogaster*, ed ho sempre trovato, specialmente nei giovani, una tendenza marcatissima alla forma *C. albicollis* che io credo debba ritenersi dovuta esclusivamente all'età. Per quanto io mi sappia, non si è mai notato un tale aumento di individui da poter pensare ad una immigrazione d'oltr' Alpe.

Accentor collaris. Sedentario, comune; scende al piano in inverno scacciato dalla presenza delle nevi. Nel 1881-1882 ne ho avuti 37 individui: 9 nel novembre, 13 nel dicembre, 10 nel gennaio, 5 nel febbraio; nel 1882-1883 13 individui: 6 nel novembre, 5 nel dicembre, 2 nel febbraio; nel 1883-1884 4 individui: 1 nel novembre, 3 nel dicembre; nel 1884-1885 23 individui: 11 nel novembre, 2 nel dicembre, 7 nel gennaio, 3 nel febbraio; nel 1885-1886 19 individui: 7 nel novembre, 1 nel dicembre, 7 nel gennaio, 4 nel febbraio; nel 1886-1887 31 individui: 15 nel novembre, 7 nel dicembre, 8 nel gennaio, 1 nel febbraio. Gli esemplari notati sono tutti quelli capitati sul mercato di Firenze e dei quali tenevo strettissimo conto.

Digitized by Google

Accentor modularis. Sedentaria, comunissima. Io l'ho osservata nidificante sui nostri monti (Appennino pistoiese), quando nel luglio 1885 osservai due giovani appesi a degli archetti tesi in una vasta e splendida tenuta della Casa Reale, se non erro, che si estende al di sopra di San Marcello pistoiese fin verso il lago Scaffaiolo ed il Corno alle Scale.

Regulus cristatus. Comune, sedentario, nidificante.

Regulus ignicapillus. Comune, sedentario, nidificante.

Acredula rosea. Rarissima, di passo invernale; dati basati sopra un individuo ucciso nel settembre 1881 e donato al prof. Giglioli.

Acredula Irbyi. Comune, sedentario; va sempre di valle in valle a piccoli branchetti di 7 od 8 individui, forse nidiata per nidiata.

Parus major. Comune, sedentaria; nel 1883 osservai una coppia che covò 3 nidiate: la prima nel maggio di 5 o 6 individui, la seconda nel luglio di 3 soli individui, la terza nel settembre composta di 5 uova, non potei seguire l'andamento della covata, ma mi riferirono che 3 nacquero e 2 uova furono infeconde.

Parus ater. Comune, sedentaria, nidificante sui nostri monti; nel 1884 ci fu in Toscana quasi un'invasione di questa specie.

Cyanistes cæruleus. Comunissima e sedentaria; nidifica in ammassi di borraccine nel centro delle quali depone le uova.

Pœcile palustris. Non rara sul mercato di Firenze, però vien quasi sempre dalla bassa Italia, qualche volta ne ho veduti esemplari uccisi nei pressi della città. Ho osservato un solo nido con 5 piccoli, nel Mugello l'8 di agosto 1884.

Sitta cæsia. Comune e sedentario ovunque.

Certhia brachydactyla. Comune, sedentario al piano ed al monte. Passa da noi nella seconda metà di settembre e nei primi di ottobre in branchetti di 2 a 4 individui, forse covata per covata; gli individui stazionarii

Digitized by Google

non abbandonano mai il luogo ove son nati o che hanno scelto, e tornano tutti i giorni a ripetere il giro delle loro piante cominciando dalla base e salendo a spirale fino in cima, di là si gettano al piede della pianta vicina; se vengono tormentati fuggono tornando poco dopo sui loro passi.

Tichodroma muraria. Raro in Toscana, io ne ho veduto un solo esemplare rampicare in città sulle mura di San Lorenzo nel 1882.

Oriolus Galbula. Comunissimo ed estivo; però arriva in Toscana sempre alla metà d'aprile, raramente prima, riparte colla prole allevata alla fine di settembre.

Lanius Excubitor. Scarsa e invernale da noi; nel 1883-1884 fu abbondantissima specialmente in Mugello, l'anno dopo appena se ne vide qualche esemplare.

Lanius minor. Specie estiva, comune. Nidifica da noi facendo 2 covate di 4 o 5 uova ciascuna.

Lanius Collurio. Specie estiva, comune più della precedente, ha istinti feroci quasi da rapace.

Lanius auriculatus. Comune, estiva. Nel 1884, il 27 novembre, due esemplari vennero dal Mugello sul nostro mercato, un altro esemplare fu ucciso il 17 dicembre 1886 nello stesso luogo.

Muscicapa collaris. Rara.

Muscicapa Atricapilla. Comune, specialmente nel Mugello, dove cova abbondantemente; è specie che alle prime pioggie parte dai nostri monti, raramente si ferma al piano.

Butalis Grisola. Comunissimo ai monti in estate. Alleva quasi sempe due covate di 4 piccoli.

Hirundo rustica. Comune in estate. Giunge da noi solitamente il 18 o 20 di marzo e secondo un detto Toscano, per San Benedetto (24 marzo) la Rondine è sul tetto. Nel 1883 io vidi le 2 prime Rondini il giorno del varo della *Lepanto*, 19 marzo, sulla spiaggia dell'Antignano, da quel giorno quasi non ne vidi altri individui fino al 15 aprile. La partenza delle Rondini avviene

Digitized by Google

sempre alla metà d'ottobre, dopo la quale epoca io non ne ho mai vedute.

Hirundo rufula. Rarissima. Un solo individuo veduto nel luglio 1883 in Casentino sui fili telegrafici presso Romena.

Chelidon urbica. Comunissimo d'estate da noi, spesso ritarda la sua venuta, ma più facilmente ritarda la partenza fino ai primi di novembre ed anche dopo.

Chelidon cashmiriensis. Rarissimo, accidentale; uccisi un individuo che è il primo catturato in Italia, in un branchetto di 15 o 20 individui il 13 ottobre 1885.

Clivicola riparia. Comune, estivo, credo che sia l'ultima specie ad arrivare da noi.

Cypselus Apus. Comunissimo, giunge alla fine di marzo, fa due covate e si ritira ai monti alle fresche pasture il 10 o 15 d'agosto, parte prestissimo.

Caprimulgus europæus. Comunissimo in estate, cova facendo generalmente 2 uova sole. So di un esemplare ucciso in Mugello il 21 novembre 1883.

Picus major. Comune e sedentario.

Picus medius. Rarissimo; sul mercato vengono non di rado esemplari, ma sono tutti uccisi a Foggia, ove sembra essere frequente.

Picus minor. Comune, sedentario, molto localizzato; in alcuni luoghi raro.

Gecinus viridis. Comunissimo, sedentario; ne ho avuti 2 individui in cui il giallo del sopraccoda era perfettamente aranciato, sembra non rara questa forma nei boschi della Romagna.

Iynx Torquilla. Sedentario, non raro; in primavera vengono numerosi individui per nidificare e ripartire subito. Ne ho avuto 3 volte il nido con due uova perfettamente bianche.

Cuculus canorus. Comune in estate. So di due catture di giovani che vivevano nel nido di *Sylvia orphaea* (1883).[1]

[1] Un individuo adulto fu trovato morto nel Chianti, sulla via provinciale il 28 novembre 1881.

Digitized by Google

Alcedo Ispida. Comunissimo e sedentario; erratico nell'ottobre perchè ne ho osservati varie volte lungo corsi di acqua dove in estate non si era mai notata la sua presenza. Fa il nido qualche volta in buche sulle sponde, ma più generalmente nei muraglioni che reggono le sponde dei fiumi o delle pescaie, sempre 4 o 5 uova.

Coracias Garrula. Comune, estiva. Nidifica da noi abbondantemente.

Merops Apiaster. Specie estiva; abbondante in alcune località ove nidifica nei piani e lungo i corsi d'acqua.

Upupa Epops. Specie estiva, abbondante in alcuni luoghi; non credo abbia mai svernato fra noi.

Strix flammea. Comune, sedentario.

Syrnium Aluco. Comune, sedentario; ne ho veduti frequentemente i nidiacei in cui l'iride fino al secondo mese è nera, poi diviene cenerina.

Asio Otus. Comune e credo sedentario.

Asio accipitrinus. Comune, sedentario.

Athene Noctua. Comune, sedentaria. È specie che piuttosto si rassegna a lunghi digiuni ed a intensissimo freddo che emigrare.

Scops Giu. Comune da noi, esclusivamente estivo.

Bubo maximus. Non rarissimo, sedentario, ma al tempo del passo sembra ne giungano d'oltr'Alpe; so di due individui che nidificarono in Casentino.

Circus æruginosus. Non raro da noi, specialmente alle epoche del passo.

Circus cyaneus. Rara.

Circaëtus gallicus. Non raro al tempo del passo.

Buteo vulgaris. Comune e sedentaria; in novembre credo che emigri di provincia in provincia.

Pernis apivorus. Comune nel tempo del passo, più frequente in ottobre e novembre.

Falco Peregrinus. Non comune da noi, sedentario; nel 1883 vidi un esemplare per varie volte lungo il fiume Ema.

Hypotriorchis Subbuteo. Comune nel tempo del passo, in ottobre specialmente, quando segue i branchi delle Lo-

Digitized by Google

dole è facilissimo catturarlo; e anco sedentario, nel 1884 ai primi di settembre ne uccisi un esemplare e vidi due giovani nel 1886; se non erro, il signor Gino Caiani ebbe due giovani non ancora perfettamente impennati.

Æsalon regulus. Scarso da noi e invernale; come la precedente segue i branchetti di uccelli migranti.

Cerchneis Tinnunculus. Abbondante e sedentario, nidifica nelle nostre vecchie torri.

Cerchneis vespertinus. Comune al tempo del passo primaverile in Toscana; passa sempre in branchetti abbastanza numerosi.

Accipiter Nisus. Comune e sedentario.

Ardea cinerea. Comune e sedentario.

Ardea purpurea. Comune e sedentario.

Egretta Garzetta. Specie non rara da noi in estate, io ne ebbi due individui nel 1881, nel dicembre, da Pisa.

Ardeola ralloïdes. Scarsa in Toscana, ogni anno se ne vede qualche esemplare nell'aprile e anche nel maggio.

Ardetta minuta. Comunissima ed estiva, credo che viaggi sempre a coppie.

Botaurus stellaris. Comune e sedentario.

Nycticorax griseus. Comune; nel maggio passa a branchi, nell'ottobre e nel novembre credo sempre alla spicciolata ed in minor numero. È stato ucciso varie volte in inverno.

Ciconia alba. Qualche esemplare all'epoca del passo si vede da noi.

Platalea Leucorodia. Scarsa, ma di passo forse regolare. Nel 1885 in padule di Fucecchio ne furono uccise varie; nel 1886-1887 ne fu catturata una nei dintorni di Firenze.

Plegadis Falcinellus. Comune al tempo del passo primaverile, mai veduto in settembre e ottobre.

Anser cinereus. Non abbondante, ma in novembre qualche esemplare è ucciso da noi.

Anser segetum. Comunissima nell'inverno, riparte in marzo.

Digitized by Google

Tadorna cornuta. Comune nell'inverno negli anni passati, dal 1884 non se ne vedono più.

Anas Boscas. Comunissimo e sedentario.

Chaulelasmus streperus. Comunissima nell'inverno, le femmine sono forse in proporzione del cinque per cento.

Spatula clypeata. Comunissimo in inverno, si trattiene in mare e la sera viene ai nostri paduli.

Dafila acuta. Comunissimo e invernale.

Mareca Penelope. Comunissimo e invernale.

Nettion Crecca. Comunissima e sedentaria.

Querquedula Circia. Comunissima, invernale; in settembre rara, comunissima in marzo.

Fuligula rufina. Comune e di passo autunnale scarso, più abbondante in marzo. Il primo individuo che io vidi fu nell'inverno 1882, dopo quel tempo capita non raro e nel 1885 ne vennero in grandissima quantità.

Fulix ferina. Comune e invernale.

Fulix Fuligula. Comune e invernale.

Fulix Nyroca. Comune e invernale.

Bucephala Clangula. Comunissimo in primavera, più scarso in autunno; i giovani prevalgono sugli adulti, è specie che deve impiegare 2 o 3 anni ad assumere l'abito adulto.

Erismatura leucocephala. Piuttosto comune in alcuni anni, in altri scarso; nel 1882-1883 ne furono catturati varii individui poi ritornò raro come per lo innanzi.

Mergus Serrator. Comune, invernale.

Mergellus Albellus. Comune, invernale.

Columba Palumbus. Comune, sedentario.

Columba Oenas. Comune, sverna in piccolo numero, non so che abbia nidificato, ma lo credo facilissimo.

Columba livia. Comune, sedentario sul litorale.

Turtur tenera. Comune, estiva.

Starna Perdix. Abbondantissima, sedentaria; viaggia in piccoli branchetti di 10 a 15 individui nel novembre e dicembre.

Coturnix communis. Comune, estiva; fa 2 e forse 3 covate.

Digitized by Google

Rallus aquaticus. Comune, qualche individuo rimane nei grandi paduli.

Ortygometra Porzana. Comune e specie estiva, ma che si trattiene fino in ottobre e forse più tardi da noi.

Ortygometra Bailloni. Comune ed estiva.

Ortygometra parva. Comune ed estiva.

Crex pratensis. Comune ed estivo, in primavera predilige i paduli, in autunno si ferma nei prati asciutti e pei campi.

Gallinula chloropus. Comune e sedentaria.

Fulica atra. Comune e sedentaria; in alcuni punti dei nostri paduli, si ammassa in modo da formare piccole colonie.

Œdicnemus scolopax. Comune e sedentario; nidifica nei luoghi aridi e scende nell'agosto nei paduli o nei luoghi freschi.

Charadrius Pluvialis. Comunissimo, invernale.

Eudromias Morinellus. Non è raro in inverno, passa a piccoli branchetti e si trattiene poco da noi.

Ægialitis cantiana. Raro da noi, più frequente in marzo ed aprile.

Ægialitis curonica. Comune e nidificante da noi lungo i corsi dei fiumi; sedentario.

Ægialitis Hiaticula. Non è frequente in autunno, però in primavera l'ho veduto varie volte sulle rive dell'Arno e nei paduli.

Vanellus Capella. Comunissima, invernale.

Recurvirostra Avocetta. Scarsa da noi, capita però facilmente al passo primaverile; nel 1885 ne furono catturati vari esemplari nei dintorni di Firenze.

Himantopus candidus. Non raro in primavera; molto irregolare per l'epoca del passo e per la sua abbondanza.

Pelidna subarquata. Abbondantissimo, specialmente nel passo primaverile.

Actodromas minuta. Comune in primavera sulla riva del mare allo sbocco dell'Arno.

Actodromas Temmincki. Piuttosto comune, si unisce sempre alla precedente.

Digitized by Google

Tringa Canutus. Raro, frequenta in primavera le bocche dei fiumi, ne ebbi un esemplare da Pisa nel 1886.

Machetes Pugnax. Comunissima, specialmente in primavera. In schiavitù ho veduto bellissimi maschi in completo abito nuziale.

Tringoïdes Hypoleucus. Comune e sedentario sulla riva del mare fra Livorno e il Calambrone, ne ho uccisi molti giovani, volava in branchetti di 4 o 5 individui.

Totanus Ochropus. Comune, sedentario; in alcuni anni comunissimo in altri scarso.

Totanus Glareola. Comunissimo, nidificante, sembrerebbe avesse nidificato in Fucecchio; è la specie più abbondante.

Totanus stagnatilis. Era specie abbastanza rara da noi, ora si è fatta comune in alcuni anni nel marzo; passa a piccoli branchetti, ma con una certa frequenza.

Totanus Calidris. Comune alle epoche del passo.

Totanus fuscus. Comunissima tanto in ottobre che in primavera, ne ho veduti individui catturati in perfetto abito nuziale.

Totanus nebularius. Comune solo in primavera.

Limosa melanura. Comune in primavera.

Scolopax Rusticula. Comune ai due passi, sverna da noi, può dirsi sedentaria perchè qualche esemplare nidifica (Maremma).

Gallinago major. Comune ai due passi. Un esemplare fu ucciso nel 1887, ai valichi dell'Appennino, il 20 agosto.

Gallinago cælestis. Comune ai due passi, l'ho osservato in estate nei dintorni di Firenze.

Gallinago Gallinula. Comune in inverno.

Numenius Arquata. Comune; ne ho veduti varii branchetti che uscivano ed entravano nella Reale bandita di San Rossore nell'agosto 1886.

Numenius tenuirostris. Scarso in inverno, qualche esemplare si ha in primavera.

Numenius Phæopus. Scarso come la specie precedente.

Digitized by Google

Glareola Pratincola. Frequente in primavera, sembra nidifichi sul nostro litorale.

Sterna fluviatilis. Comune in primavera nel Pisano.

Sternula minuta. Comunissimo in primavera lungo i corsi dei fiumi.

Hydrochelidon hybrida. Ne ebbi due individui dal padule di Massaciuccoli nella primavera 1886.

Hydrochelidon leucoptera. Comunissimo, quasi ogni anno in maggio si vede volare sull'Arno in Firenze.

Hydrochelidon nigra. Comunissimo in primavera.

Chroocephalus minutus. Comune in primavera; nel 1884 ve ne fu un'invasione.

Chroocephalus ridibundus. Comune in inverno.

Larus Audouini. L'ho veduto sulle coste dell'Elba.

Larus cachinnans. Comune e sedentario.

Stercorarius pomatorhinus. Raro, ne vidi un esemplare nel padule di Fucecchio nel marzo 1886.

Puffinus anglorum. Non rara nell'agosto, ne vidi varii individui lungo mare nel tratto da Viareggio al Forte dei Marmi.

Colymbus septentrionalis. Non rara in inverno specialmente i giovani.

Podiceps cristatus. Comune e sedentario.

Podiceps fluviatilis. Comunissimo, specialmente in inverno; si ferma anche nelle vasche dei pubblici giardini facendo strage dei piccoli pesci.

Ancona,[1] (Paolucci prof. Luigi):

La regione Marchigiana, nella quale furono raccolte le osservazioni di natura generale, è di una irregolare

[1] Le osservazioni di natura generale del prof. Paolucci riguardano spesso anche le altre provincie delle Marche, cioè quelle di Pesaro, Macerata ed Ascoli.

Digitized by Google

forma quadrilatera, inclinata nei punti cardinali in modo d'avere l'angolo superiore destro volto a N., l'angolo inferiore volto a S. e per confini naturali: a N.E. il mare Adriatico nelle quattro provincie che formano la intera regione (chilometri 150 circa di costa); a S.E. il fiume Tronto che separa la provincia di Ascoli-Piceno dall'Abruzzo; a S.O. la catena Appennina dai monti di Carpegna ai monti Sibillini; a N.E. il fiume Conca che divide la provincia di Pesaro dalla Romagna.

Idrografia. — Dalla catena Appenninica si staccano i principali corsi d'acqua che scorrono in vallate più o meno ampie e in direzione generalmente normale o quasi alla catena stessa, cioè verso E.N.E. Le vallate fluviali sono separate da serie di colli, che partendo dalla costa marina o poco lungi da questa, ascendono fino agli Appennini. Dal N.O. al S.E. le vallate più importanti sono 14, cioè: 1. del Conca — 2. del Foglia — 3. del Metauro — 4. del Cesano — 5. del Misa — 6. dell'Esino (assai grande) — 7. del Mosone — 8. del Potenza (assai grande) — 9. del Chienti — 10. del Tenna — 11. del Lete vivo — 12. dell'Avo — 13. del Tesino — 14. del Tronto (assai grande).

Orografia. — Se si toglie la pianura limitata nelle valli fluviali e qualche lembo di costa, tutto il resto della regione presenta il suolo a colline che divengono sempre più alte del mare alla catena degli Appennini, fra i quali, scendendo da N.O. a S.E. ricorderò le altezze dei principalissimi: monte Nerone (1527), monte Catria (1702), monte Cucco (1566), monte della Strega (1274), monte Sanvicino (1483), monte Gemmo (1255), monte Pennino (1572), monte Rotondo (2103), monte Priore (2333), monte Sibilla (2213), monte Vettore (2477). Sorge poi nella costa isolato il monte Conero presso Ancona per m. 572 s. m.

Climatologia. — Il clima della regione Marchigiana può dirsi in generale mite presso il mare e nei colli, sebbene talvolta rapidamente turbato dai venti del settentrione. Nella zona subappennina e appennina è naturalmente più temperato, ma più costante.

Digitized by Google

Zona litoranea. — Temperatura media annuale + 15° 7. (Osservatorio di Ancona). Venti dominanti S.E. primavera e autunno, N.O. O. inverno.

Zona subappennina. — Temperatura media annuale + 12° 5. (Osservatorio di Urbino), venti dominanti S.O. N.E.

Zona appennina. — Temperatura media annuale + 11°.8. (Osservatorio di Camerino), vento dominante S. O.

L'autunno è per la intera regione Marchigiana l'epoca delle maggiori pioggie che nelle montagne si tramutano generalmente in nevi, le quali rimangono in generale fino a maggio nelle più alte cime. In estate tanto nel litorale che nel colle che nelle vette appennine, trascorrono spesso lunghi periodi di siccità.

Elenco delle specie di uccelli osservate nelle Marche, e più specialmente nella provincia di Ancona, coi nomi volgari locali e notizie di frequenza, ed intorno le migrazioni, la nidificazione, ecc., ecc.[1]

Corvus Corax, *Corvo imperiale.* Raro, ma sedentario (*C. Ag. Fab.*).

Corvus Corone, *Cornacchia nera.* Rara (*C. Ag. Fab.*).

---

[1] Questo elenco è compilato su quello pubblicato dal prof. L. Paolucci nel suo *Catalogo sistematico delle collezioni nel Gabinetto di Storia Naturale del R. Istituto Tecnico di Ancona* (pp. 27-33), Ancona, 1880; con aggiunte e notizie fornite poi direttamente dall'Autore. Ebbi poi dalla R. Prefettura di Ancona un catalogo anonimo degli uccelli del distretto di Fabriano, compilato per cura di quel Comizio Agrario e colla data del 30 marzo 1886. In esso sono annoverate cinquanta specie non rammentate dal prof. Paolucci, ne tengo conto, ma di esse soltanto, pel fatto che un lavoro anonimo perde quasi ogni valore nel caso nostro; quelle specie sono distinte colle iniziali *C. Ag. Fab.*

Digitized by Google

Corvus Cornix, *Corvo*. Comune ai monti.

Corvus frugilegus, *Corvo*. Comune ai monti, sedentario (?)

Lycos Monedula, *Cornacchia*. Comune ai monti e sedentaria.

Pica rustica, *Gàggia*. Comune ovunque e sedentaria, nidifica in maggio e giugno; erratica poi.

Garrulus glandarius, *Gàggia brusca*. Comune ovunque e sedentaria, nidifica in maggio e giugno.

Pyrrhocorax alpinus. Rarissimo ai monti.

Pyrrhocorax Graculus. Raro (*C. Ag. Fab.*).

Sturnus vulgaris, *Storno*. Comune ovunque; passa in settembre-novembre e febbraio-marzo.

Pastor roseus, *Storno marino*. Raro (*C. Ag. Fab.*).

Fringilla cœlebs, *Fringuello*. Comune ovunque e sedentario, nidifica in maggio e giugno; passa in ottobre-novembre e febbraio-marzo.

Fringilla Montifringilla, *Fringuello montanaro*. Piuttosto scarsa, erratica.

Petronia stulta, *Passero montanaro*. Scarsa ai monti, nidifica in maggio e giugno.

Passer montanus, *Passareca*. Comune ovunque e sedentaria, nidifica da maggio a luglio; quindi erratica.

Passer Italiæ, *Passero*. Comune ovunque e sedentaria, nidifica da maggio ad agosto.

Coccothraustes vulgaris, *Paccaosso*. Comune ovunque, erratico.

Ligurinus Chloris, *Verdone*. Comune, di doppio passo e sedentario, nidifica in maggio e giugno.

Chrysomitris Spinus, *Lucarino*. Scarso, passa in marzo-aprile ed in ottobre.

Carduelis elegans, *Cardellino*. Comune ovunque, di doppio passo e sedentario, nidifica in maggio, giugno e luglio.

Serinus hortulanus, *Verzellino*. Comune al piano, passa in aprile-maggio, quasi mai in autunno.

Cannabina Linota, *Fanello*. Frequente ovunque, passa in marzo-aprile ed ottobre-novembre.

Pyrrhula europæa, *Ciuffolotto*. Scarso ai monti, erratico.

Loxia Curvirostra, *Beccostorto*. Raro al piano.

Digitized by Google

Euspiza melanocephala. Raro, nidifica in luglio e agosto.

Miliaria Projer, *Strillo.* Frequente e sedentario, nidifica in maggio e giugno, diventa erratico.

Emberiza Citrinella, *Verzaina.* Scarso ai monti, erratico; vedesi col freddo.

Emberiza Cirlus, *Ziola.* Frequente ovunque e sedentario, nidifica in maggio e giugno.

Emberiza Hortulana, *Ortolano.* Comune al piano, nidifica in maggio e giugno; arriva in aprile-maggio, parte in agosto-settembre.

Emberiza caesia, *Zigolo rugginoso.* Raro (*C. Ag. Fab.*).

Emberiza Cia, *Ziola montanara.* Scarso ai monti, erratico.

Emberiza rustica. Raro (*C. Ag. Fab.*).

Emberiza pusilla, *Muciatto minore.* Scarso (*C. Ag. Fab.*).

Emberiza Schœniclus, *Ziola d'acqua.* Scarso al piano.

Emberiza pyrrhuloïdes. Rara (*C. Ag. Fab.*).

Calcarius lapponicus. Raro assai (*C. Ag. Fab.*).

Calcarius nivalis. Accidentale, comparve a branchetti lungo il mare nel rigido inverno del 1879.

Melanocorypha Calandra, *Calandra.* Scarsa al piano.

Calandrella brachydactyla, *Strellacchina.* Scarso al piano.

Alauda arborea, *Lodolino.* Frequente ovunque.

Alauda arvensis, *Sterlacca.* Comune ovunque, di doppio passo e sedentaria, nidifica in maggio è luglio.

Galerita cristata, *Lodola cappelluta.* Comune al piano, di doppio passo e sedentaria, nidifica in maggio, giugno e luglio.

Agrodroma campestris, *Strellacchino.* Comune al piano, nidifica in giugno; giunge in aprile-maggio e parte in agosto-settembre.

Corydalla Richardi. Raro assai (*C. Ag. Fab.*).

Anthus pratensis, *Babusso.* Frequente ovunque, passa in ottobre-novembre e marzo-aprile.

Anthus cervinus, *Babusso gola rossa.* Rara al piano.

Anthus trivialis, *Favarella.* Comune ovunque, passa in settembre-ottobre ed aprile-maggio.

Anthus Spipoletta. Raro al piano.

Digitized by Google

Budytes flavus, *Boarina gialla.* Comune al piano, passa soltanto dalla metà di marzo alla metà di maggio.

Budytes cinereocapillus, *Boarina gialla.* Piuttosto scarsa al piano.

Budytes melanocephalus, *Boarina gialla.* Rara al piano.

Motacilla alba, *Boarina.* Comune ovunque e sedentaria, nidifica in maggio e giugno; passa in marzo-aprile ed ottobre-novembre.

Motacilla lugubris. Rara assai (*C. Ag. Fab.*).

Calobates melanope, *Boarina gialla d' acqua.* Comune al piano e sedentaria, nidifica in aprile, maggio e giugno.

Saxicola Oenanthe, *Gastrica di maese.* Comune ovunque, nidifica in giugno e luglio; arriva in aprile-maggio, parte in settembre-ottobre.

Saxicola albicollis, *Gastrica forestiera.* Rara al piano.

Saxicola melanoleuca, *Gastrica forestiera.* Scarsa al piano.

Monticola saxatilis, *Codirossone.* Frequente, nidifica in giugno e luglio.

Monticola Cyanus, *Passero solitario.* Comune e sedentaria, nidifica in maggio e giugno.

Merula nigra, *Merlo.* Comune ovunque e sedentario, nidifica in maggio e giugno, erratico poi; passa anche in ottobre-novembre e febbraio-marzo.

Merula torquata, *Merlo col petto bianco.* Scarso al piano.

Turdus pilaris, *Tordella gaggiara.* Scarsa al piano.

Turdus iliacus, *Tordo gaggiaro.* Scarso al piano.

Turdus musicus, *Tordo.* Comune ovunque, passa in ottobre-novembre e febbraio-aprile.

Turdus viscivorus, *Tordella.* Frequente ovunque e sedentaria, nidifica da febbraio a giugno.

Aëdon Luscinia, *Rossignolo.* Comune, nidifica in maggio e giugno; arriva in aprile-maggio, parte in settembre-ottobre.

Erithacus Rubecula, *Pettirosso.* Frequente ovunque, sedentario ai monti; passa in settembre-novembre e marzo-aprile.

Cyanecula Wolfi, *Petto turchino.* Raro.

Digitized by Google

Ruticilla Phœnicurus, *Codirosso.* Comune ovunque, passa in marzo-aprile ed in settembre-ottobre.
Ruticilla titys, *Codirosso nero.* Raro.
Pratincola Rubicola, *Occhio di bue.* Comune ovunque e sedentario, nidifica da aprile a luglio.
Pratincola Rubetra, *Gastrighino.* Scarso, al piano.
Sylvia nisoria. Scarsa (*C. Ag. Fab.*).
Sylvia orphæa, *Bigia grossa.* Scarsa (*C. Ag. Fab.*).
Sylvia cinerea, *Strupparella di maggio.* Comune al piano, passa in aprile-maggio ed in settembre ottobre.
Sylvia Curruca, *Strupparella di settembre.* Comune al piano.
Sylvia subalpina. Rara (*C. Ag. Fab.*).
Monachus Atricapillus, *Testanera.* Comune ovunque.
Monachus hortensis, *Beccafico.* Frequente ovunque.
Melizophilus undatus, *Strupparella di monte.* Scarsa, ai monti.
Pyrophthalma melanocephala, *Testanera d'inverno.* Comune al piano.
Phylloscopus sibilator, *Lagnoso.* Comune al piano.
Phylloscopus Trochilus, *Ciuì.* Scarso (*C. Ag. Fab.*).
Phylloscopus rufus, *Ciuì.* Scarso, erratico.
Hypolais icterina, *Gialletto.* Comune al piano, nidifica in giugno e luglio.
Hypolais polyglotta, *Gialletto.* Scarso (*C. Ag. Fab.*).
Acrocephalus streperus. Rara (*C. Ag. Fab.*).
Acrocephalus arundinaceus, *Rossignolone.* Raro.
Calamodus schœnobænus. Scarsa (*C. Ag. Fab.*).
Lusciniola melanopogon. Raro assai.
Potamodus luscinioïdes. Rara (*C. Ag. Fab.*).
Cettia Cettii. Raro (*C. Ag. Fab.*).
Cisticola cursitans, *Canneggio.* Scarso al piano.
Troglodytes parvulus, *Beccaccino.* Comune ovunque.
Cinclus aquaticus, *Tordo d'acqua.* Raro, ai monti.
Accentor collaris. Raro assai, dopo burrasche autunnali.
Accentor modularis, *Passera frattarola.* Comune ovunque.
Regulus cristatus, *Rampichino.* Piuttosto scarso.
Regulus ignicapillus, *Rampichino.* Comune.
Acredula Irbyi. Piuttosto scarso (*C. Ag. Fab.*).

Digitized by Google

Panurus biarmicus. Raro (*C. Ag. Fab.*).

Parus major, *Cilicchia.* Comune ovunque e sedentaria, nidifica da marzo a luglio.

Parus ater, *Cilicchia greca.* Scarsa.

Cyanistes caeruleus, *Perluccino.* Piuttosto scarsa.

Poecile palustris. Scarsa (*C. Ag. Fab.*).

Sitta cæsia, *Picchio muratore.* Comune, sedentario (*C. Ag. Fab.*).

Certhia brachydactyla, *Rampinello.* Comune al piano, sedentario; nidifica in maggio.

Trichodroma muraria, *Rampinello coll'ali rosse.* Raro.

Oriolus Galbula, *Glorio.* Comune al piano, passa in aprile-maggio ed in agosto.

Ampelis Garrulus. Accidentale (*C. Ag. Fab.*).

Lanius Excubitor, *Gastrigotto grosso.* Raro, nidifica in giugno e luglio.

Lanius meridionalis. Rara assai (*C. Ag. Fab.*).

Lanius minor, *Gastrigotto cenerino.* Frequente ovunque, nidifica in giugno e luglio; arriva in aprile-maggio, parte in agosto-settembre.

Lanius Collurio, *Gastrigotto.* Comune ovunque, nidifica in giugno e luglio.

Lanius auriculatus, *Gastrigotto testa-rossa.* Comune ovunque, nidifica in giugno e luglio; arriva in aprile-maggio, parte in agosto-settembre.

Muscicapa collaris, *Sgolacchio.* Piuttosto frequente al piano.

Muscicapa Atricapilla, *Sgolacchio.* Scarsa (*C. Ag. Fab.*).

Butalis Grisola, *Sgolacchio.* Comune al piano, nidifica in giugno.

Hirundo rustica, *Rondine rossa.* Comune al piano, giunge e passa in marzo-maggio, parte e passa in settembre-ottobre.

Chelidon urbica, *Rondine bianca.* Estivo, comune al piano ed ai monti, nidifica in maggio e giugno; arriva in marzo-maggio, parte in settembre-ottobre.

Clivicola riparia, *Fratino.* Scarso al piano.

Cotile rupestris. Scarsa (*C. Ag. Fab.*).

Digitized by Google

Cypselus Apus, *Rondone.* Comune ovunque, nidifica in maggio e giugno; giunge in aprile-maggio, parte in luglio-agosto.

Cypselus Melba, *Rondone bianco.* Raro.

Caprimulgus europæus, *Squarcio.* Comune ovunque, estivo.

Dryocopus martius, *Picchio nero.* Raro, sedentario (*C. Ag. Fab.*).

Picus major, *Picchio rosso.* Raro, ma sedentario (*C. Ag. Fab.*).

Picus medius, *Picchio rosso.* Raro, sedentario (*C. Ag. Fab.*).

Picus minor, *Picchio minore.* Raro, ma sedentario (*C. Ag. Fab.*).

Gecinus viridis, *Picchio cavallo.* Piuttosto comune; sedentario.

Iÿnx Torquilla, *Torcicollo.* Comune ovunque, nidifica in maggio; arriva in aprile-maggio, parte in agosto-settembre.

Cuculus canorus, *Cucco.* Frequente, estivo ed erratico.

Alcedo Ispida, *Uccello belverde.* Comune al piano, sedentario.

Coracias Garrula, *Gàggia marina.* Scarsa al piano.

Merops Apiaster, *Guaraguasto.* Comune al piano; passa in aprile-maggio ed in settembre-ottobre.

Upupa Epops, *Bubola.* Comune al piano; passa in marzo-aprile ed in settembre-ottobre.

Strix flammea, *Gufo.* Comune ai monti e sedentario.

Syrnium Aluco, *Gufo.* Scarso, ma sedentario (*C. Ag. Fab.*).

Asio Otus, *Gufo.* Comune ovunque.

Asio accipitrinus, *Gufo.* Comune ovunque.

Athene Noctua, *Civetta.* Frequente ovunque e sedentaria.

Scops Giu, *Chiu.* Piuttosto scarso.

Bubo maximus, *Gufo reale.* Scarso.

Circus æruginosus, *Falco testa caffè.* Scarso al piano.

Circus cyaneus, *Falco bianco.* Comune al piano.

Circus Swainsoni, *Falco bianco.* Scarsa al piano.

Pandion Haliaëtus. Raro (*C. Ag. Fab.*).

Circaëtus gallicus, *Biancone.* Sedentario, ma scarso (*C. Ag. Fab.*).

Digitized by Google

Aquila Chrysaëtus, *Aquila reale.* Scarsa ai monti.
Buteo vulgaris, *Pojava.* Comune ovunque.
Pernis apivorus. Raro, ma qualche anno giunge in copia (*C. Ag. Fab.*).
Milvus Ictinus, *Nibbio.* Sedentario (*C. Ag. Fab.*).
Falco Peregrinus, *Falcone.* Sedentario (*C. Ag. Fab.*).
Hypotriorchis Subbuteo, *Falchetto.* Comune ovunque.
Cerchneis Tinnunculus, *Falchetto.* Comune al piano, nidificante in maggio al monte Conero.
Cerchneis Naumanni, *Falchetto.* Scarso al piano.
Cerchneis vespertinus, *Falchetto.* Frequente di passo.
Astur palumbarius, *Astore.* Raro (*C. Ag. Fab.*).
Accipiter Nisus, *Sparviero.* Comune ovunque.
Gyps fulvus, *Grifone.* Avventizio (*C. Ag. Fab.*).
Pelecanus Onocrotalus, *Pellicano.* Accidentale, ne ebbi due da Porto di Numana.
Phalacrocorax Carbo, *Corvo marino.* Scarso.
Phalacrocorax Graculus. Rarissimo, avuto da Ancona.
Ardea cinerea, *Sgarzettone.* Comune al piano.
Ardea purpurea, *Sgarzettone rosso.* Comune.
Egretta alba, *Sgarzettone bianco.* Rara (*C. Ag. Fab.*).
Egretta Garzetta, *Sgarzetta bianca.* Scarsa.
Ardeola ralloïdes, *Sgarzetta.* Scarsa.
Ardetta minuta, *Sgarzetta piccola.* Frequente.
Botaurus stellaris, *Sgarzetta.* Comune.
Nycticorax griseus, *Sgarzetta.* Frequente.
Ciconia alba, *Cicogna bianca.* Scarsa.
Ciconia nigra, *Cicogna nera.* Rara.
Plegadis Falcinellus, *Corvo marino.* Scarso.
Cygnus Olor, *Cigno reale.* Rarissimo, avuto da Porto Recanati.
Anser segetum, *Oca selvatica.* Scarsa, di doppio passaggio.
Tadorna cornuta, *Volpoca.* Rara nell'inverno.
Anas Boscas, *Capo-verde.* Comune nell'inverno.
Chaulelasmus streperus. Scarsa d'inverno.
Spatula clypeata, *Mestolone.* Scarso, invernale.
Dafila acuta, *Anatra codona.* Scarso, invernale.

Digitized by Google

Mareca Penelope, *Fischione.* Non comune, invernale.
Nettion Crecca, *Scrocchetto.* Comune d'inverno.
Querquedula Circia, *Marzarola.* Comune in marzo.
Fuligula rufina, *Fischione turco.* Scarso d'inverno.
Fulix Nyroca. Scarsa (*C. Ag. Fab.*).
Bucephala Clangula, *Quattrocchi.* Scarso d'inverno.
Mergus Serrator, *Svasso grosso.* Scarso d'inverno.
Mergellus Albellus, *Svasso.* Scarsa d'inverno.
Columba Palumbus, *Palomba.* Frequente e sedentario ai monti, passa in ottobre e marzo.
Columba Oenas, *Coparolo.* Frequente, passa dalla metà di settembre alla metà di ottobre e nel marzo.
Columba livia, *Coparolo.* Frequente.
Turtur tenera, *Tortora.* Frequente, passa in aprile-maggio ed in settembre.
Perdix rufa, *Pernice.* Sedentaria e comune (*C. Ag. Fab.*).
Perdix saxatilis, *Pernice.* Scarsa, ma sedentaria ai monti.
Starna Perdix, *Starna.* Comune e sedentaria in collina.
Coturnix communis, *Quaglia.* Comune ovunque, nidifica in giugno e luglio; passa in aprile-giugno e agosto-ottobre.
Rallus aquaticus, *Sporciglione.* Comune al piano.
Ortygometra Porzana, *Sporciglione.* Scarso al piano.
Ortygometra parva, *Sporciglione piccolo.* Scarsa al piano.
Crex pratensis, *Re di quaglie.* Comune al piano.
Gallinula chloropus, *Gallinella.* Comune al piano.
Fulica atra, *Fuliga.* Scarsa al piano.
Grus communis, *Grù.* Di scarso passaggio.
Otis Tarda. Rarissima, avuta a Musone.
Otis Tetrax. Rara, avuta nei pressi d'Ancona.
Œdicnemus scolopax, *Caponessa.* Scarso al piano.
Charadrius Pluvialis, *Stornarolo.* Frequente al piano; passa in marzo-aprile ed in ottobre-novembre.
Ægialitis cantiana, *Ciurlino.* Comune al piano, ma soltanto nel passo autunnale, in agosto e settembre.
Ægialitis curonica, *Acquaroletto.* Frequente.
Ægialitis Hiaticula, *Ciurlino.* Raro (*C. Ag. Fab.*).

Digitized by Google

Vanellus Capella, *Galluzzo*. Comune al piano, di passo in marzo-aprile ed in ottobre-novembre.
Strepsilas Interpres. Raro di passo (*C. Ag. Fab.*).
Hæmatopus Ostralegus, *Beccaccia di mare*. Rara.
Recurvirostra Avocetta. Rara.
Himantopus candidus, *Acquarolo alto*. Scarso al piano.
Pelidna subarquàta, *Acquaroletto*. Comune al piano.
Actodromas minuta. Scarso di passo (*C. Ag. Fab.*).
Machetes Pugnax, *Acquarolo*. Comune al piano, di passo in marzo ed aprile.
Tringoïdes Hypoleucus. Scarso di passo (*C. Ag. Fab.*).
Totanus Ochropus, *Acquarolo*. Frequente.
Totanus Glareola, *Acquarolo*. Scarso di passo (*C. Ag. Fab.*).
Totanus stagnatilis, *Acquarolo*. Scarso.
Totanus Calidris, *Acquarolo*. Scarsa.
Totanus fuscus, *Acquarolo*. Comune al piano.
Totanus nebularius, *Acquarolo*. Scarsa di passo (*C. Ag. Fab.*).
Limosa melanura, *Pittima*. Scarsa.
Scolopax Rusticula, *Beccaccia*. Frequente, passa in ottobre-novembre ed in febbraio-aprile.
Gallinago major, *Pizzardone*. Comune al piano, passa in marzo-maggio ed ottobre.
Gallinago cælestis, *Pizzarda*. Frequente al piano, passa in febbraio-aprile ed agosto-novembre.
Gallinago Gallinula, *Pizzardino*. Comune al piano.
Numenius Arquata, *Arcangelo grosso*. Scarso, vedesi negli inverni rigidi.
Numenius tenuirostris, *Arcangelo mezzano*. Scarso.
Numenius Phæopus, *Arcangelo piccolo*. Scarso.
Glareola Pratincola, *Pernice di mare*. Scarsa.
Thalasseus cantiacus, *Cucalina*. Frequente e sedentario.
Gelochelidon anglica, *Cucalina testa nera*. Scarso.
Sterna fluviatilis, *Cucalina*. Comune.
Hydrochelidon leucoptera, *Cucalina*. Scarso di passo (*C. Ag. Fab.*).
Hydrochelidon nigra, *Cucalina*. Comune di passo in aprile-maggio ed agosto-settembre.

Digitized by Google

Chroocephalus melanocephalus, *Cucalina*. Comune d'inverno.
Chroocephalus ridibundus, *Cucalina*. Scarso d'inverno.
Larus canus, *Cucale*. Comune e sedentaria.
Larus cachinnans, *Cucale*. Comune d'inverno.
Puffinus Kuhli, *Ardenna*. Scarsa.
Colymbus arcticus. Rarissima, molte però comparvero nel porto di Ancona nell'inverno del 1886, una fu presa in abito nuziale.
Colymbus septentrionalis. Scarsa, invernale.
Podiceps cristatus, *Sbrisciolo grosso*. Scarso.
Podiceps nigricollis, *Sbrisciolo mezzano*. Comune.
Podiceps fluviatilis, *Sbrisciolo bianco e nero*. Comune.

LAZIO.

Roma, distretto di Viterbo e Montefiascone (Mimmi cavalier Mario):

Il territorio di Montefiascone misura un'estensione di ettari 8239. Nella sua quasi totalità trovasi accidentato di monticelli e colline, tranne due valli coltivate di oltre mille ettari che giacciono ai lati del nostro elevatissimo monte. Il territorio suddetto nella sua metà è coltivato a vigna e uliveti e l'altra metà, parte è rinvestita di macchia e parte seminativa.

Il nostro distretto confina al Nord col territorio di Bolsena e Bagnorea, al Sud e Sud-Ovest con quello di Viterbo, a Nord-Ovest con quello di Marta. Quivi abbiamo il lungo litorale del limpidissimo lago di Bolsena, che per circa 10 chilometri lambisce il nostro distretto che ivi trovasi fertilissimo.

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Roma, distretto di Viterbo e Montefiascone, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione, ecc. ecc.

Corvus Cornix, *Cornacchia.* Non abbondante, sedentaria e nidificante.

Corvus frugilegus, *Corvo.* Invernale a stormi.

Lycos Monedula, *Cornacchia.* Abbondantissima e sedentaria.

Pica rustica, *Pica*, *Gazella.* Comune e sedentaria al piano.

Sturnus vulgaris, *Storno.* Comune, sedentario e di passo in ottobre e marzo.

Fringilla cœlebs, *Fringuello.* Abbondante, di passo in ottobre e marzo-aprile, scarsamente sedentario, molti però svernano.

Petronia stulta, *Passera montanara.* Frequente ai monti.

Passer montanus, *Passeretto, Passerino.* Comune e sedentaria.

Passer Italiæ, *Passero.* Comune e sedentaria.

Coccothraustes vulgaris, *Frocione.* Scarso, ma anco sedentario e nidificante.

Ligurinus Chloris, *Verdone.* Raro, sedentario e nidificante.

Carduelis elegans, *Cardellino.* Comune e sedentario in collina.

Serinus hortulanus, *Verzellino.* Raro assai, ma nidificante.

Cannabina Linota, *Fanello.* Scarso, ma nidificante.

Miliaria Projer, *Strillozzo.* Comune al piano, ove nidifica.

Emberiza Cirlus, *Zivola.* Abbastanza frequente e sedentario.

Melanocorypha Calandra, *Calandra.* Sedentaria, ma non comune.

Alauda arvensis, *Allodola.* Abbondante, sedentaria e di passo in ottobre e marzo.

Alauda arborea, *Allodolina, Coarella.* Abbondante, sedentaria e di passo in ottobre e marzo.

Galerita cristata, *Ciuffa, Merdara.* Comune e sedentaria.

Anthus pratensis, *Babusso.* Comune, di passo in settembre ed aprile.

Digitized by Google

Anthus trivialis, *Tordino*. Comune, di passo in aprile ed ottobre.

Motacilla alba, *Codazinzola*, *Uccello del diavolo*. Sedentaria e comune al piano.

Saxicola Oenanthe, *Codabianca*, *Codetta*. Pochi estivi e molti di passo, dalla metà di marzo alla metà di aprile e dalla metà di agosto a quella di novembre.

Monticola Cyanus, *Passera solitaria*. Sedentaria, ma scarsa.

Merula nigra, *Merlo*. Frequente e sedentario.

Turdus viscivorus, *Tordo*. Sedentaria, ma scarsa.

Aëdon Luscinia, *Usignolo*. Estivo e comune.

Erithacus Rubecula, *Pettirosso*. Comune e anco nidificante.

Ruticilla Phœnicurus, *Codorosso*. Comune in marzo-aprile e ottobre-novembre.

Pratincola Rubicola, *Salta bastoni*. Comune e sedentario.

Sylvia cinerea, *Capoceciola*. Comune, nidificante.

Monachus Atricapillus, *Caponera*. Abbastanza frequente e sedentaria.

Monachus hortensis, *Beccafico*. Estivo e comune.

Troglodytes parvulus, *Re di uccelli*. Scarso.

Accentor modularis, *Passera fura-siepe*. Scarsa.

Regulus cristatus, *Radaicchio*. Comune.

Acredula Irbyi, *Pajainculo*, *Sporca-painoni*. Scarso.

Sitta cæsia, *Picchio murajolo*. Comune, sedentario.

Certhia brachydactyla, *Picchio scorzolino*. Comune e sedentario.

Oriolus Galbula, *Goro*. Estivo e comune al piano.

Lanius minor, *Castrica palumbina*. Estiva e comune; parte dal 20 luglio al 10 agosto.

Lanius Collurio, *Castrica asinina*. Comune ed estiva; partono in luglio ed agosto.

Lanius auriculatus, *Castrica*. Comune ed estiva; parte in luglio ed agosto.

Hirundo rustica, *Rondinella*. Estiva e comune.

Chelidon urbica, *Rondinella*. Estivo e comune.

Cotile rupestris, *Rondine grottara*. Nidifica nelle grotte sui monti.

Cypselus Apus, *Rondone*. Comune ed estivo.

Digitized by Google

Caprimulgus europæus, *Piattajone.* Comune, estivo.

Picus major, *Culorosso*, *Picchio focaro.* Sedentario e comune.

Picus medius, *Picchio cardinale.* Comune e sedentario.

Gecinus viridis, *Picchio giallone.* Sedentario e comune.

Iynx Torquilla, *Ciorlù*, *Storcicollo.* Scarso.

Cuculus canorus, *Cucco.* Estivo e comune, giunge alla fine di marzo e parte ai primi di agosto; depone le uova nei nidi di Lodola e di Strillozzo.

Merops Apiaster. Raro assai.

Strix flammea, *Barbagianni.* Comune e sedentario.

Athene Noctua, *Civetta.* Sedentaria e comune.

Scops Giu, *Gufetto.* Estivo e scarso.

Buteo vulgaris, *Falcone.* Comune e sedentaria.

Milvus Ictinus, *Falco.* Comune e sedentario.

Falco Peregrinus, *Falcone.* Non raro, sedentario.

Cerchneis Tinnunculus, *Falco.* Comune e sedentario.

Anser segetum, *Oca.* Passa a grossi branchi e danneggia i seminati; giunge ai primi di dicembre e parte verso la metà di febbraio.

Anas Boscas, *Anitra.* Invernale e comune.

Nettion Crecca, *Anitrella.* Invernale e comune.

Columba Palumbus, *Palombaccio.* Pochi sedentarii, molti di passo dal 20 settembre al 20 ottobre e dal 15 febbraio al 15 marzo.

Turtur tenera, *Tortorella.* Giunge in aprile, nidifica e parte ai primi di ottobre.

Starna Perdix, *Starna.* Abbondante e sedentaria al piano e in collina; distinguonsi due razze, una grande o « reale » una piccola detta « naturale ».

Coturnix communis, *Quaglia.* Abbondante al piano; qualcuna sedentaria, molte di passo dal 15 aprile al 15 maggio e dal 25 agosto al 10 novembre.

Rallus aquaticus, *Gallinella.* Comune, di doppio passo.

Ortygometra Porzana, *Gallinella.* Comune, di passo in aprile ed ottobre.

Charadrius Pluvialis, *Piviero.* Scarso, di passo in aprile e novembre.

Digitized by Google

Vanellus Capella, *Pavoncella*. Abbondante d'inverno al piano.

Scolopax Rusticula, *Beccaccia*. Comune d'inverno, cioè dagli ultimi di ottobre alla metà di marzo.

Gallinago cælestis, *Beccacciola*, *Beccaccina*. Comune dall' ottobre all'aprile.

ABRUZZI.

Campobasso, distretto di Jelsi (D'Amico Teodosio):

Il fiume Tappino, i tenimenti di Gildone-Riccia e Cerumaggiore, e quello di Pietracatella.

Il terreno leggermente ondulato tra amene colline, è in molti punti attraversato da corsi d'acqua, fra cui il primo è il torrente Carapella. La più elevata delle colline è la così detta Montagna di Gildone.

Sonovi punti alberati e tenute boscose, sebbene non estese. Produce diverse specie di cereali, come grano, granone, avena, orzo ecc. Ma pochi vigneti e praterie naturali e artificiali.

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Campobasso, distretto di Jelsi, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione ecc., ecc.

Corvus Corax, *Corvo*. Molto scarso, ma sedentario; vive in una roccia ad oriente del distretto, ove nidifica.

Corvus frugilegus, *Cornacchia nera*. Frequente, vive contemporaneamente al piano ed in collina; giunge in novembre, parte in marzo-aprile.

Corvus Cornix, *Ciavola*. Scarsissima, si rinviene nei punti più elevati del distretto nell'inverno.

Digitized by Google

Pica rustica, *Pica*. Frequente, si rinviene in tutto il distretto dove sono alberi ed arbusti; sedentaria.

Sturnus vulgaris, *Sturno*. Scarso e raro, ma nidificante, vive nelle colline boscose; passa alla fine di marzo, in aprile ed in settembre.

Fringilla cœlebs, *Frungillo*. Frequente e sedentario; vive in tutto il distretto di osservazione, alla collina ed al piano.

Petronia stulta, *Capotorto*. Frequente, di passo in aprile ed ottobre, sparsa per tutto il tenimento, specialmente nei luoghi pietrosi ove nidifica.

Passer Italiæ, *Passero*, Frequente, vive sparsa in tutto il distretto di osservazione ove è sedentaria.

Ligurinus Chloris, *Vitaruolo*. Vive e nidifica nelle colline arbustate; frequente, passa in maggio ed ottobre.

Carduelis elegans, *Cardellino*. Frequente, vive sparso in tutto il tenimento; sedentario.

Serinus hortulanus, *Cardillo selvaggio*. Frequente in tutto il distretto di osservazione, ove nidifica.

Alauda arvensis, *Cucciarda*, *Calandrella*. Frequente in tutto il distretto e sedentaria.

Galerita cristata, *Calandrella*, *Tupputa*. Frequente, vive in tutto il distretto sedentaria.

Anthus trivialis, *Ficetola*. Frequente e sparsa nel distretto di osservazione, ove nidifica; passa in maggio e settembre.

Motacilla alba, *Cucciamannella*, *Cucciacannella*. Frequente in tutto il distretto, vi nidifica e passa in novembre, dicembre, maggio e giugno.

Merula nigra, *Merlo*. Frequente e sedentario in tutto il distretto, specialmente nelle boscaglie e terreni chiusi da siepi.

Turdus musicus, *Malvizzo*. Frequente in tutto il distretto nei punti alberati; di passo in settembre-ottobre ed in febbraio.

Turdus viscivorus, *Tordea*. Sedentaria e comune.

Monachus hortensis, *Beccafico*. Frequente in tutto il distretto

Digitized by Google

specialmente nei vigneti e nei punti alberati, ove nidifica; passa in maggio e settembre.

Aëdon Luscinia, *Usignolo*, *Russignuolo*. Frequente ed estivo in tutto il distretto ad oriente e mezzogiorno; giunge in aprile e parte in settembre ed ottobre.

Cinclus aquaticus, *Merlo d'acqua*. Scarso, vive sulle sponde del Tappino ed in altri corsi d'acqua; sedentario.

Parus major, *Capinera, Cinciallegra*. Frequente, sparsa pel distretto e specialmente nei punti bassi; sedentaria.

Parus ater. Comune e sedentaria.

Sitta caesia, *Picchio*. Frequente, vive nei punti alberati in tutto il distretto ove è sedentario.

Oriolus Galbula, *Gravolo*, *Bavolo*. Comune, estivo, arriva in aprile, parte in settembre e primi d'ottobre.

Lanius minor, *Castrapalomba*. Comune ed estiva.

Hirundo rustica, *Rondinella*, *Renninella*. Frequente, sparsa nel distretto e nell'abitato; giunge nella prima metà di aprile, parte in settembre.

Cypselus Apus, *Rondone*, *Ronninone*. Comune ed estivo, giunge nella seconda metà di aprile, parte in settembre.

Iynx Torquilla, *Formichiere*, *Gallo di selva*. Frequente nei punti alberati, giunge in aprile, parte in settembre.

Cuculus canorus, *Cucù*, *Cuccovaio*. Frequente, vive nei punti alberati del tenimento, giunge in aprile, parte in giugno; depone l'uovo nel nido dell'*A. arvensis*.

Merops Apiaster, *Aparuolo*. Frequente, di passo in settembre; non vive in alcun punto del distretto.

Upupa Epops, *Gallo di selva*, *Luppa*. Frequente, vive nei punti alberati; giunge nei primi di aprile, parte in settembre.

Strix flammea, *Barbagianni*, *Facciomo*. Frequente e sedentario, vive nei fabbricati disabitati in molti punti del distretto.

Asio Otus, *Gufo*, *Nganna pastore*. Frequente e sedentario.

Athene Noctua, *Civetta*. Frequente, vive nei fabbricati disabitati e nel vuoto degli alberi vecchi; è sedentaria.

Circus æruginosus, *Falco*, *Astore*. Frequente in tutto il distretto ove è sedentario.

Digitized by Google

Circus cineraceus, *Falconetto.* Frequente, vive in tutto il distretto ed è sedentario.

Milvus Ictinus, *Nibbio, Arpone.* Scarso, vive sulle colline alberate, è sedentario.

Anser cinereus, *Papara a castagne.* Frequente, ma di passaggio soltanto nel dicembre.

Anas Boscas, *Mallardo.* Scarso, di passaggio in dicembre.

Columba Oenas, *Colombella.* Frequente, vive nelle colline alberate; passa in novembre e febbraio-marzo.

Columba livia, *Piccione selvatico.* Frequente in tutto il distretto e sedentario.

Turtur tenera, *Tortora.* Frequente, vive nei punti alberati; giunge in aprile, parte in settembre.

Starna Perdix, *Starna.* Frequente in tutto il distretto e sedentaria.

Coturnix communis, *Quaglia.* Frequente a mezzogiorno del distretto, alcuni svernano; giunge nella prima metà di aprile, parte in settembre-ottobre.

Vanellus Capella, *Pavoncella, Cagiana.* Frequente nei corsi d'acqua e specialmente nel Tappino in novembre e marzo-aprile.

Scolopax Rusticula, *Beccaccia, Arcera.* Frequente nei punti settentrionali ed occidentali del distretto e nelle tenute boscose, nel novembre e nel marzo.

Gallinago Gallinula, *Beccaccino.* Frequente nei punti acquitrinosi del tenimento e lungo i corsi d'acqua nel novembre e nel marzo.

CAMPANIA.

Napoli, (Praus Franceschini Carlo, e Monticelli dottore Francesco Saverio):

Buona parte della provincia di Napoli forma il golfo di Napoli, il quale comincia al capo della Campanella, gira

Digitized by Google

a lungo cerchio fino all'estrema punta di Posillipo, volge verso ponente ed inarcandosi di nuovo va a formare il golfo di Pozzuoli che termina al capo Miseno e declinando dalla parte di Borea per lunga lista d'arena va a metter capo al lago di Patria, limite della provincia.

All'entrata del golfo, a mezzodì, trovasi l'isola di Capri, all'estremo opposto, al capo Miseno, l'isola di Procida, l'isola di Ischia; più in là il gruppo delle isole Pontine.

La terra che circonda il golfo di Napoli, presenta tre elevazioni ben distinte fra loro che lo cerchiano: una nel mezzo, il monte *Vesuvio* e *Somma*, che diremo *regione Vesuviana;* una a scirocco, monte Sant'Angelo e la penisola Sorrentina che va a terminare alla punta della Campanella, che indicheremo col nome di *regione Sorrentina;* l'altra a maestro, monte Camaldoli, Capodimonte, Posillipo che termina alla punta di Posillipo, *regione Partenopea.* I piani che dividono questi monti internandosi verso settentrione, formano la parte piana che diremo *regione Campana.* La *regione Flegrea* partendo dal golfo di Pozzuoli, sale verso tramontana, ha sparsi monti, monte Nuoro, monte Barbaro, monte di Procida ed altri colli e colline minori intramezzati da valli, nelle quali si trovano i laghi Lucrino, Averno, Fusaro, Licola e Mare morto; la regione Flegrea più in su si fa piana e si congiunge con la regione Campana verso levante e con la spiaggia verso ponente e si termina nel vasto lago di Patria. I terreni che costeggiano questa spiaggia, perchè a questa sottoposti, rattengono l'acqua che, non scorrendo, fa di questi luoghi estese paludi: la loro estensione è di molte diecine di chilometri quadrati e fra essi trovansi terreni boscosi. La regione Campana dai piani presso il monte Somma salendo a settentrione volge verso ponente e riesce alla spiaggia presso il lago di Patria. La regione Sorrentina confina con la provincia di Salerno, la Campana con quella di Caserta, che la cinge fino al mare.

La coltivazione fino a 300 m. sul mare è di agrumi, viti, gelso, meleti, pereti ed altri alberi da frutto; nei par-

Digitized by Google

chi reali di caccia vedesi l'elce (*Quercus ilex*, ed il pino (*Pinus maritimus*). Infino a 500 e 600 m. trovansi noci, ulivi, sorbi, ciliegi ed altri. Da 500 in su selve cedue, castagneti, ginestre, ontani (*Alnus glutinosa*), Acero (*Acer pseudoplatanus*), Faggi (*Fagus sylvatica*), Abeti (*Abies excelsa*, *Abies nigra*), Larici (*Larix europæa*) e Pini (*Pinus maritimus* e *Pinus sylvestris*). Nella parte piana si coltiva a preferenza la fava, il trifoglio misto a cruca, il lino, la canapa. Nei terreni alberati, filari di alti pioppi (*Populus nigra*) a sostegno dei vigneti disposti a sterzeto occupano la massima parte. Il Pino (*Pinus pinea*) usato per termine dei fondi è comunissimo. Nelle pianure aperte il granturco vien seminato per grandi estensioni, così pure la canape. La coltivazione delle isole differisce poco da quella di terraferma.

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Napoli, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione, ecc., ecc. [1]

Corvus Corax, *Cuorvo*. s. scarsa p. m.
Corvus Corone, *Cornacchia*. scarsa p. m.
Corvus Cornix, *Cornacchia*. s. f. p.
Corvus frugilegus, *Ciaola*, *Craula*. f. p. m.
Lycos Monedula. app. accidentale.
Nucifraga Caryocatactes, *Rompe-noce*. app. acc. rarissima.
Pica rustica, *Cola*. *Cajazza*. f. p. m.
Garrulus glandarius, *Pica*. f. p. m.
Pyrrhocorax Graculus, *Cuorvo rosa*. app. acc.
Sturnus vulgaris, *Sturno*. f. p.
Pastor roseus, *Sturno rosa*. app. acc.
Fringilla coelebs, *Frungillo*. s. f. p. m.

---

[1] *s.* (sedentario), *f.* (frequente), *p.* (piano), *m.* (monti).

Digitized by Google

Fringilla Montifringilla, *Frungillo spagnuolo.* app. acc. in ottobre.

Petronia stulta, *Passaraina.* f. p. m. passa prima metà di marzo e di ottobre.

Passer montanus, *Passaro canzirro, Passarella i marina.* s. f. p.

Passer Italiæ, *Passaro casarinolo.* s. f. p. m.

Coccothraustes vulgaris, *Frosolone, Frosone.* f. p. m. passa prima quindicina di aprile e di ottobre.

Ligurinus Chloris, *Sciurolo.* s. f. p. m.

Chrysomitris Spinus, *Lecora.* f. p. m. passa in marzo e prima metà di ottobre.

Carduelis elegans, *Cardillo.* s. f. p. m.

Serinus hortulanus, *Cardolella, Zevardïello.* f. p. m.

Cannabina Linota, *Zenzella.* f. p. m. passa seconda quindicina marzo e prima di ottobre.

Pyrrhula europæa, *Monachino.* f. p. m.

Loxia Curvirostra, *Pizzo 'ncroce.* app. acc. uccisi 13 una mattina ad Ischia.

Miliaria Projer, *Strulacchio, Cicerone.* f. p. m. passa prima metà di aprile e ottobre; qualcuno nidifica.

Emberiza Citrinella, *Zicco.* scarso m.

Emberiza Cirlus, *Zicco.* scarso m.

Emberiza Hortulana, *Ortolano.* app. acc.

Emberiza Cia, *Zicco.* scarso p. m.

Emberiza Schœniclus, *Passarella i canne.* scarso p. m.

Melanocorypha Calandra, *Calantra.* f. p.

Calandrella brachydactyla, *Cucciarduolo.* f. p. m.

Alauda arborea, *Cuvarella, Cuarella.* f. p. m.

Alauda arvensis, *Cucciarda, Terragnola.* f. p.

Galerita cristata, *Monnezzara.* s. f. p.

Agrodroma campestris, *Cappellara.* scarso p. m.

Anthus pratensis, *Sitolo.* f. p. m.

Anthus trivialis, *Migliarino.* f. p.

Anthus Spipoletta, *Sitolo.* f. p.

Budytes flavus, *Pappamosca, Casarinola.* f. p.

Budytes cinereocapillus, *Pappamosca* (mas.) *Verrinea* (fem.). f. p.

Digitized by Google

Motacilla alba, *Monacella.* f. p.
Calobates melanope, *Pappamosca, Casarinola.* f. p. m.
Saxicola Oenanthe, *Codeianco.* f. p. m.
Saxicola albicollis, *Codeianco San Martino.* app. acc.
Saxicola Stapazina, *Codeianco Monaco.* app. acc. aprile.
Monticola saxatilis, *Coderusso montanaro, Coderusso bastardo, Mierolo i montagna, Mierlo i rocca.* app. acc. in aprile.
Monticola Cyanus, *Passaro solitario.* s. f. p. m. nidifica anche sugli alti edifizî entro Napoli.
Merula nigra, *Mierolo.* s. f. p. m.
Merula torquata, *Mierolo a piastre.* app. acc.
Turdus pilaris, *Tordea (piccola).* scarsa p. m.
Turdus iliacus, *Malvizzola.* scarso p. m.
Turdus musicus, *Marvizzo.* f. p. m.
Turdus viscivorus, *Tordea.* f. p. m.
Aëdon Luscinia, *Ruscignuolo, Riscignuolo.* f. p. m.
Erithacus Rubecula, *Piettorusso.* f. p. m.
Ruticilla Phœnicurus, *Coderusso.* scarso p.
Ruticilla titys, *Coderusso.* scarso p.
Pratincola Rubicola, *Miettemponta (d' inverno).* scarso p. m.
Pratincola Rubetra, *Miettemponta (d' està).* scarso p. m.
Sylvia cinerea, *Fucetola cannavalo.* f. p.
Sylvia Curruca, *Fucetola passaregna.* f. p.
Sylvia subalpina, *Fucetola (d' inverno).* f. p.
Monachus Atricapillus, *Capofoscola.* f. p. m.
Monachus hortensis, *Fucetola verace, Beccafico.* f. p. m.
Phylloscopus sibilator, *Volanella.* f. p. m. passa seconda metà aprile ed agosto.
Phylloscopus Trochilus, *Riillo.* s. f. p.
Hypolais icterina, *Volanara.* f. p. m. passa prima quindicina aprile e settembre.
Acrocephalus arundinaceus, *Fucetolone.* f. p. m. passa in settembre.
Troglodytes parvulus, *Sperciasepe.* s. f. p. m.
Cinclus aquaticus, *Mierolo d'acqua.* scarso p.
Accentor modularis, *Chiummarella.* scarso p.
Regulus cristatus, *Regeniello.* f. p.

Digitized by Google

Regulus ignicapillus, *Regeniello*. f. p.
Panurus biarmicus, *Mustacciello*. scarso p.
Acredula Irbyi, *Parrelluccia a coda longa*. app. acc. coi grandi freddi.
Parus major, *Trentacinche*, *Parrellone*. s. f. p. m.
Cyanistes cæruleus, *Parrelluccia*. scarsa p.
Poecile palustris, *Passero i canne*. scarsa p.
Lophophanes cristatus. app. acc.
Certhia brachydactyla, *Frecachiuppo*, *Zotero*. f. p. m.
Tichodroma muraria. scarso p.
Oriolus Galbula, *Vollaro*. f. p. m.
Lanius Excubitor, *Querula*. scarsa.
Lanius minor, *Querula palummara*. f. p. m.
Lanius Collurio, *Querula cestaregna*. f. p. m.
Lanius auriculatus, *Passaregna*, *Querula passaregna*. f. p. m.
Muscicapa collaris, *Scellavattole*. scarsa p. m. passa in aprile.
Muscicapa Atricapilla. . . ? app. acc.
Butalis Grisola, *Moscardo*, *Pizzo 'nfierro*. s. p. m. passa prima metà aprile.
Hirundo rustica, *Tagliaforbice*. f. p.
Hirundo rufula. app. acc. una uccisa in aprile 1885, nel R. Museo Zoologico.
Chelidon urbica, *Rennenella*. f. p.
Cypselus Apus, *Rennenone*, *Sbirro*. f. p.
Cypselus Melba, *Piettoianco*. f. p.
Caprimulgus europæus, *Nganna pastore*. scarso p.
Picus major, *Cacafuoco*, *Fuoco 'nculo*. s. f. p. m.
Gecinus viridis, *Scassa gallenaro*. scarso p. m.
Iynx Torquilla, *Capotortiello*, *Pizzecaformicola*. scarso p.
Cuculus canorus, *Cuculo*. f. p. m.
Alcedo Ispida, *Marteniello*. s. f. p.
Coracias Garrula, *Pica marina*, *Pica verde*. scarsa p. m.
Merops Apiaster, *Acquarulo*, *Aparulo*. scarso p. m.
Upupa Epops, *Luppeca*, *Galluccio*. f. p. m.
Strix flammea, *Facciommo*. s. f. p. m.
Asio Otus, *Ascio*. f. p. m.
Athene Noctua, *Cevetta*. s. f. p. m.

Digitized by Google

Scops Giu, *Ascetiello.* s. f. p. m.
Bubo maximus, *Gran duca, Gufo.* s. scarso p. m.
Circus aeruginosus, *Falcone.* app. acc. ucciso a Somma nel 1882.
Circus cyaneus, *Falcone ianco, Miedeco.* scarsa p. m. passa prima metà di maggio.
Circus cineraceus, *Miedeco.* f. p.
Pandion Haliaëtus. app. acc.
Circaëtus gallicus, *Arpegna, Arpegnone.* f. p.
Buteo vulgaris, *Falcone.* s. scarsa p. m.
Æsalon regulus, *Falconciello.* f. p. m.
Cerchneis Tinnunculus, *Cestariello.* s. f. p. m.
Cerchneis Naumanni, *Cestariello.* f. p. m.
Cerchneis vespertinus, *Moscardo.* scarso p. m. passa in marzo, aprile e maggio.
Astur palumbarius, *Falcone i torre, Sparviero.* app. acc.
Pelecanus Onocrotalus, *Pellicano.* app. acc. con forti burrasche, a branchi.
Phalacrocorax Carbo, *Corvastro.* app. acc.
Ardea cinerea, *Airone, Aurione.* scarso p. passa prima metà di marzo e seconda di ottobre.
Ardea purpurea, *Russiello.* f. p. passa prima quindicina di marzo e ottobre.
Egretta alba, *Aurana, Aurana ianca.* scarsa p. passa prima metà marzo e ottobre.
Egretta Garzetta, *Auranella.* f. p. passa prima metà aprile.
Ardeola ralloïdes, *Spolleca voie, Auranella melata.* scarsa p. passa seconda metà marzo.
Ardetta minuta, *Russellino.* scarso p. passa in marzo, aprile, maggio.
Botaurus stellaris, *Capone selvaggio.* f. p.
Nycticorax griseus, *Garzotta.* f. p. passa in marzo, aprile e maggio.
Ciconia alba, *Cicogna.* app. acc.
Ciconia nigra, *Cicogna.* app. acc.
Platalea Leucorodia, *Palettone.* app. acc. vedonsi i giovani nell' inverno.
Plegadis Falcinellus, *Corvella.* app. acc. in aprile e maggio.

Digitized by Google

Phœnicopterus roseus, *Fiammante.* app. acc. passa in ottobre sul lago di Patria.
Anser cinereus, *Papara.* scarsa.
Anser segetum, *Papara romana.* scarsa.
Tadorna cornuta, *Tadorna.* app. acc.
Anas Boscas, *Mallardo* (mas.) *Anetra* (fem.). f.
Spatula clypeata, *Cucchiarone, Domenicano.* scarso.
Dafila acuta, *Codalone, Codeluongo.* f.
Mareca Penelope, *Caperusso, Chiummazzone.* f.
Nettion Crecca, *Salzetta.* f. passa prima metà marzo e seconda ottobre.
Querquedula Circia, *Marzaiola.* f. passa prima metà marzo.
Fulix ferina, *Caporusso, Fischione, Fischiante.* f.
Fulix Fuligula, *Nchiummata.* f.
Fulix Nyroca, *Morettone.* f.
Bucephala Clangula, *Quattuocchie.* scarso.
Mergus Serrator, *Secone.* scarso.
Mergellus Albellus, *Secariello.* scarso.
Columba Palumbus, *Palummo selvaggio, Turchiato.* f. p. passa prima metà ottobre.
Columba livia, *Palummella de la Cava.* passa prima metà ottobre.
Turtur tenera, *Tortorella.* f.
Coturnix communis, *Quaglia.* f. p.
Rallus aquaticus, *Galleniello reale.* scarsa p.
Ortygometra Porzana, *Galleniello.* s. f. p.
Ortygometra Bailloni, *Galleniello peducchiello.* f. p.
Ortygometra parva, *Galleniello.* f. p. passa in aprile.
Crex pratensis, *Re i quaglia.* f. p.
Gallinula chloropus, *Gallenella follacara.* scarsa p.
Porphyrio cæruleus, *Gallina sultana.* acc.
Fulica atra, *Follaca.* s. f. p.
Grus communis, *Gru, Ngroia.* app. acc. ucciso nel novembre 1882.
Otis Tarda, *Otarda.* acc.
Otis Tetrax, *Gallina petrarola.* acc.
Œdicnemus scolopax, *Riversino.* scarso p.

Digitized by Google

Charadrius Pluvialis, *Peliere.* f. p.

Squatarola helvetica. scarsa p.

Eudromias Morinellus, *Turdo.* scarso p. passa in aprile ed ottobre.

Ægialitis curonica, *Uocchio cuotto.* scarso p. prima metà aprile.

Vanellus Capella, *Pavoncella.* f. p.

Haematopus Ostralegus, *Cola marina*, *Polentino.* scarso p. passa seconda quindicina aprile.

Recurvirostra Avocetta, *Pizzo stuorto*, *Avocetta.* app.-acc.

Himantopus candidus, *Gammettone*, *Vedovella.* scarso p. passa prima metà aprile e seconda ottobre.

Phalaropus fulicarius. app. acc. due soli uccisi.

Pelidna subarquata, *Tirolino romano.* f. p. passa seconda aprile e ottobre.

Pelidna alpina, *Tirolino.* f. p. passa seconda metà aprile e ottobre.

Actodromas minuta, *Romaniello.* f. p. passa seconda metà aprile e ottobre.

Tringa Canutus, *Tirolino.* app. acc.

Calidris Arenaria, *Tirolino?* f. p. passa in ottobre.

Machetes Pugnax, *Gammetta*, *Tuffella.* f. p. passa in aprile ed ottobre.

Tringoïdes Hypoleucus, *Quaglia marina.* f. p. passa in aprile ed ottobre.

Totanus Ochropus, *Tirolino.* f. p. passa in aprile.

Totanus stagnatilis, *Sichiló*, *Tirolino.* scarso p. passa in aprile ed ottobre.

Totanus Calidris, *Tirolino?* scarsa p. passa in aprile ed ottobre.

Totanus fuscus, *Tirolino.* scarsa p. passa in aprile ed ottobre.

Totanus nebularius, *Tirolino.* scarsa p. passa in aprile ed ottobre.

Limosa melanura, *Beccaccia romana.* app. acc.

Limosa rufa, *Galluzzo?* scarsa p.

Scolopax Rusticula, *Beccaccia*, *Arcera.* f. p. m.

Digitized by Google

Gallinago major, *Starnotta.* f. p. passa in marzo.
Gallinago cælestis, *Beccaccina, Arcigliola.* f. p.
Gallinago Gallinula, *Arcigliuolo, Picchiucchio.* f. p.
Numenius Arquata, *Ciarluotto.* f. p. passa in ottobre.
Numenius tenuirostris, *Ciarluottella.* f. p. passa in ottobre.
Numenius Phæopus, *Ciarluotto reale?* scarso p. passa in ottobre.
Glareola Pratincola, *Vicenza, Pernice d' acqua.* scarsa p. passa in ottobre.
Sternula minuta, *Guaraglio?* app. acc.
Hydrochelidon nigra, *Guaraglio.* app. acc.
Chroocephalus minutus. scarso.
Chroocephalus ridibundus, *Gavina?* app. acc.
Larus canus, *Gavina?* scarsa.
Larus cachinnans, *Gafio? Gafione?* scarso.
Larus marinus, *Gafio, Gafione, Gafrione.* acc.
Puffinus anglorum, *Gafio?* scarsa.
Puffinus Kuhli, *Pallante.* scarsa.
Utamania Torda, *Nasone.* app. acc. d'inverno presso Posillipo.
Fratercula arctica. app. acc. uccisa nel 1884 sul campo di Marte a 3 chilom. dal mare.
Colymbus septentrionalis. app. acc. ucciso nel novembre 1865 sul lago di Patria.
Podiceps cristatus, *Morte, Morte reale.* f.
Podiceps nigricollis, *Morticella.* f.
Podiceps fluviatilis, *Summuzzariello.* f.

Napoli, isola di Capri (Cerio dott. cav. Ignazio):

L'isola di Capri, a 17 miglia da Napoli e a circa 4 miglia dalla punta della Campanella, è posta al S.E. dell' incantevole golfo. La sua latitudine è 40° 32′ 45″ e la differenza di longitudine coll'Osservatorio astronomico di Napoli è 0° 0′ 9″. Dal lato ovest è divisa dall' isola d' Ischia per

Digitized by Google

un canale di circa 17 miglia. È tutta costituita da rocce calcaree che si elevano quasi dappertutto nel suo perimetro a picco sul mare, essendo accessibile solo da due punti di cui uno al nord, la Marina, l'altro al sud, Piccola Marina di Mulo. La sua massima elevazione sul mare, sul monte Solaro, è di circa 1800 piedi. Il clima ne è dolcissimo e temperato. La vegetazione degli alberi di alto fusto vi è scarsissima, solo nel tenimento di Anacapri si vede tuttora qualche rara Quercia, i macchieti di *Arbutus*, di Lentisco, di Elci che altra volta rivestivano tutto il versante settentrionale dell'isola sono quasi del tutto spariti per coltivare a vigneto ogni punto dove trovasi tanto di suolo vegetabile da alimentare le viti. Da qualche anno anche gli ulivi cominciano a cadere sotto la scure del contadino per sostituirli colla vite che si crede più rimunerativa. La coltura delle viti e degli agrumi, la pesca, e la caccia delle Quaglie, costituiscono le principali industrie del paese. Non vi sono depositi di acque stagnanti, e la mancanza di alta e densa vegetazione impartisce all'isola un aspetto di aridità singolare.

Alla fine di marzo incomincia il passo regolare degli uccelli e la loro strage. Già ne' primi giorni d'aprile le colline presso il mare sono tutte ricoperte di reti per la caccia delle Quaglie e delle Tortore; se ne prendono sino alla metà di giugno, sebbene in quest'ultimo mese il loro numero sia scarsissimo. Ne' primi di settembre si stendono nuovamente le reti, tenendo conto del fatto che a primavera il passo delle Quaglie è basso e perciò si preferiscono i siti presso al mare, ed in settembre si scelgono punti più elevati. L'ora del passo per le Quaglie è dalla mezza notte sino ad un'ora dopo la levata del sole. I piccoli uccelli sono presi anch'essi a migliaia e migliaia, e non v'ha quasi fanciullo od adulto nell'isola che non abbia 20 o 30 trappole dette *gratiglie* e fatte con cannucce messe su d'un archetto di salcio e con un vermiciattolo per esca, pronte per la caccia di primavera. Dopo la prima quindicina di aprile alla trappola si preferisce l'archetto come più di-

Digitized by Google

struttivo. Nonostante che per legge tale caccia sia proibita, nessuno la impedisce ed i piccoli uccelletti che passano per l'isola sono più che decimati.

Elenco delle specie di uccelli osservate sull'isola di Capri, provincia di Napoli, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione ecc., ecc.

Fringilla cœlebs. Sedentario e nidificante.
Passer Italiæ. Sedentaria e nidificante.
Carduelis elegans. Sedentario e nidificante.
Ligurinus Chloris. Sedentario e nidificante.
Pyrrhula europæa. Di comparsa accidentale.
Budytes flavus, *Currisola.* Si ferma nell'autunno.
Motacilla alba, *Codajanca.* Sedentaria.
Saxicola Oenanthe. Passa dalla fine di marzo alla metà di maggio e anche in settembre-ottobre.
Saxicola albicollis. Passa dalla fine di marzo alla metà di maggio ed in settembre.
Saxicola Stapazina. Passa dalla fine di marzo alla metà di maggio ed in settembre.
Monticola saxatilis. Passa dalla fine di marzo alla metà di maggio ed in settembre.
Monticola Cyanus. Sedentaria, nidifica tra le roccie inaccessibili.
Merula nigra. Sedentario, pochi nidificanti.
Aëdon Luscinia. Passa alla metà di marzo ed in settembre, qualche coppia rimane a nidificare.
Erithacus Rubecula. Rimane durante l'inverno.
Cyanecula Wolfi. Di scarso ed irregolare passaggio in aprile.
Ruticilla Phœnicurus, *Zéllécchia.* Passa dalla fine di marzo alla fine di maggio ed in settembre.

Digitized by Google

Ruticilla titys. Passa dai primi di marzo alla fine di maggio ed in ottobre.

Pratincola Rubicola. Passa dalla fine di febbraio a quella di maggio ed in settembre-ottobre.

Pratincola Rubetra. Passa dalla fine di febbraio a tutto maggio ed in settembre.

Monachus Atricapillus. Sedentaria e nidificante.

Tichodroma muraria. Raro in febbraio sulle roccie di Anacapri.

Oriolus Galbula. Sin dalla fine di marzo vedonsi poche coppie di passo e così in settembre.

Lanius Collurio. Passa dalla fine di marzo a tutto maggio ed in settembre.

Lanius auriculatus. Passa dalla fine di marzo ai primi di giugno ed in settembre.

Muscicapa collaris. Passa dalla fine di marzo alla metà di maggio.

Butalis Grisola. Passa dalla fine di marzo a quella di maggio.

Hirundo rustica. Di solo passo nel marzo, nessuna nidifica nell'isola; passa anche in settembre-ottobre.

Cotile rupestris. Sedentaria, nidifica tra le roccie a picco sul mare e vi rimane l'inverno; è la sola Rondine che nidifica a Capri.

Cypselus Apus. Passa in aprile e non si ferma.

Cypselus Melba. Passa ai primi di aprile.

Caprimulgus europæus. Di scarso passaggio in aprile.

Iynx Torquilla. Di scarso passaggio in aprile ed in settembre.

Cuculus canorus. Passa in aprile ed in settembre.

Alcedo Ispida. Passa in branchetti alla fine di aprile e nel maggio.

Coracias Garrula. Di scarso passo alla fine di marzo ed in aprile, individui isolati.

Merops Apiaster. Passa in aprile e maggio in branchetti di 20 a 50 individui, e così in settembre.

Upupa Epops. Passa isolata alla fine del marzo ed in settembre.

Digitized by Google

Strix flammea. Sedentaria e nidificante.

Scops Giu. Passa in aprile, individui isolati.

Bubo maximus. Ogni anno nella prima metà di maggio se ne prende qualcuno.

Nisaëtus fasciatus. Di accidentale comparsa.

Falco Peregrinus. Sedentario, due o tre coppie nidificano sull'isola, in aprile, deponendo 3 o 4 uova; cibansi specialmente di Quaglie.

Cerchneis Tinnunculus. Sedentario, nidifica tra le roccie.

Accipiter Nisus. Di scarso passaggio in autunno.

Egretta Garzetta. Passa in piccoli branchi alla fine di aprile.

Ardeola ralloïdes. Passa in piccoli branchi alla fine di aprile.

Ardetta minuta. Passa isolata alla fine di aprile.

Nycticorax griseus. Passa in piccoli branchi nell'aprile.

Columba livia. Passa in branchi alla fine d'aprile.

Turtur tenera. Passa in branchi in aprile e maggio.

Coturnix communis, *Quaglia.* Passa in copia dalla fine di marzo a tutto giugno e nel settembre ed ottobre; di rado qualcheduna rimane a nidificare. Se ne prendono parecchie migliaia alle reti tanto in maggio che in settembre. La caccia delle Quaglie colle reti costituisce un'industria molto importante per l'isola. Il numero delle Quaglie che si prendono nel passaggio del maggio ed in quello di settembre, ascendono alle 50 o 60 mila. Un solo de' vari incettatori in quest'anno 1887 ne ha mandate a' mercati di Napoli 11 mila a maggio e circa 10 mila in settembre.

Rallus aquaticus. Di passo nell'aprile.

Ortygometra Bailloni, *Ruocio.* Passa in aprile.

Ortygometra parva, *Quaglia di mare.* Di scarso passo in aprile.

Crex pratensis. Di scarso passo in aprile e maggio.

Fulica atra. Di scarso passo in aprile e maggio.

Fulica cristata. Di comparsa accidentale.

Grus communis. Di rado passa in branchi, foriera di forti temporali.

Œdionemus scolopax, *Tre-tarì.* Di scarso passaggio in aprile.

Charadrius Pluvialis. Passa alla fine di marzo.

Digitized by Google

Vanellus Capella. Qualche individuo isolato passa in aprile.

Scolopax Rusticula. Passa dalla fine di ottobre al gennaio nelle giornate fredde con vento settentrionale.

Larus cachinnans. Sedentario, nidifica sui Faraglioni.

Procellaria pelagica. Raro, si vede più facilmente in aprile.

Utamania Torda. Questa specie altra volta molto rara sul mare attorno all' isola, vi è stata notata più frequentemente in questi ultimi anni; parecchi individui furono presi, e, nel 1887, ne vidi io stesso tre presso la spiaggia al nord dell' isola. La comparsa di questi uccelli è ritenuta foriera di freddi intensi o di temporali.

Fratercula arctica. Rara ed accidentale, ne ebbi una femmina l'8 gennaio 1887, presa vivente a poca distanza dalla spiaggia settentrionale.

Osservazioni. — Le specie che nidificano a Capri sono pochissime, sia per la quasi assoluta mancanza di boschi o macchieti, sia per la caccia senza restrizione che si fa a tutti gli uccelletti di passaggio, con ogni sorta di trappole. La distruzione di alberi di alto fusto, e perfino di quelli da frutto, ed anche la incominciata distruzione dell' ulivo, il quale è sostituito dalla vite creduta più rimunerativa, ha fatto sì che anche gli uccelletti i più comuni vi nidifichino in piccolo numero. Le specie che sono di passaggio per l' isola non giungono ad ore fisse, ciò varia per molte cause e nei giorni propizî l' isola è addirittura coperta di uccelli, i quali vi si fermano poche ore. Il passo è usualmente abbondante nelle giornate in cui spira scirocco o scirocco-levante. Al loro arrivo questi uccelli vengono catturati a migliaia: fanciulli ed adulti si recano sulle colline o pei campi, pei primi arrivi usano le trappole o *gratiglie*, alla fine di aprile gli archetti; la distruzione fatta così è enorme.

Digitized by Google

PUGLIE.

Elenco delle specie di uccelli osservate nelle Puglie, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione, ecc. ecc. [1]

Corvus Corax, *Cuervo* (Bari). Stazionario e scarso nelle regioni elevate, accidentale al piano. Nel febbraio 1883 ne fu ucciso uno presso Bari.

Corvus Cornix, *Curnacchia* (Bari). Sedentaria e nidificante, ma non copiosa.

Corvus frugilegus, *Cuervo* (Bari). Giungono in truppe in autunno (cominciano a vedersi nei primi giorni di ottobre), si trattengono tutto l'inverno, e partono in marzo.

Lycos Monedula, *Ciola*, *Ciaula* (Bari). Stazionaria, copiosa, e nidificante, ma localizzata ad alcuni punti è difficile incontrarla lungi dalla sua abituale dimora.

Pica rustica, *Gazza* (Bari). Sedentaria, comune, nidificante dappertutto.

Garrulus glandarius, *Pica* (Bari). Sedentaria, comune, nidificante, meno copiosa della specie precedente.

Pyrrhocorax alpinus. Accidentale. Il 24 dicembre 1880 ne fu ucciso uno presso Bari.

Sturnus vulgaris, *Sturno* (Bari). Si vede in torme numerosissime (miriadi d'individui) nel passo di autunno (dall'ottobre), e di primavera (nel marzo). È facile incontrarne nell'inverno.

Pastor roseus. Accidentale. Si conoscono quattro sole catture in Puglia. Nel giugno del 1879 fu ucciso presso

---

[1] Questo elenco è stato compilato dal chiarissimo professore Vincenzo De Romita di Bari, autore di un lavoro pregievole sulla *Avifauna Pugliese*, pubblicato a Bari nel 1834; in questo elenco sono molte nuove osservazioni finora inedite.

Digitized by Google

Bari un giovane nel suo primo abito, appena compiutamente impennato.

Fringilla cœlebs, *Fringiedd* (Bari). Comunissimo, stazionario, nidificante. Gli immigranti cominciano a vedersi alla fine di settembre e ripassano in aprile.

Fringilla Montifringilla, *Fringiedd turchiesco* (Bari). Scarso, apparisce in pochi individui alcuni anni sì, altri no.

Petronia stulta, *Passaltario* (Bari). Comune al doppio passo, non rara d'inverno. Molte nidificano nelle regioni elevate della provincia.

Passer montanus, *Passaro turchiesco* (Bari). Di passo regolare nell'aprile e al principio di autunno: in alcuni anni copioso. Un certo numero resta a nidificare.

Passer Italiæ, *Passaro* (Bari). Un grandissimo numero è stazionario e nidificante in campagna ed in città, non schivando neppure gli edifici, in cui è maggiore il tumulto cittadino. Moltissime sono immigranti e la migrazione di autunno comincia nella seconda metà di settembre fino ai primi di ottobre, quella di primavera ha luogo in aprile.

Coccothraustes vulgaris, *Fringieddone* (Bari); *Spezza Fier*, *Piezz gruess*, *Fringiddastre* (provincia). Comincia l'immigrazione nella seconda metà di ottobre; è specie invernale dove sono boschi e macchie; emigra in marzo ed aprile.

Ligurinus Chloris, *Verdone*, *Mairino* (Bari). Viene in autunno (dall'ottobre), molti vi passano l'inverno, e si rivede copioso in aprile. Più volte di estate (luglio ed agosto) son capitati alle reti dei giovani nel loro primo abito.

Chrysomitris Spinus, *Zairo* (Bari). Non mai abbondante, si vede più o meno frequente all'epoche del doppio passo. Non manca nell'inverno. In alcuni anni non si vede affatto.

Carduelis elegans, *Cardillo, Cardillicchio*, *Capobianc* il giov. (Bari). Comune, abbondanti dall'ottobre all'aprile i migratori. Moltissimi gli stazionari, nidificanti in tutta la campagna pugliese.

Digitized by Google

Serinus hortulanus, *Lapariedd* (Bari). Comune ed abbondante nelle epoche del doppio passo come la specie precedente, s'incontra frequentemente l'inverno. Dopo l'aprile è difficilissimo vederne. Mancano prove che qualche coppia resti tra noi a nidificare.

Cannabina Linota, *'Ngannaparùlo* (Bari). Comune ed abbondante nelle epoche del doppio passo, ottobre-novembre e marzo-aprile. Si vede d' inverno.

Ægiothus rufescens. Accidentale. Ne fu catturato uno alle reti nel dicembre del 1886 in Monopoli.

Carpodacus erythrinus. Accidentale, ma non rarissimo. Dall'agosto del 1874 ho notizia di nove catture di quest' uccello; l' ultima delle quali il 27 gennaio del 1888. Tutti in livrea giovanile.

Pyrrhula europæa. Poco frequente: difficilmente abbandòna i boschi e le macchie delle Murge per venire al piano del litorale.

Loxia Curvirostra. Di apparizione irregolare, ed estiva. Da qualche anno abbondante, ma soli individui in livrea non perfetta.

Euspiza melanocephala, *Re de l'Ortuani* (Bari). Non raro: apparisce quasi tutti gli anni ora in maggiore, ora in minor copia; ordinariamente verso la fine di aprile e in maggio. Nel luglio del 1873 ne ebbi due giovani.

Miliaria Projer, *Cicirone* (Bari). Molti sedentarii e nidificanti sulle Murge, moltissimi immigranti; in qualche anno il loro passo è veramente abbondante.

Emberiza Citrinella. Accidentale. Una sola cattura.

Emberiza Cirlus, *Frisone fru fru* (Bari). Di passo regolare e piuttosto abbondante nel novembre e nell' aprile. Frequenta nell' inverno le macchie e i boschi. Questa specie e l' *Emberiza Schœniclus* sono tra gli zigoli i più comuni nella regione pugliese.

Emberiza Hortulana, *Ortuano* (Bari). Ora in maggiore, ora in minor numero, non mai in copia si vede solamente nel passo di primavera (fine di marzo e aprile).

Digitized by Google

Emberiza Cia. Di apparizione accidentale nel passo di primavera.

Emberiza leucocephala. Nell'ottobre del 1874 fu catturata alle reti una femmina.

Emberiza rustica. Un individuo nella primavera del 1874, ed un altro nell' aprile del 1881.

Emberiza pusilla. Un individuo catturato alle reti presso Bari nel maggio del 1880.

Emberiza Schœniclus, *Frisone* (Bari). Comune nelle epoche del passo di primavera e di autunno. Si vede d' inverno.

Emberiza pyrrhuloïdes. Assai scarsa. Le poche catture avvennero in primavera.

Calcarius nivalis. Accidentale, ma non rarissimo. Non si è mai visto di estate.

Melanocorypha Calandra, *Calandrone* (Bari). Comunissima, stazionaria, nidificante. Molte immigrano.

Otocorys alpestris. Un individuo cadde nelle reti nel maggio del 1877.

Calandrella pispoletta. Una femmina uccisa presso Bari il 27 marzo 1875.

Calandrella brachydactyla, *Faldeddu* (Bari). Di passo copioso in primavera (dalla fine di marzo alla prima metà di maggio). Il passo autunnale comincia verso la metà di agosto fino oltre il settembre. Gli immigranti in questa stagione hanno già compiuta la prima muta. Non poche restano a nidificare. Il 12 agosto 1886 ne ebbi un giovane non per anco compiutamente impennato.

Alauda arborea, *Picchicchiera* (Bari). Abbondante nelle epoche del passo: non manca l' inverno. Il passo di primavera comincia verso la metà di marzo, quello di autunno alla fine di settembre.

Alauda arvensis, *Terragnola* (Bari). Abbondantissima nelle epoche del passo e nell' inverno. Il passo autunnale comincia alla fine di settembre, quello di primavera si compie in marzo. Un certo numero resta tra noi a nidificare, e nel luglio ho avuto giovani nella prima loro livrea.

Digitized by Google

Galerita cristata, *Cocciarda* (Bari); *Cucughia*, *Cucughiatu* (provincia). Sedentaria, nidificante. Si incontra frequentemente, ma non in branchi.

Agrodroma campestris, *Code lenghe* (Bari). Solitario o in piccole frotte, comincia a farsi vedere in agosto; lo si rivede nel piano in aprile.

Anthus pratensis, *Spinzidd* (Bari). Dalla metà di ottobre comincia ad apparire in copia grandissima: si trattiene tutto l'inverno, e alla fine d'aprile sono già tutte partite. Non se ne videro mai in abito nuziale. Nel corrente autunno 1888 la copia è eccezionalmente grande.

Anthus cervinus, *Spinzidd papalino* (Bari). Scarsa nel passo autunnale; di regolare apparizione e qualche anno frequente e quasi abbondante nel passo di primavera (fine di aprile e prima metà di maggio). In questa stagione il loro passo comincia quando è compiuto quello della specie precedente, e tutte hanno già vestito l'abito nuziale.

Anthus trivialis, *Grassinale*, *Turdino* (Bari). Di passaggio regolare e anche abbondante in autunno e in primavera. Si vede anche d'inverno.

Anthus Spipoletta. Piuttosto raro: scarsi individui catturati nel passo di primavera (aprile) ed uno nel novembre del 1883.

Budytes flavus, *Pappamosche*, *Gialluidd* (Bari). Comune ed abbondante nell'epoca del passo di autunno (dalla seconda metà d'agosto a tutta la prima metà d'ottobre); più abbondante ancora in primavera (dalla seconda metà di marzo a quasi tutto maggio). È del genere *Budytes* la forma più frequente. In quelli di autunno sono rarissimi gli individui in abito perfetto.

Budytes cinereocapillus. Assai meno frequente della specie precedente apparisce negli stessi tempi, riferendo a questa e alla forma seguente i giovani di autunno, che mancano della fascia sopraccigliare.

Budytes borealis. Più frequente del precedente, ma assai

Digitized by Google

meno abbondante del *B. flavus;* si vede negli stessi tempi.

Budytes melanocephalus. Apparisce regolarmente tutti gli anni al tempo del passo di primavera, misto alle specie surriferite, e non può dirsi scarso. Non si vede in autunno.

Budytes paradoxus. Non raro. Quasi tutti gli anni in primavera ne capita qualcuno.

Budytes xanthophrys. Fra i molti esemplari con fascia sopraccigliare e tratti suboculari gialli, raccolti, non parmi che alcuno possa con certezza riferirsi al *Budytes xanthophrys* tipico (*Budytes melanocephalus* o meglio *Budytes paradoxus* con fascia sopraccigliare e tratti suboculari gialli). Essi con graduali passaggi si ravvicinano alla forma *B. flavus* con sopraccigli gialli, quantunque ordinariamente presentino nella colorazione del pileo e della cervice certa differenza. Ben vero però che similmente per graduali passaggi si collegano intimamente tra loro le forme *B. borealis*, *B. cinereocapillus*, e *B. melanocephalus*, in modo da trovarsi spesso di fronte ad individui che non è possibile decidere a quale delle tre forme siano da riferirsi. Queste osservazioni sono tanto più degne di ponderazione per ragione della facilità con la quale i *Budytes* presentano nell' abito variazioni allocrostiche, non attribuibili solo ad albinismo.[1]

Motacilla alba, *Monaca*, *Monachecchia*, *Aciedd d' la neva* (Bari). Abbondante nelle epoche del passo. Si trova d'inverno. Il passo autunnale comincia nella seconda metà di settembre, il passo di primavera comincia alla metà di febbraio e dura oltre il marzo. Ne ho avute nei primi giorni di maggio.

Calobates melanope, *Lamba fuess* (Bari). Si vede negli stessi

---

[1] Per quanto concerne la fascia sopraccigliare, ho esemplari riferibili alla forma *B. borealis* e alla forma *B. cinereocapillus* con fascia sopraccigliare bianca completa e nettamente distinta.

Digitized by Google

tempi della specie precedente, ma è assai meno abbondante; potrebbe anche forse dirsi scarsa. Gli individui in abito nuziale sono rari; ma nel marzo del corrente anno 1888 ne ho avuti tre.

Saxicola Oenanthe, *Paghionica matta*, *Paghionica di parete.* (Bari). Si vede abbondantemente solo alla fine d'agosto, quando immigra. È frequente, ma non copioso in aprile, quando viene a nidificare.

Saxicola albicollis, *Paghionica* (Bari). Non rara, ma scarsa. Si vede in ogni stagione, ma più frequentemente nella primavera.

Saxicola melanoleuca, *Paghionica* (Bari). È a ripetersi quello che si è detto per la specie precedente. Nessuno degli esemplari côlti in Puglia, da me esaminati, può riferirsi alla forma occidentale *S. Stapazina.*

Monticola saxatilis. Poco frequente. Le catture avvennero in primavera (aprile).

Monticola Cyanus. Stazionaria, nidificante sulle alte torri; poco frequente nella provincia di Bari, ma facile a trovarsi in provincia di Lecce.

Merula nigra, *Mierlo* (Bari). Comune. Si trova scarsamente in estate: è copioso dalla seconda metà di ottobre quando giungono i migranti e tutto l'inverno.

Merula torquata. Accidentale e assai raro.

Turdus pilaris, *Tordeca* (Bari). Non giunge tutti gli anni. Si fa vedere d'inverno; e qualche volta in copia sì, ma per pochi giorni soltanto.

Turdus iliacus, *Turd zir* (Bari). È frequente, ma non abbondante: comincia a farsi vedere in novembre, passa l'inverno ed emigra in aprile.

Turdus musicus, *Turd* (Bari). Abbondante assai; giunge ai primi giorni di ottobre, molti restano l'inverno; e al finire di marzo la loro partenza è già compiuta.

Turdus viscivorus. Stazionaria, nidificante, ma scarsa.

Aëdon Luscinia, *Usignùolo* (Bari). Scarso assai; non è difficile vederlo dal novembre all'aprile: in questo mese è meno scarso.

Digitized by Google

Erithacus Rubecula, *Piett russ* (Bari). Comunissimo l'autunno l'inverno e la primavera dove son macchie fitte.

Ruticilla Phœnicurus, *Coda ross* (Bari). Copiosi i giovani nel principio di autunno, scarsi gli adulti in abito perfetto nell'aprile; due volte in luglio ebbi giovani avanti la prima muta.

Ruticilla titys, *Coda-ross* (Bari). Scarso ma non raro; più frequenti i giovani in autunno ed in inverno.

Pratincola Rubicola, *Cacamargiale* (Bari). Frequente nell'autunno, in inverno e in primavera.

Pratincola Rubetra, *Cacamargiale* (Bari). Scarso: si vede in autunno, ma più facilmente in aprile.

Sylvia orphæa. Rara: due sole catture in aprile.

Sylvia cinerea, *Facedua* (Bari), *Beccafico* (Cassano delle Murge). Specie estiva nidificante nelle macchie. In copia sul cadere di agosto e nei primi giorni di settembre i giovani; si vede in aprile.

Sylvia subalpina, *Sibalecchia* (Bari). In aprile piuttosto frequente; molti restano a nidificare fra noi, e più volte in luglio furono catturati giovani non peranco completamente impennati.

Monachus Atricapillus, *Facedua capignora* (Bari). Comune in autunno ed in inverno nei boschi e nelle macchie; piuttosto rara nei campi coltivati.

Monachus hortensis, *Facedua* (Bari). Piuttosto comune in autunno.

Pyrophthalma melanocephala, *Sibalecchia* (Bari). Comune ed abbondante tutto l'inverno nei boschi e nelle macchie più, ma anche nei campi coltivati e nei giardini.

Melizophilus undatus. Molto rara: non ho conoscenza che di due sole catture.

Phylloscopus sibilator. Scarsamente si vede in agosto e nei primi giorni di settembre.

Phylloscopus Trochilus, *Facedua gialletta* (Bari). Scarso, e non in altro tempo che in agosto.

Phylloscopus rufus, *Ualanicchio* (Bari). Copioso tutto l'inverno, frequentando nelle giornate rigide i giardini posti

Digitized by Google

nell' abitato; giunge alla fine di ottobre e diviene già scarso in aprile.

Hypolais icterina, *Facedua gialletta* (Bari). Si vede scarsamente alla fine di agosto e nei primi giorni di settembre.

Hypolais polyglotta, *Facedua gialletta* (Bari). Un solo individuo nell' agosto del 1873.

Hypolais olivetorum. Un solo esemplare il 3 maggio 1885.

Acrocephalus arundinaceus, *Facedua gross* (Bari). Scarso. Si vede scarsamente nelle epoche del doppio passo.

Calamodus schœnobænus. Assai scarso; i pochi esemplari nell' ottobre e nell' aprile.

Lusciniola melanopogon. Catturato una sola volta.

Cisticola cursitans, *Favodda* (Barletta). Stazionario in Capitanata nei luoghi appropriati; qualche volta capita sul litorale.

Troglodytes parvulus. Stazionario, nidificante; più frequente nel verno.

Cinclus aquaticus. Accidentale; un solo individuo nel novembre 1882, (var. *C. albicollis*).

Accentor modularis, *Facedua* (Bari). Frequente nell'autunno e nell' inverno fra le macchie e i cespugli.

Regulus cristatus, *Re de l' aciedd* (Bari). Non comune, ma non raro; lo si vede in autunno ed in inverno.

Regulus ignicapillus, *Re de l' aciedd* (Bari). Si vede nello stesso tempo, ma è più frequente. L' ho avuto in luglio (giovane dell' anno).

Ægithalus pendulinus. Raro. Solo nell' agosto del 1878 ne ebbi tre giovani appena impennati.

Acredula Irbyi. Stazionario e non raro sulle Murge.

Panurus biarmicus. Accidentale. Due sole catture, una nell' aprile 1871, l' altra il 15 ottobre 1886.

Parus major, *Cinciallegra*, *Capignora* (Bari). Comunissima in tutti i tempi e dappertutto; nidifica anche nei giardini vicini all' abitato.

Cyanistes cæruleus, *Pizzolamenua* (provincia). Poco meno comune della specie precedente e nidificante. Copiosa in ottobre-novembre ed in aprile.

Digitized by Google

Sitta cæsia. Stazionario nei boschi.

Certhia brachydactyla. Non comune, ma piuttosto frequente nel principio di autunno e in primavera.

Tichodroma muraria. Accidentale: un solo individuo in Putignano, oltre quello preso al Gargano (Costa).

Oriolus Galbula, *Godia*, *Pizzicodia* (Bari). Giunge in maggio in numero se non copioso, non scarso; si fermano nelle regioni boscose delle Murge a nidificare e partono alla fine dell'estate.

Ampelis Garrulus. Rarissimo. Un solo individuo catturato sul Gargano nel 1829 (Costa).

Lanius minor, *Pagghionica grossa* (Bari). Nidificante e comune in estate sulle Murge, rara nel piano.

Lanius Collurio, *Pagghionica* (Bari). Scarsissima e solo in primavera.

Lanius auriculatus, *Pagghionica* (Bari). Comune e nidificante sulle colline e sul piano. In novembre frequentissimi i giovani.

Muscicapa collaris. Non frequente; scarsi assai gli adulti, ma assai più facili a rinvenirsi i giovani alla fine dell'estate e in autunno.

Muscicapa Atricapilla. È a ripetersi quello che si dice per la specie precedente.

Butalis Grisola, *Moscarola* (provincia). Non comune, ma neppure scarso, si trova dal novembre a tutto l'aprile.

Hirundo rustica, *Rinninedda coda longa* (Bari). Comune e nidificante: arriva alla fine di marzo e parte nel settembre.

Hirundo rufula, *Rinninedda turchiesca* (Bari). Scarsa, ma di passo regolare in primavera dalla fine di marzo ai primi giorni di maggio.

Chelidon urbica, *Rinninedda palommina* (Bari). Comune, ma meno abbondante della *Hirundo rustica*. Nidifica in città.

Clivicola riparia, *Rinninedda castagnazza* (Bari). Piuttosto scarso, e per certo non abbondante; si vede in primavera.

Digitized by Google

Cypselus Apus, *Rinninone* (Bari). Comune tutto l'estate e nidificante sulle alte torri. Arriva in aprile e parte in settembre.

Cypselus Melba, *Rinninessa* (Bari). Non frequente: si vede in numero assai scarso di primavera e di autunno.

Caprimulgus europæus, *'Ngannapastore* (Bari). Piuttosto comune, ma non abbondante, si vede dalla primavera all' autunno.

Picus major. Poco frequente; sedentario nei boschi.

Picus minor. Anch'esso poco frequente e sedentario nei boschi.

Gecinus viridis, *Gadd di vosco*, *Piddito* (Bari). Poco frequente e sedentario nei boschi.

Iynx Torquilla, *Pizzua formica* (Bari). Comune in autunno e in primavera.

Cuculus canorus, *Cuccù*, *Cuc di tortore*. Non è infrequente di primavera, in maggio; si vede qualche volta in autunno. Ne ho avuti in agosto.

Alcedo Ispida, *Aciedd di San Giuan* (Bari). Comune in tutto l'anno, ma più frequente la stagione estiva; non mai abbondante.

Coracias Garrula, *Pica marina* (Bari). Si vede in primavera (maggio), nelle regioni boscose in estate, dove nidifica, e nel passo di autunno. Non è copiosa mai.

Merops Apiaster, *Aparùlo*, *Acquarulo* (Bari). Comune ed anche abbondante in primavera (fine d'aprile e maggio); si vede di estate sulle Murge; è di passo in settembre.

Merops persicus. Accidentale. Un solo individuo nell' aprile del 1874 presso Bari.

Upupa Epops. Estiva e nidificante nei boschi; si vede facilmente altrove nella primavera (aprile e maggio) e nel settembre.

Strix flammea, *Malaciedd* (Bari). Comune e nidificante sulle alte torri anche in città. Stazionario.

Syrnium Aluco. Poco frequente, ma stazionario e nidificante. L'ho avuto in febbraio, in aprile e in giugno.

Asio Otus, *Cornicedda* (Bari). Non infrequente nelle epoche del doppio passo.

Digitized by Google

Asio accipitrinus, *Cornicedda* (Bari). Poco più frequente della specie precedente. Si vede negli stessi tempi.

Athene Noctua, *Civetta* (Bari). Comune, stazionaria e nidificante.

Scops Giu, *Cuerniciedd*, *Lagno* (Bari). È facile a trovarsi in primavera. Nidificante.

Bubo maximus, *Granduca* (Bari). Non comune, ma neppur raro, stazionario nei boschi; ma si vede altrove nelle epoche del doppio passo.

Circus æruginosus, *Farnarone* (Bari). Frequente nelle epoche del passo. Stazionario e comune tutto l'anno nei luoghi paludosi delle Saline.

Circus cyaneus, *Farnarone* (Bari). Si vede irregolarmente nel passo autunnale, raramente nel passo di primavera. Alle Saline si trova d'inverno.

Circus Swainsoni, *Farnarone* (Bari). Frequente nel passo di primavera. Una sola volta in autunno (ottobre 1887).

Circus cineraceus, *Farnarone* (Bari). Raro. Due soli individui, il primo nel maggio 1874, il secondo ♂ in livrea perfetta nell'aprile 1886.

Circaëtus gallicus. In Puglia due sole catture. Nel luglio del 1888 ebbi da Matera (Basilicata) un nidiaceo.

Pandion Haliaëtus, *Aquila bastarda* (Bari). Di apparizione irregolare, ma non rara nelle epoche del doppio passo.

Aquila Chrysaëtus, *Aquila* (Bari). Accidentale. Un solo individuo il 17 settembre 1877.

Aquila pomarina. Accidentale. Un solo individuo nell'ottobre 1875.

Nisaëtus fasciatus. Accidentale. Un solo individuo presso Taranto nel 1872.

Archibuteo lagopus. Accidentale. Un individuo nel dicembre 1879 ed una femmina nei primi giorni di maggio 1888, a Bari.

Buteo vulgaris, *Farnarone* (Bari). Scarsa. L'ho avuta nelle epoche del passo, e dalle Saline in inverno.

Pernis apivorus, *Farnarone* (Bari). Di passaggio irregolare

Digitized by Google

e mai abbondante in autunno e in primavera. Un individuo il 20 agosto 1886.

Milvus Ictinus. Accidentale.

Milvus migrans. Accidentale. Due soli esemplari: il primo nel maggio 1874, il secondo nel settembre 1877.

Falco Peregrinus. Piuttosto raro; le poche catture avvennero nelle epoche del doppio passo.

Hypotriorchis Subbuteo, *Ghizz* (Bari). Piuttosto frequente in primavera e in autunno; l'ho avuto anche di estate (11 agosto 1886).

Æsalon regulus, *Rampino*, *Riulo* (Bari). Non raro in primavera ed in autunno; l'ho avuto anche d'inverno (28 gennaio 1888).

Cerchneis Tinnunculus, *Ghizz di torre* (Bari), *Trisciungulo*, *Cristariedd* (provincia). Comune e sedentario; nidifica in campagna e anche in città.

Cerchneis Naumanni. Di passaggio irregolare; non mai abbondante, ma neppure raro; ordinariamente in primavera. Nel 1888 ne ebbi uno il 18 marzo.

Cerchneis vespertinus, *Falconett di San Giuan* (Bari). Giunge ordinariamente copioso in piccole bande nell'aprile e nella prima metà di maggio; si rivede scarsamente in autunno.

Accipiter Nisus, *Rampino*, *Riulo* (Bari). Frequente nel passo di primavera e di autunno. Si vede d'inverno.

Neophron Percnopterus. Accidentale. Un individuo catturato in Taranto (Costa).

Pelecanus Onocrotalus. Accidentale, ma non molto raro. Più volte in diverse regioni delle Puglie se ne videro branchi.

Phalacrocorax Carbo, *Mierue marino* (Bari). Di apparizione regolare in autunno ed in primavera. Ne ho avuti d'inverno.

Phalacrocorax Graculus. Accidentale, un giovane nell'aprile 1878 presso Bari.

Ardea cinerea, *Arione imperiale* (Bari). Comune; si vede tutto l'anno, ma più frequentemente nelle epoche del doppio passo.

Digitized by Google

Ardea purpurea, *Russiedd* (Bari). Comune nella primavera e nell'autunno a cominciare dai primi giorni di settembre.

Egretta alba, *Garzettone* (Bari). Scarsa, si vede in autunno e in primavera.

Egretta Garzetta, *Garzetta* (Bari). Si vede e anche copiosamente in torme in primavera e in autunno, a cominciare dell'agosto.

Bubulcus lucidus. Accidentale, un solo individuo nell'aprile 1884.

Ardeola ralloïdes, *Zippiloca* (Bari). Comune, si vede in branchi copiosamente in autunno (settembre) e nella primavera dal marzo alla prima metà di maggio.

Ardetta minuta, *Guaptiedd* (Bari). Comune nell' estate.

Botaurus stellaris, *Lebre marino* (Bari). Piuttosto comune nell'inverno nei luoghi acquitrinosi. Si vede altrove nelle epoche del passo autunnale e di primavera.

Nycticorax griseus, *Guapt* (Bari). Comune in autunno e in primavera nei luoghi paludosi, non raro negli stessi tempi nei campi coltivati; accidentale sulle Murge.

Ciconia alba. Scarsa. Le poche catture di cui ho notizia avvennero nell'aprile alle Saline. Nell'aprile 1888 n'ebbi una da Monopoli.

Ciconia nigra. Scarsa, pochi esemplari dalle Saline in primavera.

Platalea Leucorodia, *Cetra* (Bari), *Palettone* (Saline). Di apparizione regolare, ma non copiosa in primavera (ne ho avuto il 30 maggio); piuttosto scarsa, ma non rara in autunno (settembre, ottobre).

Plegadis Falcinellus, *Pidicchiadua* (Bari). Apparisce in branchi in autunno; ne ho avuti giovani nella seconda metà di agosto. Si vede in marzo e in aprile, ma forse con minor frequenza.

Phœnicopterus roseus. Accidentale, ma non molto raro alle Saline. Ho notizie di quattro catture.

Cygnus musicus. Accidentale, oltre l'esemplare citato dal dott. G. Costa, nel febbraio del 1886 ne ebbi uno ucciso presso Brindisi.

Digitized by Google

Cygnus Bewicki. Accidentale, un individuo nel Mar piccolo in Taranto l'inverno del 1879.

Bernicla leucopsis. Accidentale, un solo individuo ucciso presso Foggia l'inverno del 1878.

Anser cinereus, *Papara paesana* (Saline). Non rara, si vede tutti gli anni alle Saline in Capitanata, dal novembre. Non manca l'inverno.

Anser segetum, *Papara greca* (Bari, Saline). Copiosissima, arriva in branchi numerosi dalla fine di novembre. Si trattiene nei luoghi appropriati l'inverno fino al marzo.

Casarca rutila. Accidentale, due sole catture in Puglia, di cui la seconda nel 1875.

Tadorna cornuta, *Fiscone* (Bari), *Africa* (Saline). Piuttosto frequente nell'inverno alle Saline e in Capitanata. Accidentale, ma non rara nella campagna barese.

Chaulelasmus streperus, *Franceschina grisa* (Bari), *Tridente* (Saline). Apparisce dalla seconda metà di novembre ed anche prima e si trova nei luoghi appropriati tutto l'inverno. In qualche anno è anche abbondante come avvenne nello scorso inverno del 1888.

Anas Boscas, *Capo-verde* (mas.) *Andr* (fem.) (Bari). Comune ed abbondante dal principio di autunno, tutto l'inverno fino all'aprile.

Spatula clypeata, *Bifara* (Bari), *Pizzilata* (Saline). Comune ed anche frequente dall'autunno all'aprile.

Dafila acuta, *Maddardo verdatero* (Bari), *Cannelonga* (Saline). Comune, ma meno frequente della specie precedente, negli stessi tempi.

Mareca Penelope, *Franceschina capo rossa* (Bari). Comune ed abbondante negli stessi tempi.

Nettion crecca, *Terzetola vernile* (Bari). Comune ed abbondante negli stessi tempi.

Querquedula Circia, *Terzetola marzarola* (Bari). Scarsa assai nell'autunno e nell'inverno, si vede con frequenza, ma mai in abbondanza, nel marzo e nell'aprile.

Fuligula rufina, *Capone schiavonisco* (Bari). Apparisce rego-

Digitized by Google

larmente nell'inverno nei luoghi appropriati e in alcuni anni anche copiosamente.

Fulix ferina, *Caperuss* (Bari). Frequente dall' autunno a tutto l'inverno, non solo nei siti acquitrinosi, ma anche altrove in mare in vicinanza delle coste.

Fulix Fuligula, *Aciedd lurd* (Bari). Comune ed abbondante dall'autunno alla primavera.

Fulix Nyroca, *Caneto*, *Caneticchio* (Bari). Piuttosto scarsamente si vede in autunno, in inverno ed in primavera.

Harelda glacialis. Accidentale, una femmina nel novembre del 1875.

Bucephala Clangula. Frequente d'inverno i giovani, rarissimi i maschi adulti.

Mergus Serrator, *Musserretta* (Bari). Frequente nell'epoche del doppio passo lungo le coste marittime; comune di inverno nelle paludi delle Saline e di Capitanata, ma non così come le anatre e le fuligole di cui si è parlato.

Mergellus Albellus. Non comune, ma neppure rara si trova negli stessi tempi e negli stessi siti della specie precedente.

Columba Palumbus, *Faso* (Bari). Di passo regolare in autunno e in primavera; moltissimi rimangono l'inverno nei nostri boschi.

Columba Oenas, *Palummo salvaggio* (Bari). In branchi numerosi passano l'autunno e la primavera, e svernano dove è fitta vegetazione arborea.

Columba livia, *Palummo salvaggio* (Bari). Vive stazionario in torme numerose su molti edifici campestri ed anche urbani delle colline.

Turtur tenera, *Tortora* (Bari). Dalla seconda metà di aprile a tutta la prima metà di maggio, e spesso oltre ancora sono frequenti i numerosi stormi di Tortore. In minor copia appariscono in settembre. Un certo numero resta a nidificare nei nostri boschi.

Perdix saxatilis. Accidentale in Puglia in prossimità della Basilicata dove è stazionaria, ma non copiosa.

Digitized by Google

Starna Perdix, *Starna* (Bari). Stazionaria e nidificante nei boschi e nelle campagne coltivate. Non infrequente, ma neppure copiosa.

Coturnix communis, *Quagghia* (Bari). Comune e copiosissima dalla seconda metà di aprile a tutta la prima metà di maggio. Il loro passo di primavera può protrarsi fino a quasi tutto giugno. Molte restano a nidificare. Partono in settembre e in ottobre.

Rallus aquaticus, *Gaddiniedd* (Bari). Ordinariamente si vede in primavera, fine aprile e maggio; in minor numero in autunno, mai in copia. L'ho avuta d'inverno e di estate (18 agosto 1888) in livrea non perfetta.

Ortygometra Porzana, *Gaddiniedd* (Bari). Piuttosto scarso, si vede ordinariamente nell'aprile e nel maggio.

Ortygometra parva, *Gaddiniedd* (Bari). Si vede negli stessi tempi della specie precedente, ed è come quella poco frequente.

Crex pratensis, *Re Quagghione* (Bari). Molto scarso, non ho notizia di catture avvenute in autunno e in inverno.

Gallinula chloropus, *Gaddiniedd* (Bari). Comune; nei siti appropriati si trova frequentemente in tutte le stagioni.

Porphyrio caeruleus. Fu rinvenuto presso il lago di Lesina il dicembre 1884 (Giglioli, *Avif. Ital.* pag. 355).

Fulica atra, *Gaddinedda* (Bari). Comunissima e assai abbondante nei siti appropriati, si cattura non di rado al lido.

Grus communis, *Gro* (Bari). Di passo regolare in autunno e in primavera. Alle Saline e presso le paludi di Capitanata si uccide d'inverno.

Otis Tarda, *Gallinaccio salvaggio* (Foggia). Accidentale, ma non rara. Negli ultimi giorni di febbraio 1886 n'ebbi una femmina, uccisa presso Foggia.

Otis Tetrax, *Gaddina petrarola*, *Carriniedd* (Bari). Non rara nei piani di Capitanata, dove è nidificante, e sulle colline di tutta la Puglia.

Œdicnemus scolopax, *Turlì di terra*, *Riversino* (Bari). Si trova in tutte le stagioni, più facilmente nell'estate, ma giammai in copia.

Digitized by Google

Charadrius Pluvialis, *Piviere* (Bari). Arriva in frequenti branchi dalla seconda metà di settembre, sverna tra noi e parte in aprile. Rarissimi gli individui in livrea di nozze.

Squatarola helvetica, *Piviere marino* (Bari). Di passo in autunno e nella primavera, stazionaria nell'inverno in Capitanata. Il 20 maggio 1887 ed il 19 maggio 1888 ne ebbi due individui uccisi presso Bari in abito di nozze.

Eudromias Morinellus, *Calandra marina* (Saline). Stazionario in inverno presso le Saline e in Capitanata; non è scarso, ma neppure copioso.

Ægialitis cantiana. Stazionario e frequente, si vede in tutte le stagioni; è però più facile incontrarlo d'inverno che di estate. Rari assai sono gli individui in completa livrea degli adulti.

Ægialitis curonica, *Lagno* (Bari). Si trova in tutte le stagioni, ma è frequente solamente nelle epoche del doppio passo e principalmente in primavera (fine di aprile e primi giorni di maggio).

Ægialitis Hiaticula, *Lagnone* (Bari). Frequente nel passo di primavera (fine di aprile a tutto maggio); meno frequente, ma non scarso nel passo di autunno (settembre ottobre). In questa stagione più volte ho avuto individui nella prima livrea.

Vanellus Capella, *Monacedda* (Bari). Comune ed abbondante in stormi numerosi tutto l'inverno nei siti appropriati di tutta la Puglia. Comincia a vedersi dal settembre, parte in aprile. Rarissimi gli individui nell'abito nuziale degli adulti.

Strepsilas Interpres, *Lagnone marino* (Bari). Scarso, ma non raro, apparisce in autunno, ma più spesso in primavera. Nell'aprile 1872 ne ebbi uno in livrea completa.

Haematopus Ostralegus, *Antene*, *Antene gentili* giov. (Bari). Di passo regolare e spesso anche copioso a cominciare dalla fine di luglio a tutto l'agosto ed il settembre; ne ho avuti il 15 ottobre. Raro in primavera.

Recurvirostra Avocetta, *Aciedd salvaggio* (Bari), *Quicquera*

Digitized by Google

(Saline). Scarsa, s' incontra non raramente in riva al mare, ma più frequentemente in primavera sui terreni acquitrinosi di Capitanata.

Himantopus candidus, *Guarda pantano* (Bari). Di passo regolare, ma non copioso in aprile; più scarsamente si vede in autunno.

Phalaropus hyperboreus. Accidentale. Una femmina uccisa presso Bari il 18 ottobre 1881.

Limicola platyrhyncha, *Cicaledda vernile* (Bari). Non raro. Suole apparire di primavera sulle spiagge arenose.

Pelidna subarquata, *Piett-russ* (Bari). Comune in primavera e anche copioso verso la fine di aprile e nella prima metà di maggio. Scarso nell' autunno (settembre e ottobre).

Pelidna alpina, *Piett-russ vernile* (Bari). È veramente specie invernale; si vede in numero piuttosto scarso in autunno e in primavera. Il 20 agosto del 1886 ne ebbi una femmina in completo abito da nozze dei vecchi.

Actodromas minuta, *Cicaledda* (Bari). Comune ed abbondante in primavera (fine di aprile, prima metà di maggio). In minor numero l'autunno. L'ho avuto in abito di nozze il 20 agosto 1886; e in inverno (dicembre).

Actodromas Temmincki, *Cicaledda* (Bari). Piuttosto scarso; si vede però tutti gli anni in primavera con la *A. minuta.*

Calidris Arenaria, *Ecchie di rena* (Bari). Scarsa. Si vede in primavera ed in autunno.

Machetes Pugnax, *Poveredda* (Bari). Comune in primavera e copiosa in Capitanata; meno frequente in autunno; si vede d' inverno. Il 9 giugno 1888 n' ebbi un maschio in abito nuziale ucciso presso Bari.

Tringoïdes Hypoleucus, *Agustiniedd* (Bari). I numerosi branchi cominciano a vedersi lungo il lido dalla seconda metà di giugno a tutto agosto. Si vede in primavera, ma allora il passo non è copioso.

Totanus Ochropus, *Agustinedda verdatara* (Bari). Piuttosto comune; comincia a vedersi dalla fine di luglio durante il passo di autunno; si rivede in primavera (marzo-aprile).

Digitized by Google

Totanus Glareola, *Agustinedda bastarda* (Bari). Frequente in primavera (aprile-maggio); si rivede in autunno a cominciare dalla seconda metà di agosto, ma allora è meno frequente.

Totanus stagnatilis, *Acchieua* (Bari). Piuttosto scarso; si vede però regolarmente in primavera nel marzo e primi giorni di aprile.

Totanus Calidris, *Pied-russ* (Bari). Comincia a vedersi in giugno e prima ancora del *T. Hypoleucus*. In primavera è assai più copiosa che in autunno.

Totanus fuscus, *Chiuì* (Bari). Si vede se non in copia, frequentemente almeno, nelle epoche del doppio passo, e in primavera fino a tutto maggio.

Totanus nebularius, *Verdatero* (Bari), *Chiuvettone* (Saline). Non è abbondante, ma si vede frequentemente nelle epoche del doppio passo, dal luglio a tutto il settembre, ed in marzo e aprile.

Terekia cinerea. Accidentale. Il 20 novembre 1876 una femmina alle Saline di Barletta (Giglioli, *Avif. Ital.*, p. 399), ed un maschio l'agosto 1878 presso Bari.

Limosa melanura, *Turdinera* (Saline). Alle Saline e in Capitanata si vede e non scarsamente in primavera ed in autunno. Non so di catture avvenute in altri luoghi delle Puglie.

Scolopax Rusticula, *Biccaccia* (Bari), *Arcera* (provincia). Comincia a vedersi in ottobre e nei primi giorni di novembre suole già essere in copia; si trattiene tutto l'inverno e parte nel marzo.

Gallinago major. Non l'ho mai veduto in Puglia, ma il signor Francesco da Ceglie, abilissimo preparatore e buon conoscitore, mi assicurò d'averne veduto un esemplare in vendita in Taranto.

Gallinago caelestis, *Biccaccina* (Bari). Giunge in autunno; resta l'inverno e parte in aprile.

Gallinago Gallinula, *Beccaccina* (Bari). Negli stessi tempi della specie precedente, ma meno frequente di essa nell'inverno.

Digitized by Google

Numenius Arquata, *Turlì* (Bari), *Turdino* (Saline). Comune e frequente nelle epoche del passo autunnale (dal giugno), e del passo di primavera (marzo-aprile). Frequente anche tutto l'inverno. L'ho avuto in tutti i mesi dell'anno, tranne nel maggio.

Numenius tenuirostris, *Pappuo* (Bari). Copioso alle Saline dall'agosto al settembre. Si vede altrove, ma non in copia, durante tutto l'autunno (fine novembre) e nella primavera (tutto marzo).

Numenius Phaeopus, *Friscarúlo* (Bari), *Tatanìedd* (Saline). Si trova dal luglio all'aprile come il *N. Arquata*, ma è di questo assai meno abbondante.

Glareola Pratincola, *Guarda mascese* (Bari). Di passaggio regolare in piccoli branchi e non frequenti verso la fine di aprile e in maggio.

Sylochelidon caspia. Accidentale. Uno in Trani ucciso nel porto.

Thalasseus cantiacus, *Saettone* (Bari). Frequente dal settembre all'aprile.

Gelochelidon anglica, *Saettone* (Bari). Non raro, ma poco frequente; l'ho avuto in aprile, maggio e agosto. Un esemplare pure in abito invernale, cioè con la testa bianca.

Sternula minuta. Accidentale. Un solo individuo presso Bari nell'aprile 1877.

Hydrochelidon hybrida. Scarsissimo e solo di estate.

Hydrochelidon leucoptera, *Rinninone marino* (Bari). Searso ma non raro, si vede nell'estate a cominciare dall'aprile.

Hydrochelidon nigra, *Rinninone marino* (Bari). Frequentissimo in primavera ed in autunno; si trova in estate, e nel giugno 1876 n'ebbi un nidiaceo non atto al volo.

Chroocephalus minutus, *Gaggianiedd* (Bari). Si vede regolarmente in autunno e in primavera, ma è frequente e spesso abbondante nell'inverno.

Chroocephalus melanocephalus, *Gaggiana* (Bari). Si vede frequentemente tutto l'anno, ma più copiosamente nel-

Digitized by Google

l'inverno e in primavera. Non sono rari gli individui giovani nel primo loro abito in agosto.

Chroocephalus ridibundus, *Arpongiedd*, *Gaggiana* (Bari). Frequente in autunno e molto più nell'inverno e nella primavera. Solo il 21 luglio 1886 n'ebbi una femmina in livrea estiva e col cappuccio bruno-chiaro sparso di bianco.

Rissa tridactyla. Accidentale, ma non molto raro. Le catture di cui ho notizia avvennero in aprile.

Larus canus, *Arpone* (Bari). Frequente ed anche abbondante tutto l'inverno.

Larus fuscus. Non si vede tutti gli anni. Dalle catture di cui ho notizia (non poche) parrebbe specie estiva. L'ho avuta in maggio, il 10 giugno in livrea perfetta, e nell'agosto e settembre i giovani nel primo loro abito.

Larus cachinnans, *Arpone paparino* (Bari). Frequente, ma non mai abbondante, si vede ugualmente di autunno, d'inverno e di primavera.

Stercorarius pomatorhinus. Accidentale. Ho notizia di due sole catture, di cui la prima nel settembre 1870 a pochi chilometri da Bari.

Stercorarius crepidatus. Accidentale.

Puffinus anglorum, *Artera* (Bari). Non rara in alto mare, è accidentale sulla costa.

Puffinus Kuhli, *Artera* (Bari). Non rara; forse però si avvicina più frequentemente al lido che la specie precedente.

Utamania Torda. Accidentale. Il 12 febbraio 1886 ne fu uccisa una in Taranto, il 24 dicembre dello stesso anno un'altra a Bari. Ma a Taranto tra il 23 e il 24 dicembre 1886 ne apparvero tante nella rada, che questa ne fu letteralmente popolata. Vi si trattennero oltre un mese, e durante questo tempo se ne uccisero a centinaia, sicchè se ne compravano per pochi soldi.

Colymbus glacialis. Accidentale. Un individuo in Taranto nel Mar piccolo l'inverno del 1880.

Colymbus arcticus, *Gattone marino* (Bari). Non rara nell'in-

Digitized by Google

verno (a cominciare dal novembre) nell'Adriatico, e più frequente nel mare di Taranto.

Colymbus septentrionalis, *Gatt marina* (Bari). Piuttosto rara sulla costa barese (n'ebbi una nel dicembre 1887); non infrequente presso Taranto.

Podiceps cristatus, *Cannelonga* (Bari). Frequente nell'inverno nel mar di Taranto, e alle Saline lo si vede in piccole frotte o in coppie non di rado in prossimità della costa barese nell'autunno, nell'inverno e in primavera.

Podiceps griseigena. Accidentale. Una femmina giovane dalle Saline il dicembre del 1874.

Podiceps nigricollis, *Fonaca* (Bari). Negli stessi tempi e negli stessi siti che il *P. cristatus*, di cui è assai più frequente.

Podiceps fluviatilis, *Fonachecchia* (Bari). Si trova in tutti i tempi. È la specie più frequente del genere e si trova in tutte le livree. Ne ho avuto una femmina in perfetta livrea estiva il 16 agosto 1886.

CALABRIE.

Catanzaro, (De Fiore Carlo):

Il distretto in cui intendo fare le mie osservazioni è chiuso ad O. dal golfo di Santa Eufemia e a N.E. e S. da monti e colline che finiscono al mare col capo Suvero a N. e colla punta di Bristia a S., formando quasi un semicerchio. Lo spazio chiuso da questo semicerchio e dal mare è una bella pianura. I monti non sono molto alti e solo nei mesi di inverno si vedono le loro cime coperte di neve, ma non tutte; i più notevoli sono: quello di Riventino dalla parte di N. e quello della Contessa dalla parte di E. I fiumi che scendono da questi monti sono di poca importanza tranne il fiume Amato e l'Angitola, più piccolo del primo; questi due fiumi percorrono la pianura e la dividono in tre porzioni quasi eguali. Formano nel loro corso molti paludi

Digitized by Google

specialmente in vicinanza del mare. Sono di una certa importanza le paludi di Subutillo e della Barca perchè alquanto profondi e perchè durano anche nell'estate, e il Canneto, che estesissimo nell'inverno si asciuga perfettamente in estate, essendo formato dal torrente Tonina. Queste tre paludi sono poste fra l'Amato e l'Angitola, essendo il Canneto in mezzo, Subutillo più vicino all'Angitola e quello della Barca dalla parte dell'Amato. In questa pianura si coltiva il grano, il granturco, le fave, i fagioli ecc. principalmente, non vi sono affatto alberi; solo lungo il lido vi è una larga striscia di bosco, che si estende dall'Angitola a Santa Eufemia, formata quasi tutta da lentischi, mirti, rovi e ginepri (*J. macrocarpa*); in certi punti il bosco è molto folto. I fianchi e le falde dei monti poi sono coperti quasi per intiero da ulivi, vi sono anche molti fichi, aranci e vigneti. Sui monti quercie, larici, castagni e pini. Il clima è molto mite: la temperatura massima è stata di 32 cg., la minima di — 2 cg. La media nell'inverno è di 12 cg. La media annuale di 22 cg. circa. La neve arriva rarissimamente e per solo qualche giorno fino alle falde dei monti. Non domina alcun vento specialmente.

Elenco delle specie di uccelli osservate nel distretto di Maida, provincia di Catanzaro, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, le migrazioni, la nidificazione, ecc. ecc.

Corvus Corax. Sedentario, raro; sui monti.
Corvus Corone, *Ciávula.* Sedentaria, ma scarsa.
Corvus frugilegus, *Cuorvu.* Invernale.
Lycos Monedula, *Ciávula.* Sedentaria.
Pica rustica, *Carcarázza.* Sedentaria, comune dovunque, al monte e al piano.
Garrulus glandarius, *Pica.* Sedentaria, comune ai monti.

Digitized by Google

Sturnus vulgaris, *Sturniellu.* Comunissimo alle due epoche del passo, specialmente in pianura.

Fringilla cœlebs, *Spinzu.* Sedentario, comune dovunque, specialmente nei mesi freddi.

Passer Italiæ, *Passaru.* Comune dappertutto e sedentaria.

Coccothraustes vulgaris. Comune in aprile e maggio.

Ligurinus Chloris, *Virdune.* Comune al passo primaverile.

Carduelis elegans, *Cardillu.* Comunissimo in tutti i luoghi e sedentario.

Serinus hortulanus. Comune al passo primaverile.

Miliaria Projer, *Stridulu.* Sedentario, e comune dovunque nell' inverno.

Emberiza Cirlus. Comune d' inverno.

Emberiza Cia. Non raro d' inverno ai monti.

Melanocorypha Calandra, *Calandra.* Sedentaria e comune in pianura.

Alauda arborea, *Calandrella.* Comune ovunque, specialmente al passo autunnale.

Alauda arvensis, *Cucciarda.* Comune, specialmente al passo autunnale.

Galerita cristata, *Ciciarune.* Comunissima dovunque in tutto l' anno.

Anthus pratensis, *Calandrella e chianu.* Comune in ottobre specialmente.

Motacilla alba, *Sisicula.* Comunissima dovunque nell' inverno, anche sedentaria.

Calobates melanope, *Sisicula gialla.* Comune dovunque nell' inverno, anche sedentaria.

Monticola Cyanus, *Passaru solitariu.* Sedentaria ai monti, piuttosto rara.

Merula nigra, *Miedduru.* Comunissimo nell' inverno, anco sedentario.

Turdus musicus, *Marvizza.* Abbondantissimo nell' inverno.

Turdus viscivorus, *Turda.* Sedentaria, alquanto comune in autunno e nell' inverno.

Aëdon Luscinia, *Risignuolu.* Estivo, non comune, ma si trova al monte e al piano.

Digitized by Google

Erithacus Rubecula, *Piettirussu*. Abbondante nell' inverno.
Ruticilla Phœnicurus. Comune al passo primaverile.
Pratincola Rubicola. Comune dovunque e sedentario.
Pratincola Rubetra. Non comune, ma nidificante.
Monachus Atricapillus, *Capinera*. Sedentaria, non comune, ma si trova dappertutto.
Monachus hortensis, *Fravetta*. Abbondante in settembre e ottobre.
Phylloscopus sibilator. Numeroso in aprile e settembre.
Troglodytes parvulus. Scarso.
Cinclus aquaticus, *Miedduru d'acqua*. Alquanto raro, ma sedentario.
Accentor modularis. Comune nell' inverno in pianura.
Regulus cristatus. Qualcuno ai monti.
Acredula Irbyi. Scarso; ne arrivano alquanti in ottobre.
Parus major, *Cicanella*. Comunissima dovunque tutto l'anno.
Cyanistes cæruleus, *Cicanella*. Sedentaria, poco comune.
Certhia brachydactyla. Ai monti, molto scarso.
Oriolus Galbula, *Gálinu*. Estivo, comune in aprile e in settembre.
Lanius minor, *Gruára*. Comune specialmente in settembre; vedesi anco in ottobre; giunge in aprile.
Lanius Collurio. Alle epoche del passo. Piuttosto rara.
Lanius auriculatus. Estiva, molto scarsa.
Muscicapa collaris. Molto scarsa in aprile.
Hirundo rustica, *Rindine*. Comunissima da marzo ad ottobre. Qualcuna sverna.
Chelidon urbica, *Rindine*. Comunissimo da marzo a ottobre.
Cypselus Apus, *Rindune*. Molto comune dovunque da aprile a settembre; qualcuno rimane l' inverno.
Caprimulgus europæus, *Cordáru*. Dovunque, ma non comune; giunge in aprile, parte in ottobre; qualcuno rimane l' inverno.
Picus major. Comune e sedentario.
Iynx Torquilla, *Culerciaru*. Dovunque, ma non comune.
Cuculus canorus, *Cuccu*. Comune dovunque dalla metà d'aprile a quella di settembre.

Digitized by Google

Alcedo Ispida, *Mieddura d'acqua.* Piuttosto raro, ma sedentario.

Coracias Garrula, *Pica marina.* Comune dovunque, dalla metà d'aprile a quella di ottobre.

Merops Apiaster, *Pizzifainu.* Estivo e comune al monte e al piano all'epoca del passo, dalla metà di aprile a quella di ottobre.

Upupa Epops, *Pipitúne.* Comune specialmente in primavera; giunge in aprile, parte in ottobre.

Strix flammea, *Varvajanni.* Comune e sedentario.

Asio accipitrinus, *Gulíu.* Sedentario, non comune ordinariamente, ma è comune alle epoche del passo.

Athene Noctua, *Cuccuvella.* Abbondante dovunque e sedentaria.

Scops Giu, *Chiò.* Comune e anche sedentario.

Bubo maximus, *Nduccu.* Ai monti, raro piuttosto, ma sedentario.

Circus æruginosus, *Aceddazzu cu a testa janca.* Comunissimo in primavera e sedentario.

Circus Swainsoni, *Aceddazzu jancu.* All'epoche del passo, in pianura, ma non comune.

Circus cyaneus, *Aceddazzu janco.* Piuttosto comune, specialmente in primavera, in pianura.

Buteo vulgaris, *Aceddazzu.* Comune e sedentaria.

Pernis apivorus, *Passante.* Abbondante alle epoche del passo, specialmente in settembre e ottobre, ai monti. Passa anche nella seconda quindicina di aprile.

Cerchneis Tinnunculus, *Cristarieddu.* Comune dovunque e sedentario.

Cerchneis Naumanni. Alle epoche del passo, ma non comune. Vedesi più sovente nella seconda metà di aprile.

Cerchneis vespertinus. Alle epoche del passo, non comune.

Pelecanus Onocrotalus. Rarissimo.

Phalacrocorax Carbo, *Cuórvu de mare.* Piuttosto raro. Invernale.

Ardea cinerea, *Cicogna chiumbina.* Abbondante nel passo primaverile, aprile e maggio.

Digitized by Google

Ardea purpurea, *Russiellu.* Abbondante al passo primaverile, aprile-maggio; passa anco in novembre scarso.

Egretta alba, *Cicogna janca.* Non rara al passo primaverile, aprile-giugno.

Egretta Garzetta, *Cicognella janca.* Comune al passo primaverile, aprile-maggio.

Ardeola ralloïdes, *Zinni.* Abbondante all'epoca del passo primaverile, aprile.

Ardetta minuta. Comune specialmente in primavera, aprile; passa anco in settembre.

Botaurus stellaris, *Liébbure d'acqua.* Passa in novembre ed in aprile.

Nycticorax griseus, *Guai.* Non molto comune, di doppio passo.

Ciconia alba. Molto rara in aprile.

Platalea Leucorodia. Alquanto rara; al passo primaverile, aprile.

Plegadis Falcinellus, *Corviellu.* Abbondante in primavera, da marzo a giugno.

Phœnicopterus roseus. Rarissimo: tre giunsero nell'inverno del 1855, uno fu ucciso e preparato.

Cygnus musicus. Rarissimo nell'inverno: due capitarono in quello del 1885.

Anser segetum, *Paparune.* Comune nell'inverno.

Tadorna cornuta. Rara nell'inverno; una venne uccisa al litorale in quello del 1884.

Anas Boscas, ♂ *Capuvirde*, ♀ *Gaddina; Mellardi.* Abbondantissimo nell'inverno e anche sedentario; passa in novembre e marzo.

Chaulelasmus streperus, *Sarsellúne.* Non comune.

Spatula clypeata, *Cucchiarúne.* Comune nell'inverno.

Dafila acuta, *Cudune.* Non molto comune; passa da febbraio ad aprile.

Mareca Penelope, *Frischiettu.* Comune in tutto l'inverno.

Nettion Crecca, *Sarsella.* Abbondante in tutto l'inverno. Passa in ottobre e marzo; qualche coppia rimane a nidificare.

Querquedula Circia, *Marsola.* Abbondante in primavera, dalla metà di febbraio a quella di aprile.

Digitized by Google

Bucephala Clangula, *Domenicanu.* Comune, specialmente in marzo aprile; passa anco in novembre.

Mergus Serrator. Accidentale.

Mergellus Albellus. Rara.

Columba Palumbus, *Palumba collata.* Sedentario, ma più abbondante in autunno; comune.

Columba Oenas, *Palumba marina.* Di passo e anche sedentaria.

Columba livia, *Palumba marina.* Abbondante in pianura d'inverno e sedentario.

Turtur tenera, *Turtura.* Comune dovunque, specialmente in primavera, maggio; passa anche in ottobre.

Phasianus colchicus. Estinto da circa un secolo; si trovava in Calabria ai tempi dello storico calabrese padre Fiore, monaco di Trapani. Non ho potuto saperne di più.

Francolinus vulgaris. Interamente scomparso. Per quanto ho saputo, gli ultimi due furono uccisi a Gerace (provincia di Reggio, sulle coste del Jonio) nel 1857 circa. Molto facilmente è la *Pernice gallo*, che i vecchi cacciatori dicono specie estinta.

Perdix saxatilis, *Pernice.* Comune ai monti e al piano, sedentaria.

Starna Perdix, *Starna.* Comune dovunque al monte e al piano e sedentaria.

Coturnix communis, *Quajja.* Abbondante al monte e al piano. Passa in maggio ed in ottobre.

Turnix sylvatica. Rarissima. Una venne uccisa presso Maida dal signor Attilio Callegari nel settembre 1885, mentre cacciava le quaglie.

Rallus aquaticus, *Sporcigghiune*, *Cosmeu.* Al piano, comune nell'inverno; passa in ottobre ed aprile; è anco nidificante.

Crex pratensis, *Re dei quagghi.* Comune alle due epoche del passo, specialmente in aprile.

Gallinula chloropus, *Gallinella.* Comune dovunque nell'inverno; passa in novembre e marzo. Anco nidificante.

Fulica atra, *Folaca.* Abbonda dovunque, specialmente nel-

Digitized by Google

l' inverno; passa in novembre ed aprile. Qualcuna nidifica.

Grus communis, *Gru.* Frequente, specialmente al passo primaverile, aprile.

Œdicnemus scolopax, *Riversinu rande.* Scarso; alcuni branchi in primavera, aprile; è anco nidificante.

Charadrius Pluvialis, *Riversinieddu.* Abbondante al piano nell' inverno; passa in marzo ed aprile, anco in maggio.

Ægialitis curonica. Comune specialmente in aprile, anco sedentario.

Vanellus Capella, *Pivula.* Abbondantissima nell' inverno; passa in novembre e marzo.

Hæmatopus Ostralegus. Non rara, sulle coste in aprile e in maggio.

Himantopus candidus, *Riggitanu.* Non molto scarso, specialmente in primavera, aprile-maggio.

Totanus Glareola, *Spiune.* Frequente al passo primaverile.

Totanus stagnatilis. Scarso; si vede al passo primaverile.

Totanus Calidris, *Spiune.* Abbondante nel passo primaverile, dalla metà di marzo a quella di maggio.

Tringoïdes Hypoleucus. Non scarso nell' inverno e in primavera.

Scolopax Rusticula, *Beccaccia*, *Arcera.* Comune dovunque nell' inverno, passa in novembre ed in marzo.

Gallinago major, *Starnotto imperiale.* Molto scarso; pochi se ne vedono al passo primaverile in aprile e maggio.

Gallinago cælestis, *Beccaccinu*, *Arcigghiola.* Abbondante nell' inverno; passa in novembre ed aprile.

Gallinago Gallinula. Più scarso del precedente, ma anche comune nell' inverno.

Numenius Arquata, *Friscalùoru.* Abbondante in ottobre ed in maggio.

Chroocephalus ridibundus, *Jannulu.* Comune dovunque sul litorale e sedentario.

Hydrochelidon leucoptera, *Rindine e mare?* Comune specialmente all' epoca del passo.

Digitized by Google

Podiceps fluviatilis, *Sumbuzzature picciulu.* Abbondante l'inverno, ma ne rimangono anche in estate.

Reggio, Calabria (Moretti dott. F. S., Moschella G.):

Scrivo in Radicena, cittaduzza di seimila abitanti, nel distretto di Palme; ma il distretto di osservazione è ben vasto; limiti o confini ne sono: ad oriente il versante degli Appennini, ad occidente il golfo di Gioia, al nord e nord-est il confine della provincia di Catanzaro ed il fiume Mesima, dove questa di Reggio ha termine, a mezzogiorno Bagnara, città marittima di questa medesima provincia. Tutto questo campo di osservazione è molto variato: di monti, di montagnuole, di collinette, di pianure, di boschi di ulivi, di quercie, di elci, di castagni; di campi coltivati e di paludi. Un tempo questo immenso territorio apparteneva in gran parte a Gonzalvo di Cordova, donatogli in feudo da Re Fernando suo fratello. Esso era incolto e boschivo molto, ma ferace e ricco, al contrario del presente in cui è stato sfruttato da lurche colonie senza sapere e senza governo, e vendemmiato dalle malannate e dagli uragani (causa prima i diboscamenti arbitrarii che tuttora seguono). Su questo vasto territorio la geologia, la zoologia e la storia trovano molto da studiare, quantunque la faccia del suolo muti sempre per un processo di dissoluzione, di compenso e di trasfigurazione, a causa di cataclismi e di terremoti, che oltre ad aver cangiata mille volte la faccia del suolo, seppellirono le storie locali in pergamene o in carta, ingoiarono paesi e monumenti, che potevano raccontare allo storico un'origine perduta, e con essa le patrie leggende e le cronache più comuni. Dubuy era battuto dalle truppe spagnuole, fra cui D. Ugo di Cardone, al passo di fiume secco — dice la storia — ma noi non sappiamo dov'esso fosse. Taluno pretende al passo Rotta di cavalli, ma non è certezza se qua invece sia suc-

Digitized by Google

cessa altra battaglia. Il campo della Figurella, dopo una giornata di battaglia e più che un mese di soggiorno di Saraceni al soldo di Spagna, non presenta vestigia, sepolte forse sotto metri e metri della ghiaia di un torrente; lo stesso del campo di Quarantana, dove sono paludi ed agrumeti. Ciò premesso, le trasfigurazioni del suolo sono all'ordine del giorno; ed oggi, più che per volontà degli stessi elementi dipendono dalla volontà esclusiva dell'uomo; diboscamento e caccia clandestina sono il flagello del territorio e della selvaggina. I fiumi e i torrenti, che naturalmente non avevano letto nè dighe, oggi sono terribili nei loro straripamenti; perchè le piccole fiumane e i rigagnoli che formavano, sorgendo in mezzo ai pendii delle montagne, franano il suolo, reso oggi culto e vedovato di radici che possano ritenere la ghiaia, l'argilla o il lapillo calcare; e producendo ampii franamenti, accrescono il masso trasportato dai torrenti o dai fiumi. Con le provvide leggi forestali del Napoletano, una volta rigorosissime, era vietato diboscare questa natura di terreni franosi ed a pendio. Oggi si aggiunge la ferrovia, questa incivilitrice di popoli e mangiatrice di boschi, che coi suoi compensi alletta vie più a diboscare, e.... si dibosca sempre (?!!). A proposito della caccia clandestina o del bracconaggio, dico sempre poco per quanto son per dire; e, poichè il Governo possa formarsene una idea, ricordo che la Piana di Calabria, questa dove io scrivo, men che cento anni addietro era piena di selvatici, dal cinghiale e dal caprio, non esclusa la capra selvaggia, fino alla martora; e poi dal francolino alla quaglia. Oggi, quasi quasi non esiste più nulla, all'infuori di qualche lepre, di qualche rarissimo tasso e di qualche povera volpe, di cui un dì l'abbondanza distruggeva quella degli insetti, dei topi, ecc. Una volta anco il fagiano vi abbondava e la starna, di questa specie poi, infinite, oggi nessuna. La specie si è distrutta sette od otto anni addietro. Il tordo, per l'immensità dei boschi di ulivi, di cui abbonda questo suolo, sceglieva come prediletta dimora d'inverno anch'esso la pianura di Calabria, e se ne ven-

Digitized by Google

devano milioni alla lettera, tanto che in qualche anno vennero riguardati come calamità. Oggi pochissimi sono quelli che veggonsi, a causa della caccia tremenda, immoralissima e dannosissima che si fa dagli abitanti di Molochio, paesello che dista da qui forse un'ora e mezzo, ed è posto in collina. Colà ogni lurco villano è provveduto di reti, ed abusivamente attende alla mattina gli uccelli che a truppe scendono dalla collina al piano e li cattura. Il punto di aspetto è sul pendio di una strettola o nella gola di una montagnola, e dicesi *passo*. I proprietari di questi *passi* tesorizzano affittando un palmo di terra, che loro non frutterebbe nulla, al contadino retaiuolo o cacciatore, a peso d'oro. Gl'individui della famiglia dei tordi che muoiono ogni mattina, sono da quattro a cinquecento. Il paesello di Molochio non ha stazione di Carabinieri, e la distruzione seguita tutti gli anni impunemente; come in Sicilia si usa affittare il terreno ad aprile per la tesa dei tremendissimi lacciuoli agli avidi coloni. Non aggiungo altro alle notizie chieste, anzi chieggo venia se le vere ragioni dell' uccellagione presso il suo esaurimento (quali sono diboscamento e bracconaggio), mi hanno spinto a scrivere di più di quello che mi sarebbe concesso (*Moretti*).

Il distretto di osservazione comprende la città di Reggio Calabria e suoi dintorni, è limitato a mezzogiorno dal torrente Calopinace, a settentrione dal torrente Annunziata, ad oriente dai monti, ad occidente dal mare. I monti ove nasce il Calopinace sono distanti dal mare e boscosi. quelli ove ha origine l'Annunziata sono invece brulli, e quelli che sovrastano il villaggio di Pentimele specialmente guardano il mare più da vicino e sono di natura cretacea. Il clima è dolce, ma incostante, a prolungate epoche di siccità seguono periodi di pioggie torrenziali e di venti impetuosi. Il piano è in generale fertile, verde e ridente, profumato dagli aranceti; in alto i monti boscosi sono rivestiti di querce, faggi ed abeti (*Moschella*).

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Reggio-Calabria, coi nomi volgari locali, e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione, ecc. [1]

Corvus Corax, *Corbo reale.* Sedentario ai monti; ebbi i nidiacei in giugno (*M.*).

Corvus Corone, *Corbo*, *Corvu.* Comune (*Mor.*).

Corvus Cornix, *Corbo ianco.* Comune abbastanza e sedentaria (*M. Mor.*).

Corvus frugilegus, *Corbo*, *Ciavula.* Invernale e comune (*M. Mor.*).

Lycos Monedula. Una volta comune e sedentaria a Ravagnese, ora scomparsa (*M.*).

Nucifraga Caryocatactes. Ho ragione di credere che trovasi rarissima sui monti (*M.*).

Pica rustica, *Carcarazza.* Sedentaria e comune (*M. Mor.*).

Garrulus glandarius, *Cissa*, *Pica.* Comune e sedentaria (*M. Mor.*).

Sturnus vulgaris, *Sturno*, *Sturnejo.* Frequente in ottobre (*M. Mor.*).

Fringilla cœlebs, *Spinso*, *Spingiuni.* Comune, sedentario ed invernale (*M. Mor.*).

Fringilla Montifringilla, *Spingiuni muntagnolu.* Non comune d'autunno (*Mor.*).

Passer Italiæ, *Passaru.* Sedentario e abbondante (*M. Mor.*).

Coccothraustes vulgaris, *Frisuni*, *Pizzica firru*, *Spinso imperiale.* Raro (*M.*); comune (*Mor.*).

Ligurinus Chloris, *Virduni.* Invernale e di passo in settembre-ottobre (*M.*); comune (*Mor.*).

Chrysomitris Spinus. Autunnale (*M.*).

---

[1] Questo elenco è compilato colle notizie raccolte dal dott. F. Sofia Moretti di Radicena nella « piana di Calabria », e dal signor Giuseppe Moschella a Reggio-Calabria e contorni; ho indicato con *Mor.* e con *M.* la parte spettante all' uno od all' altro di questi osservatori.

Digitized by Google

Carduelis elegans, *Cardijuzzu*, *Ramaci* (il giov.). Comune, sedentario, ma più abbondante nell' inverno (*M. Mor.*).

Serinus hortulanus, *Virdejuzzu*. Comune, specialmente da settembre a gennaio (*M. Mor.*).

Emberiza Cirlus, *Perruzza*. Comune (*Mor.*).

Melanocorypha Calandra, *Cucugghiata*. Comune (*Mor.*).

Alauda arvensis, *Cucciarda*. Comune e sedentaria (*M. Mor.*).

Galerita cristata, *Cucugghiata*. Comune e sedentaria al piano (*M.*).

Motacilla alba, *Pispisa*, *Abatti-cuda nigra*. Scarsa, sedentaria, invernale, comune (*M. Mor.*).

Calobates melanope, *Abatti-cuda giallina*. Sedentaria, non rara (*Mor.*).

Saxicola melanoleuca, *Monacheja*. Comune (*Mor.*).

Monticola saxatilis, *Merlu petrolu*. Non comune (*Mor.*).

Monticola Cyanus. Comune (*Mor.*).

Merula nigra, *Merru*, *Merlu*. Sedentario e comune (*M. Mor.*).

Turdus musicus, *Marvizza*. Invernale e comune (*M. Mor.*).

Turdus viscivorus, *Turda*, *Chiaracurdaca*, *Turdulicia*. Comune (*Mor.*).

Aëdon Luscinia, *Risignolu*. Estivo e frequente (*Mor.*).

Erithacus Rubecula, *Pittirussu*. Comune (*Mor.*).

Monachus Atricapillus, *Testa nigra*. Comune (*Mor.*).

Monachus hortensis, *Farvetta*. Estivo e comune (*Mor. M.*).

Parus major. Comune e sedentaria (*M.*).

Certhia brachydactyla, *Rre d' aceji*, *Ncrocca sipàli*. Frequente (*Mor.*).

Oriolus Galbula, *Crusulèo*. Abbondante in aprile-maggio (*M.*).

Lanius minor, *Caracefalo*. Estiva e comune (*M.*).

Lanius auriculatus, *Caracefalo*. Comune ed estiva (*M.*).

Butalis Grisola, *Pilusa*. Autunnale (*M.*).

Hirundo rustica, *Lindaneja*. Estiva ed abbondante (*M. Mor.*).

Chelidon urbica, *Lindaneja*. Estivo e comune (*M.*).

Cotile rupestris, *Lindaneja di muntagna*. Non comune (*Mor.*).

Cypselus Apus, *Rindinune*, *Linduni*. Estivo e comune (*M. Mor.*).

Caprimulgus europæus, *Cordaru*. Estivo e comune (*M. Mor.*).

Digitized by Google

Picus major, *Gadduzzu di muntagna.* Sedentario e comune; avuto i nidiacei in luglio (*M.*).

Gecinus viridis, *Fermicularu di voscu.* Piuttosto comune e sedentario (*Mor.*).

Iÿnx Torquilla, *Formicularu*, *Fermicularu.* Sedentario e comune (*M. Mor.*).

Cuculus canorus, *Turturaru*, *Cuccu.* Comune nell' estate (*M. Mor.*).

Alcedo Ispida, *Uccello bello.* Comune e sedentario (*Mor.*).

Coracias Garrula, *Carragiau.* Frequente in collina nell'aprile e maggio (*M.*).

Merops Apiaster, *Mussovaia.* Frequentissimo di passo in aprile-maggio (*M.*).

Upupa Epops, *Pipituni.* Frequente in aprile e maggio (*M.*).

Strix flammea, *Barbajanni*, *Barvajanni.* Sedentario e comune (*M. Mor.*).

Syrnium Aluco, *Guléo.* Piuttosto scarso, ai monti (*M.*).

Athene Noctua, *Civetta*, *Pigula.* Comune e sedentaria (*Mor.*).

Scops Giu, *Scropìu.* Estivo e comune (*Mor.*).

Bubo maximus, *Nducco*, *Dduccu.* Sedentario e non raro ai monti (*M. Mor.*); ebbi i nidiacei in aprile (*M.*).

Circus æruginosus. Sedentario e di passo in maggio-giugno ed ottobre; ebbi i nidiacei in agosto (*M.*).

Circus cyaneus, *Jurmanaro.* Avuta in aprile 1886 (*M.*).

Circus Swainsoni, *Jurmanaro.* Frequente assai di passo in aprile e maggio, oggetto con altri « Rapini » o Falchi di una caccia speciale alla posta (*M.*).

Pernis apivorus, *Adorno*, *Adornu*, *Ornu*, *Orru.* Passa in abbondanza in maggio, giugno e anco in luglio, specialmente sugli altipiani di Milea sopra Scilla e Pentimele, nelle ore calde; vi è oggetto di una prediletta caccia di posta. È scarso al ripasso (*M. Mor.*).

Milvus Ictinus, *Nigghia.* Non raro, vedesi in luglio ed agosto (*M. Mor.*).

Hypotriorchis Subbuteo, *Cirbìo.* Di passo in primavera (*M.*).

Cerchneis Tinnunculus, *Rapineddu di loco.* Comune e sedentario (*M.*).

Digitized by Google

Cerchneis Naumanni. Non scarso di passo in primavera (*M.*).

Cerchneis vespertinus, *Chiumbino.* Frequente di passo in maggio (*M.*).

Astur palumbarius, *Asturi.* Di passo in primavera (*M.*).

Accipiter Nisus, *Farcu.* Comune (*Mor.*).

Neophron Percnopterus, *Nia.* Piuttosto frequente (*M.*).

Pelecanus Onocrotalus. Accidentale in branchetti (*M.*).

Phalacrocorax Carbo. Raro; uno fu ucciso sur un pioppo a Pentimele nell' ottobre 1886 (*M.*).

Ardea cinerea, *Cicogna*, *Airuni.* Piuttosto scarso di passo in marzo-aprile (*M. Mor.*).

Ardea purpurea, *Russeddu.* Comune di passo nel marzo-aprile (*M.*).

Egretta alba, *Russeddu ianco.* Rara (*M.*).

Egretta Garzetta, *Cicognedda ianca.* Non frequente di passo nel maggio (*M.*).

Ardeola ralloïdes, *Cicognedda ianca.* Di passo in aprile-maggio; fu abbondante nella primavera del 1886 (*M.*).

Ardetta minuta, *Cicognedda.* Comune di passo in aprile-maggio (*M.*).

Botaurus stellaris. Non raro specialmente in ottobre (*M.*).

Nycticorax griseus, *Orale.* Abbondante in aprile-maggio e nell' autunno (*M.*).

Ciconia alba. Scarsa (*Mor.*).

Ciconia nigra. Accidentale (*M.*).

Platalea Leucorodia, *Spatula.* Venne uccisa alle Saline in aprile (*M.*); assai rara (*Mor.*).

Plegadis Falcinellus. Raro in aprile-maggio (*M.*).

Phœnicopterus roseus, *Fiammingo.* Raro, uno fu preso in mare innanzi a Pellaro nel 1885, ed uno a Bianconuovo nel gennaio 1888 (*M.*).

Anas Boscas, *Capuvirdi.* Comune, ma una volta era più abbondante e alcune coppie restavano a nidificare (*M. Mor.*).

Spatula clypeata, *Mijardo.* Comune nell' inverno (*Mor.*).

Mareca Penelope, *Carìci.* Comune nell' inverno (*Mor.*).

Nettion Crecca, *Terzina.* Oggi scarsa, una volta nidificante (*M.*); comune nell' inverno (*Mor.*).

Digitized by Google

Querquedula Circia, *Mijardoli.* Comune in febbraio e marzo (*Mor.*).

Fulix ferina, *Mijardo.* Invernale e comune (*Mor.*).

Fulix Fuligula, *Mijardo.* Comune d' inverno (*Mor.*).

Fulix Nyroca, *Mijardo.* Comune d' inverno (*Mor.*).

Œdemia fusca. Un maschio adulto di questa specie sarebbe stato preso durante il passo straordinario di anatre che avvenne nella « piana » di Calabria nell' inverno 1879-80 (*Mor.*).

Columba Palumbus, *Fassa*, *Palumba servaggia.* Abbonda in branchi nei piani in ottobre e novembre (*M. Mor.*).

Columba Oenas, *Palumba servaggia.* Autunnale e comune (*M. Mor.*).

Turtur tenera, *Turtura.* Comune di passo in primavera (*M. Mor.*).

Perdix saxatilis, *Pernici.* Comune e sedentaria ai monti, erratica dal novembre al gennaio; va scarseggiando (*M. Mor.*).

Starna Perdix, *Starna.* Comune una volta nella piana di Calabria, è ora affatto scomparsa (*Mor.*).

Coturnix communis, *Quagghia.* Abbondante di passo e nidificante; se ne fa strage in primavera al litorale ed in autunno nei vigneti (*M. Mor.*).

Ortygometra Porzana, *Gajineja d'acqua.* Comune (*Mor.*).

Crex pratensis, *Rre di quagghi.* Non comune (*Mor.*).

Gallinula chloropus, *Fulica*, *Follaca.* Di passo in settembre (*M. Mor.*).

Fulica atra, *Murguni*, *Follaca.* Non comune (*M. Mor.*).

Grus communis, *Agroi.* Di passo a branchi, uno venne ucciso nell'aprile 1886 a Sbarre (*M.*); comune di passo (*Mor.*).

Otis Tetrax, *Turrottu.* Scarsa, invernale nella piana di Calabria (*Mor.*).

Œdicnemus scolopax, *Riversinu.* Di passo in settembre-ottobre ed anco in aprile (*M.*).

Charadrius Pluvialis, *Riversinu.* Comune di passo (*Mor.*).

Vanellus Capella, *Nivalora*, *Mbivula.* Invernale e comune (*M. Mor.*).

Digitized by Google

Himantopus candidus. Accidentale (*M.*).

Tringoïdes Hypoleucus, *Tiruli.* Di passo in primavera (*M.*).

Totanus Ochropus, *Tiruli*, *Arcignola.* Comune (*Mor.*).

Scolopax Rusticula, *Beccaccia.* Comune dalla fine del novembre alla metà di marzo (*M. Mor.*).

Gallinago major, *Crocculuni*, *Beccaccinuzzu.* Non raro (*Mor.*).

Gallinago cælestis, *Beccaccinu.* Comune, specialmente in febbraio (*M. Mor.*).

Gallinago Gallinula, *Beccaccineju mutu.* Comune d'inverno (*Mor.*).

Numenius Arquata, *Fischiaboi*, *Fischia-voi.* Scarso (*M.*); non infrequente (*Mor.*).

Glareola Pratincola. Di passo nel maggio (*M.*).

Thalasseus cantiacus. Raro, ne ebbi uno nel novembre 1886 dopo burrasca (*M.*).

Hydrochelidon nigra. Di passo in maggio (*M.*).

Chroocephalus minutus. Comune dal novembre all'aprile (*M. Mor.*).

Chroocephalus melanocephalus. Scarso, avuto in gennaio (*M.*).

Chroocephalus ridibundus. Invernale (*M.*).

Larus fuscus, *Oca marina.* Si vede in marzo (*M.*).

Larus cachinnans, *Oca marina.* Avuto in marzo ed aprile (*M.*).

Procellaria pelagica. Raro (*M.*).

Utamania Torda, *Marguni.* Abbondarono nel novembre-dicembre 1886 e gennaio 1887 (*M.*).

Fratercula arctica, *Sumbuzzaturi.* Una venne uccisa nell'aprile 1886 alla foce del torrente Scacciati (*M.*).

Podiceps fluviatilis, *Sumbuzzaturi.* Raro (*Mor.*).

Digitized by Google

Sottoregione insulare.

SICILIA.

Messina (Pistone avv. Antonio, Sole Nicola, Ruggeri Antonio):

Il distretto in cui hanno avuto luogo le osservazioni è tutta la provincia di Messina. I suoi confini sono: ad oriente lo Stretto ed il mare Ionio, a settentrione il mare Tirreno, la provincia di Catania a mezzogiorno, e quella di Palermo a ponente. Formato da una lunga zona in massima parte sul lato settentrionale dell' isola, misura in superficie chilom. q. 4579. È tutto grandemente accidentato da monti, colline e valli. — Una non interrotta serie di monti parte dalla catena dei Nettuni, l'attraversa con un andamento tortuoso, ora internandosi ed ora avvicinandosi al litorale, in tutta la sua lunghezza da presso a Capo Faro fino al limite della provincia di Palermo; con elevazione che varia da 600 a poco più di 1600 metri sul livello del mare. Le colline invece, contrafforti della catena principale, si diramano in svariatissime direzioni. Le serie più prolungate ed in più direzioni, sono quelle del versante settentrionale, che è il più lungo e più largo, mentre quelle del versante orientale sono molto più brevi, e quasi tutte in direzione del mare. Queste ultime però sono più ripide delle precedenti, come lo è tutto il versante, a causa della sua poca larghezza. In conseguenza di siffatta conformazione dei due versanti della catena, in quello settentrionale vi ha pure un maggior numero di valli molto più larghe e lunghe di quelle del lato orientale, dove generalmente sono strette e di breve corso, dal che deriva che in questo versante sono ben poche le pianure e poco estese lungo il litorale, mentre nel settentrionale ve ne ha assai

Digitized by Google

di più, ed alcune rimarchevoli. Tutte, meno poche interruzioni, seguono in continuazione l'una dell'altra sempre lungo il lido.

Straordinario è il numero di corsi d'acqua, dai quali è frastagliato l'intero distretto; ma ad eccezione di pochi, che possono ritenersi per fiumi, sebbene di tenuissima importanza, sono tutti torrenti generalmente rovinosi. Quasi dappertutto vi sono sorgenti di acqua, fra le quali alcune di acque minerali. Su di uno dei monti più alti vi è pure un piccolo lago. Lungo il litorale poi, nel lato settentrionale, si formano nell'inverno dei piccoli stagni, in parte alimentati da acque sorgenti sul sito nel corso dell'inverno, che poi disseccano nella stagione estiva, ed in parte per deposito di acque piovane per effetto della giacitura del suolo.

Il clima in generale è temperato. Il caldo anche lungo il litorale, dove naturalmente suole essere eccessivo, vi è pure spesso attenuato da venti freschi molto frequenti, specialmente nel lato orientale, dove, non di rado, sono anche impetuosissimi a causa dello Stretto. Il freddo massimo si avverte soltanto per poco tempo nel colmo dell'inverno e nei pochi siti più elevati.

In quanto alla vegetazione, offre tutte le gradazioni dai cactus al faggio. Le regioni più alte dei monti in massima parte sono nude, tenute a prati naturali. La vegetazione boschiva, che un tempo vi era ricchissima, oggi vi è molto scarsa. Soltanto in poche località vi si incontrano ancora avanzi, in generale mal ridotti, di alberatura di alto fusto a forma di bosco. Ed anche nei fianchi dei monti la vegetazione boschiva è ridotta a poco. Il contingente che ancora vi esiste è mantenuto quasi tutto a forma cedua, e nella stessa si conserva qualche bosco piuttosto in buone condizioni. Le essenze predominanti sono la quercia rovere e la quercia cerro. Indi la quercia sughero, la quale copre delle rilevanti estensioni nelle regioni più basse del versante settentrionale. In terzo luogo il castagno in ristretta quantità come pianta boschiva: questa specie in-

Digitized by Google

vece è molto più diffusa pel frutto. In alcuni siti di entrambi i versanti figura anche la quercia leccio, ma raramente. Il faggio è rappresentato in mediocri proporzioni soltanto sulle poche cime dei monti più elevati, ed ordinariamente misto al cerro ed alla rovere. I resinosi non mancano, ma ve ne sono pochissimi solo in alcune speciali località mantenuti a bosco. In rilevante quantità ne sono coltivati in non pochi siti per alberi di ornamento. Molto abbondante vi è la vegetazione di frutici e suffrutici di varie specie. Fra i primi la maggiore quantità è di erica volgare, ginestre e citiso, fra i quali si trova spesso misto il corbezzolo, il mirto, ed in alcuni siti s'incontra anche il lentisco. Gran parte delle falde dei monti e delle colline non suscettive di coltura agraria è vestita di questa vegetazione a forma macchiosa, che si conserva per ritrarne combustibile, e compensa in parte la scarsezza della vegetazione boschiva.

Variatissima vi è la coltura agraria, della quale è molto limitata quella di cereali. La più estesa è quella della vite, degli agrumi e dell'ulivo, e fra la stessa lussureggia una ricchissima varietà di alberi gentili da frutta. I vigneti e gli agrumeti occupano la massima parte delle pianure e delle falde delle colline. Su queste invece, ed alle falde dei monti, abbonda l'ulivo frastagliato da vigneti e da alberi da frutta. Quasi in tutti i siti delle medie e basse regioni non manca, dove più dove meno, altresì la coltivazione degli ortaggi, ed in parecchie località si coltivano pure la canape ed il lino. E per ultimo merita di essere notato che quasi tutte le parti pressochè sterili e rocciose fino a 400 metri sul livello del mare sono coperte di fico d'India, il quale vi prospera e fruttifica in modo maraviglioso (*Sole*).

Il circondario di Messina forma un grande ed enorme trapezio, considerandolo nella sua topografia, e se si stabilisce come punto di centro la città principale che trovasi al NE. dell'isola, possiamo delinearne i confini: al nord

Digitized by Google

contro il semicerchio delle costiere marittime del Faro, i villaggi di Pace e Ganzirri, di Torre di Faro e i comuni di Rametta, di Rocca Valdina, di Saponara Villafranca, di Spadafora, di San Martino, di Valdina Venetico, di Santa Lucia del Mela, di Gualtieri Sicaminò e di San Filippo; poi inoltrandosi verso il sud ha per confini la borgata di Gazzi e Trecampanari, il villaggio di Galati e i comuni di Santo Stefano di Briga, di Alì, di Fiumedinisi, di Guidomandri, di Itala, di Mandanici, di Nizza di Sicilia, di Pagliara, di Roccalumera e di Scaletta Zanclea; mentre all'est lo Stretto e il canale di Messina, gli scogli di San Salvatore e la spianata di San Raineri, luoghi questi che cingono il porto e formidabili per le inespugnabili fortezze della cittadella fondata da Carlo III re di Spagna; all'ovest una barriera di monti e di colli contrafforti a quelli, di cui altissimo quello di Dinnamare e il colle San Rizzo; quando al NO. ha Gesso, Bauso e Calvaruso, Milazzo e il capo dello stesso nome, Condrò, Monforte San Giorgio, San Pietro di Monforte e Spadafora San Pietro. Quindi i naturali confini di questa nostra contrada sono segnati per due parti dal mare da un lato dai monti e dall'altro dai piani.

Gettando un'occhiata sulla carta topografica si scorgono nel circondario e distretto di Messina due parti distinte: l'una cioè che stendesi dall'est al nord, vale a dire dal Capo Peloro al Capo di Milazzo, con le sue diramazioni interne fino a Rametta, e l'altra dall'est al sud come da Gazzi a Nizza di Sicilia con le sue ramificazioni sino a Fiumedinisi e Alì Superiore.

Tutti i monti del distretto di Messina si possono sommariamente coordinare nei due sistemi di monti propriamente detti, e di colli. — Nella catena dei monti propriamente detti torreggia al sud il Dinnamare e il monte Scuderi; nel sistema dei colli quello di San Rizzo e il Serro all'ovest della città.

Le linee di ineguaglianza del suolo del circondario di Messina prenominate, ripartiscono le acque fluenti dei

Digitized by Google

monti in due versanti primarii secondo i due diversi mari ai quali sono volte le sue regioni idrografiche od avvallamenti. Nel Mediterraneo, ossia al nord dell'isola, hanno foce il fiume Gallo, che è il maggior fiume del distretto da questa parte, poichè ricevendo un gran numero di affluenti è l'emissario della regione idrografica la più ampia del distretto in osservazione, la quale bene dal nome di esso fiume è chiamata. Vengono in seguito altri piccoli fiumicelli e torrenti, che tralascio di nominare perchè di poco rilievo. Al nostro Stretto e dalla parte dell'est mettono capo i torrenti di Papardo, di Pennacchio, della Guardia, dell'Annunziata, di San Licandro, di Sant'Orsola e della Roccetta; nel canale dalla parte SE. i torrenti di Portalegni e Cammaro, questo affluente al fiume Catarratti, il quale sbocca nello stesso mare; mentre lunghesso il canale nell'Ionio il fiume della Santissima (Fiumidinisi) e dell'Alcantara (Caltabiano) che divide la provincia di Messina da quella di Catania. — Gli alti colli del Faro che al settentrione allegrano l'orizzonte della Piana di Milazzo, racchiudono nelle loro propaggini meridionali quegli specchi d'acqua che sono ad un tempo i soli ed i più deliziosi laghetti del nostro distretto, costà sono i laghi e i pantani del Faro, il lago di Ganzirri, quello di Torre di Faro e i pantanelli dello stesso nome, dei quali alcuni hanno i loro trabocchi e comunicazioni col mare.

Nessun paese della Sicilia è meglio disposto dalla Natura come il nostro distretto per le sue coste, donde si spazia l'occhio sopra il panorama incantevole dell'opposte Calabrie e sul piccolo arcipelago delle isole Eolie. Fra i tanti porti che possiede la Sicilia, quello di Messina è certamente il più bello che abbia formato natura, il più sicuro che si conosca, poichè offre ai navigli numerosi approdi e, in mare fortunoso, sicuro ricetto tanto più che nello stretto *Fretum Siculum* il flusso e il riflusso si fa sentire notevolmente e la corrente vi è rapidissima, la qual cosa rende difficile la navigazione, donde le favole antiche di Scilla e Cariddi.

Digitized by Google

Quantunque caldo, in generale il clima è sano, salvo di pochissime eccezioni nei luoghi vicini alle acque stagnanti e su per gli alti monti, ove fa del freddo. Pur nondimeno possiamo dire essere per quanto temperato altrettanto incostante, poichè molto possono le correnti dello Stretto influenzare sulle condizioni climatologiche dei punti più vicini al mare.

Il suolo del nostro distretto è poi quasi dappertutto, anco sulle montagne, abbastanza fecondo e produttivo, offrendo una varietà immensa di produzioni. Le campagne producono cereali oltre il bisogno, e le spiagge del Faro, del Campo degli Inglesi, di Milazzo, insomma tutte le riviere marittime sono rivestite di aranci, di cedri, di limoni, di mandarini, di ogni specie di agrumi e di foltissimi uliveti. I vini poi del Faro e della Piana stanno al paragone con quelli di Spagna e di Cipro. Gli erbaggi e le frutta di ogni specie così nelle vicine campagne di Messina, come in quelle di tutto il distretto, sono di una bellezza, di una fragranza e di un sapore gratissimo. I castagni, le quercie sulle falde del Dinnamare, della Santissima e di Monte Scuderi; i gelsi, i vigneti nelle pianure e sui colli abbondano in tutto il circondario. Si raccolgono inoltre i prodotti dei paesi tropicali: cotone, fichi d'India, nespole del Giappone, aloe, manna ed aromi di più sorta insieme alle narcotiche piante di tabacco.

Nè meno abbondevoli sono i mari che circondano il distretto, nei quali oltre le fruttuose pesche che vi si fanno di tonni, come a Milazzo, di sardelle a Spadafora, di pesce spada a Sant' Agata e di tante altre qualità, si trovano conchiglie pregevoli e coralli. Nei laghi si fa pesca abbondante di muletti e di anguille, di telline e altre conchiglie bivalvi e univalvi, di violi ed altri piccoli pesci.

La zona di terra insulare che compone il nostro distretto ha gran copia di minerali, fra cui, oltre i marmi durissimi, alabastri trasparenti e pregiati, cristalli neri, allume, zolfo, pomici, lignite, mica, antimonio, argento e oro, salgemma, mercurio, solfato di ferro, salnitro e arse-

Digitized by Google

nico. Le miniere d'oro e di argento erano un tempo attivate sotto i Borboni, e specialmente quelle di Fiumedinisi e di Saponara. Nel nostro distretto si trovano non poche sorgenti di acque solfuree e ferrate; ve n' è anco calde, come le solfuree di Alì e le ferrigno-solforose di Messina città.

L'aspetto confuso che presentano i monti per le irregolari loro ramificazioni, gli ammassi di conchiglie fossili e resti animali sono un indizio delle grandi rivoluzioni cui soggiacque il nostro distretto per l'azione di terremoti e di inondazioni, per le quali non è mica agevole cosa stabilirne la geologica struttura.

L'agricoltura è attualmente nel nostro circondario in via di notevole progresso; e chi si facesse da un capo all'altro a percorrere questa contrada, vedendo gli estesi e larghi vigneti, i giardini di limoni irrigati onde sono liete le pianure; le coltivazioni a ciglioni e le colmate onde son floridi i nostri colli e le nostre valli, si renderebbe immagine di un delizioso giardino, e non potrebbe a meno di convenire che la nostra industria agricola, nei luoghi in cui è più fiorente, non è inferiore a quella di qualsivoglia altro paese (*Pistone*).

Elenco delle specie di uccelli osservate nella provincia di Messina, coi nomi volgari locali e con notizie sulla frequenza, sulle migrazioni, sulla nidificazione ecc., ecc. [1]

Corvus Corax, *Corvu*, *Corvu impiriali*. Si trova dappertutto, in maggior numero alle montagne, sedentario; alleva una covata di 2-3 tra giugno e luglio (*R.*); gennaio-febbraio (*P.*).

---

[1] Questo elenco è compilato su quelli forniti e sulle notizie raccolte dai signori A. Pistone ed A. Ruggeri; colle rispettive iniziali ho indicato la parte che spetta a ciascuno, quando queste sono ommesse s' intende che i due osservatori si trovano d'accordo. Debbo aggiungere

Digitized by Google

Corvus Cornix, *Corvu jancu.* Sta in luoghi montuosi; molte nel territorio di Mistretta; sedentaria.

Corvus frugilegus, *Corvu di passa.* Di transito irregolare, qualche anno abbondante in marzo-aprile sullo Stretto.

Lycos Monedula, *Ciaula.* Si trova abbondante e sedentaria nelle contrade orientali e meridionali, scarsa alle montagne; alleva una covata di 2-4 tra giugno e luglio.

Pica rustica, *Carcarazza.* Comune e sedentaria; alleva una covata tra giugno e luglio di 4-6.

Garrulus glandarius, *Tiruní.* Comune e sedentaria; alleva una covata di 4 tra giugno e luglio.

Sturnus vulgaris, *Sturnu di passa*, *Sturneddu.* Comune ed abbondante più alle maremme, di passo in marzo-aprile ed ottobre-novembre.

Sturnus unicolor, *Sturnu*, *Sturneddu niuru.* Comune e abbondante nei paesi di montagna, sedentario; depone 4-5 uova.

Pastor roseus, *Sturnu russu.* Accidentale e scarso.

Fringilla cœlebs, *Spunzuni.* Comunissimo dappertutto e sedentario; due covate di 3-4 tra giugno e luglio.

Fringilla Montifringilla, *Spunzuni barbariscu.* Rara sulle maremme, a' monti non veduta mai.

Petronia stulta, *Passarastra* Messina, *Sulitariu* Milazzo. Comune, sedentaria; alleva due covate di 4-5 tra giugno ed agosto; abbondante massime tra Messina e Patti in ottobre-novembre; si trova pure a' monti.

Passer hispaniolensis, *Passaru.* Comune, abbondante e sedentaria dovunque; alleva tre covate di 4-7 tra maggio e agosto.

Passer Italiæ, *Passaru du Distrettu.* Una piccola colonia sedentaria, isolata nei forti della cittadella di Messina (*P*).

---

che l'avv. Pistone, appassionato cultore dell'Ornitologia, ha saputo formare coi soli suoi mezzi e vincendo non piccole difficoltà con lodevolissima tenacità di proposito, una bellissima raccolta degli uccelli del distretto.

Digitized by Google

Coccothraustes vulgaris, *Spanzuni 'mpiriali.* Raro, qualcuno se ne vede tra ottobre e novembre (*R.*); forse nidificante (*P.*).

Ligurinus Chloris, *Virduni.* Comune nella zona delle maremme, sedentario e nidificante.

Chrysomitris Spinus, *Lùaru.* Di passo irregolare, qualche volta abbondante.

Carduelis elegans, *Cardiddu.* Comune e abbondante dappertutto, sedentario; tre covate di 3-4 tra aprile e agosto.

Serinus hortulanus, *Rappareddu.* Comune e sedentario nelle campagne medie e basse; tre covate di 3-4 tra aprile e agosto.

Cannabina Linota, *Zuinu*, *Ziinu.* Comune e sedentario; due covate di 3-4 tra giugno e luglio.

Pyrrhula europæa, *Passaru americanu.* Rarissimo.

Loxia Curvirostra, *Pappaiaddiscu*, *Beccu in cruci.* Raro; comparve abbondante sulle maremme di Messina nel 1838 e 1864, dopo alluvioni.

Euspiza melanocephala, *Ziulu testa nira*, *Ziulu svariu.* Rarissimo (*R.*); l'ebbi due volte, il 29 dicembre 1882 ed il 10 maggio 1884 (*P.*).

Miliaria Projer, *Ciciruni.* Comune dappertutto e sedentario; due covate di 3-4 tra maggio e luglio.

Emberiza Citrinella, *Ziulu gialinu* o *giallu.* Rarissimo.

Emberiza Cirlus, *Ziulu.* Comune in siti montuosi, scarso alle pianure, sedentario; due covate 3-4, giugno-luglio.

Emberiza Hortulana, *Ortulanu.* Scarso alle maremme, di passo in aprile-maggio, anco nidificante.

Emberiza Cia, *Ziulu cinnirinu*, *Vizziola.* Comune dalle colline in su; di passo dalla metà di ottobre a quella di novembre.

Emberiza cæsia. Rara assai (*P.*).

Emberiza pyrrhuloïdes, *Passaru di acqua.* Non scarsa e nidificante dall'aprile al luglio (*P.*).

Emberiza Schœniclus, *Ziulu di pantanu.* Raro, vedesi ne' paduli delle maremme in novembre e dicembre (*R.*); anco nidificante (*P.*).

Digitized by Google

Melanocorypha Calandra, *Calandra.* Qualche individuo viene dalle parti di Catania in marzo ed aprile tra gli stormi di *Alauda arvensis.*

Otocorys alpestris. Accidentale, due soli presi (*P.*).

Calandrella brachydactyla, *Quagghiarina.* Comune in tutte le pianure basse, di passo in aprile-maggio; più scarso in settembre-ottobre. Nidifica tra giugno e luglio allevando 3–4 pulcini.

Alauda arborea, *Cucugghiatula*, *Passaru di boscu.* Comune, di passo in ottobre-novembre, scarso in marzo-aprile; pure nidificante tra giugno e luglio allevando 3-4.

Alauda arvensis, *Calandruni.* Comune nelle basse pianure in ottobre-novembre e marzo.

Galerita cristata, *Cucucciuta*, *Cucugghiata.* Comune ne' bassi piani e più presso gli stradali, sedentaria; due covate tra maggio e giugno di 3-4.

Agrodroma campestris, *Currintuni.* Vedesi alle maremme in poca quantità tra aprile e maggio.

Corydalla Richardi, *Currintuni furasteri.* Accidentale al piano (*P.*).

Anthus pratensis, *Zivedda.* Numerosa in ottobre-novembre ed in marzo–aprile.

Anthus cervinus, *Zivedda coddu russu.* Rarissima.

Anthus trivialis, *Zividduni.* Comune nella zona media e più nelle parti orientali in aprile e settembre.

Anthus Spipoletta, *Zivedda di pantanu.* Raro, trovasi presso a' paduli sulle maremme.

Budytes flavus, *Gialinedda.* Comune e abbondante dal litorale alle colline in marzo–aprile, scarso nel settembre.

Budytes cinereocapillus, *Gialinedda masculu.* Comune in marzo ed aprile.

Budytes melanocephalus, *Gialinedda testa nira.* Scarso, pochi individui confusi con le due specie precedenti in marzo–aprile.

Motacilla alba, *Pispicia janca.* Comune e sedentaria, passa in ottobre e novembre.

Motacilla lugubris, *Pispicia svaria.* Rarissima.

Digitized by Google

Calobates melanope, *Pispicia gialla* o *di frischia*. Scarsa, ma sedentaria; nidifica tra giugno e luglio, allevando 3-4 pulcini.

Saxicola Oenanthe, *Mataccinu*. Comune e abbondante dalla metà di marzo a quella di maggio.

Saxicola albicollis, *Mataccinu jancu*. Comune al piano (*P.*).

Saxicola Stapazina, *Mataccinu cull' ali niri*. Comune di passo in aprile e maggio.

Dromolæa leucura, *Mataccinu niru*. Rara ai monti (*P.*).

Monticola saxatilis, *Cuda di focu barbarisca*. Raro, si vede in aprile-maggio.

Monticola Cyanus, *Merru di rocca*. Comune dalla zona media alla montuosa, sedentaria; una covata di 3-4 tra giugno e luglio.

Merula nigra, *Merru di sipala*. Comune dalle maremme alle montagne, sedentario; una a due covate di 3-4 tra maggio e luglio.

Merula torquata, *Merru pettu jancu*, o *a collana*. Raro.

Turdus pilaris, *Re di li marvizzi*. Rara di passo in ottobre e novembre.

Turdus iliacus, *Marvizza furastera*. Raro assai d'autunno (*P.*).

Turdus musicus, *Marvizza*. Comune ed abbondante dovunque, di doppio passo, fors' anche nidificante ai monti.

Turdus viscivorus, *Marvizzuni*. Rara, pochi individui nella zona media, sedentaria; nidifica tra maggio e luglio allevando 3-4 pulcini.

Aëdon Luscinia, *Rusignolu*, *Risignolu*. Comune dappertutto in mediocre quantità. Nei boschi fa due covate di 3-4 tra giugno e luglio.

Erithacus Rubecula, *Pettu russu*. Comune, sedentario e piuttosto abbondante alle maremme, scarso ai monti; fa due covate di 3-4 tra giugno e luglio.

Cyanecula Wolfi, *Pettu bru*. Rara (*R.*); di passo in marzo-aprile ed in settembre (*P.*).

Ruticilla Phœnicurus, *Cuda di focu*. Estivo, scarso piuttosto, di passo in aprile-maggio; nidifica tra giugno e luglio allevando 3-4 pulcini.

Digitized by Google

Ruticilla titys, *Cuda di focu pettu niru.* Non comune, sedentario ai monti.

Pratincola Rubicola, *Caca-marruggiu.* Comune dappertutto, sedentario e di passo in marzo-aprile ed ottobre-novembre.

Pratincola Rubetra, *Caca-palu*, *Proscunculu.* Comune, di passo in marzo-aprile ed ottobre-novembre (*R.*); nidificante (*P.*).

Sylvia orphæa, *Beccaficu grossu.* Rara ed estiva (*P.*).

Sylvia cinerea, *Acidduzzu di fava.* Comune, ma non frequente; sedentaria.

Sylvia Curruca, *Bianculiddu.* Non comune, passa in aprile-maggio.

Sylvia subalpina, *Caca-sipala*, *Buarottu.* Comune dappertutto in piccola quantità, sedentaria.

Sylvia conspicillata, *Acidduzzu di fava.* Comune alle maremme, sedentaria e di passo in aprile-maggio; fa due covate di 3-4 tra maggio e luglio.

Monachus Atricapillus, *Testa-nira* ♂, *Testa-russa* ♀. Comune, sedentaria e nidificante.

Monachus hortensis, *Beccaficu.* Comune sulle maremme, raro ai monti, in agosto-settembre.

Pyrophthalma melanocephala, *Chicchitedda*, *Caca-sipala cu l'occhi russi.* In scarso numero sedentario nelle campagne basse; vi nidifica tra maggio e luglio allevando 3-4 pulcini.

Melizophilus undatus, *Caca-sipala russu.* Frequente (*P.*).

Melizophilus sardus, *Caca-sipala nira.* Non abbondante, passa in marzo-aprile e settembre-ottobre; anco sedentaria.

Phylloscopus sibilator, *Virdeddu*, *Virdidduni.* Comune, non abbondante, sedentario; due covate tra giugno e luglio di 3-4.

Phylloscopus Trochilus, *Percia-rivetti* o *-ruvetti.* Comune di passo in marzo-aprile e settembre-ottobre; nidifica tra giugno e luglio allevando 3-4 pulcini in due covate.

Phylloscopus Bonellii, *'Mmucca-muschi jancu*, *Virdeddu jancu.* Scarso, trovasi nelle campagne basse in aprile-maggio, pochi in settembre.

Digitized by Google

Phylloscopus rufus, *'Mmucca-muschi*, *Virdeddu*. Notissimo dovunque, sedentario; due covate tra giugno e luglio di 3-4.

Hypolais icterina, *Virdidduni*. Pochi individui di passo in agosto-settembre.

Acrocephalus streperus, *Beccaficu di margiu*. Rara, s'incontra sulle maremme.

Acrocephalus arundinaceus, *Rusignoluni*, *Rusignolu di margiu*. Raro, vedesi sulle paludi vicine al mare.

Calamodus schœnobænus, *Beccaficu di siminatu*. Scarsa al piano.

Calamodus aquaticus, *Beccaficu di margiu*. Trovasi di rado, sta in siti paludosi.

Lusciniola melanopogon, *Beccaficu russu*. Raro, sedentario (*P.*).

Potamodus luscinioïdes, *Rusignoluni*. Rara assai (*P.*).

Cettia Cettii, *Rusignoluni di cannitu*. Sedentario, ma raro (*P.*).

Cisticola cursitans, *Riiddu di pantanu*, *Carrubbeddu*. Vedesi in mediocre quantità in tutti i luoghi paludosi litoranei tra le tife e i giunchi, vi è sedentario.

Troglodytes parvulus, *Pulicicchiu*, *Riiddu*. Comune e sedentario dalla zona de' boschetti in su, due covate di 3-4 tra giugno e luglio.

Cinclus aquaticus, *Merru d'acqua*. Comune, trovasi alle sponde de' fiumi, sempre in siti interni, sedentario.

Accentor collaris, *Ferrareddu*. Non scarso ai monti (*P.*).

Accentor modularis, *Ferrareddu*, *Carbunaru*. Comune e anco sedentario.

Regulus cristatus, *Riiddu*. Raro, ma sedentario.

Regulus ignicapillus, *Riiddu tupputu*. Scarso, ma sedentario.

Ægithalus pendulinus, *Carrubbeddu*. Non raro, localizzato (*P.*).

Acredula Irbyi, *Pinnazzola cuda longa*. Scarso (*P.*).

Panurus biarmicus, *Pispisè*. Scarso (*P.*).

Parus major, *Pirnizzola*, *Pinnazzola*. Comune, sedentaria; due covate di 8-14 tra maggio e agosto.

Parus ater, *Munacedda*. Rara, si mostra nella zona media, sedentaria.

Poecile palustris, *Munacedda a testa nira*. Rara (*P.*).

Digitized by Google

Cyanistes cæruleus, *Mancialivi.* Rara, ma sedentaria.

Sitta caesia, *Brancicaloru.* Raro, trovasi dalla zona media, sedentario e di passo in ottobre-novembre.

Certhia brachydactyla, *Brancicaloru.* Sedentario, ma scarso.

Tichodroma muraria, *Pizzicamuru.* Raro (*P.*).

Oriolus Galbula, *Crusuleu.* Comune da' siti medii in su, non abbondante, nidificante.

Lanius Excubitor, *Garganu?* Rara.

Lanius minor, *Tistazza cinnirina.* Scarsa, di passo in settembre.

Lanius Collurio, *Testa-rossa picciridda.* Scarsa, di passo in marzo-aprile.

Lanius auriculatus, *Testa rossa* (*rossa* significa *grossa*), *Carracefalu.* Comune, estiva, nidificante in giugno, una covata di 4-7.

Muscicapa collaris, *Carcarazzedda.* Rara, trovasi in aprile-maggio.

Muscicapa Atricapilla, *Acchiappamuschi.* Rara, di passo in aprile-maggio.

Butalis Grisola, *Carcarazzedda, Muscalureddu.* Non comune, di passo in aprile-maggio.

Hirundo rustica, *Rinnina.* Comune ed estiva, passa dalla metà di marzo a quella di maggio.

Hirundo rufula, *Rinnina monica* o *furastera.* Rara, s'incontra sul litorale a levante da marzo a maggio.

Chelidon urbica, *Barbottula, Martiduzzu.* Comune e abbondante più ne' siti bassi, passa da marzo a maggio; due covate di 4-6 da giugno-agosto.

Clivicola riparia, *Monacedda, Rinnina suricina.* Comune, vedesi in siti bassi.

Cotile rupestris, *Monacedda, Nivalora.* Comune, passa anco sul litorale; ma sta a' monti, vi nidifica da giugno ad agosto allevando due covate di 4-5.

Cypselus Apus, *Rindinuni* o *Rinninuni pettu-janco.* Comune, quantità mediocre, zona bassa, estivo.

Cypselus Melba, *Rindinuni* o *Rinninuni americanu.* Abbondante e nidificante.

Digitized by Google

Caprimulgus europæus, *Curdaru.* Scarso ordinariamente, talvolta abbondante, passa in aprile-maggio.

Dryocopus martius, *Pizzica-ferru niro.* Rarissimo.

Picus major, *Pizzica-ferru*, *Carpinteri.* Scarso assai.

Picus medius, *Pizzica-ferru testa russa.* Rarissimo (*P.*).

Picus minor, *Pizzica-ferru nicu.* Raro, ma sedentario.

Gecinus viridis, *Pizzica-ferru virdi.* Non raro ai monti (*P.*).

Iÿnx Torquilla, *Furmicularu.* Passa in aprile-maggio, è anche sedentario.

Cuculus canorus, *Turturaru.* Passa in aprile-maggio.

Coccystes glandarius, *Turturaru tupputu*, *Giriuni.* Rarissimo (*R.*); ne ebbi un solo, preso al Faro il 10 maggio 1884 (*P.*).

Alcedo Ispida, *Martineddu.* Conosciuto sul litorale, sedentario e nidificante.

Coracias Garrula, *Carraggià* o *Carraru.* Comune, nidifica tra giugno e luglio, una covata di 3-4.

Merops Apiaster, *Pizzicaferru.*, Comune, numeroso di passo in aprile-maggio.

Upupa Epops, *Pipituni.* Comune; una covata di 4-5 tra giugno e luglio.

Strix flammea, *Barbajanni*, *Piula.* Conosciuto nella zona bassa e media, sedentario e scarso.

Syrnium Aluco, *Cuccu di passa*, *Fuanu.* Sarebbe di passo in aprile-maggio in scarso numero, pure sedentario.

Asio Otus, *Cuccazzu*, *Fuganu.* Sarebbe di passo in aprile-maggio, anco sedentario.

Asio accipitrinus, *Orva*, *Cuccuni di passa.* Sedentario e di passo in aprile-maggio.

Athene Noctua, *Cucca.* Comune e sedentaria.

Scops Giu, *Scupiu.* Comune, estivo.

Bubo maximus, *Cuccuni.* Raro, zona alta, sedentario.

Circus æruginosus, *Arpegghia*, *Farcunazzu.* Comune, di passo in marzo, aprile e maggio e anche sedentario.

Circus cyaneus, *Arpegghia janca*, *Albaneddu di passa.* Di passo dalla metà di marzo a tutto aprile, anche sedentaria.

Digitized by Google

Circus Swainsoni, *Arpegghia*. Rarissima, ma anche sedentaria.

Circus cineraceus, *Arpegghia*. Accidentale (*R.*).

Pandion Haliaëtus, *Cefalaru*. Conosciuto sui paduli della zona bassa, sedentario in piccol numero, e di passo da marzo a maggio.

Circaëtus gallicus, *Falcunazzu*. Raro (*P.*).

Aquila Chrysaëtus, *Arpa*. Rara, zona media ed alta, sedentaria.

Nisaëtus fasciatus, *Aquilotta*. Scarsa (*P.*).

Buteo vulgaris, *Farcunazzu*. Rara, zona media ed alta.

Pernis apivorus, *Arru*, *Adornu*. Conosciuto in pochi siti della zona media, di passo in aprile-maggio, agosto e settembre.

Milvus Ictinus, *Nibbiu*, *Nigghiu*. Non raro, sedentario nella zona media e bassa.

Milvus migrans, *Nigghiu di passa*, o *niru*. Rarissimo.

Gennaia Feldeggi, *Falcuni raru*. Accidentale.

Falco Peregrinus, *Arbaneddu*. Comune, zona bassa, quantità mediocre, sedentario.

Hypotriorchis Subbuteo, *Arbaneddu di passa*. Comune di passo da marzo a maggio.

Æsalon regulus, *Cacciaventu di passa*, o *furasteri*. Comune di passo da marzo a maggio.

Cerchneis Tinnunculus, *Cacciaventu*, *Cristareddu*. Comune e sedentario; una covata di 4-5 tra giugno e luglio.

Cerchneis Naumanni, *Cacciaventu maltisi*. Non raro.

Cerchneis vespertinus, *Arbaneddu causi russi*, *Chiumminu*. Comune, di passo in aprile-maggio, qualche anno abbondante; si vede anche in ottobre (*P.*).

Astur palumbarius. Raro, zona media, ma sedentario.

Accipiter Nisus, *Sparveri*. Non raro, zona bassa e media e anco sedentario.

Gypaëtus barbatus, *Vuturu*. Rarissimo sugli alti monti (*P.*).

Vultur monachus, *Vuturu*. Raro ai monti (*P.*).

Gyps fulvus, *Vuturazzu*. Non raro ai monti (*P.*).

Neophron Percnopterus, *Masculinu*, *Aciddazzu di passa*. Non raro, piuttosto zona media ed alta.

Digitized by Google

Pelecanus Onocrotalus, *Pellicanu.* Accidentale, zona bassa.

Phalacrocorax Carbo, *Marguni.* Scarso, in novembre e dicembre.

Phalacrocorax Graculus, *Marguni svariu.* Accidentale, n' ebbi un giovane dal Faro (*P.*).

Ardea cinerea, *Aruni.* Scarso, invernale, di passo in marzo.

Ardea purpurea, *Russeddu.* Comune di passo in marzo-aprile.

Egretta alba, *Aroi jancu.* Rara in aprile e novembre.

Egretta Garzetta, *Aretta.* Comune in aprile e maggio.

Ardeola ralloïdes, *Aretta biunna*, *Sciabocchi.* Comune di passo in aprile-maggio.

Ardetta minuta, *Sciorbocchi*, *Sciabocchedu.* Comune di passo in marzo, aprile e maggio, anco nidificante; una covata di 4 in aprile-maggio.

Botaurus stellaris, *Capuni di margi*, *Bittordu*, *Bittorna.* Comune in marzo-aprile e ottobre novembre (*R.*).

Nycticorax griseus, *Grassotta.* Comune in marzo-aprile.

Ciconia alba, *Cicogna janca.* Rarissima (*R.*); passa in aprile ed ottobre, quasi regolare (*P.*).

Ciconia nigra, *Cicogna nira.* Rarissima, si vede in aprile ed in ottobre irregolarmente.

Platalea Leucorodia, *Palitta.* Accidentale (*R.*); di passo in aprile ed ottobre (*P.*).

Plegadis Falcinellus, *Gaddaranu.* Comune in aprile-maggio (*R.*).

Phœnicopterus roseus, *Fiammingu*, *Fiammanti.* Accidentale.

Cygnus musicus, *Cignu.* Accidentale (*R.*).

Anser segetum, *Paparuni.* Rara (*R.*).

Tadorna cornuta, *Cruciatu.* Rarissima (*R.*).

Anas Boscas, *Coddu virdi* (masc.), *Anitra* (fem.). Comune in marzo-aprile e novembre-dicembre (*R.*).

Spatula clypeata, *Cucchiaruni.* Raro nell' inverno (*R.*).

Mareca Penelope, *Fischiuni.* Raro nell' inverno (*R.*).

Nettion Crecca, *Purpuredda.* Comune in marzo-aprile e novembre-dicembre (*R.*).

Querquedula Circia, *Marzola.* Comune in marzo-aprile (*R.*).

Fulix Fuligula. Rarissima nell' inverno (*R.*).

Digitized by Google

Fulix Nyroca, *Purpuredda tabacchina.* Comune in marzo-aprile e novembre (*R.*).

Mergus Serrator, *Serra.* Raro d'inverno (*R.*).

Mergellus Albellus, *Sirretta.* Rara d'inverno (*R.*).

Columba Palumbus, *Fassa.* Comune e sedentario nella zona media ed alta, vi nidifica allevando tre covate di 2 da giugno-agosto. Di passo in febbraio-marzo e in ottobre.

Columba Oenas, *Palumma sarvaggia.* Comune ai colli ed ai monti, forse sedentaria; nidifica allevando tre covate di 2 tra giugno ed agosto. Passa in marzo e settembre-ottobre.

Columba livia, *Palumma servaggia*, o *roccalora.* Comune e sedentario; tre covate di 2 tra giugno ed agosto.

Turtur tenera, *Turtura.* Comune, estiva; alleva due covate di 2 tra giugno ed agosto.

Perdix saxatilis, *Pirnici.* Comune e sedentaria ai monti ed ai colli.

Coturnix communis, *Quagghia.* Comune al piano, abbondantissima, anco sedentaria.

Turnix sylvatica, *Taureddu.* Sedentaria nei piani arenosi (*P.*).

Rallus aquaticus, *Marranzanu*, *Iaddineddu di acqua.* Comune, zona bassa in marzo ed aprile, anco sedentaria.

Ortygometra Porzana, *Marranzanu*, *Iaddinedda d'acqua.* Comune in marzo-aprile ed in ottobre-novembre.

Ortygometra Bailloni, *Jadduzzeddu d'acqua.* Id. id. id.

Ortygometra parva, *Jadduzzeddu d'acqua.* Id. id. id.

Crex pratensis, *Re di quagghi veru.* Comune di passo in aprile-maggio.

Gallinula chloropus, *Jaddinedda di boscu*, *Jadduzzu di acqua.* Id. id. id., ma anche sedentaria.

Porphyrio smaragdonotus. Accidentale (*P.*).

Porphyrio caeruleus, *Jaddu-faciamu.* Accidentale.

Fulica atra, *Forgia*, *Jaddinazzu.* Comune in marzo ed in ottobre-novembre.

Fulica cristata. Accidentale (*P.*).

Grus communis, *Groi.* Comune in novembre-dicembre (*R.*); di passo regolare in marzo-aprile ed in ottobre (*P.*).

Digitized by Google

Otis Tarda, *Vecchia*. Rara assai (*P.*).

Otis Tetrax, *Pitarra*. Non tanto scarsa (*P.*).

Œdicnemus scolopax, *Rivirsinu*. Comune, di passo dalla metà di ottobre ai primi di dicembre, ed in marzo ed aprile.

Cursorius gallicus, *Gentilomu*. Raro (*R.*).

Charadrius Pluvialis, *Olivedda*, *Marteddu*. Comune di passo in ottobre-novembre e marzo.

Squatarola helvetica, *Olivedda* od *Uvaredda di margi*. Comune, di passo in ottobre-novembre e marzo.

Eudromias Morinellus, *Martidduzzu*. Scarso di passo in ottobre-novembre e marzo.

Ægialitis cantiana, *Occhialuni*. Comune (*P.*).

Ægialitis curonica, *Cirrivì*, *Occhialuni*. Comune di passo dalla metà di ottobre a quella di dicembre ed in marzo-aprile.

Ægialitis Hiaticula, *Sbrivireddu*, *Jadduzzeddu d' acqua*, *Occhialuneddu*. Comune di passo in ottobre-novembre e marzo-aprile.

Vanellus Capella, *Nivalora*. Comune di passo in novembre-dicembre e marzo-aprile.

Strepsilas Interpres, *Papunceddu*. Raro.

Hæmatopus Ostralegus, *Facianotta*. Raro.

Recurvirostra Avocetta, *Lèsina*. Rara, ma apparentemente di passo regolare da marzo a maggio.

Himantopus candidus, *Aceddu cavaleri*. Raro (*R.*); di passo in marzo-aprile e più scarso nel settembre (*P.*).

Limicola platyrhyncha. Scarso (*P.*).

Pelidna subarquata, *Papióla beccu-stortu*. Comune di passo in aprile-maggio.

Pelidna alpina, *Papiuledda*. Piuttosto raro.

Actodromas minuta, *Lodula* o *Lodona di mari*. Comune di passo.

Actodromas Temmincki, *Spiriticchiu*. Non scarso (*P.*).

Tringa Canutus. Accidentale (*P.*).

Calidris Arenaria, *Beccaccinu tri-ugni*. Passa da ottobre a dicembre ed in marzo-aprile, in quantità ora scarsa ora abbondante.

Digitized by Google

Machetes Pugnax, *Jamminu.* Passa da ottobre a dicembre ed in marzo-aprile, non tanto abbondante.

Tringoïdes Hypoleucus, *Quagghia di mari.* Comune di doppio passo.

Totanus Ochropus, *Stagnotta.* Comune di doppio passo.

Totanus Glareola, *Beccaccinu di sciumara.* Non raro, di passo in aprile-maggio ed in agosto-settembre.

Totanus stagnatilis, *Beccaccinu jammi-longhi.* Raro (*R.*); di passo in aprile-maggio ed agosto-settembre (*P.*).

Totanus Calidris, *Papióla 'mpiriali.* Scarsa, di passo in aprile-maggio ed in settembre.

Totanus fuscus, *Papióla nira.* Scarsa, di passo in aprile-maggio e settembre.

Totanus nebularius, *Jamminu riali.* Rarissima, di passo in marzo-aprile.

Limosa melanura, *Arcirotta di turdi.* Rara di passo in marzo-aprile.

Limosa rufa. Accidentale (*P.*).

Scolopax Rusticula, *Jaddazzu, Beccacciu.* Comune dappertutto dal 25 ottobre al 15 dicembre.

Gallinago major, *Arciruttuni* o *Beccaccinu riali.* Comune, zona bassa, in marzo-aprile.

Gallinago cælestis, *Ceca, Beccaccinu.* Comune in novembre, dicembre e marzo.

Gallinago Gallinula, *Beccaccineddu, Pigghiugghiu.* Comune, di passo in novembre e marzo.

Numenius Arquata, *Turriazzu, Ciulliu.* Comune, di passo in ottobre-novembre e marzo-aprile.

Numenius tenuirostris, *Turriazzolu.* Comune, di passo in novembre e marzo-aprile.

Numenius Phæopus, *Turriazzolu di jaddazzi.* Raro, passa in novembre e marzo-aprile.

Glareola Pratincola, *Beccu russu, Rindinuni di livanti.* Rara, passa in aprile-maggio.

Thalasseus cantiacus, *Ala-longa tupputa.* Accidentale (*R.*); scarso, ma sedentario (*P.*).

Sterna fluviatilis, *Ala-longa.* Rara (*R.*).

Digitized by Google

Sternula minuta, *Ala-longa di li picculi.* Scarso (*R.*).
Hydrochelidon leucoptera, *Ala-longa pedi-russi.* Scarso (*R.*).
Hydrochelidon nigra, *Ala-longa nira.* Scarso.
Chroocephalus minutus, *Oca marina di li picculi.* Comune in ottobre e marzo (*R.*).
Chroocephalus melanocephalus, *Oca marina testa nira.* Comune in ottobre e marzo (*R.*); sedentario (*P.*).
Chroocephalus ridibundus, *Oca marina.* Comune in ottobre e marzo (*R.*); sedentario (*P.*).
Gelastes Genei. Raro, ma forse sedentario (*P.*).
Larus canus, *Aipa pedi-niuri.* Comune in ottobre e marzo (*R.*); sedentario (*P.*).
Larus fuscus, *Buarazza pedi-biunni.* Rarissimo, si vede in ottobre e marzo (*R.*); sedentario (*P.*).
Larus cachinnans, *Buarazza.* Comune in ottobre e marzo (*R.*); sedentario (*P.*).
Puffinus Kuhli. Rarissima in ottobre e marzo (*R.*).
Procellaria pelagica, *Rindinuni di mari.* Comune, si vede specialmente in ottobre-novembre e marzo-aprile (*R.*); sedentario (*P.*).
Fratercula arctica, *Puddicinedda di mari.* Rara (*R.*); accidentale, meno nel gennaio 1885, quando se ne videro non poche (*P.*).
Colymbus septentrionalis, *Tummalora di li rossi.* Rara (*R.*).
Podiceps cristatus, *Aceddu parrinu.* Raro (*R.*).
Podiceps nigricollis, *Tummalora.* Raro (*R.*).
Podiceps fluviatilis, *Marguneddu.* Comune e sedentario.

Siracusa, distretto di Lentini e Carlentini (Bonfiglio prof. Giovanni):

Il nostro territorio ed il limitrofo di Carlentini sono molto accidentati. Alla pianura estesa, detta piana di Catania e piana di Lentini, fanno contrasto le colline che lo circoscrivono a mezzogiorno, a levante e a ponente.

Digitized by Google

Rendono poi importante questo distretto, parlo dal lato dell'Ornitologia, le tre estensioni di acqua che esistono in questi territorii, cioè: il Bevaio, il più gran lago di Sicilia, ad un chilometro e mezzo appena al NO. di Lentini; il Pantano, laghetto all'E. di Lentini presso il mare, ed infine il Polverazzo, le cui acque sono raccolte artificialmente con la chiusura delle foci del fiume San Leonardo solo durante l'inverno. Questo Polverazzo è situato all'E. di Lentini circa dieci chilometri distante, vicinissimo al Pantano, al SE. del quale è situato.

In questi laghi vivono miriadi di uccelli, ai quali si fa la caccia durante tutto l'inverno.

Elenco delle specie di uccelli osservate nel distretto di Lentini e Carlentini, provincia di Siracusa, coi nomi volgari locali e indicazioni di frequenza, ecc. ecc.

Corvus Corax, *Corvu.* Frequente.
Corvus Cornix, *Ciàula matisa.* Frequente.
Corvus frugilegus, *Cruvàcchiu.* Frequente.
Pica rustica, *Carcaràzza.* Frequente.
Garrulus glandarius, *Giài.* Frequente.
Sturnus vulgaris, *Sturneddu.* Frequente.
Passer hispaniolensis, *Passareddu.* Abbondantissima e assai dannosa.
Carduelis elegans, *Cardiddu.* Frequente.
Melanocorypha Calandra, *Carannulu.* Comune e sedentaria.
Motacilla alba, *Pispisa* o *Vispisa.* Frequente.
Monticola Cyanus, *Passaru sulitariu.* Scarsa.
Merula nigra, *Merru* o *Merra.* Frequente.
Turdus musicus, *Marbizzu.* Scarso.
Aëdon Luscinia, *Rusignolu.* Scarso.

Digitized by Google

Erithacus Rubecula, *Petturrussu*. Comune.
Pratincola Rubicola, *Cacamarruggiu*. Comune.
Monachus hortensis, *Beccaficu*. Abbondante.
Phylloscopus Trochilus, *Sperciaruvettu*. Frequente.
Hirundo rustica, *Martidduzzu*. Comune.
Chelidon urbica, *Rininedda*. Frequente.
Caprimulgus europæus, *Curdaru*. Scarso.
Cuculus canorus, *Cuccu di passa*. Comune.
Alcedo Ispida, *Acidduzzu di Paradisu*. Frequente.
Merops Apiaster, *Pizziferru*. Abbondante.
Coracias Garrula, *Carragiau*. Scarsa.
Upupa Epops, *Pipituna*. Comune.
Strix flammea, *Píula*. Scarso.
Syrnium Aluco, *Fuànu*. Scarso.
Athene Noctua, *Cuccu*. Frequente.
Scops Giu, *Chiù* o *Gioppu*. Comune.
Circus æruginosus, *Culorcia*. Comune.
Hypotriorchis Subbuteo, *Cozzicaventulu*. Frequente.
Phalacrocorax Carbo, *Marguni*. Scarso.
Ardea cinerea, *Ianni*. Comune.
Ardea purpurea, *Russeddu*. Frequente.
Platalea Leucorodia, *Palidda*. Scarsa.
Plegadis Falcinellus, *Guaddaranu* o *Vaddaranu*. Comune.
Phœnicopterus roseus, *Urgananti*. Tra il 31 dicembre 1887 ed il 2 gennaio 1888 comparve un branco di una quarantina, di cui 3 vennero uccisi; erano molti anni che non se ne vedevano.
Anser cinereus, *Papara*. Scarsa.
Anser segetum, *Papara*. Scarsa.
Anas Boscas, *Coddu-virdi* (masc.), *Middarda* (fem.). Abbondante, viene in dicembre; nel 1880 giunsero in numero straordinario.
Chaulelasmus streperus, *Irbalora*. Comune in ottobre e novembre.
Spatula clypeata, *Cucchiaruni*. Comune.
Mareca Penelope, *Friscuni*. Scarso.
Dafila acuta, *Carrabaru*. Scarso.

Digitized by Google

Nettion Crecca, *Trizzetta.* Scarsa, anco in settembre.
Querquedula Circia, *Girbinu.* Passa in agosto e settembre, non comune.
Fuligula rufina, *Natra turca.* Ne fu ucciso uno dentro l'abitato il 6 gennaio 1887; è comune e nidificante, giunge in marzo e parte in settembre.
Fulix ferina, *Mozu.* Comune, pochi nell'inverno 1887-88.
Fulix Fuligula, *Scavuzzu.* Comune, nidificante.
Columba livia, *Marinedda.* Comune e sedentario.
Perdix saxatilis, *Pirnici.* Scarsa.
Coturnix communis, *Quagghia.* Comune assai.
Rallus aquaticus, *Marranzanu.* Comune.
Porphyrio cæruleus, *Fascianu.* Comune e sedentario.
Fulica atra, *Iaddinedda.* Abbondantissima, sedentaria e nidificante; oltre 24 mila uccise nell'inverno 1887-88.
Grus communis, *Groi.* Comune.
Charadrius Pluvialis, *Maisòlu.* Abbondante.
Totanus Ochropus, *Puddicinu di mari.* Frequente.

Siracusa, distretto di Modica (Della Fonte cav. prof. Luigi, Garofalo prof. Orazio):

I confini della plaga di cui si danno notizie sono il mare Africano a S., il fiume Irminio ad O., le colline degli Iblei a N., ed il Busaidone ad E. La plaga comprende i comuni di Modica, Scicli e Pozzallo, formanti parte del circondario di Modica, in provincia di Siracusa. Il territorio è costituito di terreno terziario, con predominanza della formazione miocenica sulla pliocenica; l'eocenica scarseggia affatto. Il suolo è montuoso, solcato da profondi burroni, a cui attestano colline svariatamente ondulate.

La vegetazione predominante arborea è costituita principalmente da carubbi (*Ceratonia siliqua*). Vi ha rispettabile numero di ulivi (*Olea europæa*). E non mancano le amentacee cupolifere, specialmente quercie (*Quercus robur*

Digitized by Google

e *Quercus pedunculata*). Vi hanno piuttosto ragguardevole numero di fichi (*Ficus carica*), di mandorli (*Amygdalus communis*), e di rosacee, come peri, meli, prugni, ecc. Abbondano poi, coltivate, le viti (*Vitis vinifera*) ed i fichi d'India (*Cactus opuntia*), le agave (*Agave americana*), i lentischi (*Pistacia lentiscus*), i mirti e le palme silvestri e di San Pier Martire. La vegetazione erbacea è rappresentata da copioso numero di graminacee e di leguminose, ed abbondano anco molto le composte. Fra le graminacee primeggiano le poa, le agrostidi, le avenacee e le felastacee, le triticee e le panicee. E fra le leguminose figurano molte papilionacee. Il territorio è in generale scarso di vegetazione ed arido nella parte montuosa. I quattro o cinque valloni che lo solcano, sono provvisti di qualche sorgente e di qualche corso d'acqua. Nell'insieme il territorio è costituito da una serie di colline che scendono a mezzogiorno gradatamente, e da un'altitudine di circa 400 metri.

Elenco delle specie di uccelli osservate nel distretto di Modica, provincia di Siracusa, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione, ecc. ecc.

Corvus Corax, *Cuorvu*. Sedentario e frequente al monte e al piano.

Corvus Cornix, *Curnacciu*. Frequente e sedentaria.

Corvus frugilegus, *Curvettu piemuntisi*. Giunge in ottobre, parte in marzo, frequente.

Lycos Monedula, *Ciàula*. Frequente e sedentaria.

Pica rustica, *Carcarazza*. Frequente e sedentaria.

Garrulus glandarius, *Caragiau*. Frequente, sedentaria; erratica d'inverno.

Digitized by Google

Sturnus vulgaris, *Sturnieddu di passa.* Giunge in settembre, parte in marzo; scarso.

Sturnus unicolor, *Sturnieddu.* Frequente ovunque e sedentario.

Fringilla cœlebs, *Fringuellu muzzolinu.* Giunge in ottobre, parte in marzo ed aprile; scarso.

Petronia stulta, *Passarieddu di passa*, *Passarastru.* Frequente, sedentaria; anco invernale da settembre a marzo.

Passer hispaniolensis, *Passarieddu.* Sedentaria e frequente ovunque. Durante l' epidemia colèrica del 1867 questa specie scomparve affatto da Modica e dalle campagne intorno.

Coccothraustes vulgaris, *Scaccia miennuli.* Passa dal 15 ottobre al 15 novembre; scarso.

Ligurinus Chloris, *Virduni.* Scarso.

Carduelis elegans, *Cardiddu.* Frequente e sedentario.

Miliaria Projer, *Ciciruni.* Frequente, nidificante e anco di passo in settembre ed aprile.

Emberiza Cirlus, *Zuinu.* Scarso, passa in settembre e marzo, anco nidificante.

Melanocorypha Calandra, *Carannula.* Sedentaria ed erratica, frequente al piano d' inverno.

Calandrella brachydactyla, *Calandredda.* Estivo, da marzo a settembre, frequente al piano.

Alauda arborea, *Linguinedda surda.* Passa in settembre e marzo-aprile, scarsa.

Alauda arvensis, *Lodula.* Frequente al piano, passa in settembre, marzo ed aprile.

Galerita cristata, *Cappuzieddu*, *Cuccuciuta.* Sedentaria e frequente al piano.

Agrodroma campestris, *Curintinu.* Giunge in aprile-maggio, parte in settembre-ottobre; frequente al piano.

Anthus pratensis, *Vispisedda.* Passa in aprile e in settembre-ottobre; frequente.

Budytes flavus, *Vispisa di primavera.* Giunge in aprile e ripassa in ottobre, scarso al piano.

Motacilla alba, *Vispisa janca.* Passa in aprile e in settembre-ottobre ed è frequente.

Digitized by Google

Saxicola Oenanthe, *Curidda janca*. Giunge in aprile, parte in settembre, frequente.

Saxicola albicollis, *Curidda janca munachedda*. Passa in aprile e settembre, scarsa.

Saxicola Stapazina, *Curidda janca cu li ali niuri*. Passa in aprile e settembre, scarsa.

Monticola saxatilis, *Cudirussuni*, *Beccaficu impiriali*. Passa in aprile e settembre, scarso.

Monticola Cyanus, *Passiru sulitario*. Sedentaria e frequente ai monti.

Merula nigra, *Merru*. Frequente ai monti e sedentario; anco invernale da ottobre a febbraio.

Turdus pilaris, *Re de li Marvizzi*. Di passo irregolare in ottobre, novembre e marzo; scarsa.

Turdus musicus, *Marvizzu*. Frequente ovunque in ottobre.

Aëdon Luscinia, *Rusignolu*. Frequente ai monti, giunge in aprile e parte in settembre.

Erithacus Rubecula, *Pittuzzurussu*. Giunge in settembre e parte in marzo, frequente.

Ruticilla titys, *Curidda russa*. Scarso, giunge in ottobre e parte in marzo.

Pratincola Rubicola, *Sputamaruggiu*. Frequente e sedentario.

Monachus Atricapillus, *Testa niviredda*. Giunge in settembre e parte in aprile; scarso.

Monachus hortensis, *Beccaficu*. Giunge in aprile e parte in settembre; frequente.

Pyrophthalma melanocephala, *Occhiddi russi*. Sedentario, ma scarso al piano.

Phylloscopus rufus, *Beccaficu di cerza*. Giunge in agosto e parte in aprile; frequente.

Acrocephalus arundinaceus, *Re di li Beccaficu*. Giunge in aprile, parte in settembre; scarso.

Calamodus aquaticus, *Cacapalu*, *Amuraru*. Giunge in aprile, parte in ottobre; frequente al piano.

Cettia Cettii, *Ricignuolo di fiumi*. Comune e sedentario.

Troglodytes parvulus, *Acciduzzu musca*, *Perciaruvettu*. Sedentario ed invernale; frequente.

Digitized by Google

Cinclus aquaticus, *Merra d'acqua.* Sedentario, ma scarso.

Accentor modularis. Scarso al piano da novembre a marzo.

Ægithalus pendulinus, *Vurzittulu.* Sedentario ed estivo; frequente.

Parus major, *Papauzicu.* Frequente, sedentaria ed invernale.

Cyanistes cæruleus, *Fusuddiu.* Sedentaria ed invernale; frequente.

Certhia brachydactyla, *Pizzuddu tuortu.* Scarso, ma sedentario.

Oriolus Galbula, *Lauriddiu*, *Aju l'aguggia cu lu filu.* Giunge in aprile, parte in settembre; frequente.

Lanius minor, *Mulinaru grossu.* Giunge in aprile, parte in ottobre; è frequente.

Lanius auriculatus, *Mulinaru picciolu.* Giunge in aprile, parte in settembre; è frequente.

Muscicapa collaris, *Carcarazzedda.* Giunge in aprile, parte in agosto, frequente; nell' aprile 1881 comparvero in numero straordinario.

Muscicapa Atricapilla, *Monachedda.* Giunge in aprile, parte in agosto; frequente.

Hirundo rustica, *Rinnina*, *Rinininedda.* Estiva, dalla metà di marzo alla metà di ottobre; frequente.

Chelidon urbica, *Marzunieddu.* Frequente ovunque dal 15 marzo al 15 ottobre.

Cotile rupestris, *Rinnina d' inviernu*, *Martidduzzu.* Abbonda in dicembre-marzo, frequente ai monti; nel febbraio del 1886 comparve questa specie in grandi colonne e se ne fece caccia abbondantissima, essendo molto grasse erano molto apprezzate.

Cypselus Apus, *Rinninuni.* Dal 15 aprile al 15 luglio è frequente, di transito fine settembre.

Cypselus Melba, *Rinninuni di lu piettu janco.* Giunge in aprile e parte in settembre; frequente ai monti.

Caprimulgus europæus, *Curdaru.* Giunge in aprile, parte in settembre; frequente.

Caprimulgus ægyptius. Accidentale.

Iynx Torquilla, *Furmicaru*, *Furmicularu.* Giunge in marzo, parte in ottobre; frequente ovunque.

Digitized by Google

Cuculus canorus, *Turturaru.* Scarso, giunge alla metà di marzo.

Coccystes glandarius, *Turturaru tupputu.* Accidentale.

Alcedo Ispida, *Auceduzzu di paradisu*, *Cuocciu di camula*, *Pizza re.* Sedentario e frequente.

Coracias Garrula, *Carcarazza di mari.* Giunge in aprile e parte in settembre; frequente al piano, ove nidifica allevando una covata di 4-7.

Merops Apiaster, *Pizzofierru.* Frequente; giunge in aprile, parte in ottobre.

Upupa Epops, *Pipituna.* Frequente al piano dal 15 marzo al 15 settembre.

Strix flammea, *Piula.* Frequente e sedentario.

Syrnium Aluco, *Fujanu.* Scarso, ma sedentario.

Asio Otus, *Gufu.* Scarso, ma sedentario.

Asio accipitrinus, *Cuccu di passa.* Scarso di passo in marzo-aprile.

Athene Noctua, *Cuca.* Frequente e sedentaria.

Scops Giu, *Jacuopu.* Frequente, giunge il 15 marzo, parte il 15 ottobre.

Bubo maximus, *Fujanazzu*, *Aucedduzzu di notte.* Scarso al monte, ma sedentario.

Circus æruginosus, *Arpia.* Scarso, ma sedentario.

Circus cyaneus, *Farcunieddu jancu.* Scarsa, ma sedentaria.

Circus Swainsoni, *Farcunieddu jancu-rari.* Scarsa, ma sedentaria.

Circaëtus gallicus, *Farcunazzu.* Scarso al monte, giunge in aprile e parte in settembre.

Aquila Chrysaëtus, *Acula.* Scarsa ai monti.

Nisaëtus fasciatus, *Aculotta.* Frequente al monte e sedentaria; alleva una covata in aprile di 2.

Buteo vulgaris, *Farcuni.* Frequente al monte, giunge in aprile e parte in ottobre.

Pernis apivorus, *Farcuni jancu.* Giunge in aprile e parte in settembre; scarso ai monti.

Milvus migrans, *Nigghiu.* Scarso al monte, ma sedentario.

Gennaia Feldeggi, *Capuccina.* Frequente al monte e sedentario; una covata in aprile di 3 a 4.

Digitized by Google

Hypotriorchis Subbuteo, *Farchettu.* Giunge in settembre, parte in aprile; frequente.

Cerchneis Tinnunculus, *Izzu.* Frequente e sedentario.

Cerchneis Naumanni, *Marvizzaru.* Scarso.

Accipiter Nisus, *Striveri*, *Mancia jaddini.* Giunge in settembre; parte in marzo; frequente.

Gyps fulvus, *Mascolinu*, *Arpazza*, *Mangia-scecchi.* Frequente al monte e sedentario.

Neophron Percnopterus, *Tignusu.* Scarso al monte, ma sedentario; una covata in aprile-maggio di 2.

Pelecanus Onocrotalus, *Pellicanu.* Accidentale.

Phalacrocorax Graculus, *Cuorvi di mari.* Scarso.

Ardea cinerea, *Rusieddu cinnirusu.* Giunge in luglio, parte in maggio; frequente.

Ardea purpurea, *Rusieddu russu.* Giunge in marzo, parte in settembre; frequente.

Egretta Garzetta, *Rusieddu jancu.* Di passo in aprile-maggio; frequente.

Ardeola ralloïdes, *Rusieddu giarnu.* Giunge in aprile, parte in settembre; scarso.

Ardetta minuta, *Rusieddu picciulu*, *Inganna cacciaturi.* Giunge in aprile, parte in agosto; frequente.

Botaurus stellaris, *Capuni d'acqua.* Da novembre a marzo è frequente.

Nycticorax griseus, *Rusieddu cinnirusu cu la pinnacera.* Giunge in aprile e parte in settembre; è scarso.

Ciconia alba, *Cicogna janca.* Di passo irregolare in ott. scarsa.

Ciconia nigra, *Cicogna niura.* Di passo irregolare in aprile, scarsa.

Platalea Leucorodia, *Pizzu a cucchiareddu.* Casuale in marzo e scarsa.

Phœnicopterus roseus, *Fiammingu.* Accidentale.

Cygnus Olor, *Cignu.* Accidentale.

Anas Boscas, *Anitra* (fem.), *Cuoddu virdi* (masc.). Giunge in novembre, parte in marzo-aprile; frequente.

Spatula clypeata, *Cucchiaruni.* Giunge in agosto, parte in maggio; scarso.

Digitized by Google

Nettion Crecca, *Cirzotta.* Frequente da novembre a marzo.

Querquedula Circia, *Paparedda.* Giunge in novembre, parte in marzo; scarsa.

Fuligula rufina, *Testa di turcu*, *Anitra turca.* Giunge in novembre, parte in marzo; scarso.

Columba Palumbus, *Tiruni.* Frequente, sedentario, passa in ottobre e febbraio-marzo.

Columba Oenas, *Ciucella.* Frequente da ottobre a marzo.

Columba livia, *Palumma servaggia.* Sedentaria e frequente.

Turtur tenera, *Turtura.* Frequente da aprile a settembre.

Perdix saxatilis, *Pernici* (adulto), *Pirnicaru* (giovane). Sedentaria e frequente al monte.

Coturnix communis, *Quagghia.* Di passo in aprile ed ottobre, frequente e anco sedentaria.

Turnix sylvatica, *Triugni.* Scarsa, ma sedentaria; nell' autunno sale al monte e d' inverno scende al litorale.

Rallus aquaticus, *Maranzanu.* Frequente da ottobre ad aprile.

Ortygometra Porzana, *Jaddinedda d' acqua.* Frequente da marzo a novembre.

Ortygometra Bailloni, *Jaddinedda d' acqua cu li piedi giarni.* Giunge in marzo, parte in settembre; scarsa.

Ortygometra parva, *Jaddinedda d' acqua surciera.* Giunge in marzo, parte in settembre; scarsa.

Crex pratensis, *Re di quagghi.* Giunge in aprile, parte in settembre; scarso.

Gallinula chloropus, *Jaddina d' acqua.* Di passo in marzo e settembre, frequente e anche sedentaria.

Fulica atra, *Jaddinazza.* Frequente, sedentaria e di passo in agosto ed aprile.

Otis Tarda, *Pitarra.* Accidentale.

Œdicnemus scolopax, *Librazinnu* (giovane), *Circiu* (adulto). Di passo in febbraio e settembre, frequente al piano e anco sedentario.

Cursorius gallicus. Accidentale.

Charadrius Pluvialis, *Ammazza cani.* Di passo in novembre e marzo; scarso.

Digitized by Google

Vanellus Capella, *Pavunieddu*, *Nivaluoru*. Di passo in ottobre ed aprile, anco invernale; scarsa.

Himantopus candidus, *Straccacaccia*, *Jammi lunghi*. Di passo in marzo e settembre; scarso.

Tringoïdes Hypoleucus, *Jadduzzu d'acqua*. Di passo in aprile ed agosto; scarso.

Scolopax Rusticula, *Jadduzzu*. Di passo in novembre ed in marzo; frequente. Nel luglio 1880 ne venne presa una presso Modica.

Gallinago cælestis, *Beccaccinu riali*. Frequente da luglio ad aprile.

Gallinago Gallinula, *Beccaccinu*. Da settembre ad aprile è frequente.

Numenius Arquata, *Cirulli*. Scarso in aprile.

Glareola Pratincola, *Rinninuni di mari*. Giunge in aprile e parte in settembre, è scarsa al litorale.

Sylochelidon caspia, *Coipazza*. Accidentale.

Sternula minuta, *Coipedda janca*. Passa in aprile e settembre, scarso.

Hydrochelidon nigra, *Coipedda nira*. Passa in aprile e settembre, scarso.

Chroocephalus ridibundus, *Aipa*. Frequente da agosto ad aprile.

Rissa tridactyla, *Aipa triugni*. Scarso e di comparsa irregolare in febbraio ed aprile.

Puffinus Kuhli, *Aipa pizzu tuortu*. Frequente e sedentaria.

Podiceps fluviatilis, *Tumalosoru*. Frequente e sedentario.

Elenco delle specie di uccelli che nidificano nella provincia di Siracusa, distretto di Modica.

Corvus Corax. Covate 1 nei mesi di maggio e giugno, uova 4–5.

Corvus Cornix. Covate 1-2 nei mesi di maggio e giugno, uova 4-6, incubazione giorni 20-21.

Digitized by Google

Lycos Monedula. Covate 1-2 nei mesi di maggio e giugno, uova 4-6, incubazione giorni 19.

Pica rustica. Covate 1-2 nei mesi di aprile, maggio e giugno, uova 6-7, incubazione giorni 20-21.

Garrulus glandarius. Covate 1 nei mesi di maggio e giugno, uova 5-7, incubazione giorni 15.

Sturnus unicolor. Covate 1-2 nei mesi di maggio e giugno, uova 5-6.

Petronia stulta. Covate 1-3 nei mesi di maggio e giugno, uova 5-6, incubazione giorni 14-15.

Passer hispaniolensis. Covate 1-3 nei mesi di aprile, maggio e giugno, uova 5-6, incubazione giorni 14-15.

Carduelis elegans. Covate 1-2 nei mesi di maggio, giugno e luglio, uova 4-6, incubazione giorni 15.

Miliaria Projer. Covate 1-2 nei mesi di aprile e maggio, uova 4-6.

Emberiza Cirlus. Covate 1-2 nei mesi di maggio, giugno e luglio, uova 4-5.

Melanocorypha Calandra. Covate 1-2 nei mesi di aprile, maggio e giugno, uova 4-5.

Galerita cristata. Covate 1-2 nei mesi di aprile, maggio e giugno; uova 4-5, incubazione giorni 14.

Anthus pratensis. Covate 1-2 nei mesi di maggio, giugno e luglio, uova 4-6, incubazione giorni 13.

Monticola Cyanus. Covate 1-2 nei mesi di aprile, maggio e giugno, uova 5-6.

Merula nigra. Covate 1-2 nei mesi di aprile, maggio e giugno, uova 4-6, incubazione giorni 16.

Aëdon Luscinia. Covate 1 nel mese di maggio, uova 4-6.

Pratincola Rubicola. Covate 1 nei mesi di marzo, aprile e maggio, uova 5-7, incubazione giorni 14.

Troglodytes parvulus. Covate 1-2 nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, uova 6-8, incubazione giorni 13.

Ægithalus pendulinus. Covate 1-2 nei mesi di aprile, maggio e giugno, uova 4-7.

Parus major. Covate 1-2 nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, uova 8-15.

Digitized by Google

Cyanistes cæruleus. Covate 1-2 nei mesi di aprile, maggio e giugno, uova 8-10.

Lanius minor. Covate 1 nei mesi di maggio e giugno, uova 6-7, incubazione giorni 15.

Lanius auriculatus. Covate 1 nei mesi di maggio e giugno, uova 5-6, incubazione giorni 15.

Hirundo rustica. Covate 1-2 nei mesi di aprile, maggio e giugno, uova 4-6, incubazione giorni 13.

Chelidon urbica. Covate 1-2 nei mesi di aprile, maggio e giugno, uova 4-6, incubazione giorni 13.

Cypselus Apus. Covate 1-2 nei mesi di maggio e giugno, uova 2-4.

Coracias Garrula. Covate 1 nei mesi di giugno e luglio, uova 4-7.

Merops Apiaster. Covate 1 nei mesi di giugno e luglio, uova 4-7.

Upupa Epops. Covate 1 nei mesi di aprile, maggio e giugno, uova 4-7, incubazione giorni 15.

Strix flammea. Covate 1 nei mesi di maggio e giugno, uova 3-6.

Athene Noctua. Covate 1 nel mese di giugno, uova 4-7, incubazione giorni 14-15.

Scops Giu. Covate 1 nei mesi di maggio e giugno, uova 3-4.

Nisaëtus fasciatus. Covate 1 nei mesi di aprile, maggio e giugno, uova 2.

Hypotriorchis Subbuteo. Nidifica nel mese di giugno, si ignora il numero delle uova e delle covate.

Gennaia Feldeggi. Covate 1 nei mesi di aprile e maggio, uova 3-4.

Cerchneis Tinnunculus. Covate 1 nei mesi di aprile, maggio e giugno, uova 4-5.

Neophron Pernocpterus. Covate 1 nei mesi di aprile e maggio, uova 2.

Columba Palumbus. Covate 1-2 nei mesi di aprile e maggio, uova 2.

Columba livia. Covate 1-3 nei mesi di aprile, maggio e giugno, uova 2, incubazione giorni 15-16.

Digitized by Google

Turtur tenera. Covate 1 nei mesi di maggio e giugno, uova 2.

Perdix saxatilis. Covate 1 nei mesi di maggio e giugno, uova 12-16, incubazione giorni 16-17.

Coturnix communis. Covate 1 nei mesi di maggio e giugno, uova 7-14.

Œdicnemus scolopax. Covate 1 nel mese di maggio, uova 2, incubazione giorni 15-16.

NB. La difficoltà grande nella risposta al quesito, per quella parte che riguarda il concorso del maschio nell'incubazione, consigliò gli autori di queste risposte a ricercar notizie da campagnoli e cacciatori al riguardo. L'ambiguità delle risposte avute ha consigliato a non tenerne conto.

Caltanissetta, distretto di Terranova (Carvana cav. Giuseppe):

Il distretto in cui vengono fatte le osservazioni è l'intero circondario di Terranova in provincia di Caltanissetta, il quale trovasi situato sul 37°, 19′ di latitudine N. tra 1°, 35′ e 1°, 5′ di longitudine O. del meridiano di Roma. Confina dal lato E. col fiume Dorilli o Acate, in provincia di Siracusa, da N. col territorio di Barrafranca in provincia di Caltanissetta; da O. col fiume Salso o Imera, in provincia di Girgenti; da S. col mare Mediterraneo. È costituito dai territorii dei comuni di Terranova, Niscemi, Butera, Riesi e Mazzarino. Ha una estensione di chilometri quadrati 1082, 55. Dal fiume Dorilli a Gallitano, estremi limiti da est ad ovest, corre la distanza di 45 chilometri; e dalla spiaggia di Terranova a Braemi, estremi limiti da sud a nord, di 28 chilometri. I terreni nei territorii di Terranova e di Butera in maggior parte sono in pianura; gli altri di Niscemi, Riesi e Mazzarino sono in colline, montagne, altipiani e ristrettissime pianure.

Digitized by Google

Il circondario è traversato dal fiume Gela e dai torrenti Maroglio, Gattano, Comunelli, Carrubba e Braemi. Il fiume Gela, lungo 60 chilometri e largo dai 20 ai 30 metri, ha origine dai versanti delle montagne di Piazza Armerina, passa per l'estremo lato est del territorio di Mazzarino, traversa la vasta e fertilissima piana di Terranova e sbocca al mare a 600 metri di distanza e ad est da questa città. Questo fiume, a distanza di chilometri 6 dal mare, è arginato per mezzo d'una diga colossale, costruzione di tre secoli addietro, per infrenare le acque e farle servire alla irrigazione delle terre di parte della piana di Terranova. Il torrente Maroglio prende origine dai versanti delle montagne di Caltagirone, s'ingrossa con le acque che vi scarica il piccolo torrente Cimia, traversa parte della piana di Terranova e sbocca nel Gela a due chilometri circa di distanza dal mare. Gli altri sopraccennati torrenti hanno lo sbocco al mare nel territorio di Terranova ed in quello di Butera. Soltanto il Braemi, passando per la piccola pianura a nord di Mazzarino, va a sboccare nell'Imera meridionale in prossimità di Riesi. Tanto nel fiume Gela, per la suaccennata arginatura, quanto nei suddetti torrenti, le acque in primavera incominciano a diminuire, e finiscono con quasi disseccarsi in estate. Le poche acque che vi scorrono dopo la stagione invernale, impedite da un cordone di sabbia avanti la foce formato dalle onde, non possono arrivare al mare, e restano carcerate in prossimità della spiaggia, formando un cumulo copiosissimo di acqua stagnante bastantemente lungo e profondo, che mano mano coll'evaporazione va diminuendo in estate. È per questo che in prossimità alla spiaggia in ogni fiume e torrente vi è un largo stagno, dove gli uccelli acquatici durante l'inverno, quando il mare è tempestoso, vanno di giorno a trovar riposo e vitto, e vi passano le notti, specialmente durante il passo primaverile.

Pochi sono i tratti di terreni paludosi. Però vi sono molte terre, principalmente nella piana di Terranova ed in quella di Butera, che negli anni abbondanti di pioggie

Digitized by Google

vengono sommerse dalle acque che copiose scendono dalle colline soprastanti e vi rimangono sino alla primavera. Anche in queste molte sono le specie di uccelli acquatici che vi concorrono a trovarvi pascolo, principalmente di notte. A sette chilometri circa distante, dal lato est, della città di Terranova esiste il lago Coccanico, o Biviere, nell'ex-feudo Marina, proprietà della casa del Duca di Monteleone e Terranova. Esso ha la circonferenza di cinque chilometri e la estensione di ettari 112 circa. Metà è molto profondo e l'altra metà lo è meno. Nelle annate di siccità una porzione di quest'ultima si dissecca. È girato attorno di canne palustri (*Arundo phragmitis*), di giunchi ed altre piante, dove gli uccelli trovano da ricoverarsi e da cibarsi. Questo lago dal settembre al marzo è popolatissimo di molte specie di uccelli acquatici, fra le quali le Folaghe in numero straordinario in alcuni anni. La caccia si fa con barchette ed è divertentissima. All'epoca del passo primaverile vi si trovano anche numerosi uccelli di ripa o trampolieri e specie di comparsa avventizia.

Nei territorii di Terranova e Niscemi vi sono molti boschi di piante nella più parte cedui, e per essere in prossimità al mare, durante l'inverno vi si trova una quantità di uccelli ed anco le Quaglie.

Elenco delle specie di uccelli osservate nel distretto di Terranova, provincia di Caltanissetta, coi nomi volgari locali e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione, ecc. ecc.

Corvus Corax, *Corvu*, *Cuorvu*, *Cruvacchiu*. Gl'individui di questa specie non sono numerosi, e vivono per lo più in montagna; però si vedono, specialmente nell'inverno, scendere nelle pianure in cerca di vitto, e vanno sempre appaiati.

Digitized by Google

Corvus Cornix, *Ciàula grigia*, *Ciàula maltisa*, *Curnacchia*. Questa specie non è numerosa. Non si vede nelle pianure marittime, ma soltanto negli altipiani dell'interno, dove vi sono boschi ed alberi fruttiferi. Di raro qualche individuo si osserva in mezzo alle truppe della specie seguente, essendo essi sedentari.

Corvus frugilegus, *Ciaula*, *Ciavula*, *Curnacchia*, *Paula*. Gl'individui di questa specie nell'autunno si vedono giungere numerosi in cerca di frutti di olivo, oliastro e quercie, danneggiando anche i campi e nell'istesso tempo distruggendo insetti ed animali dannosi all'agricoltura.

Lycos Monedula, *Pola*, *Ciaula di campanaru*. È specie stazionaria non abbondante. Vive sui campanili e sulle chiese in città. Non lascia però di fare le sue escursioni durante l'autunno e l'inverno, e forse si unisce ai grandi attruppamenti della specie di sopra.

Pica rustica, *Carcarazzu*. È specie sedentaria e comune; abita tanto in pianura che in montagna, dove però vi sono boschi, giardini ed alberi di qualunque natura.

Garrulus glandarius, *Giaiu*, *Carragiau*, *Carnagiadu*. Specie sedentaria non abbondante; vive nell'interno nei terreni montuosi e piani, dove vi sono boschi, alberi di nocciòle, quercie ed altri frutti.

Sturnus vulgaris, *Sturneddu*, *Sturneddu di passa*. Immensi stormi di questa specie giungono fra noi verso la fine di settembre e primi di ottobre. Si fermano nelle campagne di Terranova in prossimità alla marina, dove sono abbondantissime le piante di lentisco; vi dimorano per un mese circa sino che trovano da cibarsi del frutto maturo di tali piante, di cui sono molto ghiotti. La sera vanno ad appollaiarsi negli estesi canneti attorno al lago Cuccanico ed in quelli alle foci dei fiumi e torrenti. Durante l'inverno se ne vedono spesso dei branchetti che seguono le mandrie di bovi, pecore e suini, posandosi spesso sopra questi greggi per mangiare gl'insetti che hanno addosso.

Digitized by Google

Sturnus unicolor, *Sturneddu niuru*, *Sturneddu paisanu cu pizzu giarnu*. Non tanto abbondante e sedentario. Abita i paesi interni sugli edifici, sui campanili, e sui fabbricati in campagna, ove nidifica e da dove fa sentire il suo canto che non è sgradevole.

Fringilla cœlebs, *Pinzuni*, *Spunzuni*. È comune ed abbondante; può dirsi essere specie invernale, perchè giunge qui dalla metà di settembre a tutto ottobre, proveniente dalle montagne della parte settentrionale dell'isola, dove certo nidifica. Riparte in marzo.

Petronia stulta, *Passarastra*, *Passara muta*. È specie comune, non abbondante; abita nei luoghi montuosi. In autunno scende alla pianura ed è più abbondante.

Passer hispaniolensis, *Passaru sbirru*, *Passiru*, *Passareddu*. È uccello comunissimo, sedentario, e molto abbondante ovunque. Abita in città ed anche in campagna dove vi sono fabbricati.

Coccothraustes vulgaris, *Scacciamennuli*, *Beccu grossu*. Non è abbondante come lo è nelle parti montuose. Abita dove vi sono boschi, giardini ed alberi da frutto.

Ligurinus Chloris, *Virduni*. È uccello comune ed abbondante. Arriva da noi in ottobre, ed unendosi ai Fringuelli, Fanelli, Cardellini, ecc., formano con essi grossi stormi e passano tutto l'inverno nelle pianure. Riparte in marzo.

Carduelis elegans, *Cardiddu*, *Cardillinu*. Comune, sedentario. Vive sui monti ed alle pianure. Nell'inverno è più abbondante in queste ultime, unendosi agl'individui delle specie vicine.

Serinus hortulanus, *Rappareddu*. In questo distretto si vede soltanto d'inverno unito alle specie precedenti. Scende dai monti, dove certo nidifica, in ottobre e novembre e vi ritorna in marzo.

Cannabina Linota, *Fanellu*, *Zuvinu*, *Zuinu*, *Chiochiò*. È abbondante e comune da settembre al marzo. Durante l'inverno scendono alle pianure unendosi alle specie affini. Pochi sono gl'individui che rimangono a nidificare.

Digitized by Google

Miliaria Projer, *Ciciaruni*. Può dirsi essere specie stazionaria, non lascia però di fare le sue escursioni. In alcune epoche è più abbondante; vive tanto nelle pianure che nelle colline, dove nidifica in mezzo ai seminati e nei prati.

Emberiza Citrinella, *Zizì*, *Zio*, *Ziulu giarnu*. È specie sedentaria, ma non copiosa. Vive in certe località dove vi sono vigneti ed alberi, tanto in montagna che in collina, e là nidifica. Non si vede mai nelle pianure aperte ad uso di seminerio e prati.

Emberiza Cirlus, *Ziulu*, *Zivulu*. Questa specie è poco frequente e sedentaria. Vive in montagna al margine dei boschi.

Emberiza Hortulana, *Ortulanu*, *Jardinaru*. Anche questa specie è rara in questo distretto. Vive nelle colline e nei piani dove vi sono alberi. Non mi è stato dato mai di osservare che nidifica fra noi.

Emberiza Schœniclus, *Zivulu di pantanu*. Si trova non abbondante da per ogni luogo dove vi sono canneti attorno ai paduli.

Melanocorypha Calandra, *Calannira*, *Calannaruni*, *Caranniluni*. Specie stazionaria ed abbondantissima. Vive in collina ed in pianura nelle terre seminative e prative, dove nidifica. Fugge i boschi e le terre vignate ed alberate. Durante la riproduzione si vede in coppie separate; terminato un tal periodo si riuniscono formando stormi assai numerosi. In febbraio, quando si semina il frumento così detto *marzullo*, se ne prende una grande quantità con trappole dette comunemente *balestre*.

Calandrella brachydactyla, *Calanniredda*, *Cacaviola*. Giunge da noi per la parte marittima numerosa alla fine di marzo ed anche in aprile. Vive in tutti i terreni coltivati delle pianure e delle colline, e dove non vi sono alberi nè vigneti. Sulle strade se ne incontrano grande quantità che si lasciano avvicinare dall'uomo a pochi passi, specialmente quando è a cavallo. Vanno in cerca di vitto nello sterco cavallino. Riparte in ottobre.

Digitized by Google

Alauda arborea, *Tuvittula*, *Currintina*. Arriva da noi assieme alla specie precedente, però in scarso numero. Vive nelle pianure e nelle colline in luoghi solitari, e preferisce le terre maggesate, dove nidifica; parte in ottobre.

Alauda arvensis, *Lonora*, *Lodana*, *Lodina*. Questa specie molto abbondante arriva da noi in ottobre e parte in marzo. Vive nelle pianure ed anche nelle colline nelle terre coltivate. Si unisce alle Calandre, formando con esse grossi stormi.

Galerita cristata, *Cucucciuta*, *Cuccia*. Comune e sedentaria. Abita i terreni asciutti e petrosi nei piani e nelle colline, dove nidifica. Si avvicina alle abitazioni in campagna, e nell'inverno vedesi spesso sulle strade, dove trova da cibarsi nello sterco cavallino.

Motacilla alba, *Vispisa*. È comune ed abbondante. Si trova ai margini degli stagni, nei letamai, nelle mandrie, nei terreni di fresco arati, ed anche in mezzo agli armenti. Arriva in ottobre e riparte nei primi di marzo. Forse nidifica negli alti monti dell'interno dell'isola.

Calobates melanope, *Vispisa, Pispisa giarna*. È meno abbondante della precedente specie; vive come quella ed anche sui tetti delle città. Arriva e parte come le Ballerine.

Saxicola Oenanthe, *Cuda bianca*, *Cudidda janca*. È specie di passo; arriva da noi verso aprile e ritorna nei primi di settembre, trattenendosi tutto ottobre. Abita le pianure e le colline; presceglie i luoghi solitari.

Monticola Cyanus, *Passaru sulitariu*. È stazionaria non abbondante. Vive sui monti rocciosi, ove nidifica. In autunno, e propriamente in ottobre, alcuni individui, in ogni anno, a giorni determinati, scendono sino all'abitato, e da sopra i campanili, tempî ed altri edifizi ci fanno sentire il loro bel canto.

Monticola saxatilis, *Cuda russa*. È specie non abbondante, vedendosi soltanto all'epoca del passo primaverile nei luoghi alpestri e sassosi. Credo che nidifichi sui monti dell'interno.

Digitized by Google

Merula nigra, *Merru*, *Merlu*, *Smerru*. È specie sedentaria nidificante ovunque. Non è abbondante come era un tempo; e ciò a causa dei diboscamenti da un canto, dall'altro attesa la scarsezza di altra cacciagione i cacciatori tirano a questi volatili cotanto utili per la distruzione che fanno di numerosi insetti, mentre pria erano lasciati nella loro pace. Abitano nei boschi, nei giardini, e nei vigneti delle pianure e delle montagne, dove vi sono siepi di piante vive e specialmente di roveti.

Turdus pilaris, *Re di li Marvizzi*, *Marvizzu imperiali*. Arriva in ottobre e resta tutto l'inverno sino a metà di marzo. Abita le terre boschive e salde, tanto in pianura che in montagna. Non è tanto abbondante.

Turdus musicus, *Marvizzu*, *Malvizzu*, *Turdu*. Arriva e parte come la precedente, però è più abbondante, ed abita le stesse regioni.

Aëdon Luscinia, *Ricignolu*, *Riscignolu*. Arriva da noi in marzo ed aprile e riparte in settembre ed ottobre. È abbondante, abita in tutti i luoghi dove vi sono alberi, boschi, siepi, ecc., specialmente dove vi sono ruscelli.

Erithacus Rubecula, *Petturussu*. Giunge qui da noi in ottobre e sta sino al marzo, epoca in cui parte per andare ai monti, dove, credo, va a nidificare. È abbondante e comune; abita in tutti i luoghi tiepidi.

Cyanecula Wolfi, *Cudarussa a pettu blù*, *Pettu blù*, *Pettu azzurru*. È una specie rarissima e di passo. Arriva in aprile e ripassa in settembre.

Ruticilla Phœnicurus, *Cuda russa*. Anche questa è specie scarsissima. Pochi individui si vedono da noi in primavera nei luoghi alpestri e deserti. Credo che vadano a nidificare nelle montagne dell'interno.

Pratincola Rubicola, *Cacamarruggiu*, *Trozzu*. È specie comunissima e sedentaria; abita nelle pianure e sui monti; in estate si ritira in quest'ultimi, dove nidifica.

Sylvia cinerea, *Aucidduzzu di fava*, *Occhipisciati*. È specie comune; arriva in primavera e parte in ottobre. Nel-

Digitized by Google

l'inverno se ne vedono alcuni individui, che abitano nelle siepi dove vi sono piante spinose.

Sylvia Curruca, *Spuntascebi*, *Munachedda*, *Beccaficu*. È specie non abbondante; viene qui nella primavera e parte nella fine di ottobre. Abita fra le siepi ed anche nei terreni saldi con arbusti.

Sylvia subalpina, *Spuntascebi*, *Pappamuschi*. Anche questa arriva con le altre congeneri in marzo e parte in ottobre. Abita in tutti quei luoghi dove vi sono cespugli, e principalmente nei boschi cedui.

Sylvia conspicillata, *Aucidduzzu di macchia*, *Civinciò*, *Occhijanchi*. È come la specie precedente, ed è comune. Abita nelle terre collinate ed in quelle montuose, dove vi sono arbusti, cespugli e piante di Chaemerops (*Giummarre*).

Monachus Atricapillus, *Capufuscu*, *Munachedda testa niura*. In questo distretto non è tanto abbondante. Abita nei terreni dell'interno fra gli alberi di pioppi e dove vi sono roveti vicino all'acqua.

Monachus hortensis, *Beccaficu*. Questa specie passa in aprile, e ritorna più abbondante in settembre, alla qual'epoca si fa vedere fra le siepi dei giardini, specialmente dove vi sono alberi di fichi, dei cui frutti sono ghiotti. Si trovano molto grassi e se ne fa la caccia.

Pyrophthalma melanocephala, *Munachedda*, *Munacedda*, *Occhipisciati*, *Spuntascebi*. Specie stazionaria, abbondante. Abita nei boschi e nei luoghi non discosti dall'abitato, dove in abbondanza vi sono siepi e fichi d'India, tanto in pianura che in montagna, e vi nidifica.

Melizophilus undatus, *Spuntascebi russu*. Credo essere uccello sedentario e nidificante qui. Abita i terreni montuosi interrozziti e le colline con piante spinose.

Melizophilus sardus, *Spuntascebi niuru*. È simile alla specie precedente.

Phylloscopus rufus, *Beccamuschi*, *Riiddu*, *Zivineddu*. Arriva dall'interno in ottobre, per dove riparte in marzo, ed è comune ed abbondante. Sverna in tutti i luoghi tie-

Digitized by Google

pidi, nei giardini e negli orti. Nelle giornate molto fredde viene sin entro le abitazioni cercando delle mosche dietro le vetriate delle finestre.

Cisticola cursitans, *Carrabedda*, *Carrabédduzza*. È sedentaria, ma non tanto abbondante. Abita nelle pianure fra i seminati e dove vi sono luoghi paludosi con canne selvatiche. Fa il nido fra i seminati di frumento ed anche fra le cannuccie.

Cinclus aquaticus, *Merru d'acqua*, *Adduzzu d'acqua*. È uccello non abbondante e stazionario. Si trova sempre nei corsi d'acqua ed ai margini delle paludi in mezzo ai giunchi, canneti, ecc.

Regulus cristatus, *Riiddu tupputu*. Questa specie è limitata e sedentaria. Abita sulle montagne dove sono alberi invecchiati, nelle di cui spaccature nidifica.

Parus major, *Cirrinciò*, *Chiavitteri*, *Munachedda*. È specie sedentaria, comune, ma non tanto abbondante. Vive nelle parti boschive tanto in pianura che in montagna, come ancora nei terreni migliorati ed alberati.

Oriolus Galbula, *Aiula*, *Auberi*, *Galberi*. Arrivano da noi nei primi di aprile dalla parte di mare. Si fermano qualche giorno per riposarsi e continuano il loro viaggio per l'interno, dove vi sono giardini, frutteti ed alberi di pioppo. Fanno il nido sui rami esterni inaccessibili di quest' ultimi. Ripassano in settembre.

Lanius Excubitor, *Tistuni*, *Testa grossa*, *Gargana*. È uccello non comune e di passo. Io ho veduto qualche individuo nell'autunno. Ignoro se nidifica nell'interno.

Lanius minor, *Testa grossa cinirina*, *Tistazza griscia*. Arriva in aprile, ed anche nei primi di maggio; non è abbondante. Abita i luoghi alberati vicino ai campi, dove nidifica. Parte in settembre.

Lanius Collurio, *Testa grossa*. È come la specie precedente, ed è pure scarsa.

Lanius auriculatus, *Testa grossa*, *Testa russa*, *Carcarazzeddu*. Arriva e parte come la precedente, ha gli stessi costumi, ed è più abbondante.

Digitized by Google

Hirundo rustica, *Rinnina*, *Rinnina di casa.* Arrivano qui ordinariamente nei primi giorni di marzo, ma se ne vedono spesso in febbraio. In qualche anno, dopo i primi arrivi, è succeduto istantaneamente un abbassamento di temperatura con pioggia dirotta, e molte Rondini non reggendo al freddo, e non trovando insetti da cibarsi, sono morte. Questa specie è la prima a partire appena terminato di nidificare. Le masse partono nella prima metà di agosto. Se ne vedono di tanto in tanto alcuni individui nel mese di settembre, ma sono di passaggio provenienti dall' interno dell' isola. Pochi son quelli di questa specie che abitano nelle città; la maggior parte vivono in campagna, e nidificano nei pozzi, nell' interno delle case che non sono tanto abitate ed ove possono avere accesso per mezzo di finestre che stanno sempre aperte.

Chelidon urbica, *Rinninedda*, *Rinnina martidduzzu.* Questa specie arriva più tardi della precedente, verso la metà di marzo, e parte nella seconda quindicina di agosto. Poco differisce nei costumi da quella; però i Balestrucci abitano nelle città, scegliendo per la nidificazione i cornicioni, capitelli e le sporgenze degli edifizi, per essere protetti dalle pioggie. Molte colonie di essi stabilisconsi sotto gli archi di alti ponti sopra fiumi, dove non possono essere molestati e dove trovano sufficiente vitto ed i materiali necessari alla fabbricazione dei nidi.

Cypselus Apus, *Rinninuni.* Gl' individui di questa specie sono comuni ed abbondanti. Arrivano nei primi giorni di aprile, e, qualche anno, negli ultimi di marzo. Scompaiono negli ultimi giorni di luglio. L'anno ora scorso, la mattina del giorno 26 di detto mese non se ne vide neanco uno, mentre la sera avanti erano abbondanti come al solito. Durante il mese di agosto di tanto in tanto se ne vede passare qualche branchetto con la direzione da est ad ovest. Abitano in città, nidificando dentro i buchi delle tegole sopra i tetti dei palazzi.

Caprimulgus europæus, *Nganna foddi.* Arrivano da noi nei

Digitized by Google

primi giorni di aprile, e propriamente alla fine della luna di marzo. Entrano isolatamente dalla parte del mare dopo il tramonto del sole. Abitano in montagna nei luoghi boschivi, dove nidificano. S' ignora quante covate fanno. Partono in ottobre, ed anche in novembre, epoca in cui sono d' una grassezza straordinaria.

Iynx Torquilla, *Coddu tortu*, *Mangia furmiculi*. È uccello di passo, non abbondante. Si vede soltanto in aprile ed in ottobre.

Cuculus canorus, *Cuccu di maiu*, *Cuccu di passa*. Anche questo è uccello di passo; arriva da noi non abbondante nella seconda metà di aprile colle Tortorelle, e s' interna nell' isola. S' ignora se vi nidifica.

Alcedo Ispida, *Cocciu di campa*, *Martinu piscaturi*. È uccello non tanto comune. Arriva da noi in ottobre e vi passa tutto l' inverno. Abita sulle rive dei fiumi e dei laghi.

Coracias Garrula, *Carnagiaiu*, *Carragiaiu*. Giunge nella metà di aprile; non è abbondante. Molti individui rimangono a nidificare sulle rupi ed anche alle pareti arenarie dei fiumi, dove fanno dei buchi all' altezza per quanto l' uomo non arriva. Riparte in settembre.

Merops Apiaster, *Pizzaferru*. Arriva da noi in aprile e riparte in agosto e settembre. Non è abbondante ed abita nei boschi in luoghi solitari e dove vi sono alberi fruttiferi. Fa il nido nei terreni scoscesi arenari, ed anche spesso nelle pareti dei fiumi all' altezza inaccessibile all' uomo.

Upupa Epops, *Pipituni*. Giunge qui in marzo e nella prima quindicina di aprile; ci lascia nel settembre. È più abbondante nel passo primaverile. Abita i terreni montuosi ed incolti.

Strix flammea, *Varvaianni*, *Piula*. Specie comune e sedentaria. Abita sui campanili, sulle vecchie torri e sulle rovine di casamenti in campagna.

Syrnium Aluco, *Cucca di passa*. È specie di passo, e rarissima.

Asio Otus, *Gufu*, *Curnuteddu*. Anche questa è specie rara, ma credo sia sedentaria. Abita nei boschi.

Digitized by Google

Asio accipitrinus, *Orva*, *Triorva*. Non credo sia sedentario, perchè in certe epoche, e propriamente in primavera, se ne trova qualcheduno nelle terre non molto discoste dal mare. Si suppone arrivato allora.

Athene Noctua, *Cucca*. È comune, sedentaria ed abbondante in tutti i luoghi montuosi. Abita fra le roccie e nei dirupi, dove nidifica.

Scops Giu, *Jacobbu*, *Chiuppu*. È uccello di passo. Arriva da noi in marzo ed anche in aprile, e parte in settembre. Abita nei boschi, e specialmente in quelli di uliveti, dove nidifica.

Neophron Percnopterus. Accidentale, uno venne preso vivo il 29 ottobre 1886 nel piano di Terranova, era esausto di forze.

Pelecanus Onocrotalus, *Pilucani*. Capita accidentalmente ad epoche indeterminate. Nel 1868, nel mese di novembre, ne capitò uno adulto, maschio, che fu ucciso e preparato si conservò per vari anni dal signor G. Regaud: era molto grosso. Un altro individuo giovane fu ucciso nello stesso lago Coccanico in dicembre 1881, e comprato dal cav. Ruggieri, lo tiene ancora preparato. Il 9 agosto ultimo (1886) ne capitò, sempre nell'istesso lago, un altro individuo, che fu portato ferito ad un'ala ed al petto. Fu comprato dal Municipio di Terranova, il quale fecegli apprestare tutte le cure per guarirlo, ma dopo dodici giorni morì di cancrena ed in uno stato da non potersi preparare. Mi fu assicurato che alcuni anni addietro nel fiume Salso tra Pietraperzia e Caltanissetta, vicino al ponte Capodarso, ne fu veduto un grosso branco di circa 30 individui.

Phalacrocorax Carbo, *Marauni*, *Corvu marinu*. È specie invernale e vive nel lago Coccanico e quando ne è scacciato va al mare, che non è troppo distante; ritorna però sempre nell'istesso luogo, sino che parte nel mese di marzo.

Ardea cinerea, *Ariuni cinnirinu*. È specie di passo. Arriva in abbondanza nella prima quindicina di aprile e parte

Digitized by Google

subito, fermandosi alcuni individui pochi giorni attorno al lago suddetto ed agli stagni. In settembre sono rari quelli che si vedono ritornare.

Ardea purpurea, *Russeddu*, *Russiddazzu*. È simile alla specie precedente in tutto e per tutto.

Egretta alba, *Ariuni biancu*. Anche questa è simile alla specie precedente; però è più scarsa di essa.

Egretta Garzetta, *Grassottu biancu*, *Ariuncellu*, *Ariuncinu*. Anche questa specie è di passo. Arriva in branchetti in aprile, e non si vede mai ritornare nell'autunno.

Bubulcus lucidus. Credo che questa specie sia quella che qui appellasi col nome volgare *Sprucavoi*. Uccello di passo, ed arriva in branchetti in aprile assieme alle specie affini. Non si vede nel passo autunnale.

Ardeola ralloïdes, *Grassottu*. Anche questo è uccello di passo regolare, ed è abbondante in aprile. Non nidifica fra noi.

Ardetta minuta, *Russeddu di cannitu* o *di margiu*. Arriva con le altre specie in aprile e va tosto via. Non nidifica in questo distretto.

Botaurus stellaris, *Paturu*. È specie non tanto abbondante. Giunge in ottobre e parte in marzo. Abita nei canneti attorno al lago ed agli stagni.

Nycticorax griseus, *Grassottu imperiali*. È specie di passo. Arriva qui in aprile e dopo pochi giorni sparisce.

Ciconia alba, *Cicogna*. È di comparsa irregolare, anzi accidentale. Io ne ho vedute due soltanto uccise nel citato lago, una nel 1869, che fu preparata e conservata per qualche tempo dal sopraddetto signor Regaud, ed un'altra nel 1883 che mi fu portata in stato da non potersi preparare.

Platalèa Leucorodia, *Paletta*, *Spatula*. Anche questa è specie rara e di comparsa irregolare. Non vi è anno però che non se ne uccida qualche individuo all'epoca del passo autunnale.

Plegadis Falcinellus, *Gaddaranu*. Sono di passo regolare. Si vedono arrivare a grossi stormi immediatamente dopo

Digitized by Google

che hanno terminato di passare le *Marzaiole*. Ciò succede entro la prima quindicina di aprile. Non sono tutti che si fermano per qualche giorno presso al lago, agli stagni ed alle foci; dopo due o tre giorni non se ne trova più alcuno. Nel passo autunnale non si fanno vedere perchè probabilmente passano di notte.

Phœnicopterus roseus, *Fiammante*, *Finicottiru*. È specie avventizia e di comparsa accidentale. In alcuni anni se ne è ucciso qualche individuo al lago. Nel 1882 ne fu preso uno bellissimo, che si conserva dal predetto cav. Ruggieri. Un altro me ne fu portato nel 1885, ucciso nell'istessa località, ma non mi fu possibile farlo preparare. La comparsa avviene nell'autunno.

Cygnus musicus, *Cignu*. È di comparsa accidentale ed avventizia. Ricordo che in alcuni anni si sono veduti qui dei Cigni e che qualcuno si è preso ferito leggermente e tenuto vivo per molti anni. Ricordo ancora che alcuni di tali individui erano di mole più piccola, credo doveano appartenere alla specie del Cigno minore (*Cygnus Bewicki*). Nell'inverno del 1879 al lago Coccanico ne comparve un branchetto di cinque individui, i quali in quattro giorni furono tutti presi: due leggermente feriti, ma uno di questi, dato in mano a ragazzi, lo legarono ad un piede, gli ruppero una coscia e ne morì; l'altro, comprato dal Municipio e guaritosi, adorna il giardino pubblico. Quando furono presi credo che fossero molto giovani, perchè erano di colore bianco-paglino. Quello che vive tuttora, dopo un anno circa divenne di una bianchezza straordinaria. È molto grosso e d'una eleganza ammirevole.

Anser cinereus, *Oca sarvaggia*. È specie avventizia ed accidentale. Non è sempre che si vedono qui arrivare individui di questa specie. Quando càpitano è nell'inverno, e dimorano per qualche tempo nel lago e nelle terre sommerse dalle pioggie; vi dimorerebbero a lungo se non fossero perseguitati dai cacciatori.

Anser segetum, *Oca sarvaggia*. Simile alla specie precedente.

Digitized by Google

Tadorna cornuta, *Anitra maltisa*, *Anitra janca*. È specie di passo regolare; qualche individuo arriva qui in gennaio, ma le masse giungono in febbraio, e rimangono sino a marzo. Non nidifica qui.

Anas Boscas, *Coddu virdi* (masc.), *Anatra furmintina* (fem.). È specie di passo regolare: arriva in novembre, e qualche anno nell'ultima metà di ottobre. Non tutti rimangono tutto l'inverno. Ripartono in febbraio.

Spatula clypeata, *Cucchiaruni*. È specie di passo, però non abbondante: giunge in febbraio e parte in marzo.

Dafila acuta, *Anitra cuduta*. Arriva qui nel pieno della luna di febbraio assieme alle *Morette*, formando con queste grossi stormi, e precedono l'arrivo delle *Marzaiole*. Vanno via immediatamente.

Mareca Penelope, *Anitra friscalora*. Arriva in novembre e parte in marzo ed anche negli ultimi di febbraio.

Nettion Crecca, *Papardedda*, *Mitarda*. Arriva in ottobre ed anche in novembre. Non tutti passano l'inverno fra noi, e ripartono in febbraio.

Querquedula Circia, *Riddena*. È specie di passo regolare. Incominciano in poca quantità nel pieno della luna di febbraio assieme alle *Morette* ed ai *Codoni*. Le masse arrivano nel plenilunio di marzo. In autunno non si vedono, perchè facilmente passano di notte o prendono altra via. Non nidificano fra noi.

Fuligula rufina, *Anitra turca*, *Anitra tupputa*. È specie invernale, e non abbondante.

Fulix ferina, *Cappurrussu* o *Capurrussu* (masc.), *Moja* (fem.). Arriva qui in settembre, ed anche in ottobre, e parte in febbraio.

Fulix Fuligula, *Scavuzza*. In scarso numero si vede nell'inverno. Il passo abbondante si verifica nel plenilunio di febbraio assieme ai *Codoni*, precedendo il passo delle *Marzaiole*.

Fulix Nyroca, *Occhi bianchi*. È specie invernale, e non abbondante. Abita nel lago. Parte in marzo.

Bucephala Clangula, *Anitra maltisa*, *Anitra bianca cu l'ali*

Digitized by Google

niuri. Non è abbondante. Arriva in novembre e dicembre, e parte in marzo.

Mergus Serrator, *Anitra sirretta*. È specie invernale e non abbondante. Arriva e parte come la precedente.

Columba Palumbus, *Tuduni*. È specie sedentaria in scarso numero. È pure di passo, perchè ne arrivano molti in ottobre e vanno via nel marzo. Nidifica sugli alberi d'ulivo o altri.

Columba Oenas, *Palumma sarvaggia*, *Marinedda*. È specie sedentaria. Abita sulle roccie, e nidifica nelle spaccature di esse. In autunno si vedono stormi immensi di questi volatili andare in cerca di cibo nelle terre di fresco seminate a frumento.

Columba livia, *Palumma sarvaggia*. È specie sedentaria. Vive in campagna sui dirupi, ma preferisce i fabbricati antichi, dove nidifica. Si adatta a stare in città sui campanili e sulle chiese. In Terranova ne abbiamo una immensa quantità derivati da una semplice coppia che circa vent' anni addietro da una chiesa poco discosta dalla città, dove facea abitazione, si recava sul campanile della cattedrale, dove i figli cominciarono a moltiplicare. Oggi non vi è chiesa o grande edifizio che non ne abbia un numero considerevole.

Turtur tenera, *Turtura*. Arrivano qui in aprile colle Quaglie, ed alcune anche prima. Nidificano fra noi e vanno via in settembre. Abitano dove vi sono alberi e piante in terreni boschivi.

Francolinus vulgaris, *Franculinu*. È una specie del tutto estinta in Sicilia e, credo, anche sul continente italiano. Nel 1845 era ancora abbondante nell' ex-feudo di Falconara; l' ultima coppia che io vidi fu a Desusino il 24 dicembre 1864.

Perdix saxatilis, *Pirnici*. La pernice è comune e sedentaria in questo distretto nei terreni montuosi e dove esistono radi boschetti formati specialmente di cespugli, alte eriche, rosmarino, timo ecc., e colà nidifica.

Coturnix communis, *Quagghia*. È uccello comune, abbon-

Digitized by Google

dante e molto noto a tutti. Arriva da noi nella fine di aprile o nei primi di maggio; riparte in settembre ed al principio di ottobre; però non son pochi quelli che rimangono e passano l'inverno fra noi, specialmente nelle pianure e nelle terre boschive di Terranova non molto discoste dal mare.

Turnix sylvatica, *Triungnia*. È una specie non tanto abbondante e sedentaria nelle terre di Terranova non lontane dal mare. Abita nelle terre boschive piane e ricoperte di scopa bassa e dove vi sono molti cespugli.

Rallus aquaticus, *Fasciana*, *Fascianedda*. Io credo sia specie sedentaria, quantunque si incontri più frequente in autunno e nell'inverno. Abita nei luoghi pantanosi dove vi sono fitte piante, cespugli e canneti. Si vedono più numerose nei canneti e giunchi attorno al lago.

Ortygometra Porzana, *Adduzzu d'acqua pedi virdi*. È specie limitata. Ignoro se sia di passo, o sedentaria. Abita gli stessi luoghi della specie precedente, ma preferisce i fossi fangosi e coverti di fitte piante e cespugli che confinano con terreni boschivi.

Ortygometra Bailloni, *Gadduzzeddu d'acqua pedi giarni*, *Surciteddu*. Questa specie è più scarsa della precedente, e vive nelle stesse località. Non sembra essere di passo.

Ortygometra parva, *Perciabudi picciulu*, *Surciteddu*. È simile alla specie precedente.

Crex pratensis, *Re di quagghi*. È uccello di passo, ed arriva in aprile o maggio assieme alle quaglie. Non si vede ritornare in autunno. Non nidifica qui.

Gallinula chloropus, *Gaddinedda pizzu giarnu*. È specie di passo ed è nei costumi simile all'*Ortygometra Porzana*.

Porphyrio cæruleus, *Gaddu fascianu*. Questa bella specie, che nelle paludi di Lentini può dirsi essere sedentaria, in questo distretto, e propriamente nel lago Cuccanico, non è abbondante e difficilmente vi nidifica. Io ne ho avuto qualche individuo vivo, che si è adattato benissimo alla schiavitù ed ha vissuto per alquanti anni.

Digitized by Google

Fulica atra, *Addinazza*, *Addinedda*. È specie abbondantissima al lago, ed anche, in poco numero, nelle paludi. Arrivano in agosto, settembre ed ottobre e partono in marzo. Pochi son quelli che rimangono a nidificare.

Grus communis, *Groi*. All' epoca del passo autunnale in ottobre e novembre, ed in primavera nel marzo ed aprile, si vedono passare a grossi branchi molto alti, da dove fanno sentire la loro rauca voce. Spesso precedono la pioggia. Di raro posano a terra ai margini delle terre paludose, o fra i seminati di frumento, che danneggiano positivamente.

Otis Tetrax, *Pitarra*. È specie sedentaria. È abbondante soltanto in alcune giornate alla fine di marzo e principio di aprile, allora si trovano in branchetti. Dopo quell' epoca si trovano in coppie. Abitano i terreni asciutti, preferendo i collinati petrosi, dove vi sono scopeti, come ancora i campi seminati a cereali. Colà nidifica.

Œdicnemus scolopax, *Librazzinu*. È specie comune e sedentaria; abita nei terreni asciutti, tanto in pianura che in collina, coltivati o no. La sera e durante la notte va volando facendo sentire la sua voce. Di giorno non si sente mai.

Charadrius Pluvialis, *Mazzacani*. È specie invernale. Arriva fra noi a stormi in ottobre, e riparte negli ultimi di febbraio e primi di marzo. Abita nei terreni aperti ed umidi, e spesso assieme alle pavoncelle.

Ægialitis curonica, *Acidduzzu d' acqua*, *Marinareddu*, *Curripraia*. È specie non comune. Arriva in primavera. Vive in branchetti lungo la spiaggia del mare, in riva al lago ed alle paludi: qualche coppia nidifica nelle dune vicino al mare.

Ægialitis Hiaticula, *Curripraia granni*. È specie di passo primaverile, ed è simile alla specie precedente.

Vanellus Capella, *Nivalora*, *Pavuncellu*. Arriva in branchetti in ottobre e novembre, riparte in febbraio. Abita nei piani nelle terre paludose; non isdegna però di stare

Digitized by Google

anche in certe località in collina. Spesso si uniscono ai pivieri.

Recurvirostra Avocetta, *Beccu tortu.* Quest' uccello credo sia avventizio, perchè si vede assai di raro. Io ne ho veduto un solo individuo, maschio, ucciso al lago in dicembre 1878, che andò perduto.

Himantopus candidus, *Francisottu.* È uccello di passo regolare. Giunge in branchetti in aprile. Alcuni si fermano alla spiaggia ed ai margini del lago e delle paludi per riposarsi, e dopo qualche giorno continuano il loro viaggio.

Pelidna subarquata, *Gadduzzu ciurluviu*, *Gadduzzu di mare.* È specie di passo regolare: arriva in settembre ed ottobre e parte in marzo. Abita alla spiaggia del mare, ed anche ai margini dei laghi e stagni.

Pelidna alpina, *Gadduzzu di mari picciulu.* È simile alla specie precedente.

Scolopax Rusticula, *Beccacciu*, *Gaddazzu.* È uccello di passo regolare. Arriva per lo più di notte alla fine di ottobre e principio di novembre. Trovando le condizioni confacenti, alcuni individui si trattengono per breve tempo e passano avanti. Ritornano in numero scarso nel mese di febbraio ed anche in marzo.

Gallinago major, *Arcirottu.* È specie di passo regolare. Arriva in ottobre e in novembre e parte in febbraio ed in marzo. Vive ai margini degli stagni, laghi e corsi d' acqua. Non è abbondante.

Gallinago cælestis, *Beccaccinu*, *Scaccia margi.* Anche questa è specie di passo regolare. Arriva in ottobre. Abita gli stessi luoghi della specie precedente, e parte con essa.

Gallinago Gallinula, *Arcirutteddu*, *Scaccia margi picciulu.* È simile alle due specie precedenti.

Numenius Arquata, *Cirriviu*, *Ciurluviu.* Arrivano in branchi nel novembre. Dimorano tutto l'inverno; in marzo, all' epoca del passo, sono più abbondanti. Partono nel mese di aprile. Abitano nei terreni umidi ed ai margini degli stagni, ed anche sulle dune vicino al mare.

Digitized by Google

Numenius Phæopus, *Vujarottu*. Giunge in settembre ed ottobre assieme ai Pivieri e parte in aprile. Non è abbondante. Abita i luoghi stessi abitati dai Pivieri, coi quali si unisce.

Glareola Pratincola, *Rinninuni di maisa*. Si vede soltanto in aprile e maggio a branchetti nelle terre maggesi mentre che s' irrigano per seminarle a cotone. Abitano per breve tempo alle sponde del lago. Non nidificano in questo distretto, ma probabilmente nell' interno dell' isola.

Podiceps cristatus, *Parrinu*. Arriva da noi in novembre o dicembre, e riparte in marzo. Non è abbondante. Abita al lago in mezzo agli altri nuotatori.

Podiceps nigricollis, *Occhi lucenti*. Arriva, parte e abita come la specie precedente.

Podiceps fluviatilis, *Pitirru*, *Pitirri*. È uccello comunissimo e sedentario. Abita al lago, dove nidifica.

Palermo, distretto di Castelbuono-Madonie (Minà-Palumbo dott. Francesco, Morici-Minà M.):

Le Madonie, Nebrodes, sono in Sicilia, provincia di Palermo. Questo gruppo di monti sorge nella spiaggia settentrionale dell' isola, tra il fiume Monalo ad E. e l' Imera settentrionale ad O., distano dalla spiaggia circa sette chilometri; ad oriente vi è il comune di Gerace, al sud Petralia Soprana, Petralia Sottana, Palizzi; ad ovest Collesano, al nord Isnello e Castelbuono. La sua posizione è: long. fra il 31°, 32′, 30″ ed il 31°, 51′, 49″, differenza 0°, 19′, 10″, che corrisponde a miglia geografiche 19 $^1/_6$; latit. fra il 37°, 54′, 35″ ed il 37°, 41′, 30″, differenza 0°, 12′, 5″, che corrisponde a miglia geografiche 12 $^1/_{12}$. Il gruppo delle Madonie appartiene al sistema degli Appennini insulari. Vi sono due fiumi, o meglio grandi torrenti, che nell' inverno abbondano di acque: uno è il Monalo, fiume di Pol-

Digitized by Google

lina, l'altro è l'Imera, fiume grande, dove spesso gli uccelli si dirigono nell'epoca del passo. I punti più elevati di questo gruppo sono: Pizzo dell'Antenna (metri 1975), Pizzo Salvadore (m. 1909), Pizzo Palermo (m. 1986).

Nelle falde vi sono estesi agrumeti, vigneti, orneti, frassineti, sommaccheti, svariate essenze fruttifere; poi segue la regione del ciliegio, quella del castagno, e poi le estese foreste ghiandifere all'E. e al N., e le faggete al NO. Dalla parte di SO. gli estesi noccioleti di Palizzi, e finalmente al S. le estese campagne libere destinate alla coltura del grano e delle baccelline. Nelle colture vi è la regione scoperta, ove nella Serra de' Pini vegetava il *Pinus pectinata*, che una mano vandalica distrusse tra il 1820 e il 1825.

Si comprende benissimo come una superficie così estesa, alternata da valli, colline, piani e monti, ricca di praterie, di foreste, e di differenti essenze colturali, che non tutti i circondari della Sicilia possono offerire, deve essere prescelta da uccelli sedentarî ed immigranti. Abbiamo anche un vasto litorale, ma lo studio degli uccelli marini pel nostro luogo di dimora non è stato fatto; ciò che sarebbe stato di un grande vantaggio, perchè quella estesa riviera dal Finale all'Imera, con fiumi, torrenti, laghetti e praterie, dona favorevole approdo agli uccelli immigranti, che stanchi del lungo viaggio anelano terreni e luoghi propizi al riposo ed al nutrimento.

Il gruppo delle Madonie, che elevasi a due mila metri, presenta un'ampia valle al S. con aperte campagne, una seconda dal SE. al NE., ed una terza con campagne aperte ad O.; or succede che quando spirano correnti atmosferiche violente, gli uccelli possono trovare quiete quando giungono dal loro lungo viaggio nella valle opposta. Come anche quando ne' sommi gioghi o nelle alte foreste ghiandifere la neve copre tutte quelle terre, gli uccelli scendono nel piano in cerca di più mite temperatura e di nutrimento; in quaranta anni di questi studi due volte ho osservato che tutta la campagna era coperta, sino al mare, di neve, gli uccelli silvani scesi dal monte non trovavano nutrimento,

Digitized by Google

e per le brine che si succedettero molti di questi piccoli uccellini si trovarono morti dopo lo scioglimento delle nevi; ma nelle condizioni ordinarie, nell' inverno il nostro clima è temperato, e gli uccelli vivono bene. (*Minà-Palumbo*).

Elenco delle specie di uccelli osservate nel distretto delle Madonie, provincia di Palermo, coi nomi volgari locali e con notizie sulla frequenza, sulle migrazioni, sulla nidificazione, ecc. ecc.[1]

Corvus Corax, *Cuorvo.* Frequente ovunque e sedentario, era però una volta più abbondante; nidifica in maggio.

Corvus Cornix, *Cuorvu marinu.* Rara al piano, sedentaria e nidificante.

Corvus frugilegus, *Cuorvu di passa.* Raro, invernale.

Lycos Monedula, *Ciavula.* Comune ovunque e sedentaria.

Pica rustica, *Carcarazzu.* Poco frequente, di passo; qualche coppia nidificante presso Petralia.

Garrulus glandarius, *Giai*, *Giau.* Frequente ovunque e sedentaria; molte si vedono in primavera.

Pyrrhocorax Graculus, *Ciavula cu pizzu russu.* Frequente un tempo ai monti, oggi scarso, sedentario; nidifica alla Rocca Lupa e balzo di Ciambra, depone 4 a 5 uova.

Sturnus vulgaris, *Sturnieddu.* Comune al piano in marzo-aprile a branchi.

Sturnus unicolor, *Sturnieddu niru.* Comune ai monti e sedentario.

---

[1] Questo elenco è compilato su quelli e sulle notizie fornite dal dott. F. Minà-Palumbo e dal signor M. Morici-Minà; il primo è un veterano e chiaro naturalista, ben noto pei molti lavori pubblicati sulla Storia Naturale delle Madonie, tra cui un *Catalogo degli Uccelli* stampato nel 1857, con supplementi e monografie ornitologiche speciali che videro la luce nel 1857-58-59. Anche il signor Morici-Minà ha stampato *Osservazioni di Ornitologia Nebrodense* nel *Boll. del Naturalista* pel 1886.

Digitized by Google

Fringilla cœlebs, *Pinzuni*. Comune, specialmente nell'autunno; qualche coppia rimane e nidifica.

Petronia stulta, *Pirpir* (Petralia), *Passaru di vuoscu* (Castelb.). Ai monti, comune in primavera, anco nidificante.

Passer montanus, *Passaru di campagna*. Frequente al piano, nidifica sugli alberi, noci, aranci.

Passer hispaniolensis, *Passaru sbirru*. Comune al piano e sedentaria.

Coccothraustes vulgaris, *Scacciamennuli*. Poco frequente ai colli nell'autunno.

Ligurinus Chloris, *Virduni*. Poco frequente al piano, di doppio passo.

Chrysomitris Spinus, *Lecuru*. Raro al piano.

Carduelis elegans, *Cardiddu*. Frequente ovunque e sedentario; più abbondante nell'autunno.

Serinus hortulanus. Si vede a branchetti nell'autunno ed in primavera.

Cannabina Linota, *Bastarduni*. Frequente ovunque, invernale.

Loxia Curvirostra, *Beccutortu*. Rarissimo ai monti.

Miliaria Projer, *Ciciruni*. Frequente ovunque, sedentario e di passo in primavera.

Emberiza Cirlus, *Zivula*. Frequente ovunque, sedentario; nidifica ai monti e scende al piano d'autunno.

Emberiza Cia, *Zivula di muntagna*. Frequente ai monti, sedentario.

Melanocorypha Calandra, *Ncuddarata* (Petralia). Comune nel distretto di Petralia, sedentaria.

Calandrella brachydactyla, *Ciurlidda* (Petralia). Comune ai monti nel distretto di Petralia.

Alauda arborea, *Calandredda d'arvulu*. Comune ai colli in ottobre, di rado nidificante.

Alauda arvensis, *Lonara*. Frequente ovunque in ottobre.

Galerita cristata, *Calannira*, *Cucucciuta* (Petralia). Comune ovunque e sedentaria.

Agrodroma campestris, *Currintuni*. Raro al piano.

Anthus pratensis, *Linguinedda*. Comune al piano in ottobre.

Digitized by Google

Anthus trivialis, *Linguinedda cantatura.* Raro al piano in primavera.

Budytes flavus, *Vispisa giarna.* Frequente ovunque, di doppio passaggio.

Budytes cinereocapillus, *Vispisedda.* Frequente al piano, specialmente in settembre.

Budytes melanocephalus, *Vispisa di sciumi.* Raro al piano nel maggio.

Motacilla alba, *Nivalora.* Frequente al piano, di passo in settembre ed ottobre.

Calobates melanope, *Vispisa.* Frequente al piano nell'autunno.

Saxicola Oenanthe, *Cudibianchi.* Comune ovunque nel maggio, anco nidificante.

Saxicola Stapazina, *Aliniuri.* Rara al piano.

Monticola saxatilis, *Cudirussuni.* Scarso ai monti.

Monticola Cyanus, *Mierru solitariu.* Scarsa, ma sedentaria.

Merula nigra, *Mierru niuru* o *di sciara.* Comune ovunque, sedentario.

Merula torquata, *Marvizzu* o *Turdu di passa.* Raro ai monti.

Turdus pilaris, *Re di Turdi.* Videsi un branco numeroso in Castelbuono nel 1846, è però di comparsa accidentale.

Turdus iliacus, *Turdu russu.* Accidentale, venne preso in Castelbuono nel dicembre 1886.

Turdus musicus, *Marvizzu.* Comune ovunque, viene in settembre e rimane l'inverno; uno fu veduto il 7 maggio 1886.

Turdus viscivorus, *Turdu.* Frequente ovunque, sedentaria; erratica d'inverno.

Aëdon Luscinia, *Russignuolu.* Comune al piano in primavera, anche nidificante.

Erithacus Rubecula, *Pittiddu.* Frequente ovunque, sedentario; nidifica ai monti e scende al piano nell'autunno.

Ruticilla Phœnicurus, *Cuda russa.* Poco frequente ai monti, di doppio passo.

Ruticilla titys, *Cuda russa.* Raro ai monti.

Pratincola Rubicola, *Cacamarruggiu.* Comune ovunque, sedentario.

Digitized by Google

Sylvia cinerea, *Occhi-pisciati.* Frequente ai monti, vi nidifica.

Sylvia subalpina, *Caca-sipali.* Rara in aprile.

Monachus Atricapillus, *Testa niura.* Non rara, giunge in aprile e parte in ottobre; poche coppie nidificano da noi.

Pyrophthalma melanocephala, *Cacasipali cu l'occhi russi.* Frequente ai monti, vi nidifica.

Phylloscopus sibilator, *Pittiddu virdi.* Frequente al piano in primavera.

Phylloscopus rufus, *'Mbucca-muschi.* Raro al piano.

Cettia Cettii, *Gadduzzu.* Raro al piano, ove nidifica in maggio.

Cisticola cursitans, *Aciduzzu di fienu.* Scarso al piano.

Troglodytes parvulus, *Castagniedda*, *Riiddu.* Comune ovunque, sedentario; nidifica ai monti.

Cinclus aquaticus, *Adduzzu d'acqua*, *Mierru d'acqua.* Frequente ovunque e sedentario, nidifica ai monti e scende al piano col freddo.

Accentor collaris, *Chiummaloru.* Scarso ai monti, ma sedentario; erratico nell'inverno.

Accentor modularis, *Chiummaloru.* Frequente ai monti e sedentaria; erratica nell'autunno.

Regulus cristatus, *Riiddu.* Raro ai monti, ma sedentario.

Regulus ignicapillus, *Riiddu testa russa.* Frequente ai monti e sedentario.

Acredula irbyi, *Munachedda cuda longa.* Scarso ai monti, ma sedentario; scende al piano col freddo.

Parus major, *Munachedda.* Comune ovunque e sedentaria; erratica nell'autunno.

Cyanistes cæruleus, *Munachedda.* Comune ovunque e sedentaria; erratica nell'autunno.

Sitta caesia, *Pizzuliazucchi.* Comune ai monti e sedentario.

Certhia brachydactyla, *Pizzuliazucchi piciriddu*, *Rampichina.* Comune ovunque e sedentario, scende al piano nell'inverno.

Oriolus Galbula, *Naccaluoru*, *Aggruppafilu.* Comune ovunque in primavera, anco nidificante.

Lanius Collurio, *Partarrasu di voscu.* Frequente in aprile, qualcuna rimane a nidificare.

Digitized by Google

Lanius auriculatus, *Partarrasu* (Castelb.), *Cuttunara* (Collesano). Frequente ovunque in primavera, anco estiva e nidificante.

Muscicapa collaris, *Munachedda di passa.* Non rara al piano alla fine d'aprile.

Muscicapa Atricapilla. Di passo in aprile.

Butalis Grisola, *Appappa-muschi.* Scarso in aprile.

Hirundo rustica, *Martidduzzu.* Comune ovunque, estiva.

Hirundo rufula. Rara, veduta due volte nel settembre in branchi di *H. rustica.*

Chelidon urbica, *Rinninedda*, *Munachedda.* Frequente ovunque, estivo.

Cotile rupestris, *Rinnina di passu scura.* Frequente ai monti e sedentaria.

Cypselus Apus, *Rinnina*, *Rinninuni.* Frequente; giunge in marzo-aprile e parte in luglio; di rado vedonsi passare nel settembre.

Cypselus Melba, *Rinninuni di passa.* Raro al piano.

Caprimulgus europæus, *Curdaru.* Frequente al piano in aprile, anco nidificante.

Picus major, *Pizzuliazucchi russu*, *Appizza ferru.* Frequente ovunque e sedentario, diventa erratico nell'inverno.

Picus medius, *Pizzuliazucchi russu.* Raro ai monti, ma sedentario; diventa erratico nell'inverno; nidifica in maggio.

Iynx Torquilla, *Formicolaru*, *Formicaru*, *Coddu-tortu*, *Lingualonga.* Frequente al piano in marzo-aprile e settembre.

Cuculus canorus, *Cucca di maiu.* Poco frequente ai monti e colli in primavera; alcune coppie rimangono l'estate, rinvenni l'uovo in un nido di *Pratincola Rubicola.*

Alcedo Ispida, *Aceddu celesti.* Raro al piano, ma sedentario.

Coracias Garrula, *Scornagiaiu.* Rara, ma frequente in Petralia nella primavera; qualche coppia rimane l'estate e nidifica.

[illegible]s Apiaster, *Apaluoru* (in primavera), *Vignignuolu* (in [illegible]unno). Frequente al piano, di passo soltanto in pri[illegible]ra, fa breve dimora nell'autunno.

Digitized by Google

Upupa Epops, *Pipituni.* Frequente ai monti in aprile; qualcuna rimane l'estate e vi nidifica.

Strix flammea, *Faguanu biancu.* Frequente al piano e sedentario.

Syrnium Aluco, *Faguanu.* Raro ai monti, ma sedentario.

Asio Otus, *Faguanu.* Poco frequente ai monti, ma sedentario; nidifica nei boschi in aprile, 4 uova.

Asio accipitrinus, *Varvajanni.* Raro ai monti, ma sedentario; nidifica nelle cartiere in maggio.

Athene Noctua, *Cucca.* Frequente ovunque e sedentaria.

Scops Giu, *Jacobu*, *Chiò.* Estivo e frequente ovunque, giunge alla metà di marzo.

Bubo maximus, *Faguanazzu.* Raro ai monti, ma sedentario; nidifica nelle Manche di Alfano ne' balzi con macchie nel mese di aprile.

Circus cyaneus, *Farcuni biancu.* Rara, l'ebbi nel marzo 1851 al Finale.

Circus cineraceus, *Farcuni.* Rara al Finale.

Buteo vulgaris, *Alitunni.* Scarsa ai monti, sedentaria.

Pernis apivorus, *Falcunazzu.* Scarso ai monti.

Milvus Ictinus, *Nigliu*, *Nigliazzu.* Scarso, ma sedentario; una volta era più comune, se ne videro sino a 24 sopra un solo albero.

Falco Peregrinus, *Falcuni raru.* Scarso ai monti.

Cerchneis Tinnunculus, *Crivedda.* Frequente ovunque e sedentario.

Cerchneis vespertinus, *Farcuni frusteri* o *di passa.* Al piano, di passo soltanto.

Astur palumbarius. Accidentale, ma nell'aprile 1856 e nello stesso mese del 1886 ne passarono parecchi, fermandosi alcuni giorni.

Accipiter Nisus, *Farchettu.* Frequente ovunque.

Gypaëtus barbatus. Rara, nel 1839-40 nidificò nella rupe sopra le cartiere.

Gyps fulvus, *Vuturu.* Ora scarso ai monti, sedentario; nidifica in febbraio-marzo nei balzi di Gonato, della Canna e della Juntera, depone 2 uova.

Digitized by Google

Neophron Percnopterus, *Pasqualina.*[1] Divenuto raro, sedentario e anco di passo in aprile. Ha nidificato sul balzo inaccessibile di Gonato, in marzo-aprile, depone 3 uova.

Phalacrocorax Carbo, *Cuorvu marinu.* Scarso al litorale di Cefalù.

Microcarbo pygmæus. Un individuo venne ucciso presso Cefalù.

Ardea cinerea, *Airuni.* Raro al piano nell' autunno.

Ardea purpurea, *Russeddu.* Frequente al piano nell' autunno.

Egretta alba, *Cicogna 'mperiali.* Frequente al Finale e fiumara di Castelbuono nell' autunno.

Egretta Garzetta. Rara, una colta in Petralia nel 1857, è di passo in primavera e nell' autunno.

Ardeola ralloïdes. Frequente al litorale, vi fu un passo abbondante nel 1843; passa in maggio.

Ardetta minuta. Frequente al litorale in aprile-maggio.

Botaurus stellaris. Raro al litorale.

Nycticorax griseus, *Grassotta.* Frequente al litorale di doppio passo.

Ciconia alba, *Aciddazzu biancu.* Rara.

Ciconia nigra, *Cicogna niura.* Rara, un branco si vide nel 1853 sul fiume Monalo.

Plegadis Falcinellus. Uno ucciso nell' aprile 1847 in Castelbuono.

Phœnicopterus roseus. Raro, è stato ucciso sul fiume Imera.

Cygnus musicus. Accidentale, è stato ucciso nei pantani di Cefalù nel 1845.

Anser cinereus. Accidentale, una sola cattura sull' Imera.

Anser segetum. Scarsa, veduta in Petralia tra i frumenti e lungo l' Imera.

Anas Boscas, *Coddu virdi.* Comune nell' autunno.

Chaulelasmus streperus. Avuta nell' autunno del 1846, accidentale.

Spatula clypeata. Vedesi a branchetti circa ogni tre anni.

[1] Perchè si osserva vicino Pasqua tra gli armenti bovini.

Digitized by Google

Mareca Penelope. Raro.

Nettion Crecca, *Papardedda.* Frequente nell' autunno.

Querquedula Circia, *Trizzotta.* Frequente in primavera, meno nell' autunno.

Fuligula rufina. Giunge a branchetti nell' autunno.

Fulix Nyroca. Uccisa nella fiumara di Castelbuono nel 1846, accidentale.

Bucephala Clangula. Giunge in branchetti, nel 1846 furono più del solito abbondanti sull' Imera, sempre nell'inverno.

Mergus Merganser. Accidentale, è stato preso sul Monalo e sull' Imera.

Mergus Serrator. Scarso assai.

Columba Palumbus, *Tuduni.* Ai monti e sui colli, sedentario; scende negli uliveti col freddo.

Columba Oenas, *Palumma roccalora* (Petralia). Frequente ai monti e balzi, sedentaria e di passo nell' autunno.

Columba livia, *Buccazzola.* Frequente ai monti e balzi, sedentario.

Turtur tenera, *Turtura.* Frequente ovunque in aprile, anche nidificante.

Francolinus vulgaris, *Tritarì.* Il nome volgare deriva dal fatto che si vendeva tre tarì (L. it. 1.27), quando era comune nel piano di Finale, proprietà dei marchesi Geraci. Da molti anni è scomparso. Potei disegnare a colori un Francolino ucciso a Terranova nel 1858. In Sicilia non esiste più.

Perdix saxatilis, *Pirnici.* Frequente ai monti e colli e sedentaria; in un nido si trovarono 39 uova, probabilmente deposte da due femmine.

Coturnix communis, *Quaglia.* Abbondante e anco nidificante al piano ed in Petralia; passa nel maggio; qualcuna rimane a svernare.

Rallus aquaticus, *Calacinni* (Petralia), *Puddicinu* (Castelb.). Frequente nell' autunno.

Ortygometra Porzana, *Addinedda d'acqua.* Frequente in marzo.

Ortygometra Bailloni, *Gaddinedda d'acqua surcera.* Rara, una presa nel 1886.

Digitized by Google

Ortygometra parva, *Gaddinedda d'acqua surcera.* Rara al piano.
Crex pratensis, *Re di Quagli.* Raro in primavera.
Gallinula chloropus, *Gaddinedda d'acqua.* Rara.
Fulica atra, *Facciola.* Frequente al piano nell'autunno.
Grus communis, *Groi.* Di passo ai monti nell' autunno.
Otis Tetrax, *Pitarra.* Dicesi non rara intorno al lago di Pitarra.
Œdicnemus scolopax, *Ciurruvì.* Frequente nell' inverno.
Charadrius Pluvialis, *Vujarottu.* Poco frequente nell' autunno.
Ægialitis curonica, *Addinedda monaca.* Frequente in maggio.
Vanellus Capella, *Nivalora.* Frequente al piano d' inverno.
Himantopus candidus, *Piedi luonghi.* Raro, fu abbondante nel 1842; sarebbe invernale.
Actodromas minuta. Non raro.
Tringoïdes Hypoleucus. Frequente, nel 1839 più del solito, invernale.
Totanus Ochropus, *Addinedda d'acqua*, *Gadduzzu de li grossi.* Frequente, nel 1840 più del solito, invernale.
Totanus Calidris. Scarsa in primavera.
Scolopax Rusticula, *Gaddazzu.* Frequente, viene in settembre-ottobre e rimane sino ai primi di marzo; in quel mese nel 1885 vi fu un passo straordinario e nel piano di San Paolo ne vennero uccise oltre a 500.
Gallinago cælestis, *Arcirotta.* Frequente nell' inverno.
Gallinago Gallinula, *Arciruttedda*, *Beccaccina.* Poco frequente nel novembre.
Glareola Pratincola. Rara, uccisa in Castelbuono nel 1841; passa nel maggio.
Sterna fluviatilis, *Alalonga.* Rara.
Chroocephalus melanocephalus. Frequente al litorale di Cefalù.
Chroocephalus ridibundus. Frequente al litorale.
Rissa tridactyla. Frequente alla riviera di Cefalù.
Puffinus anglorum. Frequente al litorale.
Puffinus Kuhli. Frequente al litorale.
Fratercula arctica. Venne presa a Cefalù nell' inverno 1885.
Podiceps nigricollis. Al piano di casuale comparsa.
Podiceps fluviatilis. Al piano.

Digitized by Google

SARDEGNA.

Elenco delle specie di uccelli osservate nell'isola di Sardegna, coi nomi volgari locali, e notizie sulla frequenza, migrazioni, nidificazione, ecc. [1]

Corvus Corax, *Crobu*, *Crobu nieddu*, *Crobu mannu*. Comune e stazionario in tutta l'isola, e più specialmente presso località paludose.

Corvus frugilegus, *Carroga*, *Carroga niedda*, *Crobu*. Di passo in inverno, colle stesse abitudini del precedente. Trovasi in tutta l'isola, ma più specialmente al Capo settentrionale.

Corvus Corone, *Crobu nieddu*, *Crobu*. Di passo soffermandosi al piano nell'inverno. Potei osservarla in tutta l'isola mista col *C. Corax* e col *Lycos Monedula*.

Corvus Cornix, *Carroga*, *Carroga barza*, *Carroga brascia*, *Corronca*. Comunissima, stazionaria, abita al piano e molte coppie alla riva del mare per incetta di pesciolini e di conchiglie. In tutta l'isola.

Lycos Monedula, *Tacula*, *Carroga*, *Carroghedda de çampanile*. Comune, stazionaria. Specie erratica dal piano al monte e viceversa, ma abita più nei campanili e nelle torri e castelli. In tutta l'isola, ma più specialmente in luoghi bassi.

Nucifraga Caryocatactes, *Carroga giajulada*. Di passo accidentale, ma più specialmente al Capo meridionale.

Garrulus glandarius, *Piga*, *Marra piga* (a Fonni). Comune, stazionaria, abita ai monti e nelle vallate sottostanti. In tutta l'isola.

[1] Questo elenco è compilato dal signor Pietro Bonomi, intelligente tassidermista che ha fatto un lungo soggiorno nell'isola percorrendola in ogni verso in frequenti gite a scopo di raccolte zoologiche.

Digitized by Google

Pyrrhocorax alpinus, *Carroghedda de' monti*, *Staccola*. Raro ed invernale.

Pyrrhocorax Graculus, *Staccola de' monti a peis arrubius*. Abita sui monti più alti dell' isola, ma più specialmente a Perdaliana e sui monti tutti della Barbasgia e Genn' argentu.

Sturnus vulgaris, *Sturnu pintu*, *Struddu*, *Storneddu*, *Sturru giajulau*, *Sturreddu*, *Sturru picchietatu* o *pintu*. Giunge in autunno, riparte in primavera. Abita nei piani, riparandosi a preferenza di notte nei canneti presso gli stagni ed i fiumi. In tutte le parti piane ed a preferenza paludose dell' isola.

Sturnus unicolor, *Sturru*, *Sturnu*, *Struddu*, *Sturru nieddu*. Comunissimo e stazionario. Abita nei villaggi al piano ed al monte, ma più specialmente nei pressi degli stagni. In tutta l' isola. Ne ebbi individui isabella e semialbini.

Pastor roseus. Accidentale, fu trovato durante l' invasione delle cavallette nell' isola.

Fringilla cœlebs, *Passarellu*, *Passareddu*, *Alipinti* (Cioni, Cagliari). Nidificante. Comune e specialmente in luoghi montuosi. Presenta però un passo regolare, arrivando in autunno per ripartire in primavera; nidifica a preferenza in luoghi di fitta alberazione (uliveti). In tutta l' isola, ma più al Capo settentrionale ed al monte.

Petronia stulta, *Cruculeo* o *Curculeu de monti*. Comune e nidificante. Abita in luoghi rocciosi al piano ed al monte e specialmente poi nelle roccie a picco sul mare. In tutta l' isola.

Passer montanus. Accidentale è il suo passo, ma ne potei notare col *Fringilla cœlebs* nella parte settentrionale.

Passer hispaniolensis, *Cruculèu*, *Cruculeus*, *Furfuragiu*, *Cedda de palazzu*, *Furfurinus*. Comune e nidificante ovunque in città sulle case, e in campagna anche sugli alberi. Ne ebbi con piumaggio diverso bianco ed isabella. In tutta l' isola.

Digitized by Google

Coccothraustes vulgaris, *Biccu grussu*, *Pizzugrossu*. Comune e nidificante; giungono pure in autunno e ripartono in primavera. In tutta l'isola, ma più specialmente in montagna ed al Capo settentrionale.

Ligurinus Chloris, *Verdarolu*, *Birdarolu*, *Vardarolu*. Comune, nidificante. Abita il piano ed il monte in tutta l'isola.

Chloroptila Citrinella, *Canariu* o *Canarieddu de monti*. Da solo sei anni comune e nidificante. Abita le regioni montuose e specialmente nel Nuorese. Nei rigidi inverni per cadute abbondanti di nevi, scende ai piani. È solo dall'inverno del 1882 che fu notata questa specie in Sardegna sedentaria e nidificante. Il signor Tarasconi Giov. di Nuoro ed il Manca dissero che fu solo per forte bufera di quell'inverno che giunsero e quivi si stabilirono; furono trovati indi presso la chiesa del Convento a Nuoro e nei pressi di Orune. Al Capo settentrionale dell'isola.

Chrysomitris Spinus, *Canariu de monti*, *Cardilina groga*. Arriva in autunno e riparte in primavera.

Carduelis elegans, *Cardanera*, *Cardilina*. Comune e nidificante ovunque. Presenta varietà stabili da studiarsi. Ebbi un individuo isabella. Il signor Tarasconi ed il signor Manca di Nuoro mi fecero osservare che giovani della specie stessa, della stessa età, e mantenuti tanto in gabbia che allo stato libero, alcuni sono di un colore più vivace rosso e più esteso sul capo, ali più di un bel nero ebano con distinte punteggiature bianche e più grossi, mentre in altri ciò non si osserva e quasi non hanno punteggiature. Il caso sarebbe degno di studio.

Serinus hortulanus, *Canariu de monti*, *Canariu areste*. Comune e nidificante. Abita al piano ed al monte in tutte le parti dell'isola.

Cannabina Linota, *Passareddu*, *Passarellu*, *Fanellu*. Comune, nidificante. Frequenta assai le spiaggie marine. In tutte le parti dell'isola.

Pyrrhula europæa. Di passo accidentale, ed al Capo settentrionale, in autunno, inverno e primavera.

Digitized by Google

Loxia Curvirostra, *Biccu trotu*, *Biccu tortu*, *Pizzu tortu*. Raro, passa in inverno.

Miliaria Projer, *Orgiali*, *Macottu*. Comunissimo, nidificante. Abita ovunque.

Emberiza Cirlus, *Orgiali grogu*, *Macottu giannu*, *Pispanta*. Comune e nidificante. Fa inoltre un passo in autunno e primavera. Abita al piano, ma più specialmente nelle vallate.

Emberiza Cia, *Pispanta*. Accidentale. Lo osservai nel Sassarese.

Emberiza Schœniclus, *Orgiali de is cannas*, *Pispanta de is cannissonis*, *Orgiali de is mustassus*. Comune e nidificante. Abita i canneti lungo gli stagni ed i fiumi in tutte le parti dell' isola.

Melanocorypha Calandra, *Calandrioni*, *Calandria reale*, *Calandria manna*. Comunissima, nidificante. Abita i piani e le collinette in tutta l'isola. Ne ebbi un'albina perfetta.

Calandrella brachydactyla, *Calandriedda*, *Calandrina*, *Staccaterra*, *Taccaterra*, *Terrajola* o *Terraja*. Giunge in principio di primavera, nidifica e parte in autunno. Abita a preferenza i piani d' alluvione, scarsa ai monti. In tutta l' isola, ma più abbondante al Capo meridionale. Ne ebbi un esemplare albino.

Alauda arborea, *Calandriedda*, *Calandrina*, *Chilandrina*. Abita i piani ed i monti, comune e stazionaria in tutta l'isola.

Alauda arvensis, *Calandria*, *Calandriedda*, *Chilandra*. Comune e nidificante, ma vi è però anche un passo regolare dall' autunno alla primavera. Abita a preferenza i colli ed i piani verso il mare. In tutta l' isola.

Galerita cristata. Forse giunge frammista colla precedente nei passi, però non mi fu dato mai di averne un esemplare; io la ritengo specie accidentale per la Sardegna.

Agrodroma campestris, *Pispanta*, *Fanfarrone?*, *Pispoledda*. Giunge in autunno, riparte in primavera. Abita i piani. In tutta l' isola.

Corydalla Richardi, *Calandria*, *Calandriedda a biccu fini*. Raro, di passo in primavera. Nidifica (?).

Digitized by Google

Anthus pratensis, *Pispanta.* Di passo in autunno, riparte o ripassa in primavera. Abita i piani. In tutta l'isola. Ne ebbi un esemplare isabella.

Anthus Spipoletta, *Pispanta*, *Pispanta de riu.* Raro, ma di passo in autunno e primavera. Abita i piani umidi. In tutta l'isola.

Budytes flavus, *Coetta*, *Madiscedda*, *Merisceda*, *Culisalida* (Logudoro), *Curisarida* (Sassarese). Per molti individui stazionario e nidificante. Abita e nidifica sui tetti di alti palazzi e chiese. In tutta l'isola, ma più specialmente la osservai nel Sassarese.

Budytes cinereocapillus, *Coetta*, *Madiscedda*, *Merisceda*, *Culisalida* (Logudoro), *Curisarida* (Sassarese). La notai nidificante sui tetti dell'Ateneo sassarese. In tutta l'isola, ma più specialmente nel Sassarese.

Motacilla alba, *Coetta bianca*, *Coetta*, *Madiscedda*, *Culisalida* (Logudoro). Stazionaria e nidificante per parecchi individui. Avvi un passo nell'autunno ed in primavera. Abita a preferenza i piani e frequenta i fiumi. In tutta l'isola. Giunge al Capo meridionale in settembre.

Calobates melanope, *Coetta*, *Coetta groga*, *ecc.* Di passo in autunno ed in primavera. Abita lungo i fiumi e nei piani. In tutta l'isola. Giunge al Capo meridionale in settembre.

Saxicola Oenanthe, *Culubiancu*, *Coa bianca.* Di passo in autunno e primavera. Abita i piani, e più specialmente le rive del mare e stagni, lungo le dighe. In tutta l'isola.

Saxicola albicollis, *Culu biancu.* Nel settembre, epoca di passo della precedente specie, potei pure avere esemplari della presente, ma raramente.

Saxicola Stapazina, *Culu biancu.* Vedesi ai primi di settembre colle precedenti, ma in passo più regolare ed abbondante, riparte in primavera; per nulla affatto stazionaria.

Dromolæa leucura, *Culu biancu.* Pochi esemplari stazionari, nidificanti; abita luoghi aridi, ma più specialmente nelle buche de' monti calcari: havvene presso Cagliari.

Digitized by Google

Monticola saxatilis, *Sulitariu coa de fogu*, *Cul' arrubiu.* Molto scarso, ma sedentario sugli alti monti: lo predai, come la precedente, presso Piazza d'armi di Cagliari nell'inverno. Più frequente al Capo settentrionale e nella Nurra di Alghero, nonchè all'Asinara.

Monticola Cyanus, *Sulitariu*, *Meurra de arrocca.* Non scarsa come la precedente, ma comune e nidificante, più al Capo settentrionale; abbondante nel Nuorese. In settembre scende al piano ed abita negli edifizi delle città, come a Cagliari ed a Sassari, ove sempre la notai. All'Asinara poi ne presi individui nell'aprile, i quali erano col piumaggio più lucido e di un bel bleu.

Merula nigra, *Meurra*, *Merula.* Comune assai e nidificante. Abita al monte nell'estate, ed al monte come al piano nell'inverno, più specialmente al Capo settentrionale. Presenta però un passo regolare in novembre coi Tordi, gli immigranti ripartono in primavera. Ne ebbi bianchi perfetti ed in parte.

Merula torquata, *Meurra a cannacca*, *Merula giajulada.* Non comune, giunge di passo come la precedente, ma non soffermasi.

Turdus pilaris, *Trudu culumbinu* o *Turdu colori de cenisciu.* Non comune, ma di passo come la precedente, specialmente al Capo settentrionale, ove ne presi ogni anno e ne vidi al mercato. Fui però io il primo a notare certa la comparsa di questa specie in Sardegna. Ne presi lungo i fiumi quasi asciutti ed alle fonti e pozze d'acqua.

Turdus iliacus, *Trudu piticu* o *de mata.* Abbondante nel passo invernale e più al Capo settentrionale nel Sassarese, sempre nei piani e colline d'uliveti.

Turdus musicus, *Trudu*, *Turdu*, *Murtiddus*, *Trudus* (Logudoro), *Coiloro* (Fonni), *Coilongo* (Mamajada). Abbondante nel passo invernale. Ne ebbi a colori sbiaditi tendenti all'isabellismo.

Turdus viscivorus, *Turdu* o *Trudu culumbinu.* Havvene di passo annuale, ma ne osservai nei monti del Nuorese

Digitized by Google

(Ortobene) ed anche nel Fonnese, nel mese di agosto, dei branchetti; non posso assicurare se vi sia nidificante.

Aëdon Luscinia, *Rossignolo*, *Russignolu*. Arriva in aprile, nidifica e parte ai primi di ottobre. Nel 1887 ne presi un individuo albino, che trovasi nel Museo di Cagliari. Abita al piano ed anche al monte. Abbondante nel Sassarese.

Erithacus Rubecula, *Pett' arruviu*, *Chirisi* (Logudoro). Abita al monte nell' estate, ove nidifica, ed ovunque nell' inverno.

Cyanecula Wolfi. Ne predai un individuo femmina, ma più non ne vidi; dunque raro ed avventizio per noi.

Ruticilla Phœnicurus, *Coa de fogu*. Comune, e qualcuno nidifica; fa però specialmente un passo in autunno e primavera. Anche presso Cagliari.

Ruticilla titys, *Coa de fogu*. Scarso, ma di passo annuale.

Pratincola Rubicola, *Punta de canna*. Comune e nidificante, abita specialmente al litorale marino.

Pratincola Rubetra. Raro, alcuni individui al piano in luoghi d' alluvioni. Ne depositai pel primo uno al Museo Cagliaritano, ed a Sassari ne ebbe il Martorelli.

Sylvia cinerea, *Biccafigu*, *Stampacresuras*. Non tanto comune, nidificante, cala al piano nel settembre.

Sylvia Curruca, *Biccafigu*, *Stampacresuras*. Rara ed accidentale.

Sylvia subalpina, *Topi de mata*. Arriva in settembre, parte in primavera. Abita al piano ed al monte.

Sylvia conspicillata, *Topi de mata*. Arriva nell' agosto e sverna, alcune nidificano al monte. Notai che il passo è abbondante e specialmente nelle spiaggie marine, ove invece non se ne trova affatto nel giugno e luglio. Ne ebbi un esemplare affetto d' isabellismo, che inviai a Firenze.

Monachus Atricapillus, *Capinera*, *Conca niedda*. Comune e nidificante, ma abita specialmente al monte. Abbonda nel Sassarese, ove ebbi molti nidi anche singolari.

Digitized by Google

Monachus hortensis, *Biccafigu.* Non comune, di passo irregolare, ne ebbi in agosto ed in primavera. Fui il primo a notare questa specie in Sardegna.

Pyrophthalma melanocephala, *Ogu de boi.* Comunissimo e stazionario.

Melizophilus undatus, *Topi de mata.* Comune, stazionaria, ma in luoghi montuosi, nell'inverno anche al piano.

Melizophilus sardus, *Topi de mata.* Comune, stazionaria, ma sempre al monte.

Phylloscopus Trochilus. Rara, ma certamente giunge nell'isola.

Phylloscopus Bonellii. Ne osservai nel Sassarese in grossi cespugli lungo i fiumi, alcuni anche nel Cagliaritano; dubito che nidifichi, non avendolo mai osservato nei mesi d'estate.

Phylloscopus rufus, *Papa muschitu.* Fa un passo regolare, alcuni nidificano ai monti; comune nell'inverno al monte ed al piano e persino nelle case.

Hypolais icterina. Lo trovai nel Sassarese, ma in scarso numero, e più specialmente nei canneti.

Acrocephalus palustris. Ne predai allo stagno di Sorso (Sassarese), ma è rara e di passo.

Acrocephalus arundinaceus. Scarso, di passo.

Calamodus schœnobænus. Scarso, di passo.

Cettia Cettii. Comune, nidificante, nei paduli.

Cisticola cursitans, *Papa muschitu*, *Puntacanna.* Comune, stazionario.

Troglodytes parvulus. Comune, nidificante al Capo settentrionale e molto nel Sassarese, ove pone il nido frammezzo al Capelvenere. Molto scarso nel Cagliaritano.

Cinclus aquaticus. In diciotto anni non potei osservare che un solo individuo lungo il fiume ai piedi del Genn'argentu, ma mai più potei vederne alcuno, benchè mi abbiano assicurato che lungo il fiume Luculla (Nuoro) se ne trovino.

Regulus cristatus, *Conca d'oru.* Comune nell'inverno, specialmente nel Nuorese, ma non abbondante; abita al piano come al monte.

Digitized by Google

Regulus ignicapillus, *Conca d'oru.* Più comune della precedente, anche nella parte meridionale.

Parus major. Comune, stazionaria, abita al monte ove nidifica, in autunno scende anche al piano.

Parus ater. Non comune come la precedente, abita solo al monte, ove nidifica; più abbondante nel Capo settentrionale e nel Nuorese.

Cyanistes cæruleus. Come il *Parus major;* abbonda nel Sassarese.

Certhia brachydactyla. Di passo accidentale; due individui furono uccisi, ma guasti, al Castello San Michele presso Cagliari l'inverno del 1887-88.

Tichodroma muraria. Raro e predato solo nell'inverno, mai lo osservai nell'estate, perciò non lo credo sedentario.

Oriolus Galbula, *Biccamortus.* Giunge in primavera, nidifica? Io non potei mai avere fra tanti un individuo giovane a conferma.

Lanius Excubitor, *Pitigrussa.* Di passo invernale, la notai benissimo nel Nuorese.

Lanius minor, *Pitigrussa.* Solo di passo in primavera ed al Capo settentrionale in scarso numero.

Lanius Collurio, *Pitigrussa*, *Pitilongu* (Nuorese). Abbondante ed estiva; nidifica, e parte in autunno; abita a preferenza al piano.

Lanius auriculatus, *Pitigrussa*, *Pitilongu* (Nuorese). Estiva e comune.

Muscicapa collaris, *Papamusca.* Di passo accidentale in primavera. Ne ebbi un solo.

Butalis Grisola, *Papamusca.* Comune, giunge in primavera, parte in fin d'autunno. Lo notai ancora nel novembre sotto l'atrio dell'Ateneo Sassarese, ove nidificò.

Hirundo rustica. Comunissima, giunge in aprile ed anche in marzo, riparte in settembre. Notai che alcuni individui anche con inverni rigidi si soffermarono. Ne ebbi bianche ed isabella.

Chelidon urbica, *Culu biancu.* Comunissimo, giunge in primavera e parte in sett. ed alcuni anche alla fine di ott.

Digitized by Google

Clivicola riparia, *Rundili de a' riu.* Non lo potei osservare per bene solo che sui campanili dei paesi presso stagni e paduli, come a Quarto Sant' Elena, a Oristano, a Solarussa e paesi limitrofi a quello stagno e ad altri. È nidificante, ma di passo irregolare per il numero. Ne predai sempre dall' agosto al settembre presso Cagliari ed a Porto Torres, ove si preparano in massa per la partenza.

Cotile rupestris, *Arrundili de a' roca.* Comune e stazionaria, abita luoghi alpestri e scende alle valli lungo i fiumi in cerca d' insetti; la osservai più abbondante in luoghi alti a picco sul mare, come a Capo Carbonara, Spartivento, Capo Caccia ecc.

Cypselus Apus, *Rundonis.* Giunge agli ultimi di marzo e la massa grande ai primi di aprile, parte alla metà di agosto. Ne notai individui, e non pochi, anche a tutto settembre.

Cypselus Melba, *Varzia* o *Rundoni bianca*, *Varzia de' monti.* Giunge in aprile, parte in fin d' agosto ed ai primi di settembre. Abita luoghi a picco sul mare, ed è più abbondante al Capo settentrionale. Solo alcuni individui si vedono misti al precedente.

Caprimulgus europæus. Anco sedentario. Nell' agosto e settembre abita uliveti presso ai vigneti. Abbondante al Capo settentrionale e specialmente lungo i fiumi del Sassarese nell' autunno ed inverno. Potei notare differenze di piumaggio e di mole che meritano accurato confronto.

Picus major, *Papa fromigas.* Comune e stazionario, abita luoghi alpestri e le valli.

Picus minor, *Bicca linna.* Piuttosto raro, ma sedentario, abita le foreste al Genn' argentu, Monte Spada, Nuorese e sul Limbara.

Iynx Torquilla, *Papa fromigas.* Non comune, forse sedentario e se tale lo sarebbe al monte; lo ritengo certamente di passo dall' autunno alla primavera.

Cuculus canorus, *Cucùlo*, *Pachedu* (Arzana). Comune in pri-

Digitized by Google

mavera, genera e parte. È più frequente negli uliveti del Sassarese, e ciò ritengo per l'abbondanza di cibo e di nidi ove deporre le sue uova.

Alcedo Ispida, *Pillone de Santa Maria.* Comune, stazionario; all'epoca della nidificazione si vede però scarsamente perchè nei canneti e nei dintorni di Cagliari, ai canali delle peschiere, non scende che nell'ottobre per svernarvi.

Coracias Garrula. Non la potei notare che per tre anni consecutivi nel piano di Ardara e Chilivani, ove nidifica. A Cagliari ne ebbi due individui giovani. Scarso è il numero, arriva in primavera, parte in settembre.

Merops Apiaster, *Maragan* (Cagliari), *Puzzoni birdi* (Fonni), *Rundini murinisca* (Mamojada), *Abiargiu* (Arzana, Lanusei). Giunge in aprile e maggio, abbondante; nidifica e parte in settembre ed ottobre.

Upupa Epops, *Galett' e-marzo.* Di passo in primavera, nidifica e parte in sett. e ott. I piani di Castiadas e di Chilivani come di Oristano sono i preferiti e vi abbonda.

Strix flammea, *Stria bianca.* Comune, stazionario. Un bello esemplare albino predai nei dintorni di Cagliari, che si conserva nel Museo Cagliaritano. Sonvi individui meritevoli di menzione per differenze di piumaggio ossia nel colorito di esso.

Asio accipitrinus, *Stria groga.* Migratore, non al tutto stazionario. Ho sempre ucciso questa specie durante il passo delle Quaglie alle spiaggie della Plaja (Cagliari) in settembre ed ottobre.

Athene Noctua, *Cucumeu.* Comune e stazionaria.

Scops Giu, *Zonca.* Havvene di passo irregòlare, ma ve ne sono sedentarî, svernano al piano.

Circus æruginosus, *Stori de sa puliga.* Comunissimo, stazionario ovunque sono paduli.

Circus cyaneus, *Stori biancu.* Di passo autunnale, alcune svernano alle vallate ed ai paduli. Non è comune.

Circus Swainsoni, *Storittu biancu.* Come la precedente, con la quale è stata confusa.

Digitized by Google

Pandion Haliaëtus, *Stori de pisci*, *Achili piscadrixi*. Comune e stazionario, qualcuno emigra.

Circaëtus gallicus. Rarissimo, ne ebbi un solo individuo.

Haliaëtus Albicilla. Non tanto comune, ma ne ebbi ogni inverno qualche esemplare. Nidificante.

Aquila Chrysaëtus. Abbastanza comune più al monte che al piano, ove scende raramente in inverno.

Aquila pomarina. Rara ed accidentale. Ne vidi un individuo nel Museo di Cagliari, dato dal Meloni.

Nisaëtus fasciatus, *Achili de pisci*, *Achiloni* (Cagliari). Non tanto comune, ma stazionaria.

Archibuteo lagopus. Accidentale, ma fu presa anche in Sardegna.

Buteo vulgaris. Comunissima e stazionaria; viepiù nel Sassarese. Havvene pure di passo irregolare ben distinte dalle stazionarie per mole e colorito.

Pernis apivorus. Ne vidi un individuo fresco nel Museo di Cagliari, preso dal Meloni. Raro ed accidentale.

Milvus Ictinus. Comune e stazionario.

Falco Peregrinus. Non comune, ma stazionario; può darsi che qualche individuo arrivi in autunno; nell'agosto di quest'anno 1888 ne ebbi due esemplari presi a Donorì (Cagliari).

Falco punicus. Scarso. Lo colsi pel primo a Porto Torres e ne potei pure vedere a Porticciuolo (Porto Conti d'Alghero) sulle roccie a picco sul mare, ove potei benissimo esaminarlo, ma non colpirlo, perchè l'avrei perso nell'abisso. È certo che, benchè raro, è sedentario e nidificante.

Hypotriorchis Eleonoræ. Aggiungo averlo osservato anche a Capo Caccia, Spartivento, all'Isola de'Cavoli, alla Serpentara ed anche a Sant'Elia (Cagliari). Nidificante lo sarà specialmente nelle isolette, ma certo anche a Capo Caccia.

Hypotriorchis Subbuteo. Di passo irregolare in autunno e primavera, ne ebbi dalla Nurra di Portotorres.

Æsalon regulus, *Storittu*, *Vedidore*. Di passo regolare in autunno ed invernale.

Digitized by Google

Cerchneis Tinnunculus. Comune e sedentario.

Cerchneis Naumanni. Di passo in autunno ed in primavera, alcuni svernano e pare che qualcuno si accoppî col precedente.

Cerchneis vespertinus, *Vedidore.* Come la precedente. Io ne ebbi solo esemplari giovani.

Astur palumbarius. Non comune, giungendo esso in autunno, per svernare; è certo però che qualcuno nidifica in Sardegna, e ne predai al Monte Ortobene (Nuoro) nell'agosto, località ove nidifica il Colombaccio.

Accipiter Nisus, *Feridori* e *Vedidore.* Comune, nidificante. Fa pure un passo regolare in autunno rimanendo l'inverno.

Gypaëtus barbatus, *Bentruxiu de' angiom.* Comune e stazionaria. Ne osservai nel 1886 a Correboi (Lanusei) una quantità, erano giovani.

Vultur Monachus. Comune e stazionario.

Gyps fulvus. Comune e stazionario, più abbondante.

Phalacrocorax Carbo. Comune e stazionario.

Phalacrocorax Graculus. Comune assai e stazionario.

Ardea cinerea, *Menga.* Comune, stazionario, ed in parte migratore.

Ardea purpurea, *Menga arrubia.* Di passo in autunno ed in primavera.

Egretta alba, *Menga bianca*, *Garza bianca.* Di passo in autunno ed in primavera, alcuni individui svernano.

Egretta Garzetta, *Garxixedda bianca.* Di passo in autunno ed in primavera, alcuni individui svernano.

Ardeola ralloïdes. Di passo irregolare in primavera ed anche in autunno.

Ardetta minuta. Di passo irregolare in primavera ed anche in autunno, ma meno frequente.

Botaurus stellaris. Comune, giunge in primavera, nidifica e parte.

Nycticorax griseus. Di passo irregolare in primavera ed anco in autunno.

Ciconia alba, *Grua*, *Grui.* Di passo irregolare, rara. Nel 1883

Digitized by Google

ne preparai una presa a Condongianus (Sassari), che è depositata in quel Museo.

Ciconia nigra. Di passo irregolare, in autunno ne ebbi.

Platalea Leucorodia, *Gragallu.* Di comparsa irregolare, ma è certo che giunge in fin d'autunno e parte in primavera. Ne ebbi esemplari adulti e giovani in dicembre come in aprile.

Plegadis Falcinellus, *Taranu.* Di passo irregolare in primavera ed autunno, qualcuno sverna.

Phœnicopterus roseus. Comune e stazionario per molti individui, ma durante questa fermata io vidi sempre esemplari giovani, perciò io credo sia solo un cambio di guarnigione, e che gli adulti durante i mesi della nidificazione emigrino lasciando i giovani. Nel Museo di Cagliari depositai un individuo giovanissimo che appena poteva volare, ucciso verso S. Gilla (stagno di Cagliari); esso misurava (in carne) centim. 84, ma ciò non ostante lo ritengo proveniente dalla Tunisia; l'uccisi nell'agosto. Io ho fatto ricerche sopra ricerche, ma mai mi fu dato trovare non solo vestigio di nido, e neppure uova abbandonate; dunque escludo affatto la nidificazione del Fiammante in quest'isola.

Cygnus Olor, *Cisini.* Giunge accidentalmente spinto da temporali, io pure ne vidi un individuo nello stagno di Cagliari ed in giorno di burrasca invernale.

Cygnus musicus, *Cisini.* Di casuale comparsa nell'inverno.

Anser cinereus, *Cisini.* Taluni inverni rigidi capita in branchi coll' *A. segetum*, ma non fa passo regolare.

Anser segetum, *Cisini.* Di passo invernale regolare.

Tadorna cornuta, *Anariera.* Di passo in autunno e primavera; molte svernano e molte anche si soffermano per la nidificazione, che succede in insenature del mare coperte di tamarischi, in piccoli e grandi stagni presso le dune e più specialmente in quelle dell'Asinara e di Sorso, ove sempre ne trovai.

Anas Boscas. Di passo in autunno, svernante; è assai comune e anco nidificante.

Digitized by Google

Chaulelasmus streperus. Di passo in autunno, sverna, ed è abbastanza comune.

Spatula clypeata, *Cuciarone.* Di passo abbondante in autunno e primavera, molti svernano.

Dafila acuta, *Agu.* Di passo abbondante in autunno e primavera, molti svernano.

Mareca Penelope, *Anari conc' arrubia.* Di passo in autunno e primavera; allo stagno di Sorso ne trovai nidificanti molte coppie.

Nettion Crecca, *Circuredda.* È di passo in autunno, sverna; ma è più abbondante in primavera. Alcune nidificano.

Querquedula Circia, *Circuredda a conca bianca.* È di doppio passo e svernante. Molte nidificano.

Fuligula rufina, *Piberoni.* Sono di passo doppio, alcuni svernano e qualche coppia nidifica. Ebbi le uova.

Fulix ferina, *Busciu.* Arriva in autunno, parte in primavera; è specie assai abbondante sullo stagno di Cagliari, ove ne fanno attiva caccia.

Fulix Marila, *Niedduzzu.* Rara, giunge in autunno e parte in primavera. Ne ebbi un solo individuo, che trovasi al Museo di Sassari, ed uno esiste in quello di Cagliari.

Fulix Fuligula, *Niedduzzu.* Arriva in autunno e sverna.

Fulix Nyroca, *Niedduzzu.* Arriva in autunno e sverna.

Bucephala Clangula, *Anari a ulieras.* Raro nei passi.

Œdemia fusca, *Anari a caparuccia.* Forse non rara come credesi e mista colle precedenti, invernale.

Erismatura leucocephala, *Anari de Spagna.* È specie di doppio passo, molti svernano ed alcuni nidificano al Capo settentrionale nello stagno di Sorso, ove spesso si vedono traversare quelle dune per andare o ritornare dallo stagno al mare, misti colla *Tadorna* e colla *Fuligula rufina.*

Mergus Merganser, *Strallera.* È piuttosto raro, trovasi nell'autunno ed in inverno.

Mergus Serrator, *Strallera.* Comune, giunge in autunno e parte in primavera.

Digitized by Google

Mergellus Albellus, *Strallera bianca.* Piuttosto scarsa, alcune arrivano in fin d'autunno e svernano.

Columba Palumbus, *Tidori* (Fonni). Comune e nidificante nelle foreste, specialmente al Capo settentrionale; ebbi da Nuoro dei pulcini. Fa un passo abbondante in fine d'autunno con partenza in primavera.

Columba Oenas, *Colombella.* Giunge in autunno, parte in primavera, ma ritengo che alcuni individui nidifichino, avendone io ucciso al Capo settentrionale in luglio.

Columba livia, *Colombu de is arrocas.* Comunissimo, stazionario, ma anche di passo colla precedente.

Turtur tenera, *Tortora* (ad Arzana e Lanusei). Di passo ed estiva; giunge in aprile e maggio, parte ai primi di settembre la grande massa e gradatamente sino ai primi di ottobre le altre.

Perdix petrosa, *Predixi* e *Predixis* (Lanusei), *Pudda de mata* (Fonni). Comune e stazionaria. Ebbi due esemplari con colori al tutto sbiaditi, tendenti all'isabellismo e all'albinismo.

Coturnix communis, *Quagliari.* Comune, nidificante e di doppio passo. Ebbi, ed è nel Museo Cagliaritano, un bell'esempio d'isabellismo.

Rallus aquaticus. Comune e stazionaria.

Ortygometra Porzana. Ve ne sono di passo, ma è assicurato che al Capo di Sassari nidifica e staziona.

Ortygometra Bailloni. Come la precedente, ma più rara.

Ortygometra parva. Come la precedente.

Gallinula chloropus. Comune e stazionaria.

Porphyrio caeruleus. Ne ebbi in tutte le stagioni, come pure ebbi i giovani; durante i mesi d'estate li ho sempre sentiti cantare fra i folti canneti dello stagno di Cagliari. Ne ebbi pure da Lunamatrona.

Crex pratensis. Raramente si uccide quest'uccello in Sardegna, dunque avventizio, in autunno e primavera.

Fulica atra, *Fuliga*, *Folaga.* Di passo in autunno, parte in primavera. Molte anco stazionarie e nidificanti.

Digitized by Google

Fulica cristata, *Puliga a chighirista* o *inchighiristada*. Rarissima ed accidentale.

Grus communis, *Grui*, *Grue*. Di passo irregolare in inverno; ne ebbi qualche volta in primavera e dall'interno dell'isola.

Otis Tetrax. Giunge in autunno e parte in primavera; solo qualche coppia rimane e nidifica.

Œdicnemus scolopax. Comune, stazionaria.

Charadrius Pluvialis. Giunge in autunno e parte in primavera. Il passo è numeroso nei piani di Chilivani ed Ozieri.

Squatarola helvetica. L'ebbi tanto in fine di ottobre come in primavera, credo certo che sverni. Non l'ho mai uccisa colla precedente, ma al contrario sulla spiaggia marina e delle Saline di Cagliari.

Eudromias Morinellus, *Culingioni de terra*, *Pivieri*. Giunge in autunno e sverna. Li ho sempre trovati in piccoli branchi anche in altipiani.

Ægialitis cantiana. Comune, stazionario.

Ægialitis curonica, *Zurruliu conca Molenti*. Piuttosto raro e di passo, non ne ebbi che tre esemplari. Dubito che nidifichi da noi.

Ægialitis Hiaticula, *Zurruliu conca Molenti*, *Zurruliu de mari a cannacca*. Comune e nidificante, ma ve ne sono di passo nell'autunno.

Vanellus Capella. Di passo abbondante in autunno, sverna.

Strepsilas Interpres, *Turturi de mari*. Ne ebbi in agosto, in autunno, in inverno ed in primavera, e sempre ne vidi e ne uccisi più d'uno in un colpo non lungi dal ponte della Scaffa (Cagliari). Il 28 agosto 1888 ne presi due: erano soli ed erano ♂ e ♀.

Hæmatopus Ostralegus, *Becaccia de mari*. Come la precedente specie, isolato od a coppie. Non rimane a nidificare.

Recurvirostra Avocetta. La vidi e presi sempre in inverno e primavera, ma non è di passo regolare; vi sono anni che arriva in grandi masse e anni in cui è assai scarsa e rara. Parte in marzo.

Digitized by Google

Himantopus candidus, *Cavalier d'Italia* (Cagliari). Solo di passo in primavera ed in numero scarso.

Pelidna maritima. Ne ebbi un solo individuo nel dicembre del 1878, che spedii a Torino.

Pelidna subarquata. Comune, arriva in agosto e settembre, parte al principio d'estate. Abbonda nell'inverno.

Pelidna alpina, *Beccacinu differenti.* Come il precedente.

Actodromas minuta. Ne uccisi in ogni stagione, sarebbe nidificante? Fa inoltre passo in autunno e primavera.

Actodromas Temmincki. Di solo passo in autunno e primavera, ma in scarso numero. Al Capo settentrionale ne ebbi in maggio, ma anche in dicembre.

Tringa Canutus. Ne colsi individui in novembre e febbraio, ma è di comparsa rara.

Calidris Arenaria, *Zurruliu de mari.* Non comune; giungè di passo in autunno e sverna, ma è probabile assai che alcuni nidificano da noi, avendone uccisi esemplari in estate ed individui ♀ feconde, che feci osservare e depositare nel Museo di Cagliari.

Machetes Pugnax, *Beccacinu peis grogus.* Di passo regolare; trovasi dall'agosto a tutto aprile.

Tringoïdes Hypoleucus, *Zurruliu de i' spiaggia.* Comune, stazionario e nidificante. Giunge anche per svernare in agosto, parte al principio d'estate.

Totanus Ochropus. Ve ne sono di passo come del precedente, ma è abbondante e nidificante in tutta l'isola.

Totanus Glareola, *Beccacinu differenti.* Ve ne sono dall'agosto all'aprile, ed alle volte di passo abbondante.

Totanus stagnatilis, *Zurruliutedda.* Piuttosto raro, ma ne ebbi e ne depositai nel Museo di Cagliari, presi in settembre ed in aprile nelle Saline presso Cagliari.

Totanus nebularius. Piuttosto rara, ma ne ebbi in autunno ed in primavera.

Totanus Calidris. Comune e abbondante di passo; vedesi dall'agosto a tutta la primavera, alcune nidificano nell'isola.

Totanus fuscus. Non comune, ne ebbi in autunno ed in primavera.

Digitized by Google

Limosa melanura. Piuttosto rara. In autunno come in inverno ne ebbi.

Limosa rufa. Rara assai in autunno ed inverno.

Scolopax Rusticula. Di passo abbondante. Giunge in novembre e parte in fine di febbraio e marzo.

Gallinago major. Comune. Giunge in settembre ed in primavera, alcuni svernano.

Gallinago cælestis. Giunge in autunno, parte in primavera. Poche coppie credo nidifichino, giacchè ne ebbi ad Ardara come ad Assemini in luglio ed agosto.

Gallinago Gallinula. Giunge in autunno, parte in primavera.

Numenius Arquata, *Zurruliota.* Comune e forse nidificante, havvene pure di passo invernale.

Numenius tenuirostris, *Zurruliota.* Non comune, passa in autunno ed in primavera.

Numenius Phæopus, *Zurruliota.* Non comune, passa in autunno ed in primavera, ma ne presi pure uno ai primi d'agosto.

Glareola Pratincola. Non comune. In primavera solo potei averne.

Sylochelidon caspia, *Maragan de mari mannu.* Di rara comparsa al litorale marino di Cagliari, ove solo potei osservarlo questa scorsa primavera in aprile verso Giagino (Cagliari) senza poterlo prendere.

Thalasseus cantiacus, *Maragan a peis nieddus.* Di passo in autunno, sverna e parte in principio d' estate. Piuttosto scarso.

Gelochelidon anglica, *Maragan a peis nieddus.* Raro, di passo in primavera. Ne uccisi uno ♂ adulto l'8 aprile 1886 a Ponte Corvo (Elmas), mentre si dilettava a cacciar lucertole.

Sterna fluviatilis, *Maragan de mari peis arrubius.* Giunge in primavera, nidifica e parte. Alcune si vedono in autunno, di passo.

Sternula minuta, *Runduledda marina.* Giunge in primavera, nidifica e parte.

Hydrochelidon hybrida, *Caiteddu.* Fui il primo ad averne

Digitized by Google

tre esemplari nell'inverno e primavera del 1888, tutti giovani.

Hydrochelidon leucoptera, *Caitedda peis arrubius.* Fui il primo ad avere questa specie in Sardegna; ne depositai al Museo di Cagliari. È raro e di doppio passo.

Hydrochelidon nigra, *Caitedda peis nieddus.* Giunge in primavera, alcuni nidificano e partono in settembre ed ottobre. Alcuni svernano.

Chroocephalus minutus. Di passo irregolare e non comune. Ne uccisi in luglio ed agosto.

Chroocephalus melanocephalus, *Cau*, *Cau de mari.* Raro, di passo irregolare. Ne uccisi e depositai uno nel Museo di Cagliari nell'inverno del 1880.

Chroocephalus ridibundus. Giunge in autunno, parte in principio d'estate. Molti nidificano nell'isola.

Gelastes Genei, *Cau arrosa.* Non comune, vagante; presso Cagliari l'ebbi solo, più comunemente in primavera avanzata in perfetto abito di nozze e pochi giovani. Nidifica da noi.

Larus canus, *Cau mannu.* Comune, nidificante.

Larus Audouini, *Cau de mari.* Non facile ad aversi perchè vagante per le coste. Ne uccisi pure allo Stagno e nell'anno 1881 e 1882 ne vidi molti nel porto di Porto Torres. Nidifica nell'isola.

Larus fuscus, *Cau brasciu.* Il 25 ottobre ed in novembre del 1886 cedei al Museo di Cagliari due esemplari. Del resto ritengo non essere raro, ma vagante come il precedente e nidificante.

Larus cachinnans. Comune, stazionario.

Larus marinus. Di passo accidentale.

Stercorarius pomatorhinus. Di passo accidentale. Fui il primo ad ucciderne uno presso lo stagno di Cagliari nel marzo del 1878; è depositato in quel Museo.

Puffinus anglorum, *Giaurru.* Stazionaria sulle nostre coste ed isolette. Nel 1882 in giugno a Capo Caccia (Alghero) e nel 1885 in aprile all'Isola dei Cavoli ed a Capo Spartivento ne trovai un'infinità, parte annegate in

Digitized by Google

mare e parte putrefatte fra le scogliere, certo a causa di temporale o ciclone.

Puffinus Kuhli. Stazionaria tra le isolette, vagante e nidificante. Nei mesi d'estate s'avvicinano ai nostri porti ed i pescatori ne fanno buona preda coll'amo.

Procellaria pelagica. Un individuo fu da me catturato nel golfo di Cagliari. Solo due ne ebbi dacchè sono in Sardegna; vi nidifica (?)

Utamania Torda, *Dottori* (Cagliari). Di passo in primavera. In questi due ultimi anni 1887 e 1888 ho osservato esservene grande numero, nel porto di Cagliari fra i bastimenti tranquillamente si tuffavano, e ne vennero prese parecchie coll'amo, colle fiocine e dai monelli anche con pietre.

Fratercula arctica, *Pulcinella de mari*, *Dottori*, *Nasone.* Ne acquistai da pescatori di mare alcune in primavera prese coll'amo e nelle reti, ma è rara. In questa primavera 1888 ne mandai un individuo fresco a Torino.

Colymbus glacialis, *Gangorra.* Di passo accidentale in inverno, ma molto raramente.

Colymbus arcticus, *Gangorra.* Di passo irregolare, raro. Due esemplari giovani vennero da me depositati nel Museo di Cagliari uccisi allo stagno S. Gilla.

Colymbus septentrionalis, *Gangorra.* Di passo irregolare, ma più comune anche nello Stagno.

Podiceps cristatus, *Gangorra.* Giunge di passo in autunno e sverna; alcuni nidificano, specialmente al Capo settentrionale, ove sempre ne vidi allo stagno di Sorso.

Podiceps cornutus, *Gangoredda.* Questa specie fu sempre confusa colla seguente; rara, ma è certa la sua casuale comparsa nell'isola.

Podiceps nigricollis, *Gangoredda.* In gran numero sverna in Sardegna sui nostri stagni, qualche coppia vi nidifica.

Podiceps fluviatilis, *Cazzoleddu.* Comune e nidificante, ma fa pure un passo invernale numeroso.

Digitized by Google

CORSICA.

Come appendice a questa parte del mio Resoconto aggiungo un elenco degli uccelli della Corsica, isola la cui fauna ha per noi un interesse specialissimo. Questo elenco è il risultato delle osservazioni giornaliere fatte durante quasi due mesi di permanenza nell'isola: nel settembre e ottobre 1877 io la percorsi tutta da N. a S. attraversandone il centro sulla linea Corte, Vivario, Ghisoni, Zicavo, Sartene e Bonifacio; e, seguendo le sinuosità del litorale, ne feci il giro completo, colla eccezione di un breve tratto della costa orientale tra Portovecchio e Biguglia. Nell'ottobre 1889 esplorai più specialmente i dintorni di Bastia e quelli di Corte. Alle mie osservazioni ho voluto aggiungere i risultati di quelle dei signori C. Bygrave Wharton e John Whitehead, i quali si occuparono in modo speciale dell'avifauna della Corsica e pubblicarono elenchi degli uccelli veduti e raccolti in quell'isola;[1] essi sono, per quanto mi consta, i soli che resero di pubblica ragione un tale studio. Il Bygrave Wharton soggiornò nell'isola circa otto mesi, cioè dal settembre 1874 al giugno 1875, ed osservò 113 specie di uccelli; il Whitehead vi rimase in due riprese, tra il 1882 e il 1884, circa quindici mesi; la sua lista contiene 176 specie. Possiamo quindi ritenere che il seguente elenco, in cui sono registrate 220 specie, dia un quadro quasi completo dell'avifauna côrsa e che ben poche specie ponno esser sfuggite alle nostre ricerche; colle iniziali *B.* (Bygrave), *W.* (Whitehead) e *G.* (Giglioli), ho creduto utile indicare chi di noi ha osservato la specie citata.

---

[1] C. Bygrave Wharton, *Notes on the ornithology of Corsica.* «Ibis», ser. III, vol. VI, p. 17. London 1876. John Whitehead, *Ornithological notes from Corsica.* «Ibis», ser. V, vol. III, p. 24. London 1885.

Digitized by Google

Elenco delle specie di uccelli osservate in Corsica, con alcuni nomi volgari locali e notizie di frequenza, ubicazione, ecc. ecc. [1]

Corvus Corax, *Corbu*, *Corbo*. Comune e sedentario (*B. W. G.*); nidifica in aprile e maggio.

Corvus Corone, *Corbu*. Scarsa nell'inverno (*W.*); trovata col nido in costruzione il 30 aprile (*B.*).

Corvus Cornix, *Cornacchia*. Comune e sedentaria (*B. W. G.*).

Corvus frugilegus, *Corvo*, *Corbu*. Invernale, abbonda sul lato orientale (*W.*).

Lycos Monedula. Scarsa, invernale (*W.*).

Pica rustica. Il 16 settembre 1877 vidi un individuo di questa specie, non citata da altri osservatori, presso Corte (*G.*).

Garrulus glandarius, *Ghiandaia*. Abbastanza frequente, sedentaria (*B. W. G.*).

Pyrrhocorax alpinus. Abbondante ai monti, forse sedentario (*W.*); veduto nella Valle della Restonica il 5 ottobre 1889 (*G.*).

Pyrrhocorax Graculus. Cinque veduti il 29 gennaio ed il 16 marzo (*W.*).

Sturnus vulgaris. Scarso, invernale (*B. W.*); veduto in grossi stormi presso Sagone il 5 ottobre 1877 (*G.*).

Sturnus unicolor. A Sartene ed a Bonifacio mi fu detto che lo Storno nero si vede non di rado, ma non è sedentario; io non ne vidi (*G.*).

Fringilla cœlebs, *Cione*, *Nivaiolo*. Comune e sedentario (*B. W. G.*).

---

[1] Feci il possibile per raccogliere quanti più nomi volgari di uccelli potevo, ma dovetti ben presto persuadermi che in Corsica, forse perchè non le cacciano abitualmente, moltissime delle specie non sembrano avere un nome volgare proprio e non poche specie vengono designate col medesimo nome; ciò non è davvero il caso sul continente italico.

Digitized by Google

Fringilla Montifringilla, *Pinziolo*. Di passo in ottobre (*G.*).

Petronia stulta. Scarsa (*B.*); ma sedentaria e nidificante ai monti (*W.*).

Passer Italiæ, *Cardaino*. Abbondante e sedentaria (*B. W. G.*).

Coccothraustes vulgaris, *Pizzigone*. Non raro, ma localizzato; sedentario (*W. G.*).

Ligurinus Chloris, *Verdone*. Comune e sedentario (*B. W. G.*).

Chloroptila Citrinella, *Lueru*. Comune e sedentario (*B. W. G.*); il 29 aprile trovai un nido coi piccini sulla costa, i più nidificano ai monti (*W.*).

Chrysomitris Spinus. Invernale (*W.*).

Carduelis elegans, *Cardellina*. Abbondante e sedentario (*B. W. G.*).

Serinus hortulanus, *Ziverino*. Comune e sedentario (*B. W. G.*).

Cannabina Linota, *Fanetto*. Comune, ma specialmente invernale, pochi rimangono a nidificare (*B. W. G.*).

Loxia Curvirostra. Comune e nidificante ai monti nelle foreste di pini (*W.*).

Miliaria Projer. Comune e sedentario (*B. W. G.*).

Emberiza Cirlus. Comune e sedentario (*B. W. G.*).

Emberiza Hortulana. Alcuni veduti in aprile e maggio a Biguglia (*B.*).

Emberiza Schœniclus. Scarso, invernale (*B. W.*).

Melanocorypha Calandra, *Peúda*. Scarsa (*G.*).

Calandrella brachydactyla. Abbondante e nidificante sul litorale orientale (*W.*).

Alauda arborea, *Peúda*. Comune e sedentaria (*B. W. G.*).

Alauda arvensis, *Peúdà*. Invernale e non tanto comune (*B. W. G.*).

Agrodroma campestris, *Peúda*. Comune, specialmente d'inverno (*W. G.*).

Anthus pratensis, *Peúda*. Comune (*G.*); invernale (*W.*); sedentaria (*B.*).

Anthus trivialis, *Peúda*. Veduto in aprile (*B. W.*).

Anthus obscurus. Un solo esemplare ucciso il 25 marzo; erano diversi in un padule (*W.*).

Digitized by Google

Budytes flavus. Abbondante di passo in aprile e maggio (*B. W.*).

Budytes cinereocapillus. Trovata insieme alla specie precedente in aprile (*B. W.*).

Motacilla alba, *Culitremola.* Abbastanza frequente nell'autunno ed inverno (*B. W. G.*).

Calobates melanope, *Culitremola.* Comune e sedentaria (*B. W. G.*).

Saxicola Oenanthe. Estivo e abbastanza frequente (*B. W. G.*).

Monticola Cyanus, *Merlo petraiolo.* Comune e sedentaria (*B. W. G.*).

Merula nigra, *Merlo.* Comune e sedentario, più abbondante nell'inverno (*B. W. G.*).

Merula torquata. Veduto una sola volta il 12 marzo (*W.*).

Turdus pilaris. Alcune vedute tra il 12-16 marzo 1883 (*W.*).

Turdus iliacus. Due soli veduti nel febbraio (*B.*).

Turdus musicus, *Tordano.* Abbondante durante l'inverno (*B. W.*).

Turdus viscivorus, *Trizzine.* Scarsa, ma sedentaria (*W. G.*).

Aëdon Luscinia, *Rossignolo.* Estivo e comune (*B. W. G.*).

Erithacus Rubecula, *Pettirosso.* Comune e sedentario (*B. W. G.*).

Cyanecula Wolfi. Scarso alla fine di marzo ed in aprile (*B. W.*).

Ruticilla Phœnicurus, *Nuaggiolo.* Abbastanza frequente in marzo-aprile (*B. W.*).

Ruticilla titys. Comune nell'inverno, forse nidificante ai monti (*B. W.*).

Pratincola Rubicola, *Prete* (♂), *Nonna* (♀). Abbondantissimo e sedentario (*B. W. G.*).

Pratincola Rubetra. Di passo in aprile (*W.*); forse estivo (*B.*).

Sylvia cinerea. Estiva, ma non frequente (*B. W.*).

Sylvia Curruca. Abbastanza comune e sedentaria (*W.*).

Sylvia subalpina. Estiva e comune (*W.*); ucciso a Corte in ottobre (*G.*).

Sylvia conspicillata. Abbastanza frequente e sedentaria (*W. G.*).

Digitized by Google

Monachus Atricapillus, *Terraiolo*, *Capinera*. Comune e sedentaria (*B. W. G.*).

Pyrophthalma melanocephala. Comune e sedentario (*B. W. G.*).

Melizophilus undatus. Assai localizzata, veduta in febbraio (*W.*); incontrata presso Ajaccio e nel golfo di Porto 4–7 ottobre (*G.*).

Melizophilus sardus, *Schizzu*. Comune e sedentaria (*B. W.*); la trovai singolarmente abbondante nei dintorni di Corte (*G.*).

Phylloscopus sibilator. Veduto dopo il 10 aprile (*B.*).

Phylloscopus Trochilus. Abbastanza frequente in aprile (*B.*); anche in marzo (*W.*).

Phylloscopus rufus. Invernale e abbondante (*B. W.*).

Hypolais polyglotta. Ucciso presso Portovecchio il 26 settembre (*G.*).

Acrocephalus streperus. Scarsa sul litorale orientale (*B. G.*).

Acrocephalus arundinaceus. Veduto solo di passo in maggio (*W.*).

Calamodus schœnobænus. Comune a Biguglia in aprile (*B.*); veduto il 5 ottobre presso Sagone e l'11 ottobre a Ostriconi (*G.*).

Calamodus aquaticus. Scarso nei paduli di Biguglia in aprile (*B.*).

Lusciniola melanopogon. Preso nelle vicinanze di Ajaccio in gennaio (*B.*); ucciso in novembre (*W.*).

Cettia Cettii. Comune e sedentario nei luoghi paludosi (*B. W. G.*).

Cisticola cursitans. Comune e sedentario nei luoghi paludosi (*B. W. G.*).

Troglodytes parvulus, *Mucchiaiolo*, *Muraiolo*. Comune e sedentario (*B. W. G.*).

Cinclus aquaticus, *Merlo pescatore*. Scarso lungo i corsi d'acqua tra i monti (*B. W.*); comune e sedentario, lo trovai abbondante lungo il Tavignano, la Restonica e l'Orta presso Corte, tutti quelli da me veduti avevano l'addome scuro della varietà *melanogaster*, quasi senza traccie di bruno-rosso (*G.*).

Digitized by Google

Accentor modularis. Invernale e non molto frequente (*B. W.*).

Regulus cristatus. Abbastanza comune nelle foreste sui monti (*W.*).

Regulus ignicapillus. Sedentario anche al piano (*B. W. G.*); i diversi individui da me esaminati non differivano da quelli del continente (*G.*).

Acredula Irbyi. Abbastanza frequente e sedentario (*B. W. G.*).

Parus major, *Capinera.* Abbondante e sedentaria (*B. W. G.*).

Parus ater. Comune nelle foreste sui monti (*B. W. G.*).

Cyanistes cæruleus, *Sturzapridi.* Assai comune e sedentaria (*B. W. G.*).

Sitta Whiteheadi, *Pichiu.* Dicesi comune; l'estate nelle foreste di pini ai monti, ove nidifica; d'autunno e d'inverno erratico, anche al piano (*W. G.*). Non può lodarsi il sistema tenuto dal signor Whitehead per questa e per altre specie di tacere le località ove le trovò; io vidi questa specie una sola volta al Ponte alla Leccia sul Golo il 16 settembre 1877, la credetti la comune *S. cæsia* e non mi curai di tirare su quell'uccello (*G.*).

Certhia familiaris ?, *Pichiu.* Sedentario, ma non abbondante, nelle foreste di montagna (*W.*); veduto nei castagneti presso Corte l'8 aprile (*B.*). Dalla descrizione datane dal Whitehead il Rampichino côrso sarebbe questa specie, e non la *C. brachydactyla*; a me non riuscì vederne, onde la quistione rimane per me insoluta (*G.*).

Oriolus Galbula. Abbondante durante il passo in aprile e maggio (*B. W.*).

Lanius Collurio. Estiva e comune (*W.*); ne trovai una giovane presso Corte l'8 ottobre (*G.*).

Lanius auriculatus, *Caporosso.* Estiva e comune (*B. W.*).

Muscicapa collaris. Un esemplare ucciso il 10 aprile presso Bastia (*B.*).

Muscicapa Atricapilla. Abbondante di passo nella seconda metà di aprile (*B. W.*).

Butalis Grisola. Estivo e comune (*B. W.*).

Hirundo rustica, *Róndina.* Estiva e comune (*B. W. G.*).

Chelidon urbica, *Curiancola.* Estivo e comune (*B. W. G.*).

Digitized by Google

Clivicola riparia. Vedesi numeroso in marzo-aprile, ma di solo passo (*B. W.*); veduto tra Ajaccio e Cargese il 5 ottobre (*G.*).

Cotile rupestris, *Róndina.* Abbonda ed è sedentaria tra le rupi, di rado scende al piano (*B. W. G.*).

Cypselus Apus, *Sbira*, *Spirlo.* Estivo e comune (*B. W. G.*).

Cypselus Melba. Meno comune, nidifica tra le rupi inaccessibili (*W.*).

Caprimulgus europæus, *Buccaccio.* Piuttosto frequente, estivo (*W. G.*).

Picus major, *Pichiu.* Comune e sedentario; vive nelle foreste ai monti e scende al piano col freddo (*W. G.*).

Gecinus viridis. Fui assicurato dal prof. Combe a Corte che questa specie trovasi nell' isola, ma non è comune; egli mi disse di averne ucciso uno in quei pressi.

Iÿnx Torquilla. Scarso, vedesi anche nell' inverno (*B. W.*).

Cuculus canorus, *Cucc.* Estivo e frequente (*B. W.*).

Alcedo Ispida. Piuttosto frequente in autunno e nell' inverno (*B. W. G.*).

Merops Apiaster, *Maduraiolo.* Estivo e comune in località adatte (*B. W. G.*).

Upupa Epops, *Pappagallo.* Estiva e abbastanza frequente (*B. W. G.*).

Strix flammea. Un solo veduto (*W.*).

Asio Otus. Avuto una volta in dicembre (*W.*).

Asio accipitrinus. Scarso; avuto in dicembre (*W.*); ucciso in aprile (*B.*).

Athene Noctua, *Carcavicchiola.* Non rara e sedentaria (*G.*).

Scops Giu, *Carcavicchiola*, *Malagella.* Estivo e comune (*W. G.*).

Circus æruginosus. Abbondante e sedentario (*B. W. G.*).

Circus cyaneus. Alcune vedute durante l' inverno (*B. W.*); veduto in settembre ed ottobre (*G.*).

Circus Swainsoni. Veduta tra Ajaccio e Sagone il 5 ottobre (*G.*).

Circus cineraceus. Veduta il 17 novembre (*W.*).

Pandion Haliaëtus. Abbastanza frequente e anche sedentario (*W. G.*).

Digitized by Google

Haliaëtus Albicilla. Si vede sui paduli nell'inverno, qualche coppia potrebbe anche essere sedentaria (*W.*).

Aquila Chrysaëtus, *Acula.* Sedentaria sugli alti monti (*W. G.*).

Nisaëtus fasciatus. Veduta il 26 settembre presso Portovecchio; era un individuo giovane (*G.*).

Buteo vulgaris, *Falco.* Comune e sedentaria (*W. G.*).

Pernis apivorus. Veduto il 9 ottobre presso Barghetta (*G.*).

Milvus Ictinus, *Filancio.* Comune e sedentario (*B. W. G.*).

Falco Peregrinus. Scarso, ma sedentario (*B. G.*); lo vidi tra i monti dell'interno (*G.*).

Falco punicus. Più frequente forse della specie precedente lungo il litorale roccioso, ove è sedentario (*W. G.*).

Hypotriorchis Subbuteo. Veduto il 7 ottobre presso Corte (*G.*).

Hypotriorchis Eleonoræ. Di dubbiosa comparsa (*W.*).

Æsalon regulus. Veduto in settembre e ottobre nei pressi di Bonifacio (*G.*).

Cerchneis Tinnunculus. Più frequente nell'inverno, ma anche sedentario (*B. W. G.*).

Astur palumbarius. Un giovane veduto presso Zicavo il 21 settembre (*G.*).

Accipiter Nisus. Sedentario, ma più comune nell'autunno (*W. G.*).

Gypaëtus barbatus, *Altore.* Scarsa, ma sedentaria sugli alti monti del centro (*W. G.*).

Vultur Monachus, *Avvoltoio.* Veduto il 26 settembre a Portovecchio (*G.*).

Pelecanus Onocrotalus? Di comparsa accidentale (*W. G.*).

Phalacrocorax Graculus. Abbondante e sedentario lungo il litorale (*B. W. G.*).

Ardea cinerea. Comune e probabilmente sedentario (*B. W. G.*).

Ardea purpurea. Comune in aprile, di passo (*W.*).

Egretta alba. Veduta a Biguglia il 30 aprile (*B.*).

Egretta Garzetta. Due uccise in aprile (*W.*).

Ardeola ralloïdes. Veduta in aprile e maggio (*B. W.*).

Ardetta minuta. Di passo in aprile (*B.*).

Botaurus stellaris. Sembra essere invernale, si ebbe in dicembre, febbraio e marzo (*B. W.*).

Digitized by Google

Nycticorax griseus. Di passaggio in aprile (*W.*).

Ciconia alba. Accidentale, una sola veduta il 2 aprile (*W.*).

Ciconia nigra. Ne vidi due presso Portovecchio il 26 settembre (*G.*).

Plegadis Falcinellus. Fui assicurato a Bonifacio che si vede di doppio passo quasi regolare (*G.*).

Phœnicopterus roseus. Capita non tanto di rado (*W.*); uno ucciso a Portovecchio nel marzo 1877 (*G.*).

Anser segetum. Invernale (*W. G.*).

Tadorna cornuta. Questa specie mi venne descritta come di frequente comparsa a Bonifacio; io non ne vidi (*G.*).

Anas Boscas. Comune e anco nidificante (*B. W. G.*).

Chaulelasmus streperus. Invernale, ucciso l' 11 febbraio (*W.*).

Spatula clypeata. Invernale e specialmente abbondante in febbraio e marzo (*W.*).

Dafila acuta. Abbondante in febbraio e marzo (*W.*).

Mareca Penelope. Comune durante l'inverno (*B. W.*); veduto in mare tra Isola Rossa e San Fiorenzo l' 11 ottobre (*G.*).

Nettion Crecca. Abbondante nell' inverno (*B. W.*).

Querquedula Circia. Uccisa in gennaio (*B.*); comune in marzo ed aprile (*W.*).

Fuligula rufina. Fui assicurato che capita d' inverno a Portovecchio (*G.*).

Fulix ferina. Abbondante in febbraio e marzo (*W.*).

Fulix Marila. Abbastanza frequente nell' inverno (*W.*).

Fulix Fuligula. Abbondantissima durante l' inverno (*B. W.*).

Bucephala Clangula. Invernale (*W.*).

Œdemia fusca ? Invernale (*W.*).

Erismatura leucocephala. Veduto a Biguglia l' 8 marzo (*B.*); nidificante e sedentario (*W.*).

Mergus Serrator. Ucciso in dicembre (*B.*); scarso, invernale (*W.*).

Columba Palumbus, *Colombo collado.* Comune durante l' inverno, ma anche sedentario e nidificante (*B. W. G.*).

Columba Oenas. Il 5 ottobre del 1877 ne trovai una presso Ajaccio, a metà divorata da un Falco (*G.*).

Digitized by Google

Columba livia, *Colombo petraiolo.* Sedentario e comune (*B. W. G.*); lo trovai abbondante nella grotta Dragonale presso Bonifacio (*G.*).

Turtur tenera, *Colombi.* Estiva e comune, giunge dopo la metà di aprile (*B. W.*); ne vidi alla fine di settembre (*G.*).

Phasianus colchicus, *Fascianu*, *Faggianu.* Sedentario, trovasi soltanto nel piano di Fiumorbo, ove ne uccisi due in due mesi di permanenza (*W.*). Abbastanza frequente ancora nei macchioni e boschi cedui del distretto di Ghisonaccio sulla costa orientale; fui assicurato che nell' inverno 1888–89 molti furono presi (*G.*).

Perdix rufa, *Pernice.* Comune e sedentaria specialmente ai colli, e nel S. dell' isola anco al piano (*B. W. G.*).

Coturnix communis, *Quaglia.* Abbondante e anche sedentaria, specialmente nelle parti orientali (*B. W. G.*).

Rallus aquaticus. Sparsa, ma non abbondante; specialmente invernale, ma fors' anche sedentaria (*B. W. G.*).

Ortygometra Porzana. Vedesi di passo in marzo ed aprile (*B. W.*).

Crex pratensis, *Re di quaglie.* Scarso in autunno (*G.*).

Gallinula chloropus. Veduta a Biguglia in aprile (*B.*); comune d' inverno e nidificante (*W.*).

Fulica atra. Sedentaria e comune, certi anni abbondantissima (*B. W. G.*).

Grus communis, *Gru.* Di doppio passo, raramente sosta (*G.*).

Otis Tetrax. Capita casualmente nei pressi di Bonifacio (*G.*).

Œdicnemus scolopax. Trovato sedentario nei pressi di Ajaccio (*W.*).

Charadrius Pluvialis. Abbondante nell' inverno sulla costa orientale (*W.*).

Eudromias Morinellus. Veduto vicino a Corte il 5 ottobre del 1889 (*G.*).

Ægialitis cantiana. Abbastanza comune, nidificante e sedentario (*W. G.*).

Ægialitis curonica. Veduto ed ucciso il 27 aprile (*W.*); osservato in piccoli branchi lungo l' Ortolo il 28 settembre (*G.*).

Digitized by Google

Ægialitis Hiaticula. Veduto in aprile presso Biguglia (*B.*).
Vanellus Capella. Comune durante l'inverno (*B. W.*).
Strepsilas Interpres. Ucciso al Capo Pertusato il 25 settembre (*G.*).
Hæmatopus Ostralegus. Un solo veduto il 26 aprile (*W.*).
Himantopus candidus. Un solo veduto il 30 aprile (*W.*).
Pelidna subarquata. Comune di passo nel maggio (*W.*).
Pelidna alpina. Invernale, ma scarso (*W.*); veduto ad Isola Rossa il 7 ottobre (*G.*).
Actodromas minuta. Di passo nel maggio (*W.*).
Actodromas Temmincki. Ne uccisi uno di due veduti il 7 maggio (*W.*).
Calidris Arenaria. Ne uccisi una al Capo Pertusato il 25 settembre (*G.*).
Machetes Pugnax. Di passo in aprile (*W.*).
Tringoïdes Hypoleucus. Comune d'inverno (*B. W.*); forse sedentario (*G.*).
Totanus Ochropus. Invernale e di passo in aprile e maggio (*B. W.*); veduto il 9 ottobre (*G.*).
Totanus Glareola. Scarso di passo in aprile e maggio (*W.*).
Totanus Calidris. Invernale, una veduta il 2 giugno (*W.*).
Totanus nebularius. Invernale e di passo abbondante nel maggio (*W.*).
Limosa melanura. Veduta, ma non presa, il 23 aprile (*W.*).
Scolopax Rusticula, *Beccaze*, *Beccaccia.* Abbondante in dic. e gennaio (*B. W.*); vedesi anche ai primi di ottobre (*G.*).
Gallinago major. Ucciso il 25 marzo soltanto (*W.*).
Gallinago cælestis. Invernale, ma più abbondante in novembre e marzo (*B. W.*).
Gallinago Gallinula. Comune d'inverno e specialmente in febbraio sulla costa orientale (*W.*); pochi veduti (*B.*).
Numenius Arquata. Comune d'inverno (*W.*).
Thalasseus cantiacus. Comune (*W. G.*).
Sterna fluviatilis. Invernale e comune ad Ajaccio (*W.*).
Hydrochelidon leucoptera. Due veduti il 28 maggio (*W.*).
Chroocephalus melanocephalus. Veduto a Portovecchio il 26 settembre (*G.*).

Digitized by Google

Chroocephalus ridibundus. Abbondante, specialmente d'inverno; sedentario (*B. W. G.*).

Gelastes Genei. Veduto a Bonifacio il 27 settembre (*G.*).

Larus canus. Comune (*B. W. G.*).

Larus Audouini. Ne ebbi uno il 14 gennaio (*W.*); comune e sedentario tra le isolette dello Stretto di Bonifacio (*G.*).

Larus fuscus. Veduto a Bastia (*G.*).

Larus cachinnans. Comune e sedentario (*B. W. G.*).

Stercorarius pomatorhinus. Veduto in mare presso Aleria il 12 settembre (*G.*).

Puffinus anglorum. Comune e sedentaria (*W. G.*).

Puffinus Kuhli. Abbondante e sedentaria (*W. G.*).

Procellaria pelagica. Comune in mare tra Bastia e l'isola di Capraia (*G.*).

Utamania Torda. Fece abbondante comparsa lungo la costa orientale negli inverni 1885-86 e 1886-87 (*G.*).

Podiceps cristatus. Invernale, ma non comune (*W.*).

Podiceps nigricollis. Abbondante nell'inverno (*B. W.*); veduto anche il 18 maggio (*W.*).

Podiceps fluviatilis. Comune d'inverno (*W.*); veduto anche in ottobre (*G.*).

Digitized by Google

INDICE DEI NOMI SCIENTIFICI.

A

Accentor collaris 6. 14. 24. 29. 30. 42. 46. 47. 59. 71. 74. 75. 89. 100. 107. 110. 112. 126. 142. 152. 160. 168. 208. 223. 235. 243. 281. 291. 299. 308. 324. 337. 369. 393. 403. 429. 442. 463. 478. 557. 604.

Accentor modularis 6. 14. 24. 35. 42. 75. 107. 110. 112. 118. 124. 129. 142. 160. 166. 168. 176. 183. 188. 192. 196. 208. 223. 235. 243. 254. 266. 271. 281. 291. 299. 300. 308. 324. 347. 369. 384. 393. 403. 421. 429. 442. 455. 464. 478. 486. 495. 514. 531. 557. 572. 604. 636.

Accentor montanellus 223.

Accipiter Nisus 9. 16. 26. 29. 31. 34. 36. 43. 48. 51. 63. 73. 97. 108. 111. 113. 130. 133. 135. 144. 153. 162. 167. 169. 185. 197. 211. 216. 226. 237. 246. 256. 267. 273. 283. 293. 311. 328. 337. 350. 374. 381. 385. 395. 407. 430. 446. 468. 481. 504. 518. 542. 560. 574. 606. 622. 638.

Acredula caudata 7. 14. 59. 107. 110. 129. 142. 183. 223. 244. 254.

Acredula Irbyi 142. 308. 324. 348. 356. 369. 386. 393. 404. 421. 429. 443. 464. 478. 486. 496. 514. 531. 557. 604. 636.

Acredula rosea 7. 14. 24. 29. 31. 42. 47. 59. 71. 76. 89. 107. 110. 112. 118. 120. 121. 124. 129. 142. 152. 160. 166. 168. 176. 183. 188. 192. 196. 208. 223. 235. 244. 255. 261. 266. 271. 281. 291. 308. 324. 369. 464.

Acrocephalus arundinaceus 6. 14. 24. 30. 35. 42. 51. 106. 112. 142. 152. 159. 163. 171. 183. 207. 222. 243. 254. 260. 271. 281. 291. 307. 323. 338. 347. 369. 403. 442. 478. 495. 514. 557. 571. 617. 635.

Acrocephalus palustris 6. 14. 24. 30. 35. 118. 121. 142. 159. 169. 207. 217. 222. 243. 271. 307. 617.

Acrocephalus streperus 24. 30. 35. 41. 51. 106. 112. 142. 152. 159. 168. 183. 222. 243. 254. 260. 271. 281. 291. 307. 323. 338. 347. 369. 403. 442. 478. 557. 635.

Actodromas minuta 11. 19. 27. 33. 45. 132. 147. 164. 228. 249. 253. 274. 285. 295. 314. 333. 336. 339. 378. 411. 450. 470. 483. 499. 524. 563. 609. 627. 641.

Actodromas Temmincki 147. 249. 274. 285. 314. 333. 337. 339. 411. 450. 470. 524. 563. 627. 641.

Aëdon Luscinia 6. 14. 24. 30. 34. 41. 47. 50. 58. 70. 86. 100. 101. 106. 112. 117. 121. 129. 135. 141. 151. 159. 168. 171. 176. 183. 188. 191. 196. 206. 221. 234. 242. 254. 260. 265. 270. 280. 290. 298. 306. 322. 338. 346. 356. 367. 380. 385. 392. 402. 421. 428. 441. 454. 461. 477. 486. 490. 495. 502. 512. 530.

Digitized by Google

540. 555. 566. 571. 577. 586. 603. 616. 634.
Aëdon Philomela 306.
Ægialitis cantiana 45. 146. 228. 249. 285. 295. 314. 332. 339. 377. 410. 450. 470. 482. 523. 563. 626. 640.
Ægialitis curonica 27. 32. 36. 45. 109. 114. 126. 132. 146. 155. 164. 170. 214. 249. 253. 274. 285. 295. 314. 332. 339. 378. 396. 411. 450. 470. 482. 499. 528. 535. 563. 597. 609. 626. 640.
Ægialitis Hiaticula 27. 36. 45. 146. 155. 164. 214. 228. 249. 274. 285. 314. 332. 339. 378. 411. 450. 470. 482. 523. 563. 597. 626. 641.
Ægiothus Linarius 4. 17. 23. 37. 116. 128. 140. 158. 168. 175. 182. 204. 240. 269. 278. 288. 303.
Ægiothus rufescens 4. 19. 40. 51. 56. 69. 99. 104. 111. 128. 151. 158. 169. 195. 204. 219. 240. 303. 361. 403. 508.
Ægithalus pendulinus 7. 14. 24. 30. 35. 42. 51. 129. 152. 160. 168. 217. 223. 244. 254. 261. 271. 281. 308. 324. 369. 404. 442. 514. 557. 572. 577.
Æsalon regulus 9. 17. 26. 33. 36. 43. 62. 72. 76. 119. 144. 153. 162. 211. 226. 246. 256. 266. 273. 311. 328. 350. 407. 430. 446. 468. 497. 518. 560. 621. 638.
Agrobates familiaris 222. 307.
Agrobates galactodes 307.
Agrodroma campestris 5. 17. 23. 34. 40. 56. 116. 140. 151. 158. 172. 220. 241. 270. 279. 289. 297. 305. 320. 345. 365. 382. 391. 401. 428. 439. 454. 460. 476. 491. 510. 551. 570. 602. 613. 633.
Alauda arborea 5. 13. 23. 29. 30. 34. 40. 46. 47. 49. 56. 70. 74. 82. 101. 105. 110. 112. 116. 121. 123. 128. 133. 135. 140. 151. 158. 166. 168. 172. 175. 182. 187. 190. 195. 205. 220. 233. 241. 253. 270. 279. 289. 297. 304. 320. 341. 355. 365. 380. 381. 391. 401. 420. 427. 439. 454. 459. 476. 485. 494. 509. 530. 554. 570. 585. 602. 613. 633.
Alauda arvensis 5. 13. 23. 29. 30. 34. 40. 46. 56. 70. 74. 82. 99. 101. 105. 110. 112. 116. 120. 121. 123. 128. 133. 135. 137. 140. 151. 158. 166. 168. 172. 175. 182. 187. 191. 195. 205. 220. 233. 241. 253. 260. 265. 270. 279. 289. 305. 320. 337. 344. 355. 365. 380. 381. 391. 401. 420. 428. 439. 454. 459. 476. 485. 489. 490. 494. 509. 530. 540. 554. 570. 585. 602. 613. 633.
Alcedo Ispida 8. 15. 25. 29. 31. 43. 46. 48. 61. 72. 74. 75. 94. 108. 110. 113. 119. 121. 130. 148. 153. 161. 167. 168. 184. 189. 197. 210. 225. 236. 245. 255. 261. 266. 272. 282. 292. 300. 310. 326. 349. 357. 372. 386. 394. 405. 422. 430. 444. 467. 480. 496. 503. 516. 532. 541. 559. 567. 573. 590. 605. 620. 637.
Ampelis Garrulus 7. 19. 25. 37. 71. 107. 160. 224. 235. 244. 266. 309. 370. 479. 515.
Anas Boscas 10. 16. 26. 29. 31. 36. 44. 63. 73. 108. 111. 113. 119. 125. 130. 137. 145. 154. 162. 167. 169. 172. 185. 212. 216. 227. 238. 247. 257. 262. 267. 273. 284. 294. 312. 330. 350. 375. 395. 408. 423. 447. 456. 469. 481. 487. 491. 498. 520. 533. 542. 561. 567. 574. 594. 605. 623. 639.
Anser albifrons 145. 162. 247. 447.
Anser cinereus 144. 154. 162. 185. 212. 227. 238. 247. 257. 329. 337. 375. 447. 468. 491. 498. 520. 567. 593. 607. 623.
Anser erythropus 145.
Anser segetum 10. 18. 26. 34. 44. 108. 130. 144. 154. 162. 185. 212. 227. 238. 247. 257. 273. 284. 294. 312. 330. 337. 350. 375. 395. 408. 423. 447. 456. 468. 481. 487. 498. 520. 533. 561. 567. 593. 607. 623. 639.
Anthropoïdes virgo 249.
Anthus corvinus 141. 241. 305. 366. 384. 391. 420. 460. 476. 510. 554.

Digitized by Google

Anthus obscurus 23. 37. 633.
Anthus pratensis 5. 13. 23. 34. 40. 49. 56. 70. 83. 105. 112. 114. 116. 123. 128. 137. 140. 151. 158. 166. 171. 175. 182. 191. 196. 205. 220. 233. 241. 253. 270. 279. 289. 305. 320. 337. 345. 366. 384. 391. 401. 420. 428. 439. 454. 460. 476. 485. 494. 510. 530. 554. 570. 577. 602. 614. 633.
Anthus Spipoletta 5. 17. 23. 34. 40. 49. 57. 70. 75. 76. 100. 101. 105. 110. 112. 128. 137. 141. 151. 158. 166. 168. 171. 175. 182. 191. 205. 220. 233. 241. 253. 265. 270. 279. 289. 305. 321. 337. 345. 366. 385. 391. 401. 440. 460. 476. 494. 510. 554. 614.
Anthus trivialis 5. 13. 23. 34. 40. 49. 57. 70. 76. 99. 101. 105. 112. 117. 123. 128. 137. 141. 151. 158. 168. 171. 175. 182. 187. 191. 196. 205. 220. 233. 241. 253. 265. 270. 279. 289. 305. 321. 338. 345. 366. 384. 391. 401. 420. 428. 439. 460. 476. 486. 489. 494. 510. 554. 603. 633.
Aquila Chrysaëtus 9. 15. 26. 29. 31. 43. 62. 72. 74. 96. 108. 111. 113. 126. 130. 143. 153. 161. 167. 170. 177. 226. 246. 256. 267. 272. 283. 328. 395. 423. 481. 517. 560. 573. 621. 638.
Aquila clanga 26. 143. 153. 161. 226. 246. 272. 328. 373. 430. 445.
Aquila pomarina 9. 19. 26. 37. 373. 517. 621.
Archibuteo lagopus 9. 19. 26. 37. 43. 51. 153. 161. 226. 237. 246. 272. 311. 328. 445. 517. 621.
Ardea cinerea 9. 18. 26. 31. 36. 43. 63. 73. 126. 130. 144. 154. 162. 167. 170. 173. 185. 211. 226. 237. 246. 256. 267. 273. 283. 293. 311. 329. 336. 350. 374. 395. 407. 446. 468. 481. 497. 518. 532. 542. 561. 567. 574. 591. 607. 622. 638.
Ardea purpurea 9. 18. 26. 36. 43. 63. 126. 130. 144. 154. 162. 169. 185. 211. 226. 237. 246. 256. 273. 283. 293. 311. 329. 338. 350. 374. 395. 407. 430. 446. 456. 468. 481. 497. 519. 533. 542. 561. 567. 574. 592. 607. 622. 638.
Ardeola ralloïdes 9. 19. 26. 36. 44. 51. 130. 144. 154. 162. 226. 238. 247. 256. 267. 273. 284. 293. 311. 329. 338. 350. 374. 395. 407. 430. 446. 468. 481. 497. 504. 519. 533. 542. 551. 574. 591. 607. 622. 638.
Ardetta minuta 9. 18. 26. 31. 36. 44. 63. 108. 113. 126. 130. 144. 154. 162. 169. 171. 185. 212. 226. 238. 247. 256. 262. 273. 284. 294. 312. 329. 338. 350. 374. 395. 407. 446. 468. 481. 497. 504. 519. 533. 542. 561. 574. 591. 607. 622. 638.
Asio accipitrinus 8. 18. 25. 33. 43. 48. 50. 62. 72. 108. 111. 113. 143. 153. 161. 225. 236. 246. 256. 262. 272. 283. 293. 310. 327. 373. 394. 406. 430. 445. 467. 480. 517. 532. 559. 573. 591. 606. 620. 637.
Asio Otus 8. 15. 25. 33. 43. 48. 62. 72. 76. 100. 119. 143. 153. 161. 169. 177. 184. 210. 225. 236. 245. 256. 262. 267. 272. 283. 293. 310. 327. 349. 373. 394. 406. 430. 445. 467. 480. 490. 496. 516. 559. 573. 590. 606. 637.
Astur palumbarius 9. 16. 26. 33. 43. 51. 62. 73. 97. 162. 211. 226. 237. 246. 256. 273. 311. 328. 350. 374. 395. 407. 446. 481. 497. 542. 560. 606. 622. 638.
Athene Noctua 8. 15. 26. 29. 31. 43. 46. 48. 62. 72. 74. 95. 108. 111. 113. 119. 120. 121. 130. 133. 135. 143. 153. 161. 167. 169. 177. 184. 189. 197. 210. 225. 237. 245. 256. 262. 267. 272. 283. 293. 300. 310. 327. 349. 357. 372. 381. 386. 394. 406. 422. 430. 445. 455. 467. 480. 487. 490. 494. 517. 531. 541. 559. 567. 573. 578. 591. 606. 620. 637.

B

Bernicla brenta 26. 162. 247.
Bernicla leucopsis 520.
Bernicla ruficollis 162. 375.

Digitized by Google

Bonasa betulina 73. 74. 109. 111. 114. 131. 163. 167. 170. 185. 190. 197. 213. 228. 238.
Botaurus stellaris 10. 17. 26. 32. 44. 51. 119. 125. 130. 144. 154. 162. 185. 212. 226. 237. 247. 256. 262. 267. 273. 284. 294. 312. 329. 350. 374. 395. 408. 446. 468. 481. 497. 519. 533. 542. 561. 574. 592. 607. 622. 638.
Bubo maximus 8. 15. 26. 33. 43. 48. 62. 72. 74. 95. 108. 111. 113. 119. 130. 143. 153. 161. 167. 169. 177. 184. 210. 225. 237. 245. 256. 267. 272. 283. 293. 310. 327. 373. 395. 406. 445. 467. 480. 497. 504. 517. 532. 541. 559. 573. 606.
Bubulcus lucidus 519. 592.
Bucephala Clangula 10. 17. 27. 34. 44. 131. 145. 155. 163. 227. 248. 257. 274. 312. 331. 337. 376. 409. 448. 469. 482. 498. 521. 534. 594. 608. 624. 639.
Budytes borealis 205. 366. 510. 511.
Budytes campestris 305. 366.
Budytes cinereocapillus 5. 17. 23. 30. 34. 40. 57. 105. 112. 141. 205. 220. 241. 253. 270. 279. 290. 305. 321. 345. 366. 391. 401. 440. 454. 477. 494. 510. 511. 554. 603. 614. 639.
Budytes flavus 5. 13. 23. 30. 34. 40. 47. 49. 57. 70. 83. 100. 101. 105. 112. 117. 128. 141. 151. 159. 163. 172. 175. 182. 191. 205. 220. 241. 253. 270. 279. 289. 305. 321. 338. 345. 366. 391. 401. 420. 440. 454. 460. 477, 494. 502. 510. 511. 554. 570. 603. 614. 639.
Budytes melanocephalus 305. 366. 477. 511. 554. 603.
Budytes paradoxus 511.
Budytes xanthophrys 511.
Butalis Grisola 7. 15. 25. 31. 35. 42. 48. 118. 125. 143. 152. 160. 168. 172. 184. 193. 196. 209. 224. 245. 255. 271. 282. 292. 309. 325. 338. 348. 357. 370. 384. 394. 405. 443. 465. 479. 496. 503. 515. 540. 558. 605. 618. 636.
Buteo vulgaris 9. 15. 26. 29. 31. 33. 35. 43. 48. 62. 72. 74. 76. 96. 108. 111. 113. 119. 130. 135. 143. 153. 161. 167. 169. 177. 184. 197. 211. 215. 226. 237. 246. 256. 262. 267. 272. 283. 293. 311. 328. 337. 350. 373. 395. 406. 430. 445. 455. 467. 481. 487. 497. 516. 532. 560. 573. 606. 621. 638.

C

Calamodus schœnobænus 24. 30. 35. 42. 142. 152. 160. 169. 207. 222. 243. 271. 281. 291. 307. 323. 338. 347. 369. 403. 442. 478. 514. 557. 617. 635.
Calamodus aquaticus 24. 32. 37. 42. 129. 142. 152. 160. 170. 183. 222. 243. 254. 260. 271. 281. 291. 307. 323. 338. 347. 369. 403. 442. 557. 571. 635.
Calandrella brachydactyla 105. 114. 140. 151. 158. 205. 220. 241. 253. 279. 289. 304. 320. 338. 365. 401. 439. 454. 459. 476. 494. 509. 554. 570. 584. 602. 613. 633.
Calandrella pispoletta 304. 509.
Calcarius lapponicus 140. 158. 304. 365. 476.
Calcarius nivalis 5. 19. 23. 37. 69. 75. 126. 140. 151. 158. 204. 220. 233. 241. 279. 289. 304. 365. 427. 439. 476. 509.
Calidris Arenaria 147. 164. 249. 314. 333. 411. 450. 499. 524. 563. 627. 641.
Calliope camtschatkensis 242.
Calobates melanope 5. 17. 23. 29. 30. 41. 46. 47. 49. 57. 70. 75. 76. 84. 100. 105. 110. 112. 117. 121. 123. 141. 151. 159. 166. 168. 172. 175. 182. 191. 196. 205. 220. 233. 242. 253. 260. 265. 270. 279. 290. 298. 305. 321. 345. 366. 380. 388. 391. 420. 428. 440. 454. 460. 477. 495. 511. 530. 540. 555. 585. 603. 614. 634.
Cannabina flavirostris 158. 303. 453.

Digitized by Google

Cannabina Linota 4. 13. 23. 34. 40. 46. 47. 49. 56. 69. 74. 76. 99. 101. 104. 111. 116. 128. 136. 140. 150. 158. 169. 171. 175. 182. 187. 190. 203. 219. 232. 240. 253. 264. 269. 278. 288. 303. 320. 337. 344. 364. 380. 384. 390. 400. 419. 427. 438. 458. 475. 485. 494. 508. 553. 583. 602. 612. 633.
Caprimulgus ægyptius 572.
Caprimulgus europæus. 8. 15. 25. 31. 35. 42. 48. 50. 61. 72. 93. 119. 125. 130. 135. 143. 153. 161. 168. 170. 177. 184. 189. 193. 209. 224. 236. 345. 255. 261. 266. 272. 282. 292. 300. 310. 326. 338. 349. 357. 371. 381. 384. 394. 405. 422. 429. 444. 455. 466. 480. 487. 496. 503. 516. 531. 540. 559. 567. 572. 589. 605. 619. 637.
Carduelis elegans 4. 13. 23. 28. 30. 40. 46. 47. 49. 55. 69. 75. 76. 81. 99. 104. 110. 111. 116. 120. 121. 122. 128. 135. 140. 150. 158. 166. 168. 172. 175. 182. 187. 190. 195. 203. 219. 232. 240. 253. 260. 264. 269. 278. 288. 297. 303. 320. 344. 355. 363. 386. 382. 390. 400. 419. 427. 438. 453. 458. 475. 485. 489. 494. 502. 507. 530. 540. 553. 566. 570. 577. 583. 602. 612. 633.
Carpodacus erythrinus 40. 51. 158. 240. 278. 303. 364. 458. 508.
Casarca rutila 520.
Cerchneis Naumanni 9. 19. 26. 37. 43. 51. 73. 144. 211. 246. 256. 283. 293. 311. 328. 337. 350. 407. 446. 481. 497. 518. 532. 542. 560. 574. 622.
Cerchneis Tinnunculus 9. 15. 26. 29. 31. 43. 46. 48. 50. 62. 72. 74. 96. 108. 111. 113. 119. 121. 130. 135. 144. 153. 162. 167. 169. 177. 184. 189. 211. 216. 226. 237. 246. 256. 262. 267. 273. 283. 293. 300. 311. 328. 337. 350. 373. 381. 383. 395. 407. 423. 430. 446. 456. 468. 481. 487. 497. 504. 518. 532. 541. 560. 574. 578. 606. 622. 638.
Cerchneis vespertinus 9. 17. 26. 32. 37. 43. 62. 144. 153. 162. 211. 226. 237. 216. 256. 267. 273. 283. 293. 311. 328. 350. 374. 395. 407. 446. 468. 481. 497. 518. 532. 542. 560. 606. 622.
Certhia brachydactyla 7. 15. 25. 29. 31. 42. 46. 47. 60. 71. 76. 91. 107. 110. 113. 118. 121. 129. 135. 142. 152. 160. 167. 168. 170. 176. 184. 188. 196. 203. 223. 235. 244. 255. 266. 271. 282. 292. 299. 308. 325. 348. 356. 370. 384. 393. 404. 422. 429. 443. 464. 479. 486. 496. 515. 531. 540. 558. 572. 604. 618. 636.
Certhia familiaris 7. 15. 59. 71. 75. 76. 90. 107. 110. 113. 184. 208. 308. 636.
Cettia Cettii 42. 51. 152. 160. 223. 243. 266. 291. 308. 324. 338. 347. 369. 403. 442. 478. 557. 571. 604. 617. 635.
Charadrius Pluvialis 11. 18. 27. 36. 45. 64. 73. 99. 120. 125. 132. 138. 146. 155. 164. 214. 228. 249. 258. 267. 274. 285. 295. 314. 332. 338. 352. 377. 396. 410. 423. 449. 456. 470. 482. 487. 499. 504. 523. 535. 543. 563. 568. 575. 597. 609. 626. 640.
Chaulelasmus streperus 10. 18. 44. 130. 145. 154. 162. 172. 247. 257. 284. 312. 330. 336. 350. 375. 408. 447. 469. 481. 520. 533. 567. 607. 624. 639.
Chelidon cashmiriensis 371. 466.
Chelidon urbica 7. 15. 25. 31. 35 42. 48. 50. 60. 72. 92. 100. 108. 113. 119. 121. 125. 130. 135. 143. 152. 160. 168. 170. 177. 184. 189. 193. 197. 209. 224. 236. 245. 255. 261. 266. 272. 282. 292. 299. 309. 325. 338. 349. 357. 371. 381. 382. 391. 405. 422. 429. 443. 455. 466. 479. 486. 496. 515. 531. 540. 558. 567. 572. 578. 589. 605. 618. 636.
Chettusia gregaria 450.
Chloroptila Citrinella 4. 23. 33. 55. 69. 74. 99. 158. 203. 240. 278. 288. 303. 363. 612. 633.
Chroocephalus melanocephalus 45.

Digitized by Google

51. 156. 164. 229. 250. 286. 296. 315. 335. 337. 452. 484. 526. 544. 565. 609. 629. 641.
Chroocephalus minutus 12. 19. 28. 37. 148. 164. 250. 258. 296. 315. 335. 337. 413. 452. 472. 500. 526. 544. 565. 629.
Chroocephalus ridibundus 12. 19. 28. 37. 110. 148. 156. 164. 167. 169. 214. 229. 250. 259. 275. 286. 296. 316. 335. 337. 380. 397. 413. 452. 472. 484. 500. 527. 535. 544. 565. 576. 609. 629. 642.
Chrysomitris Spinus 4. 13. 23. 33. 34. 40. 55. 69. 75. 76. 80. 99. 101. 104. 110. 111. 116. 122. 128. 136. 140. 150. 158. 169. 172. 175. 182. 190. 195. 203. 219. 232. 240. 253. 269. 278. 288. 303. 319. 337. 344. 363. 383. 390. 400. 419. 427. 438. 458. 475. 494. 507. 539. 602. 612. 633.
Ciconia alba 10. 18. 44. 51. 63. 108. 130. 144. 162. 212. 226. 238. 247. 256. 273. 284. 294. 312. 329. 374. 395. 408. 447. 468. 481. 497. 519. 533. 542. 592. 607. 622. 639.
Ciconia nigra 10. 18. 108. 130. 144. 154. 162. 247. 273. 329. 374. 395. 408. 447. 481. 497. 519. 542. 607. 623. 639.
Cinclus albicollis 463.
Cinclus aquaticus 6. 14. 24. 29. 33. 42. 46. 47. 59. 71. 74. 75. 76. 89. 107. 110. 112. 118. 129. 142. 152. 160. 166. 168. 183. 207. 223. 235. 243. 266. 271. 281. 291. 299. 308. 324. 369. 393. 403. 429. 442. 463. 478. 490. 495. 514. 531. 557. 572. 588. 604. 617. 635.
Cinclus melanogaster 463. 635.
Circaëtus gallicus 9. 10. 27. 35. 43. 48. 161. 217. 226. 237. 246. 256. 272. 283. 293. 311. 327. 338. 373. 406. 430. 445. 455. 467. 480. 497. 517. 560. 578. 621.
Circus æruginosus 8. 17. 43. 51. 62. 72. 143. 153. 161. 167. 169. 171. 184. 210. 225. 246. 256. 272. 283. 293. 310. 327. 373. 395. 406. 422. 445. 467. 480. 490. 497. 517. 532. 541. 559. 567. 573. 620. 637.
Circus cineraceus 9. 19. 43. 51. 161. 211. 225. 246. 283. 293. 310. 373. 445. 491. 497. 517. 560. 606. 637.
Circus cyaneus 9. 19. 26. 37. 43. 51. 62. 72. 126. 143. 153. 161. 177. 211. 225. 246. 272. 283. 293. 310. 327. 338. 373. 395. 406. 445. 467. 480. 497. 517. 532. 541. 559. 573. 606. 620. 637.
Circus Swainsoni 225. 246. 272. 293. 327. 338. 373. 406. 430. 480. 517. 532. 541. 560. 573. 620. 637.
Cisticola cursitans 42. 47. 142. 152. 160. 170. 243. 254. 271. 281. 291. 308. 324. 347. 369. 441. 463. 478. 514. 557. 588. 604. 617. 635.
Clivicola riparia 8. 15. 25. 31. 35. 42. 119. 121. 125. 143. 152. 161. 168. 170. 184. 224. 236. 245. 255. 272. 282. 292. 309. 325. 338. 349. 371. 394. 405. 443. 466. 479. 515. 558. 619. 637.
Coccothraustes vulgaris 4. 13. 22. 28. 30. 34. 40. 47. 55. 69. 74. 75. 80. 99. 104. 111. 116. 121. 122. 128. 140. 150. 158. 166. 168. 175. 182. 187. 190. 195. 208. 219. 232. 240. 253. 260. 264. 269. 278. 288. 303. 319. 326. 337. 343. 363. 380. 383. 390. 400. 419. 427. 438. 458. 475. 485. 494. 507. 530. 539. 553. 570. 583. 602. 612. 633.
Coccystes glandarius 310. 352. 405. 444. 559. 573.
Columba livia. 10. 16. 27. 44. 131. 137. 146. 163. 167. 169. 185. 189. 227. 238. 248. 257. 294. 313. 423. 430. 448. 456. 469. 482. 491. 498. 504. 521. 534. 562. 568. 575. 578. 595. 608. 625. 640.
Columba Oenas 10. 16. 27. 29. 34. 36. 44. 73. 97. 109. 113. 131. 145. 155. 163. 169. 171. 177. 185. 189. 193. 212. 227. 248. 257. 267. 274. 284. 294. 313. 331. 337. 351. 376. 396. 409. 423. 430. 448. 456. 469. 482. 491. 521. 534. 543. 562. 575. 595. 608. 625. 639.

Digitized by Google

Columba Palumbus 10. 16. 27. 29. 31. 36. 44. 48. 63. 73. 76. 97. 109. 113. 126. 131. 135. 145. 155. 163. 167. 169. 171. 177. 185. 189. 193. 197. 212. 227. 238. 248. 257. 267. 274. 284. 294. 313. 331. 337. 351. 376. 383. 396. 409. 423. 430. 448. 456. 469. 482. 487. 498. 521. 534. 543. 562. 575. 578. 595. 608. 625. 639.

Colymbus arcticus 28. 37. 132. 148. 156. 164. 229. 250. 286. 296. 336. 337. 380. 452. 484. 527. 680.

Colymbus glacialis 12. 19. 156. 164. 250. 259. 275. 286. 316. 336. 452. 527. 680.

Colymbus septentrionalis 12. 19. 148. 156. 164. 229. 250. 286. 296. 316. 336. 380. 397. 413. 452. 472. 484. 500. 528. 565. 630.

Coracias Garrula 8. 19. 25. 35. 37. 43. 51. 61. 72. 126. 143. 153. 161. 225. 236. 245. 255. 272. 282. 292. 310. 326. 338. 372. 394. 405. 444. 455. 467. 480. 496. 503. 516. 532. 541. 559. 567. 573. 578. 590. 605. 620.

Corvus Corax 3. 22. 28. 39. 51. 54. 68. 73. 74. 77. 99. 101. 103. 111. 115. 157. 166. 169. 174. 181. 186. 195. 202. 217. 231. 239. 269. 277. 288. 302. 318. 389. 419. 437. 453. 457. 474. 488. 493. 506. 529. 539. 551. 566. 569. 576. 581. 601. 610. 632.

Corvus Cornix 3. 13. 22. 28. 33. 39. 46. 54. 68. 75. 77. 99. 101. 110. 111. 115. 127. 133. 135. 139. 150. 157. 166. 167. 171. 174. 181. 186. 202. 218. 231. 240. 252. 259. 264. 269. 277. 288. 302. 319. 313. 362. 383. 389. 399. 419. 426. 437. 457. 475. 485. 488. 493. 506. 539. 552. 566. 569. 576. 582. 601. 610. 632.

Corvus Corone 3. 13. 22. 23. 29. 33. 39. 68. 75. 77. 96. 110. 115. 139. 150. 157. 166. 169. 171. 174. 202. 217. 231. 239. 252. 264. 277. 288. 302. 319. 361. 426. 437. 474. 493. 529. 539. 610. 632.

Corvus frugilegus 3. 13. 17. 22. 33. 39. 54. 68. 75. 76. 99. 104. 110. 111. 115. 120. 122. 127. 139. 150. 157. 171. 181. 186. 195. 202. 218. 231. 240. 252. 264. 269. 277. 288. 302. 319. 337. 343. 362. 383. 389. 399. 419. 437. 457. 475. 485. 488. 493. 506. 529. 539. 552. 566. 569. 582. 601. 610. 632.

Corydalla Richardi 40. 51. 151. 158. 220. 241. 365. 439. 476. 554. 613.

Cotile rupestris 8. 15. 25. 31. 35. 42. 48. 60. 72. 101. 152. 161. 170. 177. 184. 189. 193. 209. 236. 245. 266. 292. 300. 309. 326. 337. 444. 455. 479. 486. 503. 540. 558. 572. 605. 619. 637.

Coturnix communis 10. 16. 27. 32. 36. 44. 48. 63. 73. 98. 109. 114. 119. 121. 125. 131. 135. 146. 155. 163. 169. 177. 185. 189. 193. 197. 213. 216. 227. 238. 248. 257. 262. 267. 274. 284. 294. 300. 313. 331. 339. 351. 358. 376. 381. 384. 396. 409. 423. 431. 449. 456. 469. 482. 487. 491. 498. 504. 522. 534. 543. 562. 568. 575. 579. 595. 608. 625. 640.

Crex pratensis 11. 18. 27. 32. 36. 44. 63. 73. 109. 114. 120. 125. 131. 138. 146. 155. 163. 169. 172. 185. 190. 193. 213. 228. 239. 249. 257. 272. 274. 285. 295. 313. 332. 352. 377. 396. 410. 431. 449. 470. 482. 498. 504. 522. 534. 543. 562. 575. 596. 609. 625. 640.

Cuculus canorus 8. 15. 25. 31. 35. 43. 48. 50. 61. 72. 76. 94. 100. 108. 113. 119. 121. 125. 130. 135. 143. 153. 161. 168. 170. 177. 184. 189. 193. 210. 225. 236. 245. 255. 261. 266. 282. 292. 300. 310. 326. 338. 349. 357. 372. 381. 383. 394. 405. 422. 429. 444. 455. 466. 480. 487. 490. 496. 503. 516. 531. 541. 559. 567. 573. 590. 605. 619. 637.

Cursorius gallicus 64. 73. 164. 249. 314. 332. 377. 449. 568. 575.

Cyanecula suecica 24. 159. 242. 290. 306. 322.

Cyanecula Wolfi 6. 18. 24. 32. 34.

Digitized by Google

41. 51. 58. 70. 87. 101. 106. 114. 117. 129. 141. 151. 159. 169. 183. 206. 221. 234. 242. 254. 270. 280. 290. 306. 322. 337. 338. 367. 392. 402. 421. 441. 461. 477. 502. 555. 586. 616. 634.

Cyanistes cæruleus 7. 14. 25. 29. 31. 33. 42. 59. 71. 75. 76. 90. 107. 110. 113. 118. 124. 129. 142. 152. 160. 167. 168. 172. 176. 184. 192. 208. 223. 235. 244. 255. 261. 266. 271. 281. 291. 308. 324. 348. 356. 370. 382. 393. 404. 422. 429. 443. 464. 479. 496. 514. 531. 558. 572. 578. 604. 618. 636.

Cyanistes cyanus 235.

Cygnus Bewicki 329. 375. 520. 593.

Cygnus musicus 10. 19. 44. 51. 130. 144. 154. 162. 226. 247. 257. 273. 329. 375. 408. 447. 519. 533. 561. 593. 607. 623.

Cygnus Olor 144. 247. 329. 447. 481. 574. 623.

Cypselus Apus 8. 15. 25. 31. 35. 42. 48. 50. 60. 72. 80. 93. 100. 108. 113. 119. 121. 125. 130. 135. 143. 153. 161. 168. 170. 177. 184. 189. 193. 197. 209. 224. 236. 245. 255. 261. 266. 272. 282. 292. 300. 309. 326. 338. 349. 357. 371. 381. 385. 394. 405. 422. 429. 444. 455. 466. 480. 486. 490. 496. 503. 516. 531. 540. 558. 572. 578. 589. 605. 619. 637.

Cypselus Melba 8. 15. 25. 35. 42. 60. 72. 100. 143. 161. 168. 170. 184. 209. 245. 255. 266. 272. 282. 292. 309. 326. 338. 371. 422. 444. 455. 480. 496. 503. 516. 558. 572. 605. 619. 637.

D

Dafila acuta 10. 18. 26. 36. 44. 131. 137. 145. 154. 162. 172. 212. 227. 247. 257. 273. 284. 294. 312. 330. 336. 351. 375. 408. 447. 469. 481. 498. 520. 533. 567. 594. 624. 639.

Dendrocycna javanica 26.

Dromolæa leucura 290. 298. 305. 440. 555. 614.

Dryocopus martius 8. 15. 61. 72. 73. 74. 93. 161. 184. 189. 209. 224. 236. 480. 559.

E

Egretta alba 9. 19. 43. 51. 144. 154. 162. 197. 211. 226. 237. 246. 256. 311. 329. 350. 374. 407. 446. 456. 468. 481. 497. 519. 533. 542. 561. 592. 607. 622. 638.

Egretta Garzetta 9. 19. 44. 51. 144. 154. 162. 185. 211. 226. 237. 246. 256. 273. 283. 293. 311. 329. 338. 350. 374. 395. 407. 446. 481. 497. 501. 519. 533. 542. 561. 574. 592. 607. 622. 638.

Emberiza cæsia 51. 220. 304. 476. 553.

Emberiza Cia 4. 13. 23. 33. 40. 46. 47. 49. 56. 69. 75. 76. 99. 105. 110. 116. 122. 128. 140. 158. 168. 175. 182. 195. 204. 220. 233. 241. 278. 289. 304. 320. 337. 344. 365. 385. 391. 400. 420. 427. 439. 459. 476. 494. 509. 530. 553. 602. 613.

Emberiza Cirlus 4. 17. 23. 33. 40. 46. 47. 49. 56. 69. 76. 82. 128. 140. 151. 158. 175. 182. 187. 204. 219. 233. 241. 269. 278. 289. 297. 304. 320. 344. 355. 364. 380. 385. 390. 400. 420. 427. 439. 454. 459. 476. 485. 494. 508. 530. 540. 553. 570. 577. 584. 602. 613. 633.

Emberiza Citrinella 4. 13. 23. 28. 30. 33. 40. 46. 47. 49. 56. 69. 75. 76. 82. 99. 101. 105. 110. 112. 116. 120. 121. 122. 128. 140. 151. 158. 166. 168. 172. 175. 182. 187. 190. 195. 204. 219. 233. 241. 253. 265. 269. 278. 289. 304. 320. 337. 344. 364. 385. 390. 400. 420. 427. 439. 459. 476. 494. 508. 553. 584.

Emberiza Hortulana 4. 13. 23. 30. 34. 40. 47. 49. 56. 69. 76. 99. 105. 112. 116. 121. 122. 128. 135. 136. 140. 151. 158. 168. 175. 195. 204. 216. 219. 233. 241. 253. 265. 266. 278. 289. 297. 304. 320. 338. 344.

Digitized by Google

855. 364. 380. 384. 390. 400. 420. 427. 439. 454. 459. 476. 494. 508. 553. 584. 633.
Emberiza intermedia 459.
Emberiza leucocephala 158. 278. 304. 365. 509.
Emberiza pusilla 5. 19. 23. 37. 56. 69. 220. 278. 289. 304. 320. 337. 476. 509.
Emberiza pyrrhuloïdes 140. 158. 169. 220. 241. 253. 260. 279. 304. 320. 337. 365. 391. 401. 439. 459. 476. 509. 553.
Emberiza rustica 158. 220. 278. 476. 509.
Emberiza Schœniclus 5. 13. 23. 34. 40. 56. 69. 74. 99. 116. 123. 128. 136. 140. 151. 158. 172. 175. 182. 187. 190. 204. 220. 233. 241. 253. 270. 278. 289. 304. 320. 337. 344. 365. 391. 400. 420. 439. 459. 476. 494. 509. 553. 584. 613. 633.
Erismatura leucocephala 155. 163. 248. 274. 313. 381. 448. 469. 624. 639.
Erithacus Rubecula 6. 14. 24. 29. 30. 34. 41. 46. 47. 50. 58. 70. 75. 76. 86. 106. 110. 112. 117. 123. 129. 141. 151. 159. 166. 168. 171. 173. 176. 183. 188. 191. 196. 206. 221. 234. 242. 254. 265. 270. 280. 290. 298. 306. 322. 346. 367. 384. 392. 402. 421. 428. 441. 454. 461. 477. 486. 495. 502. 513. 531. 540. 555. 567. 571. 586. 603. 616. 634.
Erythrosterna parva 160.
Eudromias Morinellus 27. 45. 155. 164. 214. 228. 249. 274. 295. 314. 332. 352. 377. 396. 410. 424. 450. 470. 499. 523. 563. 626. 640.
Euspiza aureola 278. 304.
Euspiza melanocephala 23. 37. 219. 233. 241. 278. 289. 304. 476. 508. 553.

F

Falco Peregrinus 9. 15. 26. 37. 43. 144. 153. 162. 197. 211. 226. 237. 246. 256. 267. 273. 293. 311. 328. 373. 406. 445. 455. 467. 481. 487. 504. 518. 560. 606. 621. 638.
Falco punicus 621. 638.
Francolinus vulgaris 534. 595. 608.
Fratercula arctica 251. 236. 316. 336. 452. 500. 505. 544. 565. 609. 630.
Fringilla cœlebs 4. 13. 22. 28. 29. 40. 46. 47. 48. 55. 69. 75. 76. 79. 104. 110. 111. 116. 120. 121. 122. 127. 133. 135. 140. 150. 157. 160. 167. 172. 175. 182. 186. 190. 195. 203. 218. 232. 240. 253. 259. 264. 269. 277. 288. 297. 303. 319. 343. 354. 362. 380. 383. 390. 399. 419. 426. 438. 453. 457. 475. 485. 489. 493. 502. 507. 530. 539. 552. 570. 583. 602. 611. 632.
Fringilla Montifringilla 4. 13. 22. 33. 34. 40. 47. 48. 55. 69. 74. 75. 79. 99. 104. 116. 122. 128. 140. 150. 157. 172. 173. 175. 182. 190. 195. 203. 215. 218. 232. 240. 253. 264. 269. 277. 288. 303. 319. 337. 343. 362. 389. 390. 399. 419. 426. 438. 453. 475. 494. 507. 539. 552. 633.
Fulica atra 11. 19. 27. 29. 36. 44. 63. 109. 111. 114. 120. 125. 131. 138. 146. 155. 163. 167. 169. 185. 213. 228. 239. 248. 252. 258. 262. 267. 274. 285. 295. 313. 332. 352. 377. 396. 410. 449. 470. 482. 498. 504. 522. 534. 543. 575. 562. 568. 597. 609. 625. 640.
Fulica cristata 504. 562. 626.
Fuligula rufina 145. 154. 163. 227. 247. 273. 294. 312. 330. 375. 409. 448. 469. 482. 520. 568. 575. 594. 608. 624. 639.
Fulix ferina 10. 18. 36. 44. 131. 137. 145. 155. 163. 212. 227. 247 257. 274. 284. 294. 312. 330. 375. 409. 448. 469. 498. 521. 543. 568. 594. 624. 639.
Fulix Fuligula 10. 19. 27. 36. 131. 145. 155. 163. 185. 212. 227. 247. 257. 274. 284. 294. 312. 330. 376. 409. 448. 469. 498. 521. 543. 561. 568. 594. 624. 639.

Digitized by Google

Fulix Marila 131. 155. 163. 227. 248. 312. 330. 337. 376. 409. 448. 624. 639.
Fulix Nyroca 10. 17. 44. 131. 145. 155. 163. 227. 248. 257. 262. 274. 294. 312. 330. 376. 396. 409. 448. 469. 482. 498. 521. 543. 562. 594. 608. 624.

G

Galerita cristata 5. 13. 23. 29. 30. 40. 46. 56. 74. 83. 99. 116. 121. 128. 140. 151. 158. 166. 168. 172. 175. 182. 187. 196. 205. 220. 233. 241. 253. 260. 265. 270. 279. 289. 305. 320. 345. 355. 365. 380. 386. 391. 401. 420. 428. 439. 460. 476. 485. 489. 494. 510. 530. 540. 554. 570. 577. 585. 602. 613.
Gallinago cælestis 11. 19. 28. 37. 45. 64. 73. 101. 110. 115. 120. 126. 132. 138. 148. 156. 164. 171. 178. 186. 193. 214. 229. 239. 250. 258. 267. 275. 286. 295. 315. 334. 337. 353. 379. 397. 412. 424. 431. 451. 456. 471. 483. 488. 500. 525. 535. 544. 564. 576. 598. 609. 628. 641.
Gallinago Gallinula 11. 19. 28. 37. 45. 64. 73. 110. 120. 126. 132. 138. 148. 156. 164. 171. 173. 186. 214. 229. 239. 250. 258. 268. 275. 286. 295. 315. 334. 337. 353. 379. 397. 412. 451. 471. 483. 491. 500. 525. 535. 544. 576. 564. 598. 609. 628. 611.
Gallinago major 11. 19. 28. 32. 37. 45. 109. 115. 120. 126. 132. 138. 148. 156. 164. 171. 172. 173. 185. 193. 214. 229. 239. 250. 258. 267. 275. 315. 334. 337. 353. 379. 397. 412. 451. 456. 471. 483. 500. 525. 535. 544. 564. 598. 628. 641.
Gallinula chloropus 11. 18. 27. 29. 32. 36. 44. 63. 109. 114. 120. 125. 131. 146. 155. 163. 167. 169. 185. 193. 213. 223. 239. 249. 251. 257. 262. 267. 274. 285. 295. 313. 332. 352. 377. 396. 410. 449. 470. 482. 498. 522. 534. 543. 575. 562. 596. 609. 625. 640.
Garrulus glandarius 3. 13. 22. 28. 29. 40. 46. 55. 69. 75. 78. 104. 110. 111. 115. 120. 121. 122. 127. 133. 135. 139. 150. 157. 166. 167. 173. 182. 186. 195. 202. 218. 232. 240. 253. 259. 264. 269. 277. 288. 297. 302. 319. 343. 354. 362. 380. 383. 389. 399. 419. 426. 437. 457. 475. 493. 506. 529. 539. 552. 566. 569. 577. 582. 601. 610. 632.
Gecinus canus 72. 76. 184. 210. 225. 236. 245. 282. 310.
Gecinus viridis 8. 15. 25. 29. 31. 43. 46. 48. 61. 72. 75. 76. 94. 108. 110. 113. 119. 120. 130. 133. 135. 143. 153. 161. 167. 163. 177. 184. 189. 197, 210. 224. 236. 245. 255. 261. 266. 271. 292. 310. 326. 349. 357. 372. 381. 386. 394. 405. 422. 429. 444. 466. 480. 487. 496. 516. 541. 559. 637.
Gelastes Genei 565. 629. 642.
Gelochelidon angliça 250. 315. 335. 412. 452. 483. 526. 628.
Gennaia Feldeggi 560. 573. 578.
Glareola Pratincola 148. 156. 164. 229. 250. 236. 295. 315. 335. 339. 379. 412. 451. 472. 483. 500. 526. 544. 564. 576. 599. 609. 628.
Grus communis 11. 18. 27. 36. 37. 64. 109. 131. 146. 155. 163. 185. 197. 213. 228. 249. 258. 267. 285. 295. 313. 332. 377. 410. 449. 482. 498. 504. 522. 535. 543. 562. 568. 597. 609. 626. 640.
Gypaëtus barbatus 9. 19. 108. 162. 167. 211. 237. 560. 606. 622. 638.
Gyps fulvus 153. 162. 167. 226. 237. 246. 273. 374. 481. 560. 574. 606. 622.

H

Haematopus Ostralegus 45. 51. 132. 146. 155. 164. 249. 274. 295. 314. 333. 338. 378. 411. 450. 483. 499. 523. 535. 563. 626. 641.
Haliaëtus Albicilla 9. 19. 26. 143.

Digitized by Google

153. 161. 226. 246. 272. 311. 328. 378. 445. 621. 638.
Harelda glacialis 163. 248. 312. 376. 448. 521.
Himantopus candidus 11. 19. 27. 32. 45. 51. 146. 155. 164. 228. 249. 258. 274. 285. 295. 314. 333. 339. 378. 397. 411. 450. 470. 483. 499. 524. 535. 544. 563. 576. 598. 609. 627. 641.
Hirundo rufula 42. 51. 245. 292. 309. 371. 466. 496. 515. 558. 605.
Hirundo rustica 7. 15. 25. 31. 35. 42. 48. 50. 60. 71. 92. 100. 101. 107. 118. 119. 121. 125. 130. 135. 143. 152. 160. 168. 170. 177. 184. 189. 193. 196. 209. 224. 236. 245. 255. 261. 266. 272. 282. 292. 299. 309. 325. 338. 348. 357. 371. 381. 384. 394. 405. 422. 429. 443. 455. 465. 479. 486. 490. 496. 503. 515. 531. 540. 558. 567. 572. 578. 589. 605. 618. 636.
Hydrochelidon hybrida 28. 37. 64. 148. 165. 250. 258. 286. 315. 335. 339. 412. 452. 472. 526. 628.
Hydrochelidon leucoptera 12. 17. 28. 148. 156. 165. 250. 286. 296. 315. 335. 339. 379. 412. 452. 472. 483. 526. 535. 565. 629. 641.
Hydrochelidon nigra 12. 17. 28. 37. 45. 73. 132. 148. 156. 165. 169. 173. 186. 214. 229. 250. 252. 258. 262. 275. 286. 296. 315. 335. 337. 338. 353. 379. 397. 413. 452. 472. 483. 500. 526. 544. 565. 576. 629.
Hydrornia Alleni 332.
Hypolais icterina 6. 14. 71. 118. 124. 142. 152. 159. 168. 183. 188. 192. 222. 243. 254. 271. 281. 291. 307. 323. 338. 369. 381. 382. 392. 403. 442. 478. 495. 514. 557. 617.
Hypolais olivetorum 307. 514.
Hypolais pallida 159. 307.
Hypolais polyglotta 24. 30. 32. 41. 47. 50. 106. 142. 159. 168. 207. 222. 243. 254. 260. 271. 281. 291. 299. 307. 323. 338. 347. 369. 381. 392. 403. 429. 442. 463. 478. 514. 635.
Hypotriorchis Eleonoræ 283. 293. 311. 621. 638.
Hypotriorchis Subbuteo 9. 18. 26. 33. 36. 43. 62. 72. 119. 144. 153. 162. 184. 211. 226. 237. 246. 256. 273. 283. 293. 311. 328. 337. 378. 386. 395. 406. 430. 445. 455. 467. 481. 518. 541. 560. 567. 574. 578. 621. 638.

I

Iynx Torquilla 8. 15. 25. 31. 35. 43. 48. 50. 61. 72. 94. 100. 108. 113. 119. 125. 130. 135. 143. 153. 161. 168. 170. 177. 184. 189. 193. 197. 210. 225. 236. 245. 255. 261. 266. 272. 282. 292. 300. 310. 326. 349. 357. 372. 381. 385. 394. 405. 422. 429. 444. 455. 466. 480. 487. 490. 496. 503. 516. 531. 541. 559. 572. 590. 605. 619. 637.

L

Lagopus mutus 10. 16. 27. 29. 32. 63. 73. 74. 98. 109. 111. 114. 119. 131. 163. 167. 169. 178. 185. 213. 228. 238. 257.
Lanius auriculatus 7. 15. 25. 31. 35. 42. 48. 50. 60. 71. 91. 100. 107. 118. 142. 152. 160. 168. 177. 184. 189. 193. 196. 209. 224. 241. 255. 261. 266. 271. 282. 292. 299. 309. 325. 338. 348. 357. 370. 381. 393. 404. 429. 443. 455. 465. 479. 486. 496. 503. 515. 531. 540. 558. 572. 578. 588. 605. 618. 636.
Lanius Collurio 7. 15. 25. 31. 35. 42. 48. 50. 60. 71. 91. 100. 107. 113. 118. 121. 124. 129. 135. 142. 152. 160. 168. 170. 177. 184. 188. 192. 196. 209. 224. 236. 244. 255. 261. 266. 271. 282. 292. 299. 309. 325. 338. 348. 357. 370. 381. 393. 404. 429. 443. 455. 465. 479. 486. 496. 503. 515. 531. 558. 588. 604. 618. 636.
Lanius Excubitor 7. 17. 25. 33. 42.

Digitized by Google

60. 71. 76. 100. 118. 121. 124. 129. 142. 152. 160. 168. 170. 171. 177. 184. 192. 196. 209. 224. 236. 244. 255. 271. 282. 292. 309. 325. 370. 404. 422. 429. 443. 465. 479. 496. 558. 588. 618.

Lanius meridionalis 309. 348. 479.

Lanius minor 7. 15. 25. 31. 35. 42. 48. 60. 71. 91. 100. 107. 113. 118. 121. 124. 129. 142. 152. 160. 168. 170. 184. 188. 192. 209. 224. 236. 244. 255. 261. 266. 271. 282. 292. 309. 325. 338. 348. 357. 370. 381. 382. 393. 404. 422. 429. 443. 465. 479. 486. 490. 496. 515. 531. 540. 558. 572. 578. 588. 618.

Larus Audouini 472. 629. 642.

Larus cachinnans 28. 37. 148. 156. 165. 251. 259. 286. 296. 316. 335. 380. 452. 456. 472. 484. 500. 505. 527. 544. 565. 629. 642.

Larus canus 28. 148. 156. 165. 229. 251. 259. 268. 275. 296. 316. 335. 337. 452. 484. 500. 527. 565. 629. 642.

Larus fuscus 156. 165. 335. 452. 527. 544. 565. 629. 642.

Larus marinus 165. 500. 629.

Ligurinus Chloris 4. 13. 23. 28. 30. 40. 47. 49. 55. 69. 74. 75. 80. 99. 101. 104. 110. 111. 116. 123. 133. 135. 140. 150. 158. 166. 168. 172. 175. 182. 187. 190. 195. 203. 219. 232. 240. 253. 260. 264. 269. 278. 288. 297. 303. 319. 344. 355. 363. 380. 382. 390. 400. 419. 427. 438. 453. 458. 475. 485. 489. 494. 502. 507. 530. 539. 553. 570. 583. 602. 612. 633.

Limicola platyrhyncha 27. 33. 147. 249. 314. 333. 337. 339. 524. 563.

Limosa melanura 11. 17. 45. 51. 109. 132. 147. 156. 164. 250. 258. 275. 286. 295. 315. 334. 337. 338. 353. 379. 397. 412. 451. 471. 483. 499. 525. 564. 628. 641.

Limosa rufa 11. 19. 45. 51. 147. 164. 250. 315. 334. 379. 451. 499. 564. 628.

Locustella lanceolata 307.

Locustella nævia 24. 37. 106. 142. 160. 183. 222. 243. 271. 291. 307. 323. 369.

Lophophanes cristatus 25. 37. 59. 71. 76. 90. 160. 184. 208. 223. 244. 308. 496.

Loxia Curvirostra 4. 17. 23. 37. 40. 56. 69. 74. 76. 105. 110. 111. 116. 123. 136. 140. 151. 158. 169. 175. 182. 195. 204. 219. 233. 240. 253. 269. 278. 289. 304. 320. 364. 380. 390. 400. 420. 427. 439. 459. 475. 494. 508. 553. 602. 613. 633.

Loxia Pityopsittacus 204. 304.

Lusciniola melanopogon 222. 243. 271. 281. 307. 323. 369. 403. 442. 478. 635.

Lycos Monedula 3. 19. 22. 37. 39. 51. 68. 74. 75. 115. 139. 150. 157. 218. 232. 248. 252. 269. 288. 302. 319. 343. 399. 437. 475. 485. 493. 506. 529. 539. 552. 569. 577. 582. 601. 610. 632.

Lyrurus Tetrix 10. 16. 27. 29. 32. 63. 73. 74. 98. 109. 111. 114. 119. 120. 131. 163. 167. 169. 178. 185. 190. 197. 213. 227. 238.

M

Machetes Pugnax 11. 18. 27. 36. 45. 64. 132. 138. 147. 156. 164. 228. 250. 258. 275. 285. 295. 314. 333. 337. 338. 352. 378. 397. 411. 450. 471. 483. 499. 524. 564. 627. 641.

Mareca Penelope 10. 18. 26. 36. 44. 119. 125. 131. 137. 145. 154. 163. 172. 185. 197. 212. 227. 238. 247. 257. 273. 284. 294. 312. 330. 351. 375. 408. 447. 469. 482. 498. 520. 533. 542. 561. 567. 594. 608. 624. 639.

Megalestris Catarrhactes 259.

Melanocorypha Calandra 40. 51. 56. 70. 116. 120. 121. 123. 158. 169. 204. 233. 251. 253. 279. 289. 304. 320. 345. 355. 365. 401. 420. 439. 459. 476. 485. 494. 509. 530. 540. 554. 566. 570. 577. 584. 602. 613. 633.

Digitized by Google

Melizophilus sardus 41. 51. 307. 556. 587. 617. 635.
Melizophilus undatus 41. 243. 230. 291. 299. 307. 323. 368. 392. 403. 428. 441. 455. 462. 478. 513. 556. 587. 617. 635.
Mergellus Albellus 10. 18. 27. 36. 44. 145. 155. 163. 227. 238. 248. 257. 274. 284. 294. 313. 331. 337. 376. 396. 409. 448. 469. 482. 498. 521. 531. 562. 625.
Mergus Merganser 10. 19. 36. 44. 51. 181. 145. 155. 163. 212. 227. 238. 248. 257. 274. 313. 331. 376. 409. 448. 608. 624.
Mergus Serrator 27. 109. 114. 131. 145. 155. 163. 227. 238. 257. 274. 284. 294. 313. 331. 337. 376. 409. 448. 469. 482. 498. 521. 534. 562. 595. 608. 624. 639.
Merops Apiaster 8. 17. 25. 37. 43. 51. 61. 126. 143. 153. 161. 168. 225. 236. 215. 248. 256. 272. 283. 292. 310. 326. 338. 349. 357. 372. 394. 405. 422. 430. 444. 455. 467. 480. 487. 490. 496. 503. 516. 532. 541. 559. 567. 573. 578. 590. 605. 620. 637.
Merops persicus 310. 516.
Merula nigra 5. 14. 23. 29. 30. 33. 41. 46. 47. 49. 57. 70. 75. 76. 85. 105. 110. 112. 117. 120. 121. 129. 133. 135. 141. 151. 159. 166. 168. 176. 183. 187. 191. 196. 206. 221. 234. 242. 254. 260. 265. 270. 280. 290. 298. 306. 321. 346. 356. 367. 380. 383. 391. 402. 420. 428. 440. 454. 461. 477. 486. 489. 495. 502. 512. 530. 540. 555. 566. 571. 577. 586. 603. 615. 634.
Merula torquata 5. 14. 23. 34. 41. 51. 57. 70. 73. 74. 85. 105. 110. 112. 117. 141. 151. 159. 166. 169. 176. 183. 196. 206. 221. 234. 242. 254. 265. 270. 280. 290. 306. 321. 346. 367. 391. 421. 428. 440. 461. 477. 495. 512. 555. 603. 615. 634.
Microcarbo pygmæus 9. 19. 54. 607.
Miliaria Projer 4. 13. 23. 28. 30. 40. 46. 47. 49. 69. 99. 116. 128. 136. 140. 151. 158. 169. 172. 175. 182. 204. 216. 219. 233. 253. 269. 278. 289. 297. 300. 301. 320. 344. 355. 364. 380. 385. 390. 400. 420. 427. 439. 453. 459. 476. 485. 494. 508. 530. 553. 570. 577. 584. 602. 613. 633.
Milvus Ictinus 9. 17. 43. 72. 76. 96. 153. 162. 226. 246. 256. 273. 293. 311. 323. 350. 373. 395. 406. 430. 445. 481. 487. 491. 518. 541. 560. 606. 621. 638.
Milvus migrans 26. 37. 43. 143. 153. 162. 246. 311. 373. 406. 445. 455. 518. 560. 573.
Monachus Atricapillus 6. 14. 21. 29. 30. 35. 41. 46. 47. 50. 58. 70. 76. 88. 100. 106. 110. 112. 117. 120. 121. 123. 129. 135. 141. 152. 159. 166. 168. 171. 176. 183. 188. 192. 196. 207. 216. 222. 234. 243. 254. 260. 265. 270. 280. 290. 298. 307. 322. 347. 356. 368. 381. 382. 392. 402. 421. 428. 441. 455. 462. 478. 486. 495. 508. 513. 531. 540. 556. 571. 587. 604. 616. 635.
Monachus hortensis 6. 14. 21. 33. 35. 41. 47. 58. 71. 106. 112. 117. 124. 141. 152. 159. 168. 171. 176. 183. 188. 192. 196. 207. 222. 234. 243. 254. 265. 270. 280. 291. 299. 307. 322. 337. 347. 368. 381. 382. 392. 402. 421. 441. 462. 478. 486. 489. 495. 513. 531. 540. 556. 567. 571. 587. 617.
Monticola Cyanus 5. 14. 23. 30. 41. 46. 47. 57. 70. 75. 84. 105. 110. 112. 117. 120. 121. 151. 159. 168. 176. 182. 196. 206. 221. 234. 242. 254. 265. 279. 290. 298. 306. 321. 337. 346. 367. 380. 386. 391. 402. 420. 428. 440. 454. 461. 477. 486. 495. 502. 512. 530. 540. 555. 566. 471. 577. 585. 603. 615. 634.
Monticola saxatilis 5. 14. 23. 30. 34. 41. 47. 49. 57. 70. 84. 100. 105. 112. 117. 121. 129. 159. 168. 176. 182. 187. 196. 206. 221. 234. 242. 254. 265. 270. 279. 290. 298. 300. 306. 321. 346. 367. 380. 383.

Digitized by Google

391. 401. 420. 440. 454. 460. 477. 495. 502. 512. 540. 555. 571. 585. 608. 615.
Montifringilla nivalis 4. 13. 22. 28. 40. 55. 69. 73. 74. 104. 110. 111. 126. 150. 157. 168. 195. 203. 204. 277. 303. 363. 390.
Motacilla alba 5. 13. 23. 29. 30. 31. 41. 46. 47. 49. 57. 70. 75. 83. 100. 105. 110. 112. 117. 121. 123. 128. 133. 135. 141. 151. 159. 169. 171. 175. 182. 187. 191. 205. 217. 220. 233. 241. 253. 260. 265. 270. 279. 290. 305. 321. 345. 356. 366. 380. 382. 391. 401. 420. 428. 440. 460. 477. 486. 489. 495. 502. 511. 530. 540. 554. 566. 570. 585. 603. 614. 634.
Motacilla lugubris 305. 477. 554.
Muscicapa Atricapilla 7. 15. 25. 35. 42. 71. 92. 107. 113. 118. 125. 130. 142. 160. 177. 209. 224. 245. 271. 282. 292. 309. 325. 338. 371. 393. 404. 465. 479. 496. 515. 558. 572. 605. 636.
Muscicapa collaris 7. 15. 42. 48. 71. 92. 118. 124. 130. 152. 160. 170. 209. 244. 271. 309. 325. 338. 370. 393. 404. 443. 455. 465. 479. 496. 503. 515. 531. 558. 572. 605. 618. 638.

N

Neophron Percnopterus 446. 456. 518. 542. 560. 574. 578. 591. 607.
Nettion Crecca 10. 18. 26. 29. 31. 36. 44. 119. 125. 131. 137. 145. 154. 163. 170. 172. 185. 212. 227. 238. 247. 257. 262. 273. 234. 294. 312. 330. 351. 375. 396. 408. 423. 448. 469. 482. 487. 498. 520. 533. 542. 575. 561. 568. 594. 608. 624. 639.
Nisaëtus fasciatus 293. 311. 504. 517. 560. 573. 578. 621. 638.
Nisaëtus pennatus 445.
Nucifraga Caryocatactes 3. 13. 22. 28. 39. 51. 54. 68. 73. 74. 78. 104. 110. 111. 115. 139. 150. 157. 166. 169. 174. 202. 218. 232. 240. 277. 302. 389. 437. 493. 539. 610.
Numenius Arquata 11. 19. 28. 37. 45. 64. 132. 148. 156. 164. 186. 214. 229. 250. 258. 275. 286. 295. 315. 334. 337. 353. 379. 412. 451. 471. 483. 500. 526. 535. 544. 564. 576. 598. 623. 641.
Numenius Phæopus 11. 18. 132. 148. 156. 164. 250. 286. 315. 334. 337. 353. 379. 412. 451. 471. 483. 500. 526. 564. 599. 628.
Numenius tenuirostris 28. 37. 45. 164. 229. 250. 315. 334. 353. 379. 397. 412. 451. 471. 483. 500. 526. 564. 623.
Nyctala Tengmalmi 108. 110. 126. 161. 210. 225. 245.
Nycticorax griseus 10. 18. 26. 36. 44. 126. 130. 144. 154. 162. 212. 226. 238. 247. 256. 267. 273. 234. 294. 312. 329. 338. 350. 374. 395. 408. 447. 468. 481. 497. 504. 519. 533. 542. 561. 574. 592. 607. 622. 639.

O

Œdemia fusca 155. 163. 248. 274. 312. 331. 337. 448. 543. 624. 639.
Œdemia nigra 145. 448.
Œdicnemus scolopax 11. 16. 27. 32. 36. 45. 64. 73. 100. 126. 132. 138. 146. 155. 164. 169. 214. 228. 249. 258. 274. 285. 295. 314. 332. 338. 352. 377. 396. 410. 423. 449. 456. 470. 482. 498. 504. 522. 535. 543. 563. 575. 579. 597. 609. 626. 640.
Oreocincla varia 392.
Oriolus Galbula 7. 15. 25. 31. 35. 42. 50. 60. 72. 91. 107. 113. 118. 124. 129. 135. 142. 152. 160. 168. 170. 177. 184. 192. 196. 209. 224. 235. 244. 255. 261. 266. 271. 282. 292. 308. 325. 338. 348. 357. 370. 381. 384. 393. 404. 422. 429. 443. 455. 465. 479. 486. 490. 496. 503.

Digitized by Google

515. 531. 540. 558. 572. 588. 604. 618. 636.
Ortygometra Bailloni 11. 18. 27. 36. 44. 131. 146. 155. 163. 170. 185. 193. 213. 239. 249. 257. 274. 284. 294. 313. 331. 338. 352. 377. 396. 410. 449. 470. 498. 504. 562. 575. 596. 608. 625.
Ortygometra parva 11. 18. 27. 36. 44. 131. 146. 155. 163. 169. 185. 213. 228. 239. 249. 257. 274. 285. 295. 513. 332. 338. 352. 377. 396. 410. 449. 470. 482. 498. 504. 522. 562. 575. 596. 609. 625.
Ortygometra Porzana 11. 18. 27. 32. 36. 44. 63. 109. 114. 120. 125. 131. 137. 146. 155. 163. 169. 185. 193. 213. 228. 239. 248. 257. 274. 284. 294. 313. 331. 338. 352. 376. 396. 410. 449. 470. 482. 487. 498. 522. 543. 562. 575. 596. 608. 625. 640.
Otis Tarda 11. 19. 27. 37. 45. 51. 126. 131. 146. 155. 166. 228. 239. 249. 274. 313. 332. 352. 377. 419. 482. 498. 522. 563. 575.
Otis Tetrax 11. 19. 45. 51. 126. 131. 155. 164. 213. 228. 239. 249. 274. 313. 332. 339. 352. 377. 410. 449. 482. 498. 522. 543. 563. 597. 609. 626. 640.
Otocorys alpestris 241. 279. 289. 509. 554.

P

Pandion Haliaëtus 9. 18. 33. 143. 153. 226. 246. 272. 293. 310. 327. 373. 445. 480. 497. 517. 560. 621. 637.
Panurus biarmicus 7. 19. 126. 129. 152. 160. 170. 244. 308. 324. 404. 443. 479. 496. 514. 557.
Parus ater 7. 14. 25. 29. 35. 42. 59. 71. 76. 90. 107. 110. 113. 118. 120. 121. 124. 129. 133. 142. 160. 168. 172. 173. 183. 188. 192. 196. 208. 223. 235. 244. 255. 266. 271. 281. 291. 308. 324. 370. 393. 404. 429. 443. 464. 479. 490. 557. 618. 636.
Parus major 7. 14. 25. 29. 31. 42. 46. 50. 59. 71. 75. 76. 90. 107. 110. 113. 118. 120. 121. 124. 129. 133. 135. 142. 152. 160. 167. 168. 171. 176. 183. 188. 192. 196. 208. 223. 235. 244. 255. 261. 266. 271. 281. 291. 299. 308. 324. 348. 356. 370. 381. 382. 393. 404. 422. 429. 443. 464. 479. 490. 496. 514. 531. 540. 557. 572. 577. 588. 604. 618. 636.
Passer domesticus 40. 69. 99. 158. 166. 182. 187. 203. 219. 240. 278. 303.
Passer hispaniolensis 552. 566. 570. 577. 583. 602. 611.
Passer Italiæ 4. 13. 22. 28. 29. 40. 46. 47. 49. 55. 69. 73. 74. 75. 79. 104. 110. 111. 116. 120. 121. 122. 128. 135. 140. 150. 158. 166. 168. 175. 182. 187. 195. 203. 219. 232. 240. 253. 260. 264. 269. 278. 288. 297. 303. 319. 314. 355. 363. 380. 384. 390. 400. 419. 427. 438. 453. 458. 475. 485. 489. 494. 502. 507. 530. 539. 552. 633.
Passer montanus 4. 13. 22. 28. 29. 40. 46. 47. 49. 55. 69. 75. 76. 104. 110. 111. 116. 120. 121. 122. 128. 135. 140. 150. 157. 166. 168. 175. 182. 186. 195. 203. 218. 232. 240. 253. 259. 264. 269. 278. 288. 303. 319. 344. 354. 355. 363. 380. 384. 390. 400. 419. 427. 438. 458. 475. 485. 494. 507. 602. 611.
Pastor roseus 3. 19. 22. 37. 40. 51. 55. 104. 126. 140. 150. 157. 167. 218. 232. 240. 253. 269. 277. 288. 302. 319. 362. 438. 457. 475. 493. 506. 552. 611.
Pelecanus Onocrotalus 26. 37. 63. 108. 130. 144. 154. 162. 246. 273. 323. 374. 407. 446. 481. 497. 518. 532. 542. 561. 574. 591. 638.
Pelidna alpina 132. 147. 164. 228. 275. 285. 295. 314. 333. 352. 378. 450. 499. 524. 563. 598. 627. 641.
Pelidna maritima 249. 378. 627.
Pelidna subarquata 11. 19. 27. 33. 45. 147. 164. 228. 249. 258. 285. 295. 314. 333. 337. 339. 352. 378.

Digitized by Google

411. 450. 470. 488. 499. 524. 568. 598. 627. 641.
Perdix petrosa 423. 625.
Perdix rufa 10. 16. 44. 46. 48. 109. 111. 131. 163. 167. 170. 185. 189. 248. 274. 284. 294. 300. 318. 331. 409. 431. 448. 482. 640.
Perdix saxatilis 10. 16. 27. 29. 32. 44. 63. 73. 74. 97. 109. 111. 114. 119. 120. 121. 163. 167. 169. 177. 185. 189. 197. 218. 227. 238. 248. 274. 318. 396. 482. 521. 584. 543. 562. 568. 575. 579. 595. 608.
Pernis apivorus 9. 18. 26. 33. 43. 62. 72. 76. 211. 226. 246. 278. 283. 298. 311. 328. 337. 373. 395. 406. 445. 467. 481. 517. 532. 541. 560. 578. 606. 621. 638.
Petronia stulta 4. 13. 22. 33. 40. 47. 48. 126. 140. 157. 203. 218. 240. 264. 269. 278. 288. 308. 319 337. 343. 368. 380. 384. 390. 399. 419. 427. 433. 453. 458. 475. 485. 489. 494. 507. 552. 570. 577. 583. 602. 611. 633.
Phalacrocorax Carbo 9. 19. 63. 144. 154. 162. 246. 256. 273. 311. 329. 337. 374. 407. 446. 481. 497. 518. 532. 542. 561. 567. 591. 607. 622.
Phalacrocorax Graculus 481. 518. 561. 574. 622. 638.
Phalaropus fulicarius 156. 378. 499.
Phalaropus hyperboreus 147. 524.
Phasianus colchicus 534. 640.
Phœnicopterus roseus 162. 284. 312. 447. 456. 498. 519. 533. 542. 561. 567. 574. 593. 607. 623. 639.
Phylloscopus Bonellii 6. 14. 24. 35. 41. 47. 118. 124. 142. 159. 168. 173. 183. 188. 192. 207. 235. 248. 270. 281. 291. 307. 323. 368. 381. 388. 392. 442. 455. 462. 556. 617.
Phylloscopus rufus 6. 14. 24. 35. 41. 47. 71. 105. 118. 124. 129. 142. 159. 166. 168. 183. 188. 222. 243. 254. 270. 281. 291. 307. 323. 347. 368. 392. 403. 421. 423. 442. 455. 463. 478. 513. 557. 571. 587. 604. 617. 635.
Phylloscopus sibilator 6. 14. 24. 32. 41. 50. 58. 71. 75. 88. 105. 118. 124. 129. 141. 159. 171. 176. 183. 188. 192. 207. 222. 234. 243. 254. 280. 291. 307. 323. 338. 347. 368. 381. 388. 392. 408. 441. 455. 462. 478. 495. 513. 531. 556. 604. 635.
Phylloscopus Trochilus 6. 14. 24. 31. 35. 41. 58. 71. 75. 105. 118. 124. 129. 142. 152. 159. 169. 173. 183. 188. 192. 196. 207. 222. 235. 243. 254. 270. 280. 291. 307. 323. 338. 347. 368. 388. 392. 403. 441. 462. 478. 495. 513. 556. 567. 617. 635.
Pica rustica 3. 13. 22. 28. 29. 39. 46. 54. 69. 74. 78. 104. 110. 111. 115. 127. 133. 135. 139. 150. 157. 166. 167. 174. 182. 186. 202. 218. 232. 240. 252. 259. 269. 277. 288. 302. 319. 343. 354. 362. 386. 399. 419. 426. 437. 457. 475. 485. 489. 493. 506. 529. 539. 552. 566. 569. 577. 582. 601. 632.
Picoïdes tridactylus 224. 245.
Picus Lilfordi 25. 37. 394.
Picus major 8. 15. 25. 29. 31. 43. 46. 48. 61. 72. 75. 76. 93. 100. 108. 110. 119. 120. 130. 133. 143. 153. 161. 167. 168. 177. 184. 189. 210. 224. 236. 245. 255. 261. 266. 272. 282. 310. 326. 349. 372. 386. 394. 405. 422. 429. 444. 466. 480. 487. 496. 516. 531. 541. 559. 605. 619. 637.
Picus medius 72. 75. 94. 130. 161. 184. 210. 224. 245. 255. 261. 372. 444. 466. 480. 487. 559. 605.
Picus minor 8. 15. 25. 37. 43. 46. 48. 61. 72. 75. 76. 94. 108. 130. 133. 143. 153. 161. 168. 210. 245. 255. 261. 266. 272. 282. 310. 326. 349. 372. 394. 405. 422. 429. 444. 466. 480. 516. 559. 619.
Platalea Leucorodia 10. 19. 144. 162. 247. 278. 294. 312. 329. 374. 408. 447. 468. 497. 519. 533. 542. 561. 567. 574. 592. 623.
Plegadis Falcinellus 10. 26. 37. 44. 51. 144. 162. 247. 257. 273. 284. 294. 312. 329. 338. 374. 395. 408.

Digitized by Google

447. 468. 481. 497. 519. 538. 542. 561. 567. 592. 607. 628. 639.
Podiceps cornutus 165. 214. 275. 287. 336. 337. 630.
Podiceps cristatus 12. 19. 28. 45. 51. 182. 148. 156. 165. 214. 229. 251. 259. 275. 286. 296. 316. 336. 337. 380. 418. 452. 472. 484. 500. 528. 565. 599. 630. 642.
Podiceps fluviatilis 12. 16. 28. 29. 32. 45. 64. 120. 182. 149. 156. 165. 167. 169. 186. 214. 229. 239. 251. 252. 259. 262. 275. 287. 296. 316. 336. 353. 380. 397. 418. 452. 472. 484. 500. 528. 536. 544. 565. 576. 599. 609. 630. 642.
Podiceps griseigena 149. 156. 165. 229. 251. 286. 316. 336. 337. 528.
Podiceps nigricollis 12. 19. 28. 37. 45. 51. 149. 156. 165. 214. 251. 259. 275. 287. 296. 316. 336. 337. 380. 418. 452. 484. 500. 528. 565. 599. 609. 630. 642.
Pœcile borealis 208. 308.
Pœcile palustris 7. 15. 25. 29. 31. 35. 42. 59. 71. 75. 90. 107. 110. 118. 129. 142. 160. 170. 208. 223. 235. 244. 255. 261. 271. 292. 299. 308. 324. 370. 382. 393. 429. 448. 464. 479. 496. 557.
Porphyrio cæruleus 318. 332. 377. 498. 522. 562. 568. 596. 625.
Porphyrio smaragdonotus 562.
Potamodus luscinioïdes 6. 14. 17. 42. 51. 222. 248. 308. 323. 442. 478. 557.
Pratincola Rubetra 6. 14. 24. 30. 34. 41. 47. 50. 58. 70. 88. 105. 112. 117. 128. 141. 159. 168. 171. 176. 183. 196. 207. 221. 234. 243. 254. 270. 290. 290. 306. 322. 338. 346. 356. 368. 385. 392. 402. 421. 441. 454. 462. 478. 495. 503. 513. 531. 556. 616. 634.
Pratincola Rubicola 6. 14. 24. 29. 30. 34. 41. 47. 50. 58. 70. 75. 87. 105. 117. 121. 129. 141. 151. 159. 166. 168. 171. 176. 188. 188. 191. 207. 221. 234. 243. 254. 260. 265. 270. 230. 290. 298. 306. 322. 346. 356. 368. 381. 385. 392. 402. 421. 428. 441. 454. 461. 478. 486. 495. 503. 513. 531. 556. 567. 571. 577. 586. 603. 605. 616. 634.
Procellaria pelagica 156. 296. 316. 505. 544. 565. 630. 642.
Puffinus anglorum 236. 296. 452. 456. 472. 500. 527. 609. 629. 642.
Puffinus Kuhli 12. 19. 286. 296. 316. 336. 339. 452. 456. 484. 500. 527. 565. 576. 609. 630. 642.
Pyrophthalma melanocephala 41. 51. 105. 243. 270. 280. 291. 299. 307. 323. 347. 356. 368. 408. 421. 428. 441. 455. 462. 478. 513. 556. 571. 587. 604. 617. 635.
Pyrrhocorax alpinus 3. 13. 22. 28. 55. 69. 74. 75. 78. 104. 110. 111. 140. 157. 166. 169. 174. 182. 196. 195. 202. 218. 232. 240. 302. 319. 389. 457. 475. 506. 611. 632.
Pyrrhocorax Graculus 3. 13. 22. 23. 55. 69. 75. 104. 110. 111. 157. 166. 169. 195. 202. 232. 302. 475. 493. 601. 611. 632.
Pyrrhula europæa 4. 13. 23. 33. 40. 47. 56. 69. 74. 75. 76. 81. 104. 110. 111. 116. 128. 136. 140. 151. 158. 169. 175. 182. 195. 204. 219. 232. 240. 253. 264. 269. 278. 289. 297. 308. 320. 337. 364. 382. 390. 400. 420. 427. 438. 459. 475. 494. 502. 508. 553. 612.

Q

Querquedula Circia 10. 17. 27. 32. 44. 73. 109. 118. 119. 125. 131. 137. 145. 154. 163. 170. 172. 185. 212. 227. 238. 247. 257. 273. 284. 294. 312. 330. 336. 351. 375. 396. 409. 448. 469. 482. 498. 520. 533. 543. 561. 568. 575. 594. 608. 624. 639.

R

Rallus aquaticus 11. 16. 27. 29. 32. 36. 44. 63. 109. 114. 119. 125. 131. 137. 146. 155. 163. 167. 169. 185. 198. 218. 223. 239. 248. 252. 257.

Digitized by Google

262. 274. 284. 294. 313. 331. 351. 376. 396. 410. 423. 449. 456. 470. 482. 487. 498. 504. 522. 534. 562. 568. 575. 596. 608. 625. 640.
Recurvirostra Avocetta 27. 36. 146. 155. 164. 249. 274. 285. 314. 333. 338. 352. 378. 411. 470. 483. 499. 523. 563. 598. 626.
Regulus cristatus 6. 14. 24. 29. 35. 42. 46. 47. 59. 71. 75. 89. 107. 110. 112. 129. 142. 152. 160. 166. 168. 172. 173. 176. 183. 188. 192. 196. 208. 223. 235. 244. 254. 266. 271. 281. 291. 308. 324. 348. 369. 393. 404. 429. 442. 455. 464. 478. 486. 495. 514. 531. 557. 588. 604. 617. 636.
Regulus ignicapillus 7. 14. 24. 35. 42. 46. 47. 59. 71. 107. 110. 112. 118. 121. 124. 129. 142. 152. 160. 167. 170. 173. 176. 183. 188. 208. 223. 235. 244. 254. 266. 271. 281. 291. 308. 324. 348. 369. 383. 393. 404. 421. 429. 442. 455. 464. 478. 496. 514. 557. 604. 618. 636.
Rissa tridactyla 12. 19. 165. 286. 296. 316. 413. 452. 527. 576. 609.
Ruticilla Phœnicurus 6. 14. 24. 34. 41. 47. 50. 58. 70. 75. 100. 106. 110. 112. 117. 123. 129. 137. 141. 151. 159. 168. 171. 176. 183. 188. 191. 196. 206. 221. 234. 242. 254. 265. 270. 280. 290. 306. 322. 338. 346. 367. 380. 383. 392. 402. 421. 428. 441. 454. 461. 478. 486. 495. 502. 513. 531. 555. 586. 603. 616. 634.
Ruticilla titys 6. 14. 24. 30. 34. 41. 46. 47. 50. 58. 70. 75. 76. 87. 100. 106. 110. 112. 117. 141. 159. 168. 176. 183. 188. 191. 206. 221. 234. 242. 254. 265. 270. 280. 290. 298. 306. 322. 346. 368. 392. 402. 428. 441. 454. 461. 478. 495. 503. 513. 556. 571. 603. 616. 634.

S

Saxicola albicollis 41. 47. 51. 182. 187. 191. 205. 242. 279. 290. 298. 305. 321. 366. 454. 477. 495. 502. 512. 555. 571. 614.
Saxicola melanoleuca 367. 420. 454. 477. 512. 540.
Saxicola Oenanthe 5. 14. 23. 30. 34. 41. 47. 49. 57. 70. 76. 84. 100. 101. 105. 112. 117. 123. 128. 137. 141. 151. 159. 168. 175. 182. 187. 191. 196. 205. 221. 234. 242. 265. 270. 279. 290. 305. 321. 338. 345. 366. 380. 383. 391. 401. 420. 428. 440. 454. 460. 477. 486. 495. 502. 512. 555. 571. 585. 603. 614. 634.
Saxicola Stapazina 5. 17. 23. 32. 37. 41. 47. 51. 159. 182. 221. 242. 279. 290. 298. 305. 321. 367. 401. 420. 440. 454. 460. 495. 502. 512. 555. 571. 603. 614.
Scolopax Rusticula 11. 16. 19. 28. 29. 32. 37. 45. 51. 64. 78. 99. 100. 109. 114. 120. 126. 132. 138. 147. 156. 164. 169. 171. 173. 178. 185. 193. 197. 214. 229. 239. 250. 258. 267. 275. 286. 295. 315. 334. 337. 353. 379. 382. 397. 412. 424. 431. 451. 456. 471. 483. 488. 491. 499. 505. 525. 535. 544. 564. 574. 598. 609. 628.
Scops Giu 8. 15. 26. 31. 35. 43. 48. 62. 72. 95. 108. 119. 125. 130. 135. 143. 153. 161. 169. 171. 184. 210. 225. 245. 256. 262. 267. 272. 283. 298. 310. 327. 338. 349. 357. 373. 381. 394. 406. 422. 430. 445. 467. 480. 487. 497. 504. 517. 532. 541. 559. 567. 573. 578. 591. 606.
Serinus Canarius 364.
Serinus hortulanus 4. 17. 23. 30. 40. 55. 69. 81. 104. 110. 111. 116. 128. 140. 150. 158. 169. 175. 182. 195. 203. 232. 253. 264. 269. 278. 288. 303. 320. 344. 363. 380. 390. 400. 419. 427. 438. 453. 458. 475. 485. 489. 494. 508. 530. 540. 553. 583. 602. 612. 633.
Sitta cæsia 7. 15. 25. 29. 31. 42. 59. 71. 75. 76. 90. 110. 113. 118. 121. 129. 135. 142. 152. 160. 167. 168. 176. 208. 223. 235. 244. 255. 261. 266. 271. 281. 308. 324. 348. 378.

Digitized by Google

393. 404. 422. 429. 443. 464. 479. 496. 490. 515. 558. 604. 636.
Sitta Whiteheadi 636.
Somateria mollissima 294.
Spatula clypeata 17. 26. 36. 44. 78. 130. 137. 145. 154. 162. 172. 212. 227. 247. 257. 273. 294. 312. 330. 336. 351. 375. 408. 447. 469. 481. 498. 520. 533. 542. 574. 561. 567. 594. 607. 624. 639.
Squatarola helvetica 11. 18. 45. 51. 146. 155. 164. 228. 249. 285. 314. 332. 339. 410. 450. 499. 523. 563. 626.
Starna Perdix 10. 27. 29. 32. 46. 48. 63. 73. 74. 98. 109. 111. 114. 119. 120. 121. 131. 133. 135. 146. 155. 163. 167. 169. 177. 185. 197. 213. 227. 238. 248. 257. 262. 267. 274. 284. 294. 313. 331. 351. 358. 376. 381. 385. 396. 409. 423. 431. 448. 469. 482. 487. 491. 522. 534. 543.
Stercorarius crepidatus 12. 19. 28. 37. 316. 452. 527.
Stercorarius parasiticus 12. 19. 148.
Stercorarius pomatorhinus 12. 19. 148. 165. 229. 251. 316. 452. 472. 527. 629. 642.
Sterna fluviatilis 12. 18. 28. 32. 37. 45. 48. 64. 131. 148. 156. 164. 169. 186. 229. 250. 258. 275. 286. 296. 315. 335. 338. 353. 379. 412. 452. 472. 483. 564. 609. 628. 641.
Sterna macrura 165.
Sternula minuta 12. 16. 28. 32. 37. 45. 73. 131. 148. 156. 165. 173. 186. 229. 250. 258. 275. 286. 315. 335. 337. 339. 353. 379. 397. 412. 452. 472. 500. 526. 565. 576. 628.
Strepsilas Interpres 146. 249. 295. 314. 333. 339. 450. 483. 523. 563. 626. 641.
Strix flammea 8. 15. 25. 29. 31. 43. 48. 62. 72. 74. 95. 100. 108. 110. 113. 119. 120. 121. 130. 133. 135. 143. 153. 161. 167. 168. 177. 184. 189. 216. 225. 236. 245. 256. 262. 267. 272. 283. 292. 300. 310. 327. 349. 357. 372. 381. 386. 394. 406. 422. 430. 445. 467. 480. 487. 490. 496. 504. 516. 532. 541. 559. 567. 578. 578. 590. 606. 620. 637.
Sturnus unicolor 302. 438. 552. 570. 577. 583. 601. 611. 632.
Sturnus vulgaris 3. 13. 22. 28. 29. 33. 46. 48. 55. 69. 76. 78. 99. 101. 104. 114. 115. 120. 121. 122. 127. 135. 140. 150. 157. 166. 167. 170. 172. 174. 182. 186. 195. 203. 218. 232. 240. 253. 259. 264. 269. 277. 283. 302. 319. 343. 362. 385. 390. 399. 419. 426. 437. 453. 457. 475. 485. 489. 493. 506. 530. 539. 552. 566. 570. 582. 601. 611. 632.
Sylochelidon caspia 250. 315. 335. 526. 576. 628.
Sylvia cinerea 6. 14. 24. 30. 35. 41. 47. 106. 117. 121. 123. 129. 141. 152. 159. 168. 171. 176. 183. 188. 191. 196. 207. 217. 222. 234. 243. 254. 260. 270. 280. 290. 298. 307. 322. 338. 347. 356. 468. 381. 385. 392. 402. 421. 428. 441. 454. 462. 478. 486. 495. 513. 556. 586. 604. 616. 634.
Sylvia conspicillata 280. 307. 462. 556. 587. 616. 634.
Sylvia Curruca 6. 17. 24. 35. 41. 47. 70. 100. 106. 117. 141. 152. 159. 183. 188. 191. 207. 222. 234. 243. 254. 260. 280. 307. 322. 368. 381. 382. 402. 441. 462. 478. 495. 556. 587. 616. 634.
Sylvia nana 141.
Sylvia nisoria 24. 30. 32. 41. 47. 51. 141. 151. 176. 183. 221. 234. 242. 254. 260. 270. 306. 478.
Sylvia orphæa 6. 14. 24. 30. 34. 41. 47. 106. 112. 141. 151. 159. 168. 183. 207. 222. 242. 270. 280. 290. 298. 306. 322. 338. 368. 381. 382. 392. 402. 441. 462. 466. 478. 513. 556.
Sylvia subalpina 41. 47. 141. 207. 243. 290. 307. 322. 368. 381. 385. 392. 441. 455. 462. 478. 495. 513. 556. 587. 604. 616. 634.
Synoicus Lodoisiae 163.
Syrnium Aluco 8. 15. 25. 33. 43. 48. 62. 72. 74. 95. 119. 130. 133. 135.

Digitized by Google

143. 153. 161. 167. 168. 210. 225. 236. 245. 256. 262. 267. 272. 283. 292. 310. 327. 349. 372. 394. 406. 422. 430. 445. 467. 480. 516. 541. 559. 567. 573. 590. 606.
Syrnium uralense 225.
Syrrhaptes paradoxus 155. 218. 274.

T

Tadorna cornuta 145. 154. 162. 247. 278. 312. 330. 408. 447. 469. 481. 498. 520. 533. 561. 594. 623. 639.
Terekia cinerea 258. 334. 525.
Tetrao Urogallus 73. 131. 163. 167. 169. 185. 189. 197. 213. 227. 233.
Thalasseus cantiacus 11. 250. 286. 296. 315. 335. 379. 451. 483. 526. 544. 564. 628. 641.
Tichodroma muraria 7. 15. 25. 29. 31. 33. 42. 46. 47. 60. 71. 75. 76. 107. 110. 118. 142. 168. 177. 184. 207. 224. 235. 244. 255. 266. 271. 282. 292. 308. 325. 370. 393. 404. 422. 443. 455. 465. 479. 496. 508. 515. 558. 618.
Totanus Calidris 11. 19. 28. 37. 45. 147. 156. 164. 229. 250. 258. 275. 285. 295. 315. 334. 338. 352. 379. 412. 451. 471. 483. 499. 525. 535. 564. 609. 627. 641.
Totanus fuscus 11. 19. 45. 138. 147. 164. 250. 258. 275. 295. 315. 334. 338. 352. 379. 412. 451. 471. 483. 499. 525. 564. 627.
Totanus Glareola 11. 19. 28. 37. 45. 132. 147. 164. 229. 250. 258. 275. 285. 295. 315. 333. 339. 352. 378. 411. 451. 471. 483. 525. 535. 564. 627. 641.
Totanus nebularius 142. 156. 164. 250. 275. 286. 295. 315. 334. 337. 338. 379. 412. 451. 471. 483. 499. 525. 564. 627. 641.
Totanus Ochropus 16. 27. 29. 32. 37. 73. 101. 109. 114. 126. 132. 138. 147. 156. 164. 170. 185. 214. 228. 250. 258. 275. 285. 295. 315. 333. 352. 378. 397. 411. 450. 471. 483. 499. 524. 544. 564. 568. 609. 627. 641.
Totanus stagnatilis 11. 19. 45. 109. 147. 156. 164. 250. 275. 285. 315. 334. 338. 378. 451. 471. 483. 499. 525. 535. 564. 627.
Tringa Canutus 164. 285. 314. 333. 450. 471. 499. 563. 627.
Tringoïdes Hypoleucus 11. 16. 27. 32. 36. 45. 48. 64. 109. 114. 120. 132. 147. 156. 164. 169. 214. 223. 250. 258. 275. 285. 295. 300. 314. 338. 352. 378. 397. 411. 450. 456. 471. 483. 499. 524. 535. 544. 564. 576. 609. 627. 641.
Troglodytes parvulus 6. 14. 24. 29. 30. 42. 46. 47. 50. 58. 71. 75. 76. 88. 106. 110. 112. 118. 121. 124. 129. 142. 160. 166. 168. 172. 176. 183. 188. 192. 196. 207. 223. 235. 243. 254. 266. 271. 281. 291. 299. 308. 324. 347. 369. 384. 392. 403. 421. 429. 442. 455. 463. 478. 486. 495. 514. 531. 557. 571. 577. 604. 617. 635.
Turdus atrigularis 159. 421. 440.
Turdus iliacus 5. 18. 24. 33. 34. 41. 49. 57. 70. 101. 106. 114. 117. 123. 129. 137. 141. 151. 159. 171. 173. 176. 183. 191. 196. 206. 221. 234. 242. 254. 265. 270. 280. 290. 306. 321. 337. 346. 367. 385. 392. 402. 421. 429. 440. 454. 461. 477. 495. 512. 555. 603. 615. 634.
Turdus musicus 5. 14. 24. 34. 41. 49. 57. 70. 75. 76. 85. 100. 106. 112. 117. 120. 121. 123. 129. 137. 141. 151. 159. 168. 170. 173. 176. 183. 187. 191. 196. 206. 221. 234. 242. 254. 265. 270. 280. 290. 306. 322. 337. 346. 367. 385. 392. 402. 421. 428. 440. 454. 461. 477. 489. 495. 512. 530. 540. 555. 566. 571. 586. 603. 615. 634.
Turdus obscurus 23. 37. 440.
Turdus pilaris 5. 17. 24. 33. 34. 41. 57. 70. 85. 100. 101. 106. 114. 117. 123. 129. 137. 141. 151. 159. 171.

Digitized by Google

176. 183. 191. 196. 206. 221. 234. 242. 254. 265. 270. 280. 290. 306. 321. 316. 367. 382. 391. 402. 421. 428. 440. 454. 461. 477. 495. 512. 555. 571. 583. 603. 615. 634.
Turdus Swainsoni 306.
Turdus viscivorus 5. 14. 24. 29. 30. 41. 46. 47. 49. 58. 70. 74. 75. 86. 106. 110. 112. 117. 121. 123. 129. 133. 135. 141. 151. 159. 166. 168. 170. 176. 183. 188. 191. 196. 206. 221. 234. 242. 254. 260. 265. 270. 280. 290. 298. 306. 322. 346. 356. 367. 385. 392. 402. 421. 428. 440. 454. 461. 477. 486. 489. 495. 512. 530. 540. 555. 603. 615. 634.
Turnix sylvatica 534. 562. 575. 596.
Turtur tenera 10. 27. 31. 36. 44. 48. 51. 73. 76. 97. 114. 119. 131. 135. 146. 155. 163. 169. 171. 177. 185. 189. 193. 197. 213. 227. 238. 248. 257. 262. 267. 274. 284. 294. 313. 331. 338. 358. 376. 381. 385. 396. 409. 423. 430. 448. 456. 469. 482. 487. 491. 498. 504. 521. 534. 543. 562. 575. 579. 595. 608. 625. 640.

U

Upupa Epops 8. 15. 25. 31. 35. 43. 48. 50. 61. 72. 76. 95. 100. 108. 113. 119. 130. 135. 143. 153. 161. 168. 170. 177. 184. 189. 193. 210. 225. 236. 245. 256. 261. 266. 272. 288. 292. 310. 327. 338. 349. 357. 372. 381. 382. 394. 405. 422. 430. 445. 455. 467. 480. 490. 496. 503. 516. 532. 541. 559. 567. 573. 578. 590. 606. 620. 637.
Utamania Torda 296. 316. 336. 452. 456. 500. 505. 527. 544. 630. 642.

V

Vanellus Capella 11. 18. 27. 35. 45. 51. 64. 73. 109. 114. 120. 126. 132. 138. 146. 164. 172. 185. 193. 214. 228. 239. 249. 258. 267. 274. 285. 295. 314. 332. 337. 338. 352. 378. 397. 411. 431. 450. 470. 483. 488. 491. 499. 505. 523. 535. 543. 563. 576. 597. 609. 626. 641.
Vultur monachus 237. 446. 560. 622. 638.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE DEI NOMI VOLGARI.

A

Abbatti-cuda giallina 540.
» nigra 540.
Abiargiu 620.
Acchiappamuschi 558.
Acchieua 525.
Acciduzzu musca 571.
Aceddazzu 532.
» cu a testa janca 532.
» janco 532.
» jancu 532.
Aceddu cavaleri 563.
» celesti 605.
» parrinu 565.
Achili de pisci 621.
» piscadrixi 621.
Achiloni 621.
Aciddazzu biancu 607.
» di passa 560.
Acidduzzu d'acqua 597.
» di fava 556.
» di Paradisu 567.
Aciduzzu di fienu 604.
Aciedd di San Giuan 516.
» d'la neva 511.
» lurd 521.
» selvaggio 523.
Acquaiolo 455.
Acquaroletto 482, 483.
Acquarolo 483.
» alto 483.
Acquarulo 496, 516.
Aculle 229.
Acula 9, 573, 638.
» bianca 9.
» dla couva bianca 9.
» pescoira 9.
» real 9.
» roussa 9.
Aculotta 573.
Addinazza 597.
Addinedda 597.
» d'acqua 608, 609.
» monaca 609.
Adduzzu d'acqua 588, 604.
» » pedi virdi 596.
Adorno 541.
Adornu 541, 560.
Africa 520.
Aggruppafilu 604.
Agroi 543.
Agu 624.
Agugia 43, 293.
» foestea 293.
Agugiotto 293.
Aguina 321.
Agula 108.
Agustinedda bastarda 525.
» verdatara 524.
Agustiniedd 524.
Aigia 9.
Aipa 576.
» pedi-niuri 565.
» pizzu tuortu 576.
» triugni 526.
Airon 63, 162, 237, 256.
» blanc 162.
» dal becol negro 212.
Airón 211, 226, 246.
» blanco 211.
» blanc 226.
» foresto 247.
Airòn 312.
Airone 497.
» maggiore 446.
» minore 446.
Airoun 9.
» giaun pcit 9.
Airuni 542, 607.
Aiula 588.
Ajassa 3.
Ajroûn 130.
Aju l'aguggia cu lu filu 572.
Ala-longa 164.
» di li picculi 165.
» nira 165.
» pedi russi 165.
» tupputa 164.
Alalonga 609.
Albaneddu di passa 559.
Albanella 327, 372.
» reale 327.
Albaro 257.
Alberna 63.
Ale de fógo 244.
Alèt 118.
Alet nigher 118.
Alett 107, 130, 160.
» del col blanc 160.
Aletù 118.
Aliniuri 603.
Alipinti 611.
Alitunni 606.
Aliuzza 325.
Allocco 327, 349, 372, 394, 406, 430, 445.
» di padule 445.
Allodola 485.
Allodolina 485.
Alocc 236.
Alocco 422.
Aloch 72.
Aloco 256.
» coi corni 184.
» de campanil 177.
» de vale 256.
» grande 184.
Alóco 245.
» de palù 245.
» salvadégo 245.
Alocón 245, 246.
Alodóla 245.
Alpigino 402, 421.
Alsavola 351.
Altore 638.
Alzavola 375.
Amarot 116.
Ambra 4.
» dla flocca 5.
Ambroun 4.
Ammazza cani 575.
Amolott 55, 69.
Amorott 128, 158.
Amulot 69.
Amuraru 571.
Anara 257.
» bastarda 248.
» da zógolo 247.
» salvádega 247.
Anari a capanuccia 624.
» a ulieras 624.
» conc' arrubia 624.
» de Spagna 624.
Anariera 623.
Anatra codona 481.
» di mare 331.
» furmintina 594.
Andr 520.
Aneda salvadega 108, 130, 162.
Anedra salvaiga 73.
Anera 247.
» della coa longa 212.

Digitized by Google

Anera grossa 212.
» medana 212.
» salvarega 212.
» subiota 212.
» visciarola 212.
Anerón 212.
» dal bech sotil 212.
Anetra 498.
Ania 10.
» greca 10.
» matta 294.
» neigra 44, 294.
» sarvaega 44.
» sarvaja 10.
» sarvaja dla couva longa 10.
Anida selvadiga 63.
Anima de sbiro 315.
» di sbirro 379.
Anitra 487, 561, 574.
» bianca cu l'ali niuri 594.
» cuduta 594.
» friscalora 594.
» janca 594.
» maltisa 594.
» salvadiga 73.
» sirretta 595.
» tupputa 594.
» turca 575, 594.
Anitrella 487.
Anitrin 312.
Annia 284.
» de due cüe 284.
» du collo russo 284.
Antene 523.
» gentili 523.
Antióla 204.
Anzoleto 248.
Apaluoru 605.
Aparulo 496.
Aparúlo 516.
Aparuolo 490.
Appappa-muschi 605.
Appizza ferru 605.
Aquila 43, 62, 72, 108, 130, 211, 311, 394, 423, 517.
» bastarda 517.
» de mar 246.
» di mare 328, 372.
» reâ 283.
» reale 161, 177, 256, 481.
Aquiloto 256.
Aquilóto 246.
Aquilotta 560.
Aquilotto 327, 446.
Arancino 348, 369, 393, 404.
Arbaneddu 560.
» causi russi 560.
» di passa 560.
Arcada 214.
Arcája 250.
Arcangelo grosso 483.
» mezzano 483.
» piccolo 483.
Arcaza 186, 258.
Arcáze 229.
Arcàzuil 229.
Arcera 491, 499, 525, 535.
Arcigghiola 535.
Arcigliola 500.
Arcigliuolo 500.
Arcignola 544.
Arcirotta 609.
» di turdi 561.
Arcirottu 598.
Arciruttedda 609.
Arciruttedu 598.
Arciruttuni 564.
Arcistrello 350.
Ardenna 484.
Arena 247.
» salvadega 185.
Aretta 561.
» biunna 561.
Ariattin 266.
Arione 328.
» imperiale 518.
Ariotto 374.
Ariuncellu 592.
Ariuncinu 592.
Ariuni biancu 592.
» cinniriuu 591.
Armentarèsse 220.
Armentarutt 234.
Arol jancu 561.
Arpa 560.
Arpan 4.
Arpazza 574.
Arpegghia 559, 560.
» janca 559.
Arpegna 497.
Arpegnone 497.
Arpezin 306.
Arpia 573.
Arpone 491, 527.
» paparino 527.
Arpongiedd 527.
Arru 506.
Arrundili de a' roca 619.
Arsega 275.
Arsigneul 4.
Artera 527.
Aruni 561.
Arzadega 131.
Arzagola 351.
Arzavola 330, 396.
Ascetiello 497.
Ascio 496.
Asiá 247.
Asiáda 247.
Asiáo 247.
Assiolo 349, 372, 445.
Astór 211.
Astòr 226.
Astoréla 211.
Astore 328, 350, 374, 395, 407, 445, 446, 481, 490.
Asturi 542.
Auberi 588.
Aucco 43.
» grosso 43.
Aucedduzzu di notte 573.
Auceduzzu di paradisu 573.
Aucidduzzu di fava 586.
» di macchia 587.
Aüco 310.
Aurana 497.
» ianca 497.
Auranella 497.
» melata 497.
Aurione 497.
Auzhel dalle pite 211.
Avariul 237.
Averla 348.
Averla bigia 348.
» capirossa 325, 348.
» cenerina 325
» gazzerina 348.
» gazzina 348.
» grossa 325, 348.
» piccola 325, 348.
Averlia bianca 370.
» gazzerina 370.
» rossa 370.
Avión 211.
Avocetta 499.
Avvoltoio 638.

B

Babbusso 401.
Babusso 476, 485.
» gola rossa 476.
Baccalotto 456.
Bacco 408.
Badascule 232.
Badàscule 218.
Bagiánto 251.
» maciâ 251.
Bagiongolo 412.
Balaina gianca 305.
» zala 305.
Balainha 279.
Balarin 226, 237, 246.
Balarina 4, 70, 117.
Balarota 117.
Bâlén-na 41.
Balerina 120.
Balestruccio 325, 349, 371, 394, 405, 422, 429, 443, 455.
» bigio 349.
Balia 325, 370, 371, 443.
Ballarina 57, 105, 159.
» gialda 57, 70.
Ballarotta 159.
Ballerina 70, 321, 345, 366.
» gialla 321, 345.
Balúco 245.
Bándule 233.
Báo 251.
Barazzolo 448.
Barazzuolo 408, 423.
Barba-piero 209.
Barbagian 184, 210, 256.
Barbagiáni 245.
Barbagianni 327, 349, 372, 394, 406, 422, 430, 445, 487, 490.
Barbajanni 541, 559.
Barbapièro 244.
Bàrbazagn 267.
Barbell dè corna 118.
Barbexin 281.
Barbezuan 225, 236.
» grand 225, 236.
Barbisa 4.
Barbottula 558.
Barèch 213.
Barluato 253.
Barusóla 249.
Barvajanni 541.
Basettino 443.
Bastarduni 602.
Bati-ale 176.
Batiale 70, 183, 184, 207, 209, 254, 255.

Digitized by Google

Batiale negrisol 177.
Batiàle 245.
» moro 245.
Batiàle foresto 242.
Batiàlis 224.
Batialón 209.
Batilégno 245.
Batticoa 182.
Batticóa 241.
» zala 242.
Batticoda 345, 391, 420, 428.
» bigia 366.
» di fosso 366.
» di tetto 366.
» gialla 366.
Batticodola gialla 391.
» nera 391.
Bavolo 490.
Bazana 292.
Bec in cros 519.
» in crus 105.
Beca foermighe 119.
» mure 117.
Becaccia 73.
Becacin 73.
Becacópi 240.
Becafic 117.
Becafigh 7.
Becafico 176, 183, 196, 234, 254, 280, 307.
» de palù 207.
» zelega 183.
Bécafigo 235.
Becafigo 243.
» foresto 245.
Becafigon 183.
Becaformig 72.
Becalegn 210.
» curglós 208.
» medan 208.
» negro 210.
» ross 210.
Becalégn 208.
Becalegnét 208.
Becalegnón 210.
Becalén 208.
Becamur 208.
Becamuri 184.
Becanela 258.
Becanéla 250.
Becanéle 229.
Becanót 214.
Becanòt 229.
Becanoto 186, 258.
Becanóto 250.
» muto 250.
Becarán 208.
Becaréla 214.
Becasas 208.
Becasassi 184.
Becasássi 244.
Becasin cito 73.
Becassa 11, 73, 250, 295, 315.
» de mâ 286.
Becassetta 11.
Becassin 11, 73.
» gambe lounghe 11.
» mazzengo 45.
Becasson gross 11.
Becassounot gris peit 11.
Becassot 11.
Becazóch 210.
Becc in cros 158.
Becc in crôs 56.
» in cross 233.
» in crus 116.
» stuart 233.
Becca' lesina 333.
Becca mosche 347.
» moschino 442.
Beccaccia 334, 353, 379, 397, 412, 424, 431, 451, 456, 483, 488, 491, 499, 535, 544, 641.
» de mari 626.
» di mare 333, 378, 411, 450, 483.
» reale 353.
» romana 499.
Beccaccina 488, 500, 525, 609.
Beccaccineddu 564.
Beccaccineju mutu 544.
Beccaccino 334, 353, 379, 397, 412, 421, 424, 456, 478, 486, 489, 491, 495.
» mezzano 379.
» piccolo 353.
» reale 353, 451.
Beccaccinu 535, 544, 564, 576, 598.
» di sciumara 564.
» differenti 627.
» jammi longhi 564.
» peis grogus 627.
» riali 564, 576.
» tri-ugni 563.
Beccaccinuzzu 544.
Beccacciola 488
Beccacciu 564, 598.
Beccafich 71.
Beccafichino 347, 368.
Beccafico 322, 347, 368, 392, 402, 421, 428, 441, 442, 513.
» canapino 403.
» cannaiolo 323.
» di padule 347, 369, 442.
» giallo 368.
» passerino 421, 441.
» piccolo 368.
» reale 347, 368.
» selvatico 323.
Beccaficone 347, 441.
Beccaficu 567, 571, 587.
» di cerza 571.
» di margiu 557.
» di siminatu 557.
» grossu 556.
» impiriali 571.
» russu 557.
Beccafig de risera 160.
» zenerin 159.
Beccafigh 58.
» gros 159.
Beccafigo 41, 222, 291.
Beccafigón 242.
Beccamoro 542.
Beccamosche 270, 404, 405.
Beccamoschino 369.
Beccamuschi 587.
Beccapesce 335.
Beccapesci 353, 372, 379, 394, 412, 450. 451.
Beccaragni 286.
Beccarossa 257.
Beccascia 64.
Beccassa 45, 286.
» d'ma 45.
» de ma 45.
» de mâ 295.
» de mae 314.
Beccassin 286, 295, 315.
» reâ 45.
» sordo 45.
» surdo 295.
Beccaze 641.
Beccazza 109.
Becch in crous 128.
Becco torto 289.
Beccociatto 44.
Beccotorto 40. 278.
Beccostorto 475.
Beccu in cruci 553.
» russu 564.
» tortu 598.
Becculortu 608.
Bech an crous 4.
» dur 4.
» in crous 69.
» stort 4.
Bechela 186.
Becher 105.
Beco in crose 182, 253.
Bèco storto 304.
Becogrosso 253.
Becostorto 204.
Becotto 364, 390.
Beduina 244.
Bella donna 62, 130.
Belladonna 161.
Belluàto 241.
Bentruxiu de' angiom 622.
Berbexin 291.
» de cua longa 281.
Berluato 182, 195.
Berluàto 241.
Berluáto 241.
Berna 73.
Bert 3.
» franseis 3.
Berta 3, 54, 69, 104, 127, 157, 277, 288, 336, 452.
» rossa 69.
Bertacco 296.
» piccin 296.
Bertavela 10.
Bertina 435.
Bertolo 329.
Bertolotto 329.
Bet 206.
Bét 206.
Betarél 206.
Béto 242.
Betúz 206.
Betùzh 206.
Bianchet 6, 106.
Bianchét 207.
» de bosch 207.
Biancheta 213.
Bianchéta 207, 213.
Bianchéta 176.
Biancheto 254.
Biancheton 183.
» becafigo 176.
Bianchetón 207.
Bianchett 118.
Bianchettón 222.

Digitized by Google

Bianchin 104.
Biancola 290.
Biancone 373, 406, 430, 445, 480.
Bianculiddu 556.
Bibbio 351.
Bicca linna 619.
Biccaccia 525.
Biccaccina 525.
Biccafigu 616, 617.
Biccamortus 618.
Biccu grussu 612.
» tortu 613.
» trotu 613.
Bifara 520.
Bigia 421.
» grossa 441, 478.
Bigina 347, 428.
Bigino 371.
Bigione 322, 368.
» piccolo 368.
Birdarolu 612.
Biseghin 258.
Biseghin 249.
» del sabiôn bianco 249.
» d' istá 249.
» novêlo 249.
» rigá 249.
» rosso 249.
Bisighin 228.
Bittordu 561.
Bittorna 561.
Blançhetón 221.
Blancón 237.
Bo-gros 71.
Boain 307.
Boari 117.
Boàri 315.
» picenin 315.
Boarina 128, 159, 175, 182, 205, 253, 305, 401, 420, 428, 477.
» gialla 477.
» gialla d' acqua 477.
» squassacoa 175.
» zala 182.
Boarina 241.
Boarináto 241.
Boarine 220.
Boarola 205.
» zhala 205.
Böba 119.
Bocassa 265.
Bocássa 215.
Bochass 236.
Boçhass 236.
Boén 41.
Boën 291.
» gianco 291.
Boenétto 41.
Boënetto 291.
Boiin 285.
Boin 280, 281.
» de primaveja 280.
» gianco 281.
Balarotta 128.
Bonicola 345, 365.
Boscara 183.
Boscardela 207.
Boscardelêta 207.
Bosco 409.
Bouarina 5.
Bouciard 6.
Boulou 6.
Bouñalin 7.
Bouw 72.
Bozzoletto 375.
Brancicaloru 558.
Braviere 364.
Brescandalo 266.
Brinzo 452.
Brunel 69.
Brusala 184.
Brúsola 244.
Buarazza 165.
» pedi-biunni 165.
Buarina 105.
Buarottu 556.
Buba 61, 72, 130, 161, 177.
Bubba 161.
Bubbola 61, 373, 394, 405, 430.
Bubo 177.
Bubola 480.
Búbola 210.
Bübola 108.
Bubú 245.
Buccaccio 637.
Buccazzolo 608.
Bucciajola 393.
Bufferla grossa 266.
» mezzana 266.
» piccola 266.
Bufo 349.
Bulgaria 285, 286.
» de gambe russe 285.
» de sciume 285.
Bulgarin 285.
Bulgarin 285.
Bumbola 455.
Burgainetto 285.
Burgainotto 286.
Burububû 210.
Buschin 42.
Busciu 624.
Büsun 311.
Buulin 228.
Buvreul 69.
Buzaseze 118.

C

Cá de Scacc 119.
» de Sere 119.
Caca-marreggiù 556.
» -palu 556.
» -sipala 556.
» -sipala cu l'occhi russi 556.
» -sipala nira 556.
» -sipala russu 556.
» -sipali 604.
Cacamargiale 513.
Cacamarruggiu 567, 586, 603.
Cacafuoco 496.
Cacapalu 571.
Cacasipali cu l' occhi russi 604.
Cacaviola 584.
Cacciaventu 560.
» di passa 560.
» furastieri 560.
» maltisi 560.
Caenáno 249.
Caenásso 249.
Cagiana 491.
Cagnaccio 331.
Cagnass 230, 236.
Cagnasse 237.
Cagne 237.
Cagnina 107.
Caitedda peis arrubius 629.
» nieddus 629.
Caiteddu 628.
Caja 10.
Cajazza 492.
Cajorno da testa russa 282.
» lumbardo 282.
» nostrâ 282.
» terragno 282.
Cajurno 42.
» lombardo 42, 292.
» lombardo grosso 42.
» nostrà 292.
» testa roussa 292.
Calabria 10.
Calacinni 608.
Calandar 57.
Calandra 41, 56, 70, 116, 128, 175, 204, 205, 289, 320, 345, 365, 401, 421, 439, 476, 485, 489, 530, 554, 613.
» col capeùs 116.
» marina 523.
» nostrana 205.
Calandrat 233.
Calandrâtt 220.
Calandre 233.
Calándre 220.
Calandredda 570.
» d'arvulo 602.
Calandrella 530.
» e chianu 530.
Calandria 613.
» manna 613.
» reale 613.
Calandriedda 613.
» a beccu finu 613.
Calandrin 220.
Calandrín 241.
Calandrina 158, 205, 613.
Calandrino 320, 401, 439.
Calandrión 241.
Calandrioni 613.
Calandro 401.
Calandròn 220.
Calandrone 509.
Calandruni 544.
Calannaruni 584.
Calannira 584, 602.
Calanniredda 584.
Calantra 494.
Calavria 10.
Calca bodda 326.
Calcapaglione 323.
Calchin 131, 163.
Calcinaiola 448.
Calderino 363, 390, 400, 419, 427.
Calenzolo 427.
Calenzòlo 390.
Calenzuolo 344, 363.
Campanáto 248.
Campanatón 248.
Campanèle 248.
Canapiglia 330, 350, 475,

Digitized by Google

Canapino 442.
Canarieddu de monti 612.
Canarin d'montagne 69.
» d'mountagna 4.
Canariu areste 612.
» de monti 612.
Canaról 207.
Canaróla 243.
Canavirola 6.
Canavrota 6.
» di busson 6.
Canelin 207.
Canelon 183.
Canelón 207, 243.
Canepino 323.
» maggiore 323.
Caneroncione 347.
Caneticchio 521.
Caneto 254, 525.
Canéto 243, 245.
Canevaról 207.
Canevarola 254.
Canevaróla 243.
Canevarolón 243.
Canevela 183.
» rossa 183.
Canivello 455.
Cannaiola 403.
» grossa 369.
» piccola 369.
Cannaiuola 347.
Cannajola 323.
Cannajolino 323.
Cannareccione 369, 442.
Canneggio 478.
Cannellone 410.
Cannelonga 520, 528.
Cantaris 4.
Caodóro 208.
Caonegro 183, 196, 207.
Caonero 207, 243, 254.
» foresto 242.
Caorosso 183, 243.
Caostorto 184.
Caostórto 245.
Capastr 9.
Capellua 182.
Capelòta 175.
Capelua 196.
Capelúa 205, 241.
Capelúga 205.
Capéluga 253.
Capelûnna 40.
Capenegar 70.
Capenera 70.
Caperuss 521.
Capeusso 498.
Capibigio 347.
Capidoro 348.
Capigiallo 348.
Capignora 514.
Capigrosso 455.
Capilúa 241.
Capilúda 241.
Capinegra 348.
Capinera 322, 347, 368, 392, 393, 402, 420, 428, 441, 490, 531, 616, 635, 636.
» piccola 393.
Capinero 176.
Capirossa 370, 443.
Capirosso 325, 455.
Capitorsolo 426.
Capitorza 310.
Capnegar 70.
Capnegàr 58.
Capnegher 106, 129, 159.
Capneiar 70.
Capneigro 70.
Capneir 6.
» d'mountagna 6.
» gros 6.
Capnigher 117.
Capo verde 312.
Capo-verde 481, 520.
Capobianc 507.
Capocchino 377.
Capofoscola 495.
Capoceciola 486.
Capon de padú 312.
Capone schiavoniaco 520.
» selvaggio 497.
Caponera 486.
Caponeri 222, 234.
Caponessa 482.
Caporosso 363, 447, 636.
Caporusso 498.
Capotortiello 496.
Capotorto 489.
Capovaccajo 446.
Cappellaccia 345, 365, 391, 401, 421, 430.
Cappellaccio 320.
Cappellara 494.
Cappellone 408.
Capponaccio 350, 408.
Cappone di padule 446.
Cappurussu 594.
Capuzieddu 570.
Capuccina 573.
Capufuscu 587.
Capuni d'acqua 574.
» di margi 561.
Capurussu 594.
Capuvirde 533.
Capuvirdi 542.
Caracefalo 540.
Caraciatri 72.
Caragiau 569.
Caranniluni 584.
Carannula 570.
Carannulu 566.
Carbunaru 557.
Carca baggiu 292.
Carcababi 8.
Carcabaggi 42, 282.
Carcarazza 539, 552, 569.
» di mari 573.
Carcaràzza 566.
Carcarázza 529.
Carcarazzedda 558. 572.
Carcarazzu 582, 601.
Carcarezzeddu 588.
Carcassûco 307, 308.
Carcavicchiola 637.
Carcatepe 70.
Carcateppe 8.
Cardain 303.
Cardainha 278.
Cardaino 633.
Cardanera 612.
Cardarugiolo 264.
Cardeinna 288.
Cardelin 240.
Cardelit 69.
Cardellina 633.
Cardellino 320, 344, 363, 412, 427, 438, 453, 475, 485, 489.
Cardello 438.
Cardén-na 40.
Carderino 344.
Cardiddu 553, 566, 570, 583, 602.
Cardijuzzu 540.
Cardilina 612.
» groga 612.
Cardillicchio 507.
Cardillinu 583.
Cardillo 494, 507.
» selvaggio 489.
Cardillu 530.
Cardinali 116.
Cardinalin 104, 158, 182.
Cardinalin 120.
Cardlin 4.
Cardolella 494.
Carenzolo 343, 363.
Carenzuolo 344.
Carici 542.
Carnagiadu 582.
Carnagialu 590.
Caròsol 117.
Carpinteri 559.
Carrabaru 567.
Carrabedda 588.
Carrabédduzza 588.
Carracefalu 558.
Carraggià 559.
Carragiau 541, 567, 582.
Carraru 559.
Carriniedd 522.
Carroga 610.
» barza 610.
» brascia 610.
» giajulada 610.
» niedda 610.
Carroghedda de campanile 611.
» de monti 611.
Carrubbeddu 557.
Carrucola 575.
Casarinola 494, 495.
Cassasut 45.
» pcit 45.
Cassola 205.
Cassul 10.
Castagnetta 281, 291.
Castagniedda 604.
Castrapalomba 490.
Castrica 422, 486.
» asinina 486.
» palumbina 486.
Castrice 393.
Castrocchia 422.
Catarinela 175.
Catór 213, 227.
Catórn 213.
Catórs 238.
Catuss pizzul 236.
Catûss 237.
Catùss 225.
» pizzul 225.
Cau 629.
» arrosa 629.
» brasciu 629.
» de mari 629.
» mannu 629.
Cauross 227.
Cavajer 11.
» loumbard 11.

Digitized by Google

Cavalarin 257.
Cavalarin 249.
Cavalier d'Italia 378, 397, 411, 450, 627.
Cavalonghia 71.
Cavazùa 244.
Cavrìòl 251.
Cavrìòla 251.
Cazzoleddu 630.
Cazzulot 130.
Cazzuron 162.
Ceca 564.
Cecca 319, 343, 347, 363, 399, 426, 437.
Cecè 204.
Cecero 446.
Ceciora 323.
Cedda de palazzu 611.
Cedron 163.
Cedroun 131.
Cefalaru 560.
Cegessa 391.
Celestin 244.
Centocóste 247.
Centossi 315.
Centrub 71.
Cercè 204.
Cercè grande 204.
Cercégne 238.
Cercer 176.
Cercigne 227.
Cesena 346, 367, 402.
Ceseno 226.
Cesessa 391.
Cestariello 497.
Cetra 519.
Cevetta 496.
Çhacarùto 222.
Çhapelate 233.
Çhapelute 233.
Çhapeluto 233.
Charandine 235.
Chéc 203.
Checa 69.
Chéca 203, 240.
Chèche 218, 232.
Chérso 247.
» foresto 248.
Cheurv 68.
Chiappamosche 394.
Chiappapesci 394.
Chiaracurdaca 540.
Chiavitteri 588.
Chicchitedda 556.
Chilandra 613.
Chilandrina 613.
Chiò 523, 606.
Chio-chio 334.
Chiochiò 583.
Chioco 412.
Chirist 616.
Chirliucchiò 549.
Chiu 480.
Chiù 349, 373, 394. 406, 422, 430, 445, 567.
Chiucco 327.
Chiui 525.
Chiuino 323.
» bianco 323.
» giallo 323.
» verde 323.
Chiumbino 542.
Chiummaloro 604.
Chiummarella 495.
Chiummazzone 498.
Chiummainu 560.
Chiuppu 591.
Chiurletto 379.
Chiurlo 349, 353, 379, 397, 422.
» -in Chiò 327.
» maggiore 451.
» piccolo 451.
Chiurlotto 379.
Chiuvettone 525.
Çhoss 227, 238,
Çia 204, 241.
Ciabrier 8.
Ciach-ciach 5.
Ciaciara 5.
Ciaciarello 303.
Cialdin 250.
Ciane 349.
Ciaola 492.
Ciapamusch 91.
Ciappa mosche 282.
Ciapusso 290.
Ciardoulina 4.
Ciarletta 290.
Ciarlettua 41, 280, 291.
Ciarlettuin-na 41.
Ciarlettuinna 41.
Ciarluottella 500.
Ciarluotto 500.
» reale 500.
Ciatarùn 304.
Ciáto de palú 241.
Ciattarón 10.
Ciattarun 289.
Ciattarùn 279.
Ciaucin 6.
Ciaula 506, 552, 582.
» di campanaru 582.
» maltisa 566.
Ciàula 569.
» grigia 582.
» maltisa 582.
Ciauva 68.
Ciavareul 72.
Ciavola 488.
Ciavula 539, 582, 601.
» cu pizzu russu 601.
Ciávula 529.
Cic-ciac d'montagna 70.
Cicanella 531.
Ciccibeú 41.
Cicerone 494.
Cicheich 7.
Ciciarune 530.
Ciciaruni 584.
Cicic 69.
Cicirone 508.
Ciciruni 553, 570, 602.
Cicogna 10, 63, 374, 395, 408, 497, 542, 592.
» bianca 481.
Cicogna chiumbina 532.
» jauca 533, 561, 574.
» 'mperiali 607.
» nera 374, 481.
» niura 561, 574, 607.
'Cicógne 226.
Cicognedda 542.
» ianca 542.
Cicognella janca 533.
Ciconia 395.
Cieuvi 295.
» grosso 295.
Cifulot 69.
Cifulott 104.
Cifoulot 4.
Cign 10, 44.
Cigno 226, 247.
» reale 447, 481.
» salvatico 447.
» selvatico 375.
Cignu 561, 574, 593.
Cilicchia 479.
» greca 479.
Cin 10.
Cincera 370.
Cincia 348, 422.
» bigia 370, 443.
» grossa 370.
» mora 370.
» nera 404.
» turchina 370.
Cińcia verd 6.
Cinciallegra 429, 490, 514.
Cinciara 244.
Cincibin 176.
Cincinguatto 374.
Cincin 4, 6.
» bianch 6.
» da neive 42.
» giaun 6.
» peit 6.
Cincina 324, 374.
Cincinina 324.
Cincino 348.
Cinciribin 254.
» sénarin 254.
Cinciuin 69.
Cing salvadegh 130.
Cingalina 443.
Cingallegra 429.
Cingallina piccola 422.
» reale 422.
Ciniga 258.
Cip 204.
Cipp 220, 233.
Ciprioto 177.
Ciràut 219.
Çirant 232.
Cirbio 541.
Circin 575.
Circolessa 413.
Circuredda 624.
Circuredda a conca bianca 624.
Ciribibi 7.
Cirinciá 588.
Cirrisola 502.
Cirrivi 563.
Cirriviu 598.
Cirulli 576.
Cirzotta 575.
Cio 70.
Ciò 43, 210, 283.
Ciô 245.
Ciô 293.
Ciò-cio 254.
Ciòch 210.
Ciocheta 185.
Ciochèta 118, 258.
Ciochèta 214, 250.
Ciodo 310.
Cioja dal bech giaun 3.
» » » rouss 3.
Ciola 506.
Cione 349.
Ciosséta 247.

Digitized by Google

Ciosso 185.
Ciósso 247.
Ciouch 72.
» d'mountagna 8.
Ciouñù 5.
Ciouin 43.
Cious 8.
Çisila 245.
Çisile 236.
» de mar 229.
'Cisile 224.
Çisilin 236.
Cisini 623.
Cissa 539.
Ciu 233.
Ciù 220, 256.
Ciù 245.
Ciù-Ciau 235.
Ciucch 237.
Ciucella 475.
Ciuffa 485.
Ciuffina 336.
Ciuffolot 56.
Ciuffolotto 420, 438, 475.
Ciuffotta 420.
Ciuffoulot 4.
Ciufolotto 427.
Ciui 183, 478.
Ciui-cin 69.
Çiu çàu 222.
Ciuin 176, 183.
» bianco 183.
Ciuit 71, 207.
» giaun 71.
» verdogn 71.
Ciuite 236.
Ciulliu 564.
Ciumbin 286.
» piccin 286.
Ciumbina 286.
Ciurletto nero 329.
Ciurlicón 249.
Ciurlidda 602.
Ciurlino 482.
Ciurlo a picche 334.
Ciurlodi 365.
Ciurloi 487.
Ciurlottello 451.
Ciurlottino 334.
Ciurlotto 331.
Ciurluviu 598.
Ciurruvi 609.
Cius 184.
Ciusso 177.
Ciuu 267.
Ciüñci 118.
Civinciò 587.
Civetta 327, 349, 372, 395, 406, 422, 430, 445, 455, 480, 487, 490, 517, 541.
Clàme plòe 228.
Clàme plòè 228.
Clumb favazz 267.
Cŏ rosso 119.
Coa bianca 614.
» de fogu 616.
» rossa de monte 254.
Coacassola 205.
» bella 205.
» brutta 205.
» de montagna 205.
» negra 205.
» zhala 205.
Coalonga 208.
Coalónga 241, 244.
Coalunga 162.
Coarella 485.
Coarós 206.
Coarossa 183, 251.
» della regina 183.
» mora 183.
Coárossa 242.
» foresta 242.
Coarosso 254.
» foresto 254.
Coárosso moro 242.
Coarossolon de montagna 182.
Coarossón 206.
Coaroussa 129.
Coarussolón 242.
» foresto 242.
Coatimon 183.
Coatórcol 210.
Cocàl 229.
Cocál 214, 250, 251.
Cocalina bianca 186.
» piccola 186.
» scura 186.
Cocaline 229.
Cocchiume 378.
Cocciarda 510.
Cocciu di campa 590.
Coccolone 353, 456.
Cŏch 119.
Coda ross 513.
Coda-ross 513.
Codabianca 486.
Codacassola 205.
Codajanca 502.
Codalone 498.
Codaros spazzacamin 206.
Codarós 206.
Codaross 234.
» dal peto turchin 206.
» de montagna 206.
» salvarego 206.
Codaróss 206.
Codaròss 221.
Codàross di montagne 221.
Codarossol da sass 206.
» negro 206.
Codarossól 206.
» da páluch 206.
Codarossolón 206.
Codarossón 206.
» de montagna 206.
Codatórcol 210.
Codazhil 207, 208.
Codazinzera 420.
Codazinzola 486.
Codazzinzola 401.
Codazzola 324.
Coddu tortu 290, 605.
» virdi 561, 594, 607.
» -virdi 567.
Code lenghe 510.
Codebándule 233.
Codeluongo 498.
Codeianco 495.
» Monaco 495.
» San Martino 495.
Coderusso 490.
» bastardo 495.
» montanaro 495.
Codetta 486.
Codibianco 345, 366, 428, 454.
Codibiancola 440.
Codibugno 369, 429.
Codibugnolo 369, 404, 421, 429, 443.
Codibugnolo 393.
Codino 345.
Codirossa 346.
Codirossino 367.
Codirosso 346, 366, 367, 392, 402, 421, 428, 441, 454, 478.
» grosso 346.
» nero 478.
» reale 454.
» spazzacammino 368.
Codirossola 265.
» di monte 265.
Codirossolo 392.
Codirossone 346, 367, 391, 401, 420, 440, 477.
Coditremola 420, 440.
» gialla 440.
Codizzinzola 440.
Codolo 408.
Codona 183, 447.
Codoncino 369.
Codone 380, 351, 369, 375, 408.
Codorin 129.
Codorosso 486.
Codur 120, 132.
Çoeta 245.
Coèta 244.
Çoetón 245.
» de válo 246.
Coetta 614.
» bianca 614.
» groga 614.
Collongo 615.
Colloro 615.
Colpazza 576.
Colpedda janca 576.
» nira 576.
Col rouss 10.
Cola 69, 492.
» marina 499.
Colaina 206.
Colanzo 257.
Colánzo 247.
Colasso 44, 284.
Coll loungh 131.
Collaetto 279.
Collarone 423.
Collo verde 284, 294.
» verde piccin 294.
Collotorto 394.
Colloverde 44.
Colomb de corone 238.
» salvadi 238.
» salvàdi 227.
Colòmb 227.
Colombaccio 351, 376, 396, 409, 423, 430, 448.
Colombásso 248.
Colombazzo 177.
Colombella 265, 331, 351, 376, 396, 409, 423, 448, 456, 491, 625.
Colombi 640.
Colombo 430.
» collado 639.
» petraiolo 640.
» salsáro 248.
» salvadego 185, 257.

Digitized by Google

Colombo salvádego 248.
» salvarego 212.
» torresàn 257.
Colombu de is arrocas 625.
Collostorto 310.
Colverd 10.
Combattent 164.
Cômbea 44.
Compare-piero 209.
Conca d' oru 617, 618.
» niedda 616.
Conglich 204.
Conglit 204.
Contorcol 210.
Coombo 313.
» sarvaego 44.
Coparolo 482.
Cor marin 132.
Corbatt 157.
Corbo 343, 539, 632.
» ianco 539.
» reale 539.
Corbu 632.
Cordaru 540.
Cordáru 531.
Cordolella 494.
Çore 231.
Çòre 217, 218.
Çorf 202.
» del mantèl 202.
Coridór 214.
Coridor 249.
Coridór 249.
Coridoréto 249.
Caridorón 214.
Çorin 232.
Corlich 214.
Corlichét 214.
Corlicón 214.
Cornac 68.
Cornacchia 181, 319, 343, 362, 383, 399, 419, 426, 437, 475, 485, 492, 632.
» nera 361, 437, 474, 488.
Cornacia 202, 252.
» de tore 252.
» munara 252.
» senarina 252.
Cornácia 240.
Cornaggetta 288.
Cornaggia 277.
Cornággia 39.
Cornagia 68, 104.
» grisa 115.
» molinara 68.
» negra 115.
Cornass bartone 68.
Cornazh 202.
Cornazha 202.
Cornicedda 516, 517.
Cornila 231.
Cornile 231.
Corniola 202.
Coronca 610.
Coross 163.
Corossolon 57, 159.
Corossoulofin 129.
Corridòr 228.
» pizzul 228.
Coriere 365, 377, 378, 396, 411, 439.
» grosso 450.
Corriere piccolo 378, 450.
Corrierino 411.
Corrisodo 345, 428, 439, 449.
Corsin 41.
Corv 104.
» gross 103.
Corvacchia 437.
Corvastro 497.
Corvatt 231.
Corvàtt 217, 218.
Corvella 497.
Corvetto 343.
Corviellu 533.
Corvo 174, 181, 202, 252, 302, 319, 343, 362, 389, 399, 426, 437, 453, 475, 485, 488, 632.
» biso 202.
» da bosch 202.
» da croda 202.
» grande 174.
» grosso 437.
» imperiale 474.
» marin 246.
» marino 437, 481.
» -merlo 174.
» molinar 174.
» reale 389.
Córvo 239, 240.
Corvon de mòntagna 339.
Corvu 539, 551, 566, 581.
» di passa 552,
» jancu 552.
» impiriali 551.
» marinu 591.
Corzh 202.
Cosmeu 534.
Cotimone 196.
Cotór 238.
Cotórnesa 313.
Cotornis 131.
Cotorno 163, 177, 185, 213.
Cotourno 131.
Coturna 119.
Coturnice 331, 396.
Còu 228.
Cou-còù 130.
Côu-rouss 131.
Coua-lunga 71.
Couarouss 70.
» d' montagna 70.
» meanè 70.
Conareussa cita 70.
Coubianch 70.
Coucai 12.
Coucou 8.
Coucú 8.
Couloumb favè 10.
» sasvaj 10.
» toré 10.
» tourer 10.
Couloumbaña 10.
Cournagia 68.
Cournajas 3.
» gris 3.
» pcit 3.
» real 3.
Courv 68.
Coûrv 54.
Couva lounga 7.
» rouss 70.
» rousson 70.
Coûvaroûs 58.
Couvaroussa 6.
Cova-in-terra 394.
Côva longa 59.
Covarôss 58.
» d' montagna 58.
Côvaroussou 57.
Cozzìcaventulu 567.
Cra-cra 308.
Crasc 104.
Crascin 109.
Craula 492.
Cravâ 283.
Cravé 8.
Cráver 72.
Crè-crè 131.
Creccola 185.
Crecola 212.
» mora 212.
Crécola 247.
Crecoléta 212.
Crècré 159.
Crecule 238.
Crècule 227.
Crespolino 419, 438.
Cristareddu 560.
Cristariedd 518.
Cristarieddu 532.
Crivedda 606.
Crivela 8, 9, 43.
» grixa 283.
» russa 283.
Crivéla 43.
Crivèla 43, 283.
Crò 202.
Crŏ 202.
Crosss 68.
Crobu 610.
» mannu 610.
» nieddu 610.
Crocál 250, 251.
» a testa nera 250.
Crocale 259.
Crocaléta 250.
» negra 250.
Crocalina 250, 258.
» nera 250.
Crocalina 250.
Crocalo 259.
Crocalón 251.
Crocchiotto 452.
Croccolone 353, 379, 397, 455.
Crocculuni 544.
Çrochète 229.
Crociere 369, 400, 420, 430, 439.
Croff 115.
» gros 115.
» nigher 115.
Croos bianch 3.
Crosnobel 182, 204.
Crosnobel gran 204.
» grando 204.
» picolo 204.
Crosnobl 219.
Crotar 237.
Crouas 3.
» neigro 68.
Crov 3.
Crovasc 68.
Crovin 39.
Crovo 277, 302.
» imperiale 288.
» senein 288.

Digitized by Google

Cróvu 39.
Cruasc 68.
Cruccione 349.
Cruciatu 561.
Cruculeo de monti 611.
Cruculèu 611.
Cruculeus 611.
Crusulèo 540.
Crusuleu 558.
Cruvacchiu 581.
Cruvàcchiu 566.
Cu-cù 455.
Cù bianc 57.
» -cù 61.
Cü gianco 282.
Cû gianco de bosco 290.
Cua de Rondanina 294.
» lunga 107, 290.
» rossa da Madonna 290.
» russa 280.
Cùa russa 306.
» russa de padule 306.
Cuàje 227.
Cuarella 494.
Cuarossetta 41.
Cuarossón 41.
Cuarussa 105.
Cuarussetta 290.
Cuarusson 290.
Cuarussùn 279.
Cubianc 159, 164.
Cübianc 105.
Cubianca 132.
Cubianch 72, 128, 130.
Cubianco de montagna 205.
Cuc di tortore 516.
Cuca 573.
Cucale 484.
Cucalina 483.
» testa nera 483.
Cucc 225, 236, 637.
Cucca 559, 591, 606.
» di maiu 605.
» di passo 590.
Cuccazzu 559.
Cucchiarone 498.
Cucchiarùne 533.
Cucchiaruni 561, 567, 574, 594.
Cuccia 585.
Cucciacanella 489.
Cucciamannella 489.
Cucciarda 489, 491, 530, 540.
Cucciarduolo 494.
Cucco 255, 349, 372, 394, 480, 487.
Cücco 282, 292.
Cuccovaio 490.
Cuccu 531, 541, 567.
» di maiu 590.
» di passa 559, 567, 573, 590.
Cucců 326, 516.
Cúccu 43.
Cucculiuta 570.
Cuccule 444.
Cuccumeggia 327.
Cuccuni 559.
» di passa 559.
Cuccustrettola 366.
Cuccuvella 532.
Cuch 210, 266.
Cüchett 108.
Cuchucc 236.
Cüciao 312.
Cuciarone 624.
Cuco 177, 184, 210.
Cúco 215.
Cucŏ 72.
Cucü 310.
Cucû 72, 161, 490.
Cücu 310.
Cucucciuta 554, 585, 602.
Cucugghiata 540, 554.
Cucugghiatula 554.
Cucughia 510.
Cucughiatu 510.
Cücul 108.
Cucule 422.
Cuculio 372.
Cuculo 349, 372, 405, 429, 496.
Cucúlo 619.
Cucumeo 620.
Cuda bianca 585.
» di focu 555.
» di focu barbarisca 555.
» di focu pettu niru 556.
» russa 585, 586, 603.
Cudarussa a pettu bl'i 586.
Cudibianchi 603.
Cudidda janca 585.
Cudirussuni 571, 603.
Cudune 533.
Cuel stuart 236.
Cuell stuárt 225.
Cuèrin 228.
» pizzul 228.
Cuernicicdd 517.
Cuervo 506.
Cugianco d' aegua 45.
» d' aja 42, 294.
» de riva 42.
» de téra 41
Çul 223.
Çulte 225, 336.
Cul' arrubiu 615.
Cul bianc 5, 7, 117.
» bianc d' aqua 120.
» bianch 5, 7.
» bianch de mountagna 5.
» bianco 253, 258.
» bianco d' acqua 185.
» da ja jeui 72.
» rouss 6.
Culandra 439.
Culbianch 11, 70, 73, 205.
» d' eva 8.
» da acqua 214.
Culbianco 175, 182, 205, 250, 321, 366, 391, 401, 420.
» a gola nera 420.
» acquatico 397.
» foresto 242.
Culbiánco 242, 250.
Culerciaru 531.
Culett 234.
Culètt 221.
Culingioni de terra 626.
Culisalida 614.
Culitromola 631.
Culmastur 73.
Culo bianco 196.
Culobianco 395.
Culorcia 567.
Culorosso 487.
Culrossolone 321.
Culu biancu 614, 618.
Culubiancu 614.
Cumbo sarvaego 294.
» turraieu 294.
Cümbo sarvaego 284.
Cuo gianco 309.
» gianco de monte 305.
Cuocciu di camula 573.
Cuoddu virdi 574.
Cuorvi di mari 574.
Cuorvo 492, 601.
» rosa 492.
Cuorvu 529, 569, 581.
» di passa 601.
» marinu 601, 607.
Cuórvu de mare 532.
Curculeu de monti 611.
Curdaru 559, 567, 572, 605.
Curentin 45.
Curenton 45.
Curiancola 636.
Curidda janca 571.
» janca cu li ali niuri 571.
» janca munacedda 571.
» -russa 571.
Curisarida 614.
Curintinu 570.
Currintuni 554.
» furasteri 554.
Curnacchia 506, 582.
Curnacciu 569.
Curniteddu 590.
Curnutedda 590.
Cuross 106.
» féré 106.
Curridoŭ 285.
Currintina 585.
Currintinu 602.
Curripraia 592.
» granni 597.
Currosso 322.
Curvettu piemuntisi 569.
Cuss 225.
Cutrettola 345, 360, 440.
Cuttî 345.
Cuttî 366, 440.
Cuttunara 605.
Cuturna 109.
Cuvaroussa 6.
Çuvrin 232.
Czin de palŭ 243.

D

Dalin 207.
Dama 62, 72, 119.
Damina 43.
Dardanet 72.
Dardao 282.
» da pansa gianca 282.
Darden 130, 160.
Dardi 119.
Dardù 119.
Dduccu 541.
Dergna 7.
Diavou d' mountagna 8.
Dindio salvarego 213.
Dinzio salvàrego 213.
Domenicano 498.

Digitized by Google

Domenicanu 534.
Dondina 70.
Dord 159.
Dôrd 57.
Dorde 234.
Dórde 221.
Dordei 234.
» pizzul 231.
Dordin 220.
Dordina 57, 70, 158.
Dòrdine 233.
Dormiglione 455.
Dort 159.
Dottori 630.
Dourd 129.
Dourdina 128.
Dourin 7.
Dourt 70.
Dragòn 247.
Drèsa 117.
Dresc 58, 70.
Dress 106, 129, 159.
Dressin 129, 159.
Dressoûn 129.
Düc 108.
Duca 132.
Dug 62, 225, 231.
» piscnin 62.
Dugo 43, 62, 210, 293.
Dügo 283.
Dugoù 8.
Duraldi 241.
Durigàtt 228.
Durdina 105.
Durt 70, 117.
Dus 62, 119.

E

Ecchie di reua 524.
Erbaio 408.
Eula 62, 73.

F

Facciola 609.
Facciommo 496.
Facciomo 490.
Facedua 513, 514.
» capignora 513.
» gialletta 513, 514.
» gros 514.
Facianotta 563.
Faganél 203.
» nostran 203.
Faganell 219, 232.
Faganelo 182, 253.
Faganélo 240.
Faggianu 540.
Fagian 73.
Faguanazzu 606.
Faguanu 606.
» biancu 606.
Fainél 175.
» montin 175.
Fale d' acqua 161.
Falch d' San Martin 9.
Falchet di Tör 119.
» di Lodole 119.
Falchét 210.
» paluder 210.
Falchèt de tore 211.
Falchetasc 62.
Falchetin 216.
Falchetin 211.
Falcheto 185.
» balarin 184.
» bianco 177.
» torresan 177.
Falchéto 246.
» balarin 246.
» foresto 246.
Falcheton 62.
Falchett 62, 63, 72, 73, 108, 130, 161, 162, 267.
» d' oselitt 72.
» da Passer 267.
» de campanil 162.
» de campanin 130.
» de palud 161.
Falchètt 62.
Falchettin 72, 256.
Falchetto 256, 328, 350, 395, 425, 430, 446, 456, 481.
» da uccelli 373, 446.
» fringuellaio 446.
» nero 350.
Falchetton 256.
Falchettón 246.
Falco 350, 395, 487, 490, 638.
» bianco 373, 480.
» cappone 350, 373, 395, 406.
» cenerino 374.
» cucculo 328.
» cuculo 350, 407, 446.
» da uccellini 423.
» di padule bianco 406.
» di padule 373, 406, 415.
» gallinaio 445.
» palombaro 256.
» pescatore 373.
» reale 455.
» rosso 446.
» testa caffè 480.
Falcon 237.
Falcón 211.
Falconcello 497.
» f torre 497.
» ianco 497.
Falcone 373, 406, 445, 481, 487, 497.
Falconett di San Giuan 518.
Falconetto 491.
Falcoun 9.
» dla couva fourcua 9.
Falcunazzu 560, 606.
Falcunl raru 560, 606.
Falcùzz 226, 230, 237.
» di ciampanil 226.
Faldeddu 509.
Fallante 456.
Fanel 4.
Fanéll dla Regenna 269.
Fanello 419, 427, 475, 485.
Fanellu 583, 612.
Fanét 4.
Fanett 128, 158.
Fanetto 278, 288, 303, 633.
» corso 288.
» córso 278.
Fanetto 40.
Fanfarrone 613.
Fanin 4, 59.
» bastard 69.
» dla Rgina 69.
Fanett 56.
Fannin 56.
» bastard 56.
Farchet 9.
» d' mountagna 9.
» da Pernis 9.
» di giari 9.
» dle causse rousse 9.
» dle Passre 9.
» ratè 9.
Farcheto 311.
Farchèto 311.
» american 311.
Farchéto 311.
Farchetto 43, 283.
» da Regina 293.
» dai pê rusci 293.
Farchétto 43.
Farchettu 574, 606.
Farchtoun 9.
Farciola d' montagna 70.
Farco 283, 310, 311.
» büson 311.
» de padù 293, 310.
» gallinà 43.
» gallinà 293.
» gianco 310.
» grosso 283.
» marsaiolo 311.
» pescou 293.
» reale 311.
Farcón 43.
Farcoun dla testa bianca 8.
Farcu 542.
Farcunazzu 559, 560, 573.
Farcuni 573, 606.
» biancu 606.
» di passa 606.
» frusteri 606.
» jancu 573.
Farcunieddu jancu 573.
» jancu-rari 573.
Faringuello 453.
Farnarone 517.
Farvetta 540.
Fasan 10, 63, 73.
» d' mountagnà 10.
» de montagna 131.
Fasanella 63, 73.
» de montagna 131.
Fasciana 596.
Fascianedda 596.
Fascianu 568, 640.
Fasen 73.
Faso 520.
Fassa 543, 562.
Favà 290.
Favaccio 332.
Favarásso 218.
Favarella 476.
Favareto 183.
Favaréto 242, 244, 245.
Favas 73.
Favazo 257, 313.
Favazzo 187.
Favita 235.
Favite 223.
Favodda 514.
Favreto 183.
Felizéta 249.
Fenicottero 284.

Digitized by Google

Fenuggià 291.
Fenuggià 41.
Féra 240.
Ferain 308.
Feránt 203.
Ferao 308.
Feridori 622.
Fermicularu 541.
» di voscu 541.
Ferrareddu 557.
Fialapp 266.
Fiammante 444, 498, 593.
Fiammanti 261.
Fiammingo 542.
Fiammingu 561, 574.
Fiascaccio 329.
Fiaschet 7.
Fiaschetta 324, 369, 393.
Fiaschettone 324, 401, 442.
Ficetola 489.
Fifa 332, 352, 450.
Fifina 305.
Figarola 176.
Filancio 638.
Filandél 211.
Filinguello 343.
Filunguello 319, 343, 362, 426.
Finch 203.
» subiot 204.
Finco 182, 195, 203, 240, 253.
» montan 182, 253.
» montán 240.
» subiòto 240.
Finett 104.
Finfignon 244.
Finicottiru 593.
Fio 257.
Fiorancino 348, 421.
Fiorancino 348.
Fiorarancino 369.
Fiorin 249.
Fiorin 249.
Fiorino 324.
Fiorrancino 369, 429, 442.
Fiotto 195.
Fisc-cion 314, 315.
» rússai 314.
Fischia-voi 544.
Fischiaboi 544.
Fischioncello 334.
Fischione 334, 374, 408, 444, 482, 498.
» turco 330, 409, 482.
Fischiuni 561.
Fiscone 520.
Fisola de mar 251.
Fisoléto 251.
Fisolo 259.
Fisolo 251.
» canariòl 251.
Fisolon de mar 251.
Fista 182, 205, 241, 253.
» granda 205.
» piccola 205.
Fistarella 182.
Fistarelo 241.
Fistázza 241.
Fistel 183.
Fiston 182, 253.
Fistón 205, 241.
Fiumalbo 377, 449.
Fófana 247.
Fófanácchio 247.
Fófano 247.
Fogieta 213.
Foiana 373.
Fola 6.
Folaca 534.
Folaga 11, 295, 296, 332, 352, 377, 396, 449, 625.
Fôlaga 63.
Fôlar 59.
Folariga 6.
Folcora 410.
Folega 120, 131, 163, 185, 258.
Fólega 213.
Foléga 249.
Folenga 313.
» de marso 313.
Folengheta 313.
Folengòn 313.
Folga 267.
Fòlighe 228.
Follaca 498, 543.
Fonaca 528.
Fonachecchia 528.
Forabeucc 106.
Foracanele 183.
Foracanéle 243.
Foramacchie 369.
Forapaglia 347.
Forapoglie 369, 403, 442.
Forbicione 335.
» maggiore 335.
Forcinella 405.
Forfeson 256.
Forgia 562.
Formicaru 605.
Formichiere 490.
Formicolaru 605.
Formicularu 541.
Formiguin 310.
Fornareu 70.
Forzana 213.
Forzhél 213.
Fossacchia 366.
Fossaccio 345, 366, 391, 401.
Fosso 401.
Foti-borse 315.
Fottivento 353.
Foular 71.
Foûlireûf 64.
Fouloun 11.
Fournè 281.
Fournera 5.
Fráche nòlis 218, 232.
Franceschina capo rossa 520.
» grisa 520.
Franciscottu 598.
Francolin 63, 73, 163, 185, 213.
» blanc di mont 238.
» di bosc 238.
Francolin 228.
» bianch 228.
Fracolin 131.
Francolino 410.
Francolo 452.
Francoulinn 73.
Franculin 109.
Franculinu 595.
Frangouei 4.
Frangoul 69.
Franguéi 55.
Franguel 55, 69, 104, 116, 264.
» d' mountagna 55, 59.
» di al bianch 69.
» dla flocca 4.
» dla nev 55, 69.
» montagnon 69.
» montan 55, 69.
» muntan 104.
Franguell 157.
» de la nev 157.
Franguéll 127.
Franguèo 203.
» de montagna 303.
» main 303.
Franzell 232.
Franzèll 218.
Frarétta 243.
Frarótol 208.
Fraselin 203.
» foresto 203.
Fraticello 379.
Fratin 7.
Fratin 184, 244, 255.
Fratino 330, 479.
Frattin 292.
Fravetta 531.
Frecachiuppo 496.
Frecc 69.
Fredelin 203.
Fregione 319.
Frenguel 175.
Frenguello 288.
» de mâ 296.
Frenguéllo 40.
» montanin 40.
Fri-fri 308.
Fricialase 306.
Fringiedd 507.
» turchiesco 507.
Fringieddone 507.
Fringiddastre 507.
Fringuel marino 320.
Fringuei 69.
Fringuello 277, 319, 343, 362, 390, 399, 419, 426, 438, 453, 475, 485.
» della neve 54.
» marino 343, 364, 400, 438.
» montanaro 475.
Fringuellu muzzolinu 570.
Fringuèlo 240.
Frisarin 240.
Friscarúlo 526.
Frischiettu 533.
Friscuni 567.
Frison 69, 158, 175, 182, 195, 265.
» d' montagna 71.
» di fiochet 71.
Frisôn 55.
Frisón 203, 240.
Frisone 109.
» fru-fru 508.
Frisott 232.
Frisòtt 219.
Frisoun 69.
Frisoûn 128.
Frisù 116.
Frisul 229.

Digitized by Google

Frisuni 539.
Frixiun 288.
Frixiún 40.
Frixiùn 278.
Frocasini 441.
Frocione 485.
Frosolone 494.
Frosone 344, 390, 427, 438, 494.
Frullino 333, 353, 451.
Frungillo 489, 493.
» spagnuolo 491.
Fruson 4.
Frusone 344, 363, 400, 419.
Frust'asino 346.
Fuanu 559.
Fuànu 567.
Fucetola cannavalo 495.
» d' inverno 495.
» passaregna 495.
» verace 495.
Fucetolone 495.
Fuffignón 244.
Fuganu 559.
Fuin 196.
Fujanazzu 573.
Fujanu 573.
Fulaga 44.
Fulega 109, 285.
Fuleghetta 285.
Fullca 543.
Fuliga 482, 625.
Fuoco 'nculo 496.
Furfuragiu 611.
Furfurinus 611.
Furmiar 286.
Furmiàr 225.
Furmicaru 572.
Furmicularu 559, 572.
Fusuddiu 572.

G

Gabbiana 456.
Gabbianello 335, 413.
Gabbiano 413, 452.
» reale 452.
Gabian 316.
Gabiosna bussonera 7.
» d' passage 7.
» farchétta 7.
» mesaña 7.
» roussa 7.
Gabiourna 7.
Gada 202.
Gadd di vosco 516.
Gaddaranu 561, 592.
Gaddazzu 598, 609.
Gaddina 533.
» petrarola 522.
Gaddinedda 522.
» d' acqua 609.
» d' acqua surcera 608, 609.
» pizzu giarnu 596.
Gaddiniedd 522.
Gaddu fascianu 596.
Gadduzzeddu d' acqua pedi giarni 596
Gadduzzu 601.
» ciurluviu 598.
» de li grossi 609.
Gadduzu di mare 598.
» di mari picciulu 598.
» di muntagna 541.
Gafio 500.
Gafione 500.
Gafrione 500.
Gaggi 421.
Gaggia nicciolera 68.
Gàggia 475.
» brusca 475.
» marino 480.
Gaggiana 526, 527.
Gaggianiedd 526.
Gagia 69, 104.
» nisciulera 104.
Gagia 55.
» marina 72.
Gaia 202.
» de nosele 202.
» marina 202.
» mata 202.
» noselera 202.
» todesca 202.
Gaiola 202.
Gaj 3.
Gaja 157.
Gajineja d' acqua 543.
Gajola 202.
Gal çedron 213.
» de montagna 119.
» de monte 178.
» forzhél 213.
» lauriót 213.
» zhedrón 213.
Galbè 60, 160.
Galbèe 129.
Galber 118.
Galberi 588.
Galeden 164.
Galét 210.
» de montagna 210.
Galeto de marso 310.
» de montagna 184.
» de monte 256.
Galèto de marzo 245.
» de monte 245.
» mejarólo 245.
Galett' e-marzo 620.
Galina bianca 213.
Galinassa 73.
Galinássa 250.
» de mar 219.
Galinazin 243.
Galinazha 214.
Galinazhéta 206.
Galinazza 132, 178, 258.
» de mar 109, 132, 164, 185.
Galinàzze 229.
Galinél 211.
Galineta 213.
Galinétta 44, 45.
» d' aegua 44.
» neigra 44.
Gálinu 591.
Gall cedroún 131.
» d' montagna 73.
» de montagna 109, 181, 163.
Gallenella follacara 498.
Galletto d' marzo 43.
» de marzo 283, 292.
» de montagna 177.
» marzolo 327.
Galletto marzuolo 349.
Gallina 163.
» ceciata 407.
» de montagna 131.
» giudea 408.
» petrarola 498.
» prataiola 352, 377, 449.
» sultana 498.
Gallinaccio 444.
» salvaggio 522.
Gallinascia 64.
Gallinase 73.
Gallinella 267, 319, 343, 362, 426, 449, 456, 482, 487, 506, 534.
» de montagna 178.
Gallinetta 284, 285, 294.
» d' acqua 63.
» du becco russo 284.
» grossa 295.
» piccina 294, 295.
» piccinha 284, 285.
Galleniello 498.
» peducchiello 498.
» reale 498.
Gallo di selva 490.
Galluccio 496.
Galluzzo 483, 499.
Galo cedron 185.
» sforcelo 185.
Galzhedrón 213.
Gambalevret 11.
Gambalevrot 11.
Gàmbalonga 241.
Gambe lounghe 11.
Gambecchio 378, 450.
Gambeta 314.
Gambetón 250.
» rosso 250.
Gambett 132.
Gambetta 351, 352, 378, 397, 411, 450, 451.
» muta 333.
Gambettino 352, 411.
Gambetto nero 412.
Gambetton 258.
Gambettone 352, 378, 379.
Gambettoûn 132.
Gambino 332.
Gambinon 275.
Gammetta 499.
Gammettone 499.
Gamsgeier 237.
Ganavel di fau 8.
Gangorra 630.
Gangoredda 630.
Ganiel de franguei 119.
Garbè 282, 292.
Garbé 7.
Garbeo 308.
Gardé 107.
Gardel 232.
Gardèl 219.
Gardelin 175, 182, 203, 253.
Gardelin 232, 240.
Gardellin 195.
Gardena 183, 206.
Gardèna 176.
» negra 176.
Gardlin 264.
Gargana 588.
Garganel 10, 73.
Garganell 109, 119, 131, 163.

Digitized by Google

Garganella 44.
Garganèlla 44.
Garganello 284, 294.
Gargaru 558.
Gargot 10.
Garigula 110.
Garle 236.
Garlett 236.
Garxixedda bianca 622.
Garza 329.
» bianca 622.
Garze 237.
Garzetta 119.
Garzétta bianca 246.
Garzetto 519.
Garziero 253.
Gárzo 246.
Garzotta 497.
Gascetta del co negher 160.
» del co ross 160.
Gascieton 160.
Gasgetta 129, 160.
» mornera 129.
» rossa 160.
Gasgia 69, 127.
Gasgia 157.
Gasgia 55.
Gastrica di maese 477.
» forestiere 477.
Gastrighino 478.
Gastrigotto 479.
» cenerino 479.
» grosso 479.
» testa-rossa 479.
Gatt marina 528.
Gatto de mare 259.
Gattone marino 527.
Gavarèlo 312.
Gavazùa 244.
Gavinell 108.
Gavino 500.
Gavitorciola 266.
Gaza 161, 202, 302.
» carnera 115.
» da la coa longa 252.
» ladra 115.
» magiona 253.
» maina 310.
» marina 255.
» mora 174, 252.
» nera 195.
» nisolèra 115.
» rossa 174, 195, 253.
» roussa 69.
» zucona 195.
Gáza chéca 240.
» de la cóa longa 240.
» féra 240.
» rabiosa 240.
Gazanela 183.
Gazanéla 242.
Gazáro 242.
Gazella 485.
Gazeol 118.
» frizunera 118.
» » piccola 118.
Gazér 242.
Gazetton 158.
Gazha 202.
Gazuèla 309.
Gazza 69, 319, 343, 362, 399, 426, 506.
» ladra 182.
» mora 182.
Gazza rossa 182.
Gazzanha 275.
Gazzanna 288.
Garzan-na 40.
Gazzarro 402.
Gazzera 343, 419, 426, 437.
Gazzina 443.
» reale 443.
» rossà 443.
Gazzott 107.
» flüval 107.
Gegè 158.
Gelardina 163.
» gainera 163.
Gemon 158.
Gemôn 104.
Gemoûn 128.
Gentilomu 563.
Gerardélo 248, 249.
German botta 380.
Germana 130.
Germanello 351, 375, 423.
Germano 330, 350, 375, 396, 423, 447, 456.
» nero 352.
» piccolo 351.
» reale 350, 395, 443.
» turco 375.
Gesso 265.
Ghè 3.
Ghé d' mariña 8.
Ghella 335.
Ghepié 8.
Gheppio 350, 385, 407.
Ghiandaia 319, 343, 362, 419, 426, 437, 632.
» marina 405, 444.
Ghiandaja 389, 399.
» di mare 394.
» marina 326, 372.
Ghierla 443.
Ghizz 518.
» di torre 518.
Giaèu 295.
Giagà 250.
» picola 250.
Giai 601.
Giài 566.
Giaiu 582.
Giaje 232.
» marine 236.
» màte 232.
Giàje mate 218.
Gialdirola 57.
Gialinàzze falcuzze 229.
Gialine forcèle 227.
Gialinedda 554.
» masculu 554.
» testa nira 554.
Giali cedron 238.
» çedron 227.
» forcell 238.
Gialletto 439, 478.
Gialline forçele 238.
Giallino 264, 347.
Gialluidd 510.
Giallut dé blèle creste 225.
Giandara 264.
Gianetta 279.
Giânetta 289, 290.
Gianétta 40, 41.
Gianfruscola 449.
Giardule 234.
Giarégule 228.
Giaretta 280.
Giarla 236.
Giarle 236.
» zimule 236.
Giàrle 224.
» fajàne 224.
» marine 225.
» zimule 224.
Giau 601.
Giauné 4.
Giaurru 629.
Giavani 71.
Gic Giac 105.
Gilardina 63, 109, 120.
» gianera 131.
Gilardiña 11.
Gilardinna 295.
Gilardinotta 295.
Gioja 3.
Gioppu 567.
Giracollo 455.
Girardela 185.
Girardina 185, 257, 313.
Girardiña 11.
» pcita 11.
Girasole 349.
Girbinu 568.
Gireu 132, 164.
Gireü de fium 164.
Giriuni 559.
Giú 237.
Giugo 290.
Giver 132.
Glorio 479.
Goa 277, 288.
Goba 313.
Gobulo 325.
Godla 515.
Gogo 442.
Golo 393, 404, 422.
Gorgoglione 444.
Goro 486.
Gorva 165.
Gorzbleu 70.
Gracchio 319.
Gracchiola 437.
Graccio 319.
Gragallu 623.
Gran Bubo 177.
» duca 256, 497.
» Dug 62.
» Dugo 130.
Granaiolo 375.
Grand' Airone d' Italia 374.
Granduca 517.
Granduch 8, 72.
Grandug 72.
Grandugo 151.
Grassetta 5.
» da eva 5.
Grassinale 510.
Grassotta 561, 607.
Grassottu 561, 592.
» biancu 592.
» imperiali 592.
Gratasass 71.
Gravolo 490.
Gravotól 214.
Grecorello 408.
Gregorello 409.
Gregorio 455.
Gricciaiola 454, 455.
Gricciole 438.
Grifone 374, 481.

Digitized by Google

Grillaio 374, 407.
Gring 71.
Grisareul 6.
Griséto 245.
Grisett 234.
Grisetta 130.
Grison da croda 208.
Grisùte 221.
Grisutt 234.
Grisùtt 221.
Griva 5, 70.
» côrso 280.
» d' montagna 5.
» del geneiver 5.
» nostrá 280.
» savojarda 5.
Grivass 5.
Grivea 40, 289.
Grivein 289.
Grixelan 294.
Grixeloun 295.
Gro 522.
Groi 562, 568, 597, 609.
Grola 174, 252.
» zenerina 240.
Gròla 239, 240.
Grotón 212, 213.
» dalla colana 212.
Grottaione 372, 405, 422, 444.
Grottajone 393, 394.
Gru 11, 131, 213, 258, 498, 535, 640.
Grù 44, 410,482.
Grú 285.
Grü 313.
Grua 11, 185, 213, 295, 622.
Gruára 531.
Gruga 332.
Grugnett 63, 120, 131, 163.
Grügnett 109.
Grügnetton 109.
Grugnettôun gainèe 131.
Grugnetù 120.
Grue 377, 449, 626.
Grûe 228.
Grui 622, 626.
Guǎ 247.
Guà dal zúfo 247.
Guaddaranu 567.
Guai 533.
Guapt 519.
Guaptiedd 519.
Guaraglio 500.
Guaraguasto 580.
Guarda mascese 526.
» pantano 524.
Guardianina 265.
» gialla 265.
Gueja 443.
» cenerina 443.
» gazzina 443.
» » reale 443.
Gufetto 487.
Gufo 184, 349, 372, 394, 406, 430, 480, 490, 497.
» grande 184.
» reale 327, 373, 395, 406, 445, 480.
» selvatico 327.
Güfo 310.
Gúfo major 245.
Gufu 573, 590.
Guglia 430.
Guia 211.
Guina 117.
Gulasso 294.
Guléo 541.
Guliu 532.
Guzetta 70, 158.
Guzzetta 128.
Guzzettina 128.
Guzzettôun 128.

I

Iaddinedda 568.
» d' acqua 562.
Iaddineddu di acqua 562.
Ianni 567.
Icét dla steila 6.
Imperatorin 506.
Imperga 257.
Incarcabodda 335.
Inganna cacciaturi 574.
Ingolavento 371.
Irbalora 567.
Izzu 574.

J

Jacobbu 591.
Jacobu 606.
Jacuopu 573.
Jaddazzu 564.
Jaddina d' acqua 575.
Jaddinazza 575.
Jaddinazzu 562.
Jaddinedda d' acqua 575.
Jaddinedda d' acqua cu li piedi giarni 575.
» » surcera 575.
» di boscu 562.
Jaddu-fascianu 562.
Jadduzzeddu d' acqua 562, 563.
Jadduzzu 576.
» d' acqua 576.
» di acqua 562.
Jammi lunghi 576.
Jamminu 564.
» riali 564.
Jannulu 535.
Jardinaru 584.
Jarmunaru 541.

L

L' Osel cavalaro 256.
Lagia 399.
Lagno 517, 523.
Lagnone 523.
» marino 523.
Lagnoso 478.
Laja 39.
Lamba fuess 511.
Lapariedd 508.
Lauriddiu 572.
Lavarin 69, 104.
Lebre marino 519.
Lecora 494.
Lecuru 602.
Legaurin 69.
Legorin 158.
Legorin 128.
Legürin 104.
Leiroun 10.
» blanch 9.
» dla piuma 10.
Lengua lunga 292.
Lescarina 6.
Lesina 378.
Lèsina 563.
Librazinnu 575.
Librazzinu 597.
Liebbure d' acqua 533.
Lindaneja 540.
» di muntagna 540.
Linduni 540.
Lingualonga 605.
Linguinedda 602.
» cantatura 602.
» surda 570.
Lippun 295.
Lnina 70.
Locch 267.
Locco 445.
Locket 119.
Lodana 585.
Lodi 70, 233.
Lodina 585.
Lodna 5.
Lodoa 279, 289.
Lódoa 305.
Lodoin 304.
Lodola 56, 70, 105, 116, 128, 158, 175, 182, 195, 205, 253, 391, 420, 428, 454.
» buona 401.
» » panterana 345.
» cantarina 204.
» cappellaccia 345, 365, 428.
» cappellana 439.
» cappelluta 476.
» ciuffa 365.
» col zhuf 205.
» di passo 345.
» nostrale 345.
» pantera 439.
» reale 345.
» vera 365.
Lódola 241.
Lodolaio 373, 406, 445.
Lodolajo 395.
Lodóléta marina 249.
Lodoli 116.
Lodolicchio 420, 454.
Lodolin 253.
Lodolin 241.
Lodolin foresto 241.
Lodolina 365, 439.
Lodolino 373, 420, 427, 476.
Lodoula 5, 70.
» de camp 70.
» del ciuff 70.
Lodona di mari 563.
Lodracchio 320.
Lodua 40.
Lódua 40.
Lodula 70, 563, 570.
» d' montagna 70.
Lodule 233.
Lódule 233.
Lodùle 220.

Digitized by Google

Lodúle çhapelùde 220.
» di campàgne 220.
Logheri 116.
Lok 119.
» de bosk 119.
Lolôch 72.
Lolôch 62.
Lonara 602.
Lonora 585.
Loudnin 5.
Loudoulina 5.
Loumbarda 11.
Louluch 72.
Lourok 130.
Lourouck 130.
Lûaru 553.
Lucarin 4.
Lucarino 319, 438, 475.
Lucherino 344, 347, 363, 390, 400, 419, 427.
Lueru 633.
Lugaén 40.
Lugain 288.
Lûgain 303.
Lûgao 278.
» côrso 278.
Lugár 203.
Lugarin 175, 182, 240, 253.
Lugaro 182, 195.
Lugau corso 288.
Lugher 203.
» col ciuff 158.
Lugherin 203.
» tedesco 204.
» todesco 204.
Lugret 203.
Lugrín 203.
Lui 254.
Luí 254.
Lui 254, 307, 347, 368, 392, 403, 421, 428, 442, 455.
» bianco 368.
» giallo 368.
» grosso 441.
» verde 347, 368, 441.
Luicchio 347.
Lújar 232.
Lùjar 219.
Lujer 232.
Luluch 72.
Lunea 285.
Luppa 490.
Luppeca 496.
Luri 224, 235.
Lurli 235.
Lusignol 265.

M

Machet 117.
Machét 207, 209.
Macheti de montagna 117.
Machett 129.
Macottu 613.
» giannu 613.
Maddardo verdatero 520.
Madiscedda 616.
Maduraiolo 637.
Magasséto 217.
» rosso 248.
Magásso 247.
Magásso moro 247.
Magassón monáro 247.
Magassóna 247.
Magnan 70.
Magnanen 275.
Magnanina 368.
Magóga 251.
Magoghéta 251.
Magonét 70.
Magrun 286, 296.
» grosso 286.
» piccin 296.
Magrunetto 286, 287.
Maiarda giauna 69.
» neigra 69.
Mairino 507.
Maisòlu 568.
Majàs 227.
Malaciedd 516.
Malagella 637.
Mallardo 491, 496.
Malvizzo 489.
Malvizzola 495.
Malvizzu 586.
Mancia jaldini 574.
Manciali vi 558.
Mangia furmiculi 590.
» scecchi 574.
Manicujè 7.
Marangan 620.
» de mari mannu 628.
» de mari peis nieddus 628.
» de mari peis arrubius 628.
Marangone 336, 407, 446.
Maranzanu 575.
Marauni 591.
Marbizzu 566.
Margon 70.
Margùn 313, 316.
Marguni 544, 561, 567.
» svariu 561.
Marguneddu 565.
Marigiana 408.
Marigiano 375.
Marinaredda 597.
Marinedda 568, 595.
Marioli boaroi 314.
Marra piga 610.
Marranzanu 562, 568.
Marsola 533.
Marteddu 563.
Martellino 324.
Marteniello 496.
Marticca 279.
Martidduzzu 563, 567, 572, 605.
Martín 251.
Martin pescador 72.
» pescadór 61.
» pescadù 108.
» pescoù 130.
» pescou 161, 292.
» pescoù 282.
Martinaccio 335.
Martineddu 559.
Martinello 377, 397.
Martinellone 377.
Martinèo 310.
Martinèt 70.
Martineu 70.
Martinicca 279.
Martinu piscaturi 590.
Marvizza 530, 540, 555.
» furastera 555.
Marvizzaru 574.
Marvizzo 495.
Marvizza 586, 571, 603.
» di passa 603.
» imperiali 586.
Marvizzuni 555.
Marzaieù 284.
Marzaiola 498.
Marzaiuola 351.
Marzajola 396, 448.
Marzarola 482.
Marzeu 295.
Marzéu 45.
Marzola 561.
Marzolo 327, 375.
Marzunieddu 572.
Mascolinu 574.
Masculinu 560.
Massaiola 366.
Massucco 285.
Massuccotto 285.
Mazhorin 212.
Mázorin 247.
Mazorin 227.
Mázoro 257.
Mazurin 212, 238.
Mazzacani 597.
Mazzorin 185.
Márzoro 247.
Mataccinu coll' ali niri 555.
» jancu 555.
» niru 555.
Matèla 118.
Matelina 107.
Matellot 160.
Maton 268.
Matón da croda 203.
Mattacchiano 324.
Mattarott 107.
Mattugia 344, 427.
Mattugino 344.
Mbivola 543.
'Mbucca-muschi 601.
Megiaróla 240.
Megióra 244.
Melesia 255.
Mellardi 533.
Meng 109.
Menga 622.
» arrubia 632.
» bianca 622.
Merdaiolo 429.
Merdara 485.
Merel 265.
» aquar 266.
» sassar 265.
Mergollo 329.
Merisceda 614.
Meri 57, 70.
» d' montagna 70.
» del stomich bianch 70.
» negher 70.
» pescadour 71.
» rouss 70.
Merla 242, 454.
» aquareola 118.
» du cullarit 70.
» montana 117.
» tettaiuola 346.
Merlacquaccio 324.
Merletta 411.
Merli 234.

Digitized by Google

Merli de golaine 281.
» della Porretta 265.
Merlo 41, 57, 60, 70, 105, 117, 129, 159, 176, 196, 206, 212, 254, 280, 290, 306, 321, 346, 367, 391, 402, 420, 428, 440, 451, 477, 480, 489, 634.
» acquà 42.
» acquaiolo 369, 403, 429.
» acquajolo 393, 442.
» acquireu 107.
» acquirêu 59.
» adurà 107.
» casengo 279.
» casuengo 279.
» col collare 367, 391.
» col petto bianco 331, 440, 477.
» col vezzo 391.
» d'acqua 160.
» d'eva 71.
» d' montagna 57.
» da acqua 207.
» dal petto bianco 257.
» de bosco 206.
» de montagne 159.
» de muntagna 105.
» forestiero 346.
» foresto 242.
» garbel 71.
» gianco 290.
» main 302.
» marino 437.
» montagnólo 242.
» pescatore 635.
» pescòu 281.
» petraiolo 634.
» reusa 277, 288.
» rocaè 306.
» russo 279.
» terragnólo 242.
Merlott 234.
Merlou 5.
» ciappâ 290.
» ciappâ da cua gianca 290.
» da eva 6.
» pescou 291.
Merlu 540, 586.
» petrolu 540.
Merra 566.
» d'acqua 572.
Merru 540, 566, 571, 586.
» a collana 555.
» d'acqua 557, 588.
» di rocca 555.
» di sipala 555.
» pettu jancu 555.
Merula 615.
» giajulada 615.
Mesdúch 8.
Mestolone 330, 375, 447, 481.
Meurra 615.
» a camacca 615.
» de arrocca 615.
Miareu 159.
Miarola 4.
Miccola 450.
Miciola 378.
Middarda 567.
Mieddura d' acqua 532.
Miedduru 530.
» d' acqua 531.
Miedeco 497.
Mierli d' aghe 235.
Miérli 221.
» de golâine 221.
Mièrli d' àghe 223.
» di montagne 218.
» ross 218.
Mierlo 512.
» i rocca 495.
Mierue marino 518.
Mierolo 495.
» a piastre 495.
» d'acqua 495.
» i montagne 495.
Mierru d' acqua 604.
» di sciara 603.
» niuru 603.
» solitariu 603.
Miettemponta d' està 495.
» d' inverno 495.
Migliarina 319.
Migliarino 320, 344, 365, 439, 494.
Mignarda 305.
Mignattaio 447.
Mignattajo 395.
Mignattino 452.
Mignattone 374.
Mijardo 512.
Mijardoli 543.
Miliésa 241.
Mivola 411.
'Mmucca-muschi 557.
» » jancu 556.
Moetta 294.
Moetto 296.
Moetton 294.
Moja 594.
Monaca 511.
Monacedda 523, 558.
Monacella 495.
Monachecchia 511.
Monachedda 572.
Monacheja 540.
Monachella 321, 366, 377.
» a collo nero 367.
» a gola nera 367.
» golanera 321.
Monachina 352, 404, 411.
Monachino 335, 494.
Monghella 159, 160.
Monegheta 207.
Moneghin 129, 160.
Moneghina 118.
Monighetta 71.
Monighina 59, 71.
Montagnola 103.
Montagnola col ciufo 184.
Montan 56, 69, 157, 175, 195, 203.
Montàn 218.
Montán 232.
Montanel 116.
Montanello 320, 344, 364, 390, 400, 427, 439.
Montanélo 240.
Montanin 288.
Montarino 325.
Monten 69.
Moracchiolo 455.
Morat 71, 117.
Morat carbuner 117.
» dè la stela 117.
Morátule 234.
Moràtule 222.
Moratulòn 222.
Moreta 183, 208.
Moréta 176.
Moréta 212, 243.
Moreton 185.
Moretón 247, 248.
Morett 129, 159.
Moretta 41, 254, 257, 330, 409, 448.
» codona 376.
» grigia 448.
» nera 376.
» tabaccata 376, 409.
» turca 376.
Moretton 159, 163, 257.
Morettone 330, 375, 396, 448, 498.
Morettoûn 131.
Morêu 58.
Moreûl 58.
Morigiana 375, 447.
Moriglione 325, 488.
Moro 227.
Morte 500.
» reale 500.
Morticella 500.
Moscardo 496, 497.
Moscarola 515.
Moséca 208.
Mounezzara 494.
Mounietta 12.
Mountan 4.
Mountân 128.
Mountanel 4.
Mouretta 6.
Mozzetto 182.
Mozzu 568.
Mucchiaiolo 635.
Muciatto 391, 400.
» minore 476.
Muciattola 439.
Mugiatto 344.
Mugnaio 407.
Mugnajaccio 335, 380.
Muiniate 235.
Mujâ 290, 291.
Mulacchia 437.
Mulinarie 233.
Mulínaru picciolu 572.
» grossu 572.
Mulinè 12.
Munacedda 557, 587.
» a testa nira 557.
Munachedda 587, 588, 604, 605.
» cuda longa 604.
» di passa 605.
» testa niura 587.
Munarasso 257.
Muneghéta 249.
» da la coláua 249.
Muneghetta 281.
Muneghina 107.
Muntagnin 277.
Muraiola 370, 422.
Muraiolo 635.
Muratt 106.
Murguni 543.
Muscaluredda 558.
Musserretta 521.

Digitized by Google

Mussovaia 541.
Mustacciello 496.
Mustacin 255.
Mustacin 244.
Mûtan 278.
Mutuna 71.

N

Naccaluoru 604.
Nasone 500, 630.
Natra turca 568.
Nchiummata 498.
Ncrocca sipàli 540.
Ncuddarata 602.
Ndurco 641.
Nduccu 532.
Nedròt salvadeg 119.
Negròla 208.
Negrisol 176.
Neiroun 9.
Neucciola 72.
Nevareul 4.
Nganna foddi 589.
» pastore 490, 496.
'Ngannaparùlo 508.
'Ngannapastore 516.
Ngroia 498.
Nia 542.
Nibbio 373, 406, 455, 481. 491.
» nero 373, 406.
Nibbiu 560.
Nibi 72.
Nibiu 72.
Nicciolera 68.
Niedduzzu 624.
Nigghia 541.
Nigghiu 560, 573.
» di passa 560.
» niru 560.
Nigliazzu 606.
Nigliu 606.
Nisciolera 54.
Nivaiolo 632.
Nivalora 543, 558, 563, 597, 603, 609.
Nivaluoru 576.
Nizzola 400, 439.
» cenerina 420.
» di padule 420.
» muciattola 439.
» nera 420.
» prataiola 420.
Nòcciola 61.
Nociola 72.
Nonetta 7.
Nonna 350, 634.
» col ciuffo 374.
» rossa 446.
Nonnotto 446.
Nottoan 289.
Nottola 349, 371.
Nottolaccio 371, 429.
Nottolone 349, 429, 444.
Nottuán 40.
Nottuan de Provenza 289.
Nuaggiolo 634.
Nugola 352.
Nuttuan 278.

O

Oca 247, 329, 330, 408, 423, 487.
» da gran 312.
» de mâ 286, 296.
» de mae 316.
» di li picculi 565.
» faraóna 247.
» granaiola 449.
» granda 247.
» grande 212.
» marina 544, 563.
» mezana 296.
» paa 294.
» paglietana 447.
» pizhola 212.
» salvadega 108, 130, 155, 257.
» salvádega 247.
» salvadego 162.
» salvarega 212.
» sarvaega 281.
» sarvaggia 593.
» sarvaja 10.
» selvatica 375, 395, 456, 481.
» testa nira 186.
Ocanell 116.
Occhi bianchi 596.
» di Pulce 371.
» lucenti 599.
» -pisciati 604.
» rossi 441.
Occhialone 336.
Occhialuneddu 563.
Occhialuni 563.
Occhiddi russi 571.
Occhijanchi 587.
Occhio cotto 441.
» di bove 416.
» di bue 478.
» rosso 347, 352, 403, 441.
Occhiocotto 428.
Occhione 332, 352, 396.
Occhiorosso 368, 403.
Occhipisciati 586, 587.
Och 212.
Ochetta 12, 296.
» de mae 315.
Oçhe 238.
» salvàdie 227.
Ochin 45, 286, 296.
Ocie 238.
Ocieto 244.
Ocio 244.
» de bo 254, 255.
» de bò 175, 207, 208.
» d' oro 249.
Odola 105, 241.
» de campagna 105.
Odolin de crap 105.
Oggioun 132.
Ogu de boi 617.
Olivedda 563.
» di margi 563.
Olôch 62.
Olouch 72.
» di bosch 72.
Oloûch 62.
Onicerece 69.
Oolouch 72.
Orale 542.
Orco marin 248.
Organéto 244.
Organeto de la China 255.
Organetto 364.
Organin 182.
Orgiali 613.
» de is cannas 613.
» » » mustassus 613.
» grogu 613.
Ornu 541.
Orru 541.
Ortolà 116.
Ortolan 56, 69, 175, 241.
» do nev 233.
» di montagne 233.
Ortòlan 128.
Ortolàn 204.
» salo 241.
Ortulàn di montagne 220.
Ortolano 253, 320, 344, 364, 390, 400, 420, 427, 439, 454, 476, 494.
Ortuano 508.
Ortulan 195.
Ortulàn 219, 304.
Ortulanu 553, 584.
Orva 559, 591.
Oselazh 211.
Osel dall' ojo 208.
» della Madonna 208.
» della neve 204.
» tedesco 204.
Oselét del bosch 207.
Oselin da la bela cresta 244.
Osélo cavalaro 247.
» de la Madóna 245.
Ostregante 295.
Otarda 131, 164, 377, 449, 498.
Ouco 292.
» gianco 292.
Ouricul 7.
Ourtoulan 4.
» bianch 5.
Ousel dii sass 70.
Ouslè 9.
Ouvina 5.
Ovivâ 285.
» du testùn 285.
Oxelo da sexi 291.

P

Paccaosso 475.
Pacech 205.
Pachedu 619.
Pagghionica 515.
» grossa 515.
Paggiaetta 279.
Paghionica 512.
» di matta 512.
» di parete 512.
Paglaissa 305.
Pagion 69.
Pagiôn 55.
Paglianculo 421.
Pagliaresca 400.
Pagliarolo 442.
Paglierino 347.

Digitized by Google

Paiarzin 41, 42.
Paisòla 118.
Pajarana 116.
Pajarina 4.
Pajariz 265.
Pajarola 6.
Pajinculo 486.
Palaccia 72.
Palandra 420.
Paletta 592.
Palettone 497, 519.
Palidda 567.
Palitta 561.
Pallante 336, 500.
Palomba 482.
Palombaccio 487.
Palòte 227.
Paloto 257.
Palóto 247.
Palugána 243.
Palughin 207.
Palumba collata 534.
» marina 534.
» servaggia 543.
Palumma rocalora 562.
» roccalora 608.
» sarvaggia 562, 595.
» servaggia 562, 575.
Palummella de la Cava 498.
Palummo salvaggio 521.
» selvaggio 498.
Pampua 71.
Panegas de montagna 203.
Panegás 203.
» de montagna 203.
» nostran 203.
Panigaèo 305.
Pantana 379.
Panterana 345, 365.
Pantiera 365, 420.
Paola 202.
Paolinaccio 335.
» moro 335.
» toppato 335.
Paolinaccione 335.
Paoncel 73.
Paonsína 249.
Paonzhin 214.
Paonzina 185, 258.
Papa fromigas 619.
» muschitu 617.
» -moschin 208.
Papafico 177.
Papamoschin 243.
Papamoschin 243.
Papamusca 618.
Papara 498, 567.
» a castagne 491.
» greca 520.
» paesana 520.
» romana 498.
Paparagno 308.
Papardedda 594, 608.
Paparedda 575.
Paparune 533.
Paparuni 561.
Papauzicu 572.
Papefig 234.
Pàpefig 224.
Papefigh 222.
Papemoschin 222.
Papiola 'mpiriali 564.
» nira 564.
Papióla beccu-stortu 563.
Papiulodda 563.
Pappagallo 637.
Pappaiaddiscu 553.
Pappamosca 494, 495.
Pappamosche 510.
Pappamuschi 587.
Pappardella 331.
Pappardellino 331.
Pappuo 526.
Papuncedda 563.
Paranzin piccol 260.
Paranzino 266.
Parasceula 129.
Parascieula 107.
» de munt 107.
Parascioeula 160.
Parasciolin 129, 160.
Parasciolina 59.
Parasciulin de munt 107.
Parisseua 281, 291.
Parissuca 42.
Parissuetta 292.
Parissuin 42, 291.
» celeste 42.
» cua lunga 291.
Parnigia 73.
Parnigon 63.
Parnis 63, 213.
Parousciola 71.
» celesta 71.
» dal ciuf 71.
» del capuss 71.
» dla coua lunga 71.
» grisa 71.
» grossa 71.
» guarantina 71.
» molinera 71.
Parousciolin 71.
Parousciolina 71.
Parpajoun 7.
Parrellone 496.
Parrelluccia 496.
» a coda longa 496.
Parrinu 599.
Partarrasu 605.
» di voscu 604.
Parulé 107.
Parusciola 59.
» gialda 71.
Parusciolettа 59.
» d'montagna 59.
Parussola 189, 196, 208.
» de la calota 208.
» todesca 208.
Parússola 244.
» de monte 244.
» foresta 244.
» montagnóla 244.
» mora 244.
» todesca 244.
Parussóla montagnola 244.
Parùssole de còde lunge 223.
Parussoléta 244.
Parussolin colla cresta 184.
Parussolín 244.
Parussiña 7.
Parussulatt 235.
Parussule 235.
» de code lunghe 235.
» mate 235.
Parùssule 223.
» grise 223.
» mate 223.
Pasara 175.
Pasara crautina 175.
Pasera busareola 116.
» merder 116.
Pasqualina 607.
Pasqualino 534.
Passaltario 507.
Passante 532.
Passara 55, 253.
» megiarola 253.
» muta 583.
» palugana 254.
» solitaria 176, 182, 254.
Pássara 242.
» solitaria 242.
Passaraina 494.
Passarastra 552, 583.
Passarastru 570.
Passare 219.
» çharandine 222.
» taliane 219.
Passareca 475.
Passareddu 566, 583, 611, 612.
Passaregna 496.
Passarella i canne 494.
» i marina 494.
Passarellu 611, 612.
Passaretta 128.
Passarieddu 570.
» di passa 570.
Passarin 55, 69.
Passarinot 69.
Passaro 507.
» canzirro 494.
» casarinolo 494.
» solitario 495.
» turchiesco 507.
Passaron d' montagna 69.
» de montagna 157.
Passarot 55, 69.
» d'rasa grossa 4.
» » pcita 4
» di sales 4.
» doumesti 4.
Passaroun 128.
Passaru 530, 539, 552.
» americanu 553.
» di acqua 553.
» di boscu 554.
» di campagna 602.
» di vuoscu 602.
» du distrettu 552.
» sbirru 583, 602.
» solitariu 530.
Passeru solitariu 566, 585.
Passegua 295.
Passer 104.
» grosso 104.
» solitari 234, 235.
Pásser solitári 221.
Passera 128, 206, 344, 390, 400, 419, 427.
» bastarda 264.
» buschina 107.
» casolina 427.
» di macchia 347.
» di padule 365, 401, 439.
» di tetto 363.
» forestiera 343.
» frattarola 478.
» fura-siepe 486.
» grossa 344.
» grossaia 344, 363.

Digitized by Google

Passera lagia 343, 363, 390, 419, 427, 438, 453.
» macchiaiola 455.
» matta 403.
» mattella 129.
» mattugia 344, 363, 390, 419.
» mattusa 438.
» minuta 363.
» montanara 485.
» ragia 319.
» reale 363, 438.
» salcina 400.
» scopaiola 421.
» scopajola 442.
» scoparina 369.
» scopina 403.
» sepaiola 369, 421.
» solitaria 57, 117, 159, 196, 206, 321, 346, 367, 391, 402, 420, 428, 440, 486.
» stipaiola 346, 369.
» strega 363.
» sulitaria 105.
Passerat 232.
Passere çharandine 235.
» dal becc gruess 232.
» di çiàmp 218.
» minude 232.
Passeretta 157.
» de montagna 160.
Passeretto 485.
Passerin 69, 205.
Passerina 347.
» stipaiola 369.
Passerino 485.
Passero 319, 475, 485, 489.
» i canne 496.
» montanaro 475.
» solitario 477.
Passerot 219.
» colombera 69.
Passeroton 69.
Passerott 232.
Passerotto 158, 427, 453, 456.
Passiru 583.
» sulitario 571.
Passra 69.
» d' lesca 5.
» d' macia 266.
» d' montagna 59.
» d' mountagna 4.
» marenga 4.
» salutaria 70.
» solitaria 70.
» soulitaria bleu 5.
» » roussa 5.
Pastorele blanche 233.
Pastorèle blanche 220.
» zale 233.
» zàle 220.
Passua 40, 278, 288.
» salutia 41.
Pássua muinàa 303.
» teracina 303.
Passuetta 278, 288.
Passuétta 40.
Passuun 40, 288.
Passuùn 278.
Paturu 592.
Paula 582.
Paunsi 120.
Pavarin grande 205.
Pavion salvadi 73.
Pavoncella 378, 397, 488, 497, 499.
» di padule 447.
Pavoncin 228.
Pavone affricano 395.
Pavonetta 285.
Pavoni africani 374.
Pavonzhin 214.
Pavonzin 109.
Pavonzina 132.
Pavonzina 64.
Pavuncellu 597.
Pavunieddu 576.
Pecchiaiolo 406.
Peçhecrots 237.
Peccetto 280.
» da sorchi 280.
Pecetto 41.
Pelicâu 130.
Pellere 499.
Pellicano 108, 328, 374, 446, 481.
Pellicanu 561, 574.
Penacin 247.
Pendolin 129, 160, 254.
Pendolin 214.
Penninculo 348.
Pentin 160.
Peppola 343, 362, 390, 399, 419, 426, 438.
Percia-rivetti 556.
Percia-ruvetti 556.
Perciabudi picciulu 596.
Perciaruvettu 571.
Perdigiorni 284, 294.
» gianco 283, 293.
» piccin 284, 294.
» russo 283, 293.
» senein 283, 293.
Perdigiorno piccin 44.
» rosso 43.
» seneen grosso 43.
Perissèa 308.
Perisseta 308.
Perissuin 308.
Perlina 404.
Perlonza capinera 422.
Perlonzina 422.
Perluccino 479.
Pernice 331, 431, 448, 482, 534, 640.
Pernice di mare 379, 412, 451, 483.
» gallo 534.
Pernici 543, 575.
Pernigot 238.
Pernigótt 227.
Pernis 63, 73, 109, 119, 163, 227, 238.
» bianca 10.
» gaja 10.
» grisa 10.
» roussa 10.
Pernis di pràd 228.
» -roussa 73.
Pernis 131.
Pernisa 248.
» bianca 178.
Pernise 177, 213, 248, 257, 313.
» bianca 185.
» d' acqua 500.
Pernise de mae 315.
» piccola 185.
» rossa 185.
Perniseta 109.
Pernisetta 63.
Pernisotto 185.
Pernixe 286.
» de mâ 295.
» rossa 44.
» roussa 294.
» russa 284.
Pernixotto de mâ 286.
Perruzza 540.
Perticòla 311.
» gianca 311.
Perticolin 311, 312.
Perusciola 59.
Perusciolina 59.
Perussola bianchizha 208.
» col suffo 208.
» col zhuf 208.
» da chèba 208.
» dalla coda longa 208.
» granda 208.
» moscona 208.
» todesca 208.
» turchignola 208.
Perùssola 211.
Peruzhola 208.
» todesca 208.
Peruzholin 208.
Pescamartin 42, 72.
Pescareula 44.
Péscarin 12.
Pescaron 44.
Pesciaiola 409.
» grossa 409.
Pesciajola 396.
Pescina 331, 352, 376.
Petarélo 212.
Petaross 234.
» turchin 234.
Petaròss 221.
» turchin 221.
Petass 219.
Pétasso 241.
Petazzo 182.
Petirosso 242.
Péto bleu 280.
Petonzo 175, 253.
Petorosso 254.
Petronélla 40.
Petronilla 289.
Petross 106.
Petrouss 6.
Pett' arruviu 616.
Pett' azzurro 367, 392, 421.
Pett' azur 129.
Pett' rouss 58.
Pettaro 183.
Pettarouss 58, 70.
Pettazzurro 322, 402.
Pettegola 379.
Pettiere 322, 346, 402, 421, 441.
Pettiross 234.
Pettirosso 346, 367, 392, 428, 454, 477, 486, 634.
Pettirouss 70.
Pettiruscio 295.
Petto turchino 477.
Pettorosso 483.
Pettu azzurru 586.

Digitized by Google

Pettu blù 586.
» bru 555.
» russu 555.
Petturussu 567, 586.
Petussêto 242.
Petússo 242.
Péuca 201.
Peúda 633.
Pevion salvadegh 109.
Pia 314.
Pia-vesp 161.
Piagnucolone 421.
Piattaione 422, 444.
Piattajone 487.
Piattone 405.
Piberoni 624.
Pica 69, 437, 485, 489, 493, 506, 529, 539.
» marina 496, 516, 532.
» verde 496.
Picamonte 5.
Picarân 130.
Picardela 8.
Picasc 72, 108.
» -negar 72.
» -rouss 72.
» -vert 72.
Picasc verd 161.
Picascet 72.
Picasch 130.
» gainèe 130.
Picascieu 129.
Picascin 71.
Picascitt 72.
Picass 8.
Picatass 8.
Picatin 7.
» di bauss 7.
Picatoun 7.
Picazo 308, 310.
Picc 336, 241.
» de corône 224.
» gris 225.
» mezzàn 224.
» neri 236.
» verd 224, 236.
Piccasc 61.
Piccascet 71.
Piccascett 61.
Piccasciett 59.
Piccascin d'montagna 60, 61.
Piccetto 290.
Picch 61.
Picchicchiera 509.
Picchieri 421.
Picchietto 404, 443.
Picchio 444, 490.
» bigio 443.
» cardinale 487.
» cavallo 405, 422, 444, 480.
» farfallino 393.
» focaro 487.
» galletto 405, 420, 444.
» gallinaccio 326, 349, 372, 394.
» giallo 422.
» giallone 487.
» mezzano 372.
» minore 372, 480.
» muraiolo 348, 422.
» murajolo 325, 404, 443, 486.
Picchio muratore 325, 393, 429, 479.
» nero 480.
» pollastro 349.
» ragno 393.
» rosso 326, 349, 372, 394, 405, 422, 480.
» rosso maggiore 349, 444.
» rosso mezzano 444.
» rosso minore 444.
» rosso piccolo 326, 349, 394, 405.
» scorzolino 486.
» verde 349, 372, 394, 429.
Picchiotto 370, 393.
Picchiucchio 500.
Piccion di mare 380.
» torraiolo 423, 430.
Piccioncino 335.
Piccione 456.
» marino 456.
» selvatico 491.
Picciourouss 70.
Piccol dugo 161.
Piccoscin 71.
Piccounsu 292.
Piccózz 161.
Piccozz ross 161.
Piceto 306.
Picett 129, 159.
Pich 210.
» bracc 72.
» cul roûss 61.
» d' montagna 61.
» d' mountagna 8.
» del cul rouss 72.
» di mur 71.
» dla mort 7.
» -gaj 8.
» muradôur 59.
» murau 7.
» -negar 72.
» nègar 61.
» neigro 72.
» neir 8.
» -nejar 72.
» -peit 8.
» -rouss 72.
» » cito 72.
» » -mezzan 72.
» roûss 61.
» -togn 59.
» vert 61.
» -vert 72.
Pichet 71.
» dla rusca 71.
» fiorâ 72.
» pantoulon 71.
Pichét 7.
» d' mountagna 8.
Pichin 71, 72.
Pichiu 636, 637.
Picial 117.
Piciourouss 6.
Piconso gazanà 43.
Picot ross 119.
» seneri 118.
» verde 119.
Picott 236.
Picozz 130.
Picozzin 160.
» senerin 129.
Picùn 310.
Picunsin 43.
Picunzetto 282.
» senein 281.
Picunzo 282.
» gallinâ 282.
» verde 282.
Piddito 516.
Pidicchiadua 519.
Pied-russ 525.
Piedi luonghi 609.
Pietrino 454.
Piett russ 513.
» -russ 524.
» » vernile 524.
Piettirussu 531.
Piettoianco 496.
Piettorusso 496.
Piezz gruess 507.
Piga 610.
Pigazet 72.
Pigghiunghiu 564.
Pigh gross 266.
Pigion 69.
Piglia mosche 348.
Pignóla 247.
Pignólo 247.
Pigosón 245.
Pigossetto 295.
Pigosso 255.
» verde 255.
Pigot 210.
» moro 210.
» negro 209.
» ross 210.
» todesch 210.
» verdo 210.
Pigozh 210.
» negro 209.
» verdo 210.
Pigózh 210.
Pigozhét 210.
Pigozhon 209.
Pigozzin 197.
Pigozzo rosso 177, 184.
» verde 177, 184.
Pigula 541.
Piguset 71.
Pillone de Santa Maria 620.
Pilucani 590.
Pilusa 540.
Pincino 353.
Pinin 55, 69.
Pinnazzola 557.
» cuda longa 557.
Pinsoun 4.
Pintin 129.
Pinzacchio 353, 379.
Pinziolo 633.
Pinzuni 588, 602.
Pio 131.
Pio-piò 45.
Piò-piò 45.
Pióch 204.
Piombi 119.
Piombin 61, 132, 184, 210, 236, 255.
» da acqua 210.
» da croda 208.
Piombin 245.
Piombinello 405.
Piombino 372.
Piónsa mora 241.
Pionza 175, 182, 241, 253.

Digitized by Google

Pionza smaiardada 175.
Pioumba 6.
Pioumbin 8, 12.
Piouravej 11.
Piouravela 11.
Piourousa 5.
Piovanello 333, 378, 411.
» pancia nera 450.
» » rossa 450.
» piccolo 378.
Piovanellino 333.
Pipituna 567, 573.
Pipitúne 532.
Pipituni 541, 559, 590, 606.
Pirnicaru 575.
Pirnici 562, 568, 595, 608.
Pirnizzola 557.
Piro-piro 333, 334, 352.
Piroulét 6.
Pirpir 602.
Pirullino 378, 411.
Pisagò 248.
Pisagrù 248.
Pisoca 185.
Pispanta 614.
» de is cannissonis 614.
Pispanta de riu 614.
Pispicia di frischia 555.
» gialla 555.
» janca 554.
» svaria 554.
Pispisa 540, 565.
» giarna 585.
Pispisè 557.
Pispola 345, 366, 391, 402, 420, 439, 454.
» di padule 440.
Pispoledda 614.
Pispolino 366.
Pispolo 428.
Pispolone 391, 401, 420, 428.
Piss 70.
Piss-piss 57.
Pissa mue 307.
Pit 213.
Pit da acqua 214.
Pita bianca 213.
» da giara 213.
Pitamoutas 6.
Pitarel 206.
Pitaróla 205.
Pitaro 176.
Pitaróla 205.
Pitarra 563, 575, 597, 609.
Pitavla grossa 7.
» mora 7.
Pittiddu 603.
» virdi 601.
Pitigrussa 618.
Pitilongu 618.
Pitirri 599.
Pitirru 599.
Pitta formigue 282.
» muin 292.
» muscin 291.
Pittafigo 280.
Pittafurmighe 43.
Pittamon 42.
Pittamuscin 42.
Pittima 334, 379, 397, 412, 451, 483.
Pittiros 265.
Pittirosso 346, 367.
Pittirusso 540.
Piturlino 320.
Piu 109.
Più-più 73.
Piula 573, 590.
Piula 567.
Piumbin 266.
Piuvi 71.
Piuuzo 282.
» torsicollo 282.
Piunzzetto 282.
Piv 60.
Pivaróto 249.
Pivaro 249.
Pivarón 249.
Pivé doré 132.
Pivi 60.
Pivi 8.
» di bauss 8.
Pivié 164.
Pivič 11.
» doré 11.
» douminican 11.
» real 11.
Pivièo 314.
Piviere 258, 332, 352, 396, 411, 423, 449, 456, 523.
» di scoglio 332.
» marino 523.
» realo 456.
» tortolino 352, 377, 396.
Pivieressa 410.
Pivieri 626.
Piviero 487.
Pivion salvadigo gross 73.
» selvadigh 63.
Pivioun salvadig 73.
Pivolone 412.
» piccolo 412.
Pivulco 228, 229.
» pizzùl 229.
Pivula 535.
Piza formighe 310.
Pizzaccarin 267.
Pizzaccherino 267.
Pizzacra 267.
» d'mar 275.
Pizzaferru 590.
Pizzafigh 58.
Pizzamei 159.
Pizzarda 483.
Pizzardino 483.
Pizzardo 412.
Pizzardone 483.
Pizzecaformicola 496.
Pizzica ferru 559.
» » nicu 559.
» » niru 559.
» » testa russa 559.
» » virdi 559.
Pizzica firru 539.
Pizzicaferru 559.
Pizzicamuru 558.
Pizzicodia 515.
Pizzifainu 532.
Pizziferru 567.
Pizzigacann 559.
Pizzigone 633.
Pizzilata 519.
Pizzo 'neroce 491.
» 'fierro 496.
» stuorto 499.
Pizzofierru 573.
Pizzolamenua 514.
Pizzu a cucchiareddu 574.
» tortu 613.
Pizzua formica 516.
Pizzuddu tuortu 572.
Pizzugrossu 612.
Pizzuliazucchi 604.
» russu 605.
» picirìddu 604.
Plombin 225.
Pochéta 211.
Pógia 246.
Pogianelo 256.
Pogliana 327.
Poiana 72, 177, 350, 373.
» de zocca 177.
Poja 184, 256.
Poja bianca 246.
» » de vále 246.
» de vále 246.
Pojana 62, 119, 130, 161, 184, 212, 230, 237, 256, 328.
Pójana 246.
Pojane 237.
Pojàne 226.
» col ciaf blanc 225.
Pojanella 162.
Pojanon 62.
Pojava 481.
Pola 120, 582.
Polastrà d'inverno 313.
Polastrela 313.
Polentino 499.
Poliastrina 410.
Pollastrona 410.
Pollin salvadegh 131.
Pollo sultàno 377.
Porciglione 376.
Potaséca 208.
Potazzina 404, 443.
» piccola 404.
Poula ciàpiña 11.
» da eva 11.
Poulin d'acqua 45.
Poundrà 9.
» bianca 9.
» grossa 9.
Poundrá 9.
Pounta d'melia 6.
Poupoú 8.
Poupoula 8.
Poveredda 524.
Pravon 158.
Pravoûn 128.
Predicatour 4.
Predixi 625.
Predixis 625.
Preto 368, 634.
Pretino 322.
Prillo 332, 333, 334.
Prinzacchino 353.
Prispola 320, 321, 345, 454.
Prispolino 315.
Prispolone 315, 366.
Priviere 352.
Proscunculu 556.
Psi-psi 69.
Pudda de mata 625.
Puddicinedda di mari 565.
Puddicinu 608.
Puddicinu di mari 568.
Pujen 267.
Pulcinella de mari 630.
Pulicicchiu 557.

Digitized by Google

Puliga a chighirista 626.
» inchighiristada 626.
Pullastron 109.
Pulzon 266.
Punta de canna 616.
Puntacanna 616.
Pupa 72.
Puppla 72, 266.
Puppola 61, 422, 445.
Purpuredda 564.
» tabacchina 562.
Puta 8.
Puticchia 348.
» grossa 348.
Puttanella 332, 377.
Puvioûu de Colombèra 131.
» salvadegh 131.
Puzzuni birdi 620.

Q

Quaggia 284.
Quaggiu 291.
Quagghia 522, 543, 562, 568, 575, 595.
» di mari 564.
Quagghiarina 554.
Quagia 185, 248, 291, 313.
Quâgia 44.
Quagina 248.
Quagio 248, 257.
Quaglia 331, 351, 376, 396, 409, 431, 419, 456, 482, 487, 491, 498, 504, 608, 640.
» di mare 499.
» marina 450, 456, 504.
Quagliari 625.
Quagliera 351.
Quaia 73, 109, 119, 177, 197.
Quaja 10, 63, 131, 163, 213, 248.
Quajastróni 248.
Quajja 534.
Quâjna 248.
Quajo 238.
Quajot 213.
Quak 130.
Quaquà 61.
Quatremula 105.
» gialda 105.
Quatroci 248.
Quattr' eucc 131.
Quattr' occhi 376.
Quattr' oeuggi 44.
Quattrocchi 409, 482.
Quattroci 257.
Quattroecci 70.
Quattuocchie 498.
Querula 496.
» cestaregna 496.
» palummara 496.
» passaregna 496.
Quicquera 523.

R

Raari 116.
Racanella 409.
Radaicchio 486.
Ragnàr 224.
Raj 11.
Ral 11, 213, 214.
Ralet 213.
Ramaci 540.
Rampegarolo 196.
Rampeghin 42, 107, 160, 176, 184, 255, 292, 308.
» de monte 255.
» de muaggia 282.
» de zengia 177.
» di cepp 160.
» picolo 184.
Rampeghin de monte 244.
Rampeghin 129.
Rampighina 604.
Rampichino 318, 370, 404, 422, 429, 443, 478.
Rampighett 71.
Rampighi 118.
Rampighin 7, 59, 60, 71, 235.
Rampigin 223.
Rampignet 7.
Rampinello 479.
» coll' ali rosse 479.
Rampino 518.
Ranocchiaia 350, 374.
Ranocchiaja 446.
Ransigneul 6.
» dlo cane 6.
» » » pcite 6.
Rapalin 303.
Raperino 320, 344, 363, 390, 400, 427, 453.
Rapineddu di loco 541.
Rapparoddu 553, 583.
Rattouner 72.
Ravanin 55, 69.
Ravanit 69.
Re 347.
» cacchino 347.
» cacco 347.
» cucala 6.
» d' Ortolan 233.
» da quaje 11, 213.
» de l' aciedd 514.
» de l' Ortuani 508.
» de li Marvizzi 571.
» dë quae 120.
» de quai 109.
» de quaj 131, 163.
» de quagie 257.
» dee quagie 313.
» dei quagghi 534.
» di beucc 71.
» di Cuàje 228.
» di Giarègule 228.
» di li Beccaficu 571.
» di li Marvizzi 555, 586.
» di Lodole 391.
» di macchia 317, 369, 421, 429.
» di macchie 455, 482.
» di Ortolán 219.
» di Pivi 8.
» di quagghi 575, 596.
» » » veru 562.
» di quagli 609.
» di quaglie 396, 410, 449, 640.
» di quai 73.
» di quaj 63.
Re di Ransigneui 6.
» di Rusignúl 222.
» di scês 58.
» di Turdi 603.
» di uccelli 486.
» di usei 71.
» dle caje 11.
» i quaglia 498.
» pcit 6.
» quagghione 522.
» quaglia 431.
» quaglio 352.
» -re 71.
Ré-Ré 58.
Realét 213.
Realéto 248, 249.
Reatel 71.
Reati 118.
Reatin 281.
Reatin 176.
Reattin 42, 160, 291.
Recacco 324.
Redêst bastard 209.
Redéstol 209.
Redestol falconier 209.
Redestola 177.
Redéstola 209, 244.
» bianca 244.
» falconiéra 244.
» foresta 244.
» lóra 244.
Redestolón 209, 244.
Regeniello 495, 496.
Regestola falcona 184.
» picola 184.
» rossa 184.
Regéstola 244.
» bianca 244.
» falconiera 244.
» foresta 244.
» lora 244.
Regestolon 184.
Regiña 6, 7.
Regino 377.
Regorin 69.
Reguestolon lor 209.
Regúz 207.
Reiestola 196.
Renello 407.
Rennenella 496.
Rennenone 496.
Renninella 490.
Reotîn 129.
Repéndol 209.
Repipin 235, 244.
Repipin 223.
Requaggio 44, 295.
Requagio 349, 285.
» negro 185.
» rosso 185.
Requagiato 185.
Requaglio 332.
Requajo 213, 249.
» rosso 249.
Resegon 163.
Resegott 131.
Resestola 265.
» da la testa rossa 255.
» falconiera 255.
Reséto 213.
Reusa 107.
Reuz 207.
Reŭzhol 207.
Revêst de montagna 209.

Digitized by Google

Rezeto 183.
Ribobolo 348.
Ricignolu 582.
Ricignuolu di fiumi 571.
Riddena 594.
Riggitanu 535.
Rigogolo 348, 370, 393, 429, 443.
Rigolin 55.
Rigorin 55, 69.
Rigulin 69.
Riiddu 557, 584, 604.
» di pantanu 557.
» testa russa 604.
» tupputu 557, 588.
Riilo 495.
Rindine 531.
» e mare, 535.
Rindinuni 540.
» americanu 558.
» di livanti 564.
» di mari 565.
» pettu-janco 558.
Rindune 531.
Rinnina 558, 571, 589, 605.
» d' inviernu 571.
» di casa 589.
» furastera 558.
» martidduzzu 589.
» monica 558.
» suricina 558.
Rinnina di passu scura 605.
Rinninedda 571, 589, 605.
» castagnazza 515.
» coda longa 515.
» palommina 515.
» turchiesca 515.
Rinninessa 516.
Rinninone 516.
» marino 526.
Rinninuni 571, 589, 605.
» americanu 558.
» di li piettu janco 571.
» di maisa 559.
» di mari 576.
» di passa 605.
» pettu janco 558.
Rininedda 567.
Rioundeula 7.
Rioundula dle roche 8.
Risarolo 183.
Risarólo 243, 245.
Riscignolu 586.
Riscignuolo 495.
Risëreu 160.
Risignolu 540, 555.
Risignuolu 530.
Risireu 129.
Riulo 518.
Rivelin 132.
Riversinieddu 535.
Riversinq 498, 522.
Riversinu 543.
» rando 535.
Rocaireul 8.
Rochéto 247, 257.
Rochetto 330.
Roegantin 244.
» maciX 244.
Romaniello 499.
Rompanos 68, 157.
Rompe-noco 493.
Rompinose 174.
Roncass 119.
Rondanina 266, 309.
» de mâ 296.
Rondena 119, 130, 160.
Rondèna 177.
» de montagna 177.
Rondeni 119.
Rondenina 255.
Rondic 266.
Rondin 184, 236.
» d' acqua 184.
» de monte 184.
Rondin 245.
Rondin 224.
» di mar 229.
Rondina 245.
Ròndina 636, 637.
Rondina dal cu bianco 209.
Rondinaccio 319.
Rondine 245, 325, 326, 348, 394, 422, 429, 413.
» bianca 479.
» d' inverno 455.
» di mare 379, 397.
» forestiera 371.
» grottara 486.
» reale 348.
» rossa 479.
» vera 371.
Rondinela 184, 255.
Rondinéla 245.
Rondinele 236.
Rondinella 130, 455, 486, 490.
Rondinino 349.
Rondol 209.
» de montagna 209.
» del cul bianch 72.
Rondól de zhime 209.
» grand 209.
Róndol 209.
» da croda 209.
Rondola 71.
Rôndola 60.
Rondolét dal cul bianch 209.
» de croda 209.
» griso 209.
Rôndolina 60.
Rondolon 72.
» d' montagna 72.
Rondolón 209.
Rôndolôn 60.
» d' montagna 60.
Rondon 108, 161, 184, 255, 292.
» bianc 161.
» bianco 255.
» de mar 161.
» foresto 184.
» marin 255.
Rondón 42, 209, 245.
» gianco 42.
Rondôn 177, 224, 309.
Rondone 326, 349, 371, 394, 405, 412, 413, 422, 429, 444, 455, 480, 486, 490.
» bianco 326, 371, 480.
» di mare 414.
Rondôun 130.
Rondul 236.
Ròndul 224.
Ronninone 490.
Ros-ciuz 207.
Roséto 243.
Rôsëza 285.
Ròseza barbaresca 286.
Roussgneul 70.
Rosigneol 117.
Rosignol 176.
Rosignolo 322, 346.
» di padule 323, 324, 347.
Rôssera 131.
Rossignèo 306.
Rossigneu 70, 129, 159.
Roussignêu 58.
Roussignêul 58.
Rossinnolo 196, 251, 428, 477, 616, 634.
» bastardo 254.
Rossignolo 183.
Rossignolone 478.
Rossina 330.
Rostabò 314.
Rondanina 292.
» d' mountagna 8.
Roundaniña 7.
Roundolon negher 72.
Roundolina 71.
Roundon sassareu 72.
Roundoula 7.
Roundula 71.
Rounseza 295.
Rounsenento 291.
Rovegárolo 214.
Rre de aceji 540.
» di quagghi 543.
Rugnetta 279.
Rumfun 283.
Rouncasc 109.
Roundanin-na 42.
Rundaninha 282.
Rundeledda marina 628.
Rundena 107.
Rundili de a riu 619.
Rundini murinisca 620.
Rundoni bianca 619.
Rundonis 619.
Rundun 282.
Ruocio 504.
Ruscigneu 41, 280, 290.
» cannajeu 281.
» d' egua 291.
» de canne 291.
» foesté 42.
» lombardou 291.
Ruscignuolo 495.
Rusetto 254.
Rusieddu cinnirusu 571.
» » cu la pinnacera 571.
» giarnu 571.
» jancu 571.
» picciulu 571.
» russu 571.
Rusigneu 106.
Rusignol 70.
Rusignolo 346, 367, 402, 421, 441.
» di padule 369, 403, 442.
Rusignólo 242.
Rusignolu 555, 566, 571.
» di margiu 557.
Rusignoluni 557.
» di cannitu 557.
Rusignul 234.
Rusignùl 221.
» matt 223.
Russa 315.
Russeddu 542, 561, 567, 592, 607.

Digitized by Google

Russeddu di cannitu 592.
» di margiu 592.
» iancu 542.
Russellino 497.
Russiddazzu 592.
Russiedd 519.
Russiello 497.
Russiellu 533.
Russignól 206.
Russignolu 616.
Russignuolo 490.
Russignuolu 603.

S

S-ciaruzol 207.
Saettone 526.
Salciaiola 442.
Salimpunta 368, 421.
» di poggio 368.
Salta bastoni 486.
Saltampalo 322, 368.
Saltancecce 441.
Saltanseccio 368.
Saltanselce 428.
Saltanvette 368.
Saltasecce 346.
Saltastecce 392.
Saltimpalo 346, 402, 428.
Saltimpunta 265.
Saltinpalo 441.
Salzetta 498.
Sansiról 203.
Santa Maria 349.
Sarchianacclo 455.
Sardagna 117, 129, 159.
Sarlodi 365.
Sàrsacola 177.
» dalla testa rossa 177.
Sarsegna 185.
Sarségna 247, 257.
Sarsegnóla 247.
Sarsella 533.
Sarsellúne 533.
Sartagnola 159.
Saslot 10.
Sassellara 346.
Sassareu 70.
Sassello 321, 346, 347, 392.
Sassareul 72.
» d' montagna 72.
Sassareûl 60.
» d' montagna 60.
Sassarieul 72.
Sauta-beucc 71.
Sbarégol 210.
Sbatti-ae 292
Sbéregh 210.
Sberna 63.
Sbi Sbi 279.
Sbira 637.
Sbiro 209, 224, 292.
Sbiro 245.
Sbirro 496.
Sborro 399
Sbraviere 361.
Sbrisciolo bianco e nero 484.
» grosso 484.
» mezzano 484.
Sbriviredu 563.
Sbruttùn 278.
Sbrusasese 176.
Scaccia margi 598.
» miennuli 570.
» picciulu 598.
Scacciameunuli 583, 602.
Scagózza 250.
Scanapéa 12.
Scappaxin 290.
Scappaxina 290.
Scarza 395, 407.
» bianca 395, 407.
» bigia 395.
» cappona 374.
» cenerina 374.
» col ciuffo 374.
» rossa 395, 407.
Scarzetta 395.
Scarzotto 395.
Scassa gallenaro 496.
Scassaçòde 220.
Scassola 241.
Scavuzza 594.
Scavuzzu 568.
Scellavattole 496.
Scepita 332.
Sceraute 253.
Sçhasseallis 224.
Schiaccino 368.
Schiarantè 240.
Schiaranto 240.
Schiattaione 364.
Schiribilla 377, 396, 449.
Schizzu 635.
Sciabica 352, 377.
Sciabiga 396.
Sciabocchedda 561.
Sciabocchi 561.
Scieta 72.
Scigueta 108.
Sciguetta 130, 161.
Scigoun 289.
Sciguun 40.
Sciguun 278.
Scimareul 70.
Scimarèul 58.
Scimireu 159.
Sciorbocchi 561.
Sciscico 161.
Sciscieu 108, 130.
Sciscieûl 62.
Sciurolo 494.
Sciuscieul 72.
Sciuveta 72.
Scivetta 45.
Scoasi 118.
Scodaross 234.
» di montagne 234.
Scodaròss 221.
Scopaiola 421, 429, 443.
Scopajola 393.
Scoperagnola 368.
Scopina 393, 429, 443.
Scorbat 68.
Scorbatt 54.
Scorbattin dal bech giald 157.
Scornagiaiu 605.
Scossa nuci 303.
Scosson 303.
Sèoterzolo 454.
Scourbat 127.
Scricciolo 369, 392, 403, 421, 442.
Scrivañ 5.
Scrizz 234.
Scrocchetto 346, 482.
Scrocchino 368.
Scropiu 541.
Scupiu 559.
Scurbat 68.
Scvetta 62.
Scvetton 62.
Sdárnali 233.
Sdordi 117.
Sdrunàl 219, 233.
Secariello 498.
Secone 498.
Seenna 292.
Segalin 207.
Segheta 313.
Seghettone 331, 376.
Selega 195.
Sélega 253.
» da la macia zala 240.
» foresta 240.
» grossa 240.
» megiarola 253.
» megiaróla 240.
» palugana 243.
» palugàna 241, 243.
Sélegon 240.
Semenzarul 232.
Senentnu 292.
Seneppia 334.
Seneppino 334.
Seneppio 334.
Senuella 281.
Sepajola 392.
Serena 43, 62, 72.
» cua lunga 43.
Sereña 8.
» di prà 8.
Serenha 283.
Serenùn 282.
Seretta 294.
Serin 4.
Sermollo 390.
Sérola 248.
Seroléta 248.
Serolón 248.
» de Pò 248.
Serra 562.
Sérule 227.
Sfogio 213.
Sfógio 249.
Sforcelôun 131.
Sforzana 185.
Sforzána 248, 249.
Sforzhana 213.
Sforzhanéla 213.
Sforzhanòn 213.
Sfranzell 232.
Sfredelin 203.
» foresto 203.
Sfrisarin 253.
Sfrison 104, 210.
Sfrisón 203.
Sfrisòn 55.
Sfrisott 232.
Sgalbeder 266.
Sgambérlo 249.
Sgambetton 164.
Sgambirlo 249.
Sgarbèo 308.
Sgardéla 247.
Sgárdo 246.
» bianco 246.

Digitized by Google

Sgárdo rosso 246.
» zenerin 246.
Sgardule 234.
Sgarela 183.
Sgarettoûn de mâr 132.
Sgarin 132.
» negher 132, 165.
Sgarin 12.
Sgarrin 73.
Sgarz çenerin 238.
» cenerin 226.
Sgarza 185.
» marina 157.
» rossa 185.
Sgarze 237.
Sgarzòtt 226.
» blanc 226.
» pizzul 226.
Sgarzetta 185, 256, 481.
» bianca 481.
» piccola 481.
Sgarzétta 246, 247.
Sgarzettone 481.
» bianco 481.
» rosso 481.
Sgarzo 256.
Sgárzo 246.
Sgarzorin 158.
Sgarzorin 128.
Sgavazúa 244.
Sgnepa 120, 315.
Sgnèpa 132.
Sgnepi 120.
Sgnepîn 132.
Sgnepon de mar 162.
Sgnepoûn 132.
Sgneppa 64, 110, 164.
Sgneppin 64, 110, 164.
Sgneppon 109, 164.
Sgneppoûn de mar 132.
Sgnepù 130.
Sgolacchio 479.
Sgolg 162.
Sgolgia 62, 130.
» roussa 130.
Sgolgion 162.
Sgolgioûn 130.
Sgolgin 63, 108, 162.
Sgolgiu 130.
Sgorza 73.
Sgotto 407.
Sgourgétta 9.
Sgrisul 221, 234.
Sguà 256.
Sguassacóa 242.
Sguasseróto 241.
Sguisèta 116.
Sguisetta 70.
Sguisetù 116.
Sguizeton 105.
Sguizzeta 105.
Sgulatrel 110.
Sguseta 175.
Sguseton 175.
Sì Sì de monte 289.
Sì Sietta 289.
Sia 241.
» d'Africa 278.
» da canne 278, 289.
» da coi 281.
» da neive 279, 289.
» giana 278.
» montagnina 289.
» muntagnin-na 40.
Sia nostrà 40.
» nostrâ 278, 289.
» paggea 289.
Sia pagéa 40.
» russa 278.
Sia 241.
Siaen 40.
Siain 278, 288.
Sibalecchia 513.
Siccio 325.
Sichiló 499.
Sicogna 10.
Sieta 119.
Sigheugna 284, 294.
Siglot 116.
Signo 257.
Sigogna 130, 162, 256.
» negra 162.
Sigugna 312.
Silo 304.
» d'inverno 304.
Silùn de montagna 304.
Sima cousti 290.
Simacusti 41.
Simma custi 280.
Simmacusti de primaveja 280.
Siolonso 175.
Slóto 241.
Sipa 70.
Sirin 4.
Sirretta 562.
Siseol 119.
Sisi 41.
» d' aequa 40.
Sisi da prou 40.
Sisicula 530.
» gialla 530.
Sisila 236, 255.
Sisila 245.
Sisilin 242.
Sitolo 494.
Sivetta 283, 293.
Sivettua 293.
» grixa 293.
» groussa 293.
» neigra 293.
» roussa 293.
Sivetua 310.
Sivilott 232.
Sivilòtt 219.
Sivitoula 8.
Sivitouloun 8.
Sizin 308.
Smágo 246.
Smagón 251.
Smajard 219.
Smajàrd 233.
Smajàrda 175.
Smerghéta 251.
Smeriglio 446.
Smergo 251, 294.
Smérgo 251.
Smergón 251.
» mancià 251.
Smerru 586.
Sneppin 73.
Soeta 256.
Soeton 256.
Sordone 369, 403, 442.
Sotarol 186.
Sotaról 214, 251.
Sott' aqui 120.
Sottacquin 64.
Sottanello 456.
Sottaquin 132.
Sottopozzi 186.
Spaiarda 69, 105.
» gialla 69.
» grisa 69.
Spajarda 56, 128, 158.
Sparacannelle 369.
Sparavé 9.
Sparussola 255.
Sparussolin 255.
Sparvál 226.
Sparvel 237.
Sparveri 560.
Sparvier 211.
» da Colombi 211.
Sparviere 328, 374, 395, 407.
Sparviero 481, 497.
Spatola 329, 408.
Spatula 44, 294, 542, 592.
Spazacamin 183.
Spazzacamino 392.
Specchio 408.
Spennacchino 329.
Sperciaruvettu 567.
Sperciatepe 495.
Spérga 248.
Spernaciu 247.
Spernisa 248.
Speronzola 176.
» dalla coa longa 176.
Speronzolin 176.
Sperussola 244.
Sperussolín 244.
Spezza-fier 507.
Spia da Nottuan 40.
» de Nottoan 289.
» de Nuttuan 279.
» dee Quagie 305.
» di Ortùlan 305.
Spigosòn 245.
Spigozzin 197.
Spilorso 295.
Spingiuni 539.
» muntagnolu 539.
Spinso 539.
» imperiale 539.
Spinsidd 510.
» papalino 510.
Spinzu 530.
Spioncello 440.
Spions 116.
» dè la larga 116.
Spiplina 265.
Spipola 265.
Spiriticchiu 563.
Spirlo 637.
Spiune 535.
Spolleca voie 497.
Sporca-painoni 486.
Sporciglione 482.
» piccolo 482.
Sprucavoi 592.
Spunta calocchie 346.
Spuntascebi 587.
Spurru 587.
» russu 587.
Spunzuni 552, 583.
» bárbarisu 552.
» imperiali 553.
Spurcido 410.
Spuntamaruggiu 571.
Squaiard 69.

Digitized by Google

Squaiardóla 241.
Squajardola 182, 253.
Squarcio 180.
Squartasatt 119.
Squarúsola 242.
Squassacoa 175.
Squerussolo 176.
» moro 176.
Squerussolon de montagna 176.
Staccola 611.
» de monte a peis arrubius 611.
Staccaterra 613.
Stampacresuras 616.
Stapazina 420.
Starna 63, 73, 313, 331, 351, 396, 409, 431, 448, 482, 487, 491, 522, 534, 543.
» stipajola 396.
Starnotta 500.
Starnotto imperiale 535.
Steila d' or 6, 7.
Steinvogel 70.
Steli 118.
Stelin 71, 107, 160, 176, 183, 208.
» dal mostacio 176.
» picolo 183.
Stólin 208.
Stelin 223.
Stelletin 107.
Stellin 59, 129, 251.
Stellin 244.
Sterla 284.
Sterlacca 276.
Sterna 294.
Stérna 44.
Sternagnola 347.
Sterpazzola 322, 323, 347, 368, 402.
Sterpazzolina 322.
Stiaccino 322, 344.
Stiaccione 320, 371, 444.
Stiattaione 344.
Stiattajone 427.
Stiattardo 427.
Stipaiuola 347.
Stipajola 324.
Stomi bleu 6.
Storázli 211.
Storcicollo 414, 487.
Stórdeola 321, 322.
Storela 181, 256.
» de campanil 211.
Storéla 211, 246.
» piccola 211.
Storcicollo 319.
Stori biancu 620.
» de pisci 221.
» de sa puliga 620.
Storittu 621.
» biancu 620.
Stórlo 253.
Storlo color de rosa 253.
Storn rèusa 40.
Stornarolo 482.
Storneddu 611.
Stornel 115.
Stornél 203.
Stornell 55, 69, 157.
» rosa 157.
Stornèlo 240.
Stornin 69, 71.
» de tor 69.
Storno 40, 319, 343, 362, 390, 399, 419, 426, 437, 453, 475, 485.
» marino 319, 438, 475.
Stornoûn 132.
Storsacol 8.
Stortacheul 72.
Stortacol 72, 108.
Stortacoll 62, 130, 161.
Storzacheul 72.
Storzicol 177, 255.
Storzicolo 181.
Storzicóllo 245.
Stourn 3.
Stournel 369.
» d' mariñe 3.
Stournell 127.
Stoûrnell 55.
Strabúsine 247.
Strabúso 247.
Straccacaccia 576.
Stragazza 60, 71, 160.
» cita 71.
» grisa 71.
» grossa 71.
» molinara 60.
» molinera 71.
Stragazzetta 129.
Stragazzon 60, 71.
Stragazzoûn 129.
Strallera 624.
» bianca 624.
Strapassua 289.
Strapássua 40.
Strapozéto 251.
Strapozzeto 259.
Strelacchina 476.
Strellacchina 476.
Stria bianca 620.
» groga 620.
Stridulu 530.
Strillin 285.
Strillo 476.
Strilózo 241.
Strilozzo 314, 390, 400, 420, 439, 453, 485.
Striolo 182.
Striólo 240.
Strisciaiuola 345, 366.
Strisciajola 321, 391, 440.
Striveri 574.
Strolaga 336, 380, 397, 413, 452.
Strolaghina 336.
Stronello 40.
Stroubioun 5.
Struddu 611.
Strulacchio 494.
Strûlo 240.
Strullo 195.
Strupparella di maggio 478.
» di monte 478.
» di settembre 478.
Strureddu 611.
Stur 72.
Sturlenga 306.
Sturneddu 552, 566, 582.
» di passa 582.
Sturneddu niuru 583.
» paisanu cu pizzu giarnu 583.
Sturnejo 539.
Sturnell 104, 232.
Sturnèll 218.
Sturnello 271, 288.
Sturnèo 302.
Sturnieddu 570, 601.
» di passa 570.
» niru 601.
Sturniellu 530.
Sturno 489, 493, 506, 539.
» rosa 493.
Sturnu 552, 611.
» di passa 552.
» pintu 611.
» russo 552.
Sturru giajulau 611.
» nieddu 611.
» picchiettatu 611.
» pintu 611.
Stûrzapridi 636.
Suasso 413, 452.
» piccolo 452.
Subiareul 11.
Subiarola 5.
Subiot 5, 69, 204.
Sublót 204.
Subioto 182, 253.
Subióto 204.
Succiacapre 444.
Sulitariu 552, 615.
» coa de fogu 615.
Sumbuzzature picciulu 536.
Sumbuzzaturi 544.
Summuzzariello 500.
Surciteddu 596.
Susinello 265.
Susino 265.
Suttacquin 45.
Svasso 380, 413, 482.
» grosso 482.
» piccolo 380.
Sverzarin 175.
Sverzelin 232.
Sverzellin 55.
Sverzellino 363.
Sverzeri 116.
Sverzerin 104.
Sverzerin 240.
Sverzùl 219.
Svetta 62.
Svit-svit 70.

T

Taccaterra 613.
Taccola 127, 157, 319, 437.
Tacola 115.
Tacula 610.
Tadorna 498.
Tagliaforbice 496.
Taliano 333.
Tallurino 352, 396, 410, 423, 449.
Taloch bianco 204.
Talóch 208.
» bianco 203.
» griso 208.
» ross 203.
Tanabûs 130.
Tantalo 291.
Tarabus 162, 237.
Tarabús 226.

Digitized by Google

Tarabús 212.
» dalle ongie col peten 212.
Tarabusèt 212.
Tarabusino 350.
Tarabuso 185, 256, 350, 395.
Tarabúso 212, 247.
» zhenerin 212.
Taragn 106, 159.
Taragneul 71.
Taragnóla 250.
Taranu 623.
Tarasega 204.
Tariga 10.
Tarin 4.
» d' mar 4.
» » peit 4.
Tartagin 184, 255.
Tartagin 245.
Taschet 7.
Tataniedd 526.
Taureddu 526.
Teccola 376.
Terén-na 40.
Terragnola 494, 509.
Terrajola 613.
Terraja 613.
Terraiolo 635.
Terreina 289.
Terzetola marzarola 520.
» vernile 520.
Terzina 542.
Testa bleu 7.
» di turcu 575.
» gatto 293.
» grossa 588.
» » cinirina 588.
» negra 307.
» neigra 280, 290.
» » montagninha 280.
» neira 7.
» nigra 510.
» -nira 556.
» niura 604.
» niviredda 571.
» rossa 312, 558.
» -rossa picciridda 558.
» russa 588.
» -russa 556.
Testagatto 43.
Testaneigra 41.
Testanera 478.
» d'inverno 478.
Testin d' oo 308.
» d' ou 42, 291.
Teston 45.
Testonotto 45, 295.
Tötă rais 116.
Tetavace 209.
Tetavache 177, 209.
Tetaváche 245.
Tettavacc 72, 161, 310.
Tettacavre 184.
Tidori 625.
Tignusu 574.
Tiroli-Tiroli 378.
Tirolino 499.
» romano 499.
Tiruli 544.
Tiruni 575.
Tiruni 552.
Tistazza cinnirina 558.
» griscia 588.
Tistuni 588.
Todeschin 129.
Tomio 421.
Tomireula 113.
Topi de mata 616, 617.
Topino 349, 371, 405.
Torcicollo 372, 405, 422, 429, 480.
Tord 265.
Tordano 634.
Tordea 489, 495.
» piccola 495.
Tordeca 512.
Tordeja 290.
» corsesca 290.
Tordela 346, 367, 392, 402, 421, 428, 440.
» alpigina 440.
» fôrestiera 346.
Tordella 477.
» gaggiara 477.
Tordèna 306.
Tordessa 454.
Tordiera 346.
Tordin 206.
Tordin 242.
Tordina 70, 175, 182, 205, 401.
Tordina 241.
» foresta 241.
Tordino 345, 421, 439, 486.
Tordo 242, 254, 306, 322, 346, 367, 392, 402, 428, 454, 477, 486.
» alpigino 440.
» alpino 428.
» bottaccio 346, 367.
» bottaio 392.
» ciach 206.
» cisilin 242.
» cua russa 306.
» d' acqua 478.
» da ua 176, 183, 196, 206, 254.
» da úa 242.
» dalla colaina 206.
» dalla colana 206.
» della coa negra 206.
» fassán 206.
» gaggiaro 477.
» gajér 206.
» gaión 206.
» gazan 183.
» gazaro 254.
» gazáro 242.
» gazhér 206.
» gazoto 176.
» gazzaro 196.
» grosso 367.
» maggiore 440.
» main 310.
» marino 326, 349, 391, 420, 430, 440.
» negro 206.
» piccolo 367.
» reale 346.
» sassello 367.
» siselin 183.
» smarér 206.
» spinaról 242.
» zheselin 206.
» zhisilót 206.
» zhit 206.
Tordol 206.
Torgicollo 349, 372.
Torod 70.
Torsacol 8.
Torsicollo 282.
Tortoèla 313.
Tortoin 315.
Tortola 351, 376, 423, 456.
» boscajola 448.
Tortora 119, 185, 197, 213, 257, 331, 351, 396, 409, 423, 430, 482, 491, 521, 625.
» salvadega 177.
» selvatica 376.
Tòrtora 376.
Tórtora 218.
» salvádega 218.
Tortorela 213.
Tortorele 238.
Tortorèle 227.
Tortorella 275, 487, 498.
Tortorina 267.
Totanéll 228.
Totanélo 250.
Totanin 185, 258.
Totano 258.
Totáno 250.
Tótano bastardo 250.
» moro 250.
» muto 250.
» negro 250.
Tòtanon 250.
Totanón 250.
Tòtul 228.
Toumboulot 12.
Tourd 5.
» chilour 5.
» subioulin 5.
Tourdenia 41.
Tourtora 131.
Tourtorella 131.
Tourtoula 10.
Tourtoura 10.
» salvadiga 73.
Tourtula selvadig 73.
Trabucchella 329.
Trabucco 329.
Traciola 5.
Tramontanéla 250.
Tramontano 319.
Trasola 4.
» grisa 4.
Travacola 132.
Tre-tari 504.
Tre-tre 207.
Tremacoua 128.
Tremacouva 70.
Tremacôva 57.
Tremacua 70.
» del cap neigro 70.
» giana 70.
Trementin 182.
Trenta coste 256.
» pés 106.
Tretacinche 496.
Trentacingliris 233.
Trentecoste 185.
Trentacóste 247.
Trentarola 71.
Trentin 164.
Tresso 247.
Tridente 520.
Triorva 591.
Trisciungulo 518.

Digitized by Google

Tritari 608.
Triugna 596.
Triugni 575.
Trizzetta 568.
Trizzine 634.
Trizzotta 608.
Troumboun 10.
Trozzu 586.
Trodu 615.
» culumbinu 615.
» de macia 615.
» piticu 615.
Trudus 615.
Trullora 439.
Tuduni 595, 608.
Tuffella 499.
Tuffetto 336, 380, 397, 452.
Tuffolino 413.
Tufin 316.
Tui 58.
Tui 118.
» bianch 118.
» verd 118.
» zald 118.
Tuin 58, 106, 129, 159, 242.
Tuina 421.
Tuinot 118, 159.
Tuio 207.
Tuit 71, 106.
Tumalosoru 576.
Tummalora 565.
» di li rossi 565.
Tuon 163.
Tuoun 131.
Tupinet 7.
Tupputa 489.
Turchiato 498.
Turd 106, 512.
» spinard 106.
» zir 512.
Turda 530, 540.
Turdinera 525.
Turdino 510, 526.
Turdo 41, 290, 499.
» corsin 290.
» côrso 280.
» nostrâ 280.
» sarvaego 291.
Turdu 586, 603, 615.
» colori de ceuisciu 615.
» culumbinu 615.
» di passa 603.
» russu 603.
Turdulicia 540.
Turduinna 294.
Turli di terra 522.
Turli 526.
Tûrli 105.
Turlo 70, 128.
Tûrlo 158.
Turriazzolu 564.
» di jaddazzi 564.
Turriazzu 564.
Turrottu 543.
Turtua 284.
Túrtua 44.
Turtura 109, 534, 543, 562, 575, 595, 608.
Turturaru 541, 559, 573.
» tupputu 559, 573.
Turturi de mari 626.
Tus 9.
Tutù 11.
Tuvittula 585.

U

Ualanicchio 513.
Ucsel bel verdo 326.
» Santa Maria 326, 349, 372, 394, 422, 430, 444.
Uccello bello 541.
» belverde 480.
» del diavolo 486.
» della neve 393.
» muratore 455.
» turco 455.
Ucièl biel verd 225.
Uciell de bile creste 236.
Ugion 71.
Uitatt 220, 233.
Uite 220, 233.
Uitt 234.
Uitt 222.
Ungaresin 59.
Uocchio cotto 499.
Upa 72.
Upupa 130, 245.
Urgananti 567.
Uscell' dal frecc 60.
Usel d' jeux couleur ciel 71.
» dla Madona 71.
» vespee 161.
Usell ad la Madona 59.
» de la nef 104.
» legoratt 132, 164.
Useo Santa Maria 310.
Useo smenièo 310.
Usignolo 54, 346, 392, 421, 454, 486, 490.
Usignólo 242.
Usignùolo 512.
Uslin dal testin gialò 71.
Uslin dal fred 266.
Ussarin 129.
Ussarin 244.
Usserin 160.
Uvaredda di margi 563.

V

Vaca grossa 108.
Vaccherina 70.
Vaddaranu 567.
Vainetta 5.
Vanett 64, 164.
Vanetta 11, 132.
Vardarolu 612.
Variul 237.
Varvaianni 590.
Varvajanni 532, 606.
Varzia bianca 619.
» de' monti 619.
Vastrica 404.
» a collo rosso 404.
» colombina 404.
Vecchia 563.
Vedidore 621, 622.
Vedovella 499.
Velia 429, 433.
» capirossa 370.
» cenerina 370.
» comune 370.
Velia gazzina 370.
» rossa 443.
Verda 204.
» bella 204.
» brutta 204.
Verdarolu 612.
Verdatero 525.
Verdello 419, 428.
Verdogn 69.
Verdolin 69, 158, 182.
Verdon 104, 182. 195, 240.
Verdón 40.
Verdôn 55.
Verdone 319, 334, 363, 400, 438, 453, 475, 485, 507, 633.
» bastardo 364.
Verdosin 128.
Verdoun 469.
Verdoûn 128.
Verdun 278, 288, 303.
Verrou 3.
Verzaina 476.
Verzellin 55.
Verzellino 475, 485.
Vesparolo 256.
Vétola 250.
Vì-Vì 285.
Viatara 185, 257.
Viatára 248, 249.
Vicenza 500.
Viduetta 295.
Vidul 226, 230, 237.
Vignigniuolo 605.
Vina 70.
Vinaccina 69.
Vinascina 56.
Virafeuje 4.
Virdeddu 556, 557.
» jancu 556.
Virdejuzzu 540.
Virdidduni 556, 557.
Virdune 530.
Virduni 539, 553, 570, 583, 602.
Virziola 553.
Viscarda 57, 70, 106, 112, 159.
Viscera 117.
Vispisa 566, 585, 603.
» di primavera 570.
» di sciumi 603.
» giarna 603.
» janca 570.
Vispisedda 570, 603.
Vit-Vit 56.
Vitaruolo 489.
Vitounetta 6.
Vitt-Vitt 57.
Volababi 8.
Volanara 495.
Volanella 495.
Voulet 11.
Vòli di bo 228.
Vollaro 496.
Volpeca 330, 481.
Voltapietre 333.
Voltaprie 295.
Voltolino 352, 396, 499.
» piccolo 352.
Vujarottu 599, 609.
Vuota borse 334.
» -borse 379, 397.
Vuturazzu 560.

Digitized by Google

Vuturu 560, 606.
Vurzittulu 572.

Z

Zairo 507.
Zalét 207.
Zaléte 243.
Zaléto 243.
Zanevron 234.
Zaranto 210.
Zelega 264.
» grossa 182.
» piccola 182.
Zeleghetta 195.
» meglarola 182.
Zéllécchia 502.
Zenevron 234.
Zenevrôn 221.
Zenzella 494.
Zerpignola 208.
Zevardiello 494.
Zharánt 203.
Zhavátol 203.
Zhavátul 218.
Zhedron 213.
Zhelega 209.
Zheránt 203.
Zhicogna 212.
Zhilega 203.
Zhiliga 209.
» de razha grande 203,
Zhilighéta 203.
Zhiligót 203.
Zhimal 207.
Zhimalét 207.
Zhiria 209.
Zhisila 209.
Zhisilon de mar 214.
Zhit 205.
» -gnoch 204.
Zhiton 205.
Zhiveta 210.
» da croda 210.
Zhivtu da croda 210.
Zhivitón 210.
Zhoéta 210.
Zhorla 202.
» dal bech ross 203.
» » » zal 202.
Zhuit 207.
Zhuita 210.
» da campagna 210.
Zhurla 202, 203.
Zia 4, 241, 248.
Ziato 241.
Zicco 494.
Zietta 158.
Zif 159.
Ziffolot 56, 69.
Zifolott 128.
Zifotola 176.
Zigno 247.
Zigola 182, 427.
Zigolino 344.
Zigolo 320, 344, 390, 391, 400, 454.
» giallo 364, 390, 420, 427, 439.
» muciatto 344, 365.
» mugiatto 365.
» nero 364, 427.
» rugginoso 476.
Zii 69.
Ziinu 553.
Zinni 533.
Zinzella 401.
Zio 584.
Ziola 476.
» d' acqua 476.
» montanara 476.
Ziott 128.
Ziofin 128.
Zip 69.
» -zip 69.
Zipp 56, 57, 105, 233.
Zippar 57.
Zipper 129.
Zippiloca 519.
Ziria 320.
» gialla 320.
» muciatta 320.
» nera 320.
Zisi 4.
Ziulu 553, 584.
» cinnirinu 553.
» di pantanu 553.
» gialinu 553.
» giarnu 584.
» svariu 553.
Ziulu testa nira 553.
Zivedda coddu russu 554.
» di pantanu 554.
Ziverino 633.
Ziveta 177, 184.
Zivetta 267.
Zividduni 554.
Zivineddu 587.
Zivola 485.
Zivula 602.
» di muntagna 602.
Zivulu 584.
» di pantano 584.
Zizi 584.
Zoeta 184, 245.
Zonca 620.
Zotero 496.
Zufolott 69.
Zufolotto 364.
Zuinu 553, 570, 583.
Zuit 71.
Zurla 202.
» dal bech ross 202.
Zurlichéto 249.
Zurruliota 628.
Zurrullu 617.
» conca Molenti 626.
» de l' spiaggia 627.
» de mari a cannacca 626.
Zurrullutedda 627.
Zuvinu 583.

Digitized by Google

Digitized by Google

ERRATA-CORRIGE.

PARTE PRIMA.

Pagina	*Linea*	*Errata*	*Corrige*
332	6	DRYCOPUS	DRYOCOPUS
348	26 e 27	? Pavoni africani, ? Pavone africano	. . . . . (cancellato)
349	5	id. id.	. . . . . »
481	23	Fassine	Frassine
505	26	COLUMBIA	COLUMBA
545	30	non è comune	di passo non regolare
569	31	Stamiano	Starniano
577	4	Boün	Bolin
588	3	Bigio ferro	Grigio ferro
608	29, 30	Portoferraio, Elba	Firenze, sull' Arno

PARTE SECONDA.

51	20	*Agrodroma*	*Corydalla*
171	24	*Otus vulgaris*	*Asio Otus*
211	37	*Ardea Garzetta*	*Egretta Garzetta*
235	26	*Cyanistes cyaneus*	*Cyanistes cyanus*
219	27	*Himantopus Ostralegus*	*Haematopus Ostralegus*

Digitized by Google

Digitized by Google

AGGIUNTE.

PARTE PRIMA.

Pagina	*Linea*	*Aggiungi*
422	10	— Billo marino (*Alberese*, *Maremma*).
444	25	— Pavoni africani (*Sesto fior.*) — Pavone affricano (*Casentino*).

PARTE SECONDA.

472	28	**MARCHE.**

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

This book should be returned to the Library on or before the last dat stamped below.

A fine of five cents a day is incurr by retaining it beyond the specifi time.

Please return promptly.

Digitized by Google